

幼
幼
新
書

重刻幼幼新書序

上古聖人其視黔黎真若一體稍得其所以生者即思去其所以害生者以故炎帝甫制耒耜教民對執

而五穀之外百藥性味之
所宜與對治之法君臣佐
使之用即繼之黃帝之堊
其人甫息肩于兵革即憂
其灾厲沴疾而岐紫之術

顯彼其一日而不能忘衛
民之生也如此然聖人之
于民老老幼幼寧有二觀
且必自幼而壯而後老而
至于幼幼之術抑何其簡

略不備哲也至秦越人之
遊秦以其地賢小兒始為
盧顗醫而張仲景之高弟
衛汎衍其方而得一卷已
爾若夫倉公華佗徐氏父

子之術神矣而未有稱及
幼幼者何也豈聖人之仁
其心思尚有所不及而三
代之民不甚愛其子耶將
無風氣樸茂所得于先天

者不薄而天札之慮少故
也然自余之生長閭里間
耳目所覩見人之生以日
計而得全者十不能七也
以月計而得全者十不能

八也以歲計而得全者多
矣然痘癰瘰之則十又不
能六也夫痘疹于幼為甚
危而醫之于方絕不及者
何也或曰其症不起唐以

前第不知所繇始攷之前
史備載人貌之妍醜正偏
猷不言疹靨其然哉夫勇
者之為疾非若壯而老者
之有七情五欲集心勞形

以為罔其感也不煩而治
之若稍易然既不能自名
其所苦與所繇病狀欲以
方寸之指而察其脉則甚
難天下之為人父以律為

人子者之情則老者差急
而少者差緩然以事理論
則老者所必至而少者尤
摧闕而可憫用是而觀凡
唐宋之際有能究顓顓及

痘癰諸方證而筆之書者
其人不必聖人而其用心
與操術則聖人也宋故有
幼幼新書長沙劉帥託叢
爲方者王曆王湜萃諸方

而詮次之而李康為之序
者也凡三百餘季而書箴
佚不備吾覲之精于醫者
陳履端氏奉其父之遺意
求之二十餘年而始得其

全念其傳之弗廣也訂其
誤刪其複而手書之以授
梓人於戲若履端者不亦
聖人之徒也哉竊聞之

主上高拱淵穆日勤思元

元卹災賜租必欲使斯壘
登仁壽之域而後愉快然
則是書行其所以陰翊王
政不淺也是故感而為序
之

嘉議大夫南京刑部右侍
郎予告瑯琊王世貞謨

重刻幼幼新書序

夫醫之道難言也其原稽之五
運六氣而論衛氣以二十八星
房昴為緯虛張為經奎壁角亢
則其門戶也又推之太乙移天五

帝之所司鬼神之與幽此聖人
之能事而豈今之所論乎普之
喜方者太倉公自言其所授出
公孫光陽慶始甚秘必精謹始
肯傳然經脉言小兒者尤鮮也

惟官能言嬰兒病頭毛逆上者
不全一言耳及扁鵲入秦爲兒
醫則固有其術哉漢以來乃無
其書豈盡載他方中耶曹魏後
漸著矣江左有俞氏療小兒方

徐升嚮療少小百病方逮療少
小雜方又療少小疹方范氏療
小兒襍方王末療小兒襍方小
兒經方徐氏少小方療小兒丹
法皆自晉以來傳梁大清樓所

列也唐以後書不能盡舉顧今
竝不存雖宋劉湖南書尚亡洪
陳子得之如此其艱也夫少小者
雖云生長之易然氣猶舍而未
充故云荻莢也凡物根莢之萌

唯在所滋植之辟豫章之始芽
藥也搔之不勝逮其長也而後
能勝震陵之風雨則夫幼幼者
經方藥論可不備陳哉且幼之
病病者無窮而醫之論病者莫

盡剝血營猶淖筋節尚柔脉
之不可究尋止以形氣色澤毛
革決之其凝泣之端淺深之候
順逆之變少多之喻虛實之殊
過不及之分迎奪之用合離之

辨所謂拙者以不足巧者以有
餘是尤不可以盡言也且人知少
者始之病疹也似同而終之所傳
化也不測醫之始授也似易而卒
之所取驗也甚微謂攻之可使疾

去者而不知毋伐其和取之于毫
芒而失之于千里以為養長之者
而其入愈深至不可療是何其相
鑿之甚也而以為其初未始殊故
陳子類之百數十門者古所謂如

迎浮雲如窺深淵殆猶未耶若瘡
疹者尤幼少所以係死生也謂古
或未有者張鷟陳澤不以面乎
唐人所謂麻胡與黑靨巨胡將
無是耶然胡迺不患故不敢深

犯我者是以地耶則古今之變又
安可窮者大要發之以至於痴而
晚若苗之秀以實乎必若內則之
言致謹於閨門衽席間眎聽飲
食盡所謂胎教者必無患矣是

其爲十全之禁方哉宋以來吳
之專家者曰陳曰錢二氏陳以
熱錢以涼故有火與冰喻者今
二家漸歇而書猶出自錢則其
源緒可推而金陵之陳自枳田

益盛陳子傳父學而參以衆家
尤精良有驗四方來謁藥者恒
滿若是書求之累年不置為之
分析條其義與所授各有宜其
解悟得之性手敏心調特以神

遇之而猶必本之方所載可謂不
輕用矣予固好數意尤善之予所
聞五驗曰敷和升明備化審平靜
順此醫之大旨也少小方當不易
此屬銀梓且完為書此列其

端

賜進士河南按察司僉事

晉階朝列大夫前監察御史

沛國劉鳳撰

始平馮時範書

吳郡車樊之別

校刊幼幼新書序

友人陳子履端校輯幼幼新書既就緒復手
自繕寫付梓應文閱之而深有感焉夫人之
所病病疾多而醫之所病病道少方書之切
於世用也尚矣矧嬰兒質特脆而語未達調
治為艱又古方之傳者獨鮮宜陳子之悉力

購求而殫精刊定也其為病者謀為治病者
謀可謂均無憾也已抑醫之能十全也不專
在方方不足則患夫少筭而不勝方有餘則
患夫多岐而易惑欲其不乖於方而不泥於
方也必也運量於一心乎傳曰如保赤子心
誠求之雖不中不遠矣語天下之無所不用

其心孰如父母之愛子者善醫者果能以衆
父母心為吾心即隨時審症處方授藥採摭
損益動中機宜必能通其不能言之意而奏
彼不世出之功雖古方所未教者咸可裁自
一心而授之罔向靡不如意也奚但顛顛一
科擅神聖功巧哉推是心也而視人親若吾

親則過雒陽而即為耳目痺醫可也憫匹夫
正婦弗獲其所則過邯鄲而即為帶下醫可
也舉同類之痺疴疾痛者而皆孩之雖醫國
醫天下者且將就而問道焉而況呱呱襁褓
者疇不長育於寸衷之惻怛耶然則新書四
十卷而一言以蔽之者豈他物也且夫世所

急願治而醫所不易治者皆以嬰兒所苦爲
最甚或者邂逅此際而一念稍差於是乎見
鼎盛家而爲貪求心見下劣家而有輕忽心
若然者其胸次已先自亂矣縱有禁方五車
誰復能決擇而善用之乎故嘗謂業醫者活
人之心不可無而自私之心不可有未醫彼

病先醫我心夫然後可與斟酌變化握道樞
以應無窮而幼幼之書始不爲紙上陳言已
矣陳君君子長者也仁慈一脈既紹松田先
生之家學而早歲習儒中歲奉釋其滋培夫
心地者尤有素所謂不可無之心幾備而不
可有之心幾泯焉者其究心是編也雖曰載

籍極博以愚觀之皆若妙明心之註脚云爾
噫嘻愚更有叩於君君方刊布新書而復叅
尋內典內典所謂有奴藥王名阿伽陀遍治
衆病者此非特新書未載蓋自炎帝所嘗軒
帝所問尚秘焉以此幼幼奚啻十金即萬金
不足道也第不知其藥之貌象若何君試拈

出與宇宙間精於醫者共識之

萬曆十有四年歲在丙戌秋九月之望日巢
居子張應文著并書

幼幼新書古序

門人左迪功郎潭州湘潭縣尉主管學事巡
捉私茶鹽礬李庚

醫家方論其傳尚矣自有書契以來雖三墳之言世
不得見而神農本草黃帝內經乃與宓犧氏之八卦
綿歷今古爛然如日星昭垂信乎藥石不可闕於人
而醫書尤不可廢於天下或者乃謂醫特意耳不庸
著書唐史臣以此劇口稱道於許嗣宗殊不知張仲
景孫思邈輩率千百年而得一人使其方劑之書不

傳則醫之道或幾於熄矣是或一偏之論也

湖南帥潮陽劉公鎮拊之暇尤善方書每患小兒疾苦不惟世無良醫且無全書孩抱中物不幸而殞於庸人之手者其可勝計因取古聖賢方論與夫近世聞人家傳下至醫工技工之禁方閭巷小夫已試之秘訣無不曲意尋訪兼收並錄命幹辦公事王曆義道主其事鄉貢進士王湜子是編其書雖其間取方或失之詳立論或失之俗要之皆因仍舊文不敢輒加竄定越一年而書始成惜乎公未及見而疾不起

公臨終顧謂庚曰幼幼新書未有序引邇來欲自爲之今不皇及矣子其爲我成之庚曰謹聞命嗚呼學士大夫公天下以爲心者幾何人哉平日處念積慮無非急已而緩人先親而後疎物我異觀私爲町畦其來蓋非一日昔吾夫子助祭於蜡出游魯觀之上喟然發嘆以爲大道之行天下以爲公故人不獨親其親不獨子其子大道旣隱天下爲家各親其親各子其子夫子之嘆蓋嘆魯也然而天下後世豈止一魯而已哉滔滔者皆是也東漢人物如第五倫者悃

幅無譁質直好義似若可然也意其設心必有大過
人者至於或人問之以有私乎倫則曰吾兄之子嘗
病一夜十往退而安寢吾子有疾雖不省視終夕不
寐自以謂不能無私夫以兄之子尚若爾況他人之
子乎以第五倫尚若爾況下倫一等者乎宜乎夫子
之嘆之也今公之爲是書使天下之爲父兄者舉無
子弟之戚少有所養老有所終家藏此書交相授受
慶源無窮其爲利顧不博哉以此知公之存心非特
無愧於今之人抑亦無愧於古之人矣紹興二十年

九月幾望謹序

重刻幼幼新書叙

醫兵也小兒病弱國幼主被敵也質柔脆易侵難禁
且不能自達難測而易起疑故治小兒病輔弱國扶
幼主而禦強敵也不有祖述即山甫方村不免浪戰
即勝猶幸况不勝乎宋本幼幼新書心保赤子具本
具末具變悉中冓縈得呂牙孫武制勝合變之玄機
誠醫家韜鈴之選也板經兵火亡失已久印本世唯
存二一留中秘遠不可得一屬錢氏閔不可求端
世幼科傳自白下先子枳田痛嬰兒多抱期頤而夭

襁褓宏修前學斬斬若不逮構得一二端髫時捧讀
心慕更求無獲而錢氏故本轉歸雲間顧研山氏端
因黃清甫河水爲介紹懷資偕某懇得之與某各藏
其半顧本合南北宋板復缺三卷有奇端神祈廣詢
一恒徐永錫氏有質本抄得其金玉菴楊大潤氏欲
抄而索之某竟秘以烈焰辭閱歲徐本歸古歛程大
綱氏復往抄之始獲觀全帙深慰天幸且筆且讀領
其要畧會見壺醫傷寒家無分七熱風食輒以傷寒
治問之曰不爾何以身熱如炙也疳積家無分五疳

蟲食積聚輒以疳積治問之曰不爾何以面黃腹脹
肌羸也驚悸家無今痘疹癰疽風痰魃厥悉以驚風
治問之曰不爾何以涎潮搐搦戴目也昧日用偏仁
智治多天闕目擊其弊知不可戶曉也鄙心惻然欲
以書傳布而廣濟之載易寒暑刪繁理亂裁初本十
之三稿凡四易卷四十總五百四十七門便簡閱也
傾貲採梓數字償值手錄授工首事兩月食木者六
之一同志如某者雜以力助完卷可冀庶乎家世者
不至襲醫名而妄投崛起者不至無章程而杜誤師

門授受不至秘而不傳使人人祖述病者起生者延
天者壽仁術廣開惠澤宏溥遠宗作者之謨近繼先
子之志一生苦心盡是矣雖然病有機變方貴合宜
運用之妙存乎一心書猶筌蹄也亦猶兵家時日異
宜戎蠻異性器械坐作巨膠柱也尤有進焉大率腦
麝牛黃爰暨石藥悍劑皆不可輕用醫家每以細利
而重投病家每因慕名而甘戀不知厚味一進引寇
入肝脾心臟牢不可拔遂為兒異日害雖鵠緩莫能
施其術此又世之大戒也故更以鄙見擬別錄本草

輔之見古方不可執一云

萬曆十四年太歲丙戌端陽日古吳陳履端謹序

幼幼新書

凡例

一原初

此書議論悉中肯綮凡遇一病具本具末具
變故病名甚夥顧顧經以後是書以前盡皆
編入降是幼科諸書若百問類萃集成等多
不過四五冊然是書為幼第一全書但卷
帙浩繁工未易集方論重複觀者起厭未有
專刻者

一古序

序云取方失之詳立論失之俗要之皆因仍
舊文不敢輒加竄定以此卷帙繁冗端極知
僭妄盡加筆削撮要刪繁期于便覽獨于本
旨則毫不敢失云

一參考

宋演山省翁曰潭州周宅廣取其文編集幼
幼新書四十卷排列名方似涉繁碎猶如元
帥欲以一箭退伏兵定太平求選善射一夫

百萬軍衆皆張弧矢以待以較臨機對壘檢閱較審正猶關而鑄兵夫萬軍皆張弧矢則一箭雙雕下者固衆而不中紅心者亦多以是故就中稍加去取若必無益而有害者皆削去合于時者存之至若論議可否並載以待觀者自裁止于章句加筆削云耳

一正記

第四卷將護小兒法門保衛鞠育章云衛白之天五杜風池之邪白即古顛字衛白之天

五疑當作衛顓顓之天夫此書雖王曆王湜
所編想劉帥病革後止完三十八卷餘皆潦
草以完故事未經對訂故此類甚多中亦有
文脉相斷者悉用鄙意恭定改政

一存疑

第七卷驚啼門千金翼方用阿伽佗藥此在
釋典華嚴經第七十八卷入法界品彌勒菩
薩告善財童子云菩提心者如阿伽佗藥能
令無病永安隱故則知阿伽陀之一味或佛

之寓言表理或竺軋實有是藥但震旦從來
所無千金翼之意蓋特謂驚啼之證天意人
事相半儻非藥石所能療者醫家病家皆須
發菩提心即福德陰佑庶幾嬰兒自安乎至
若疲啼門睡洪散用佛花下註云即毘陀羅
華則此品本出法華經云天雨摩訶毘陀羅
華註為大白華斯乃天中之天將說諸佛並
尊以一大事因緣出現于世故天帝先現奇
祥尚非人寰所有况東土哉今以此境白花

結子號風茄者文以美名權充之不啻優孟之效孫叔敖耳然既與乳香朱砂麝香共劑想能安神止啼則指物而非譚理却與阿伽陀例不同又按華嚴經所論一菩提心而所喻百千端只藥部中有名善見者能除一切病有名無畏者離五恐怖有名摩訶應伽者毒蛇聞氣遠去有云毗笈摩者毒箭自然墮落此皆事理兼帶不可思議因茲想像佛之法藥豈但區區愈人四大病已耶

一刪繁

書既未經竄定方皆排列則其繁處頗多或一章盡合全刪或章中句有繁者刪或句中
字有繁者刪悉皆刪以就簡別削章削句削
字例具後

一理亂

如第三卷秘要指迷具人面部穴前總一圖
後列八圖每圖各于五官寫穴并色及見證
殊覺紊亂難觀今總一圖先于某處填某穴

以便觀者知某部位後即細開頭顙印堂太陽山根眉為一項面臉為一項眼目眩睛為一項耳聾人中為一項口唇承漿為一項細開某處見某色主某證主吉凶

一去複

如第三卷病原門止宜列病名并致病之由如五疳止宜直書名目莊氏五疳歌細分某疳見某病証此病證形候門事不宜在病原門然病証形候門水鑑五疳歌與病原門莊

氏五疇歌持三五句異今病形候門以水鑑
為主而莊氏同者削去異者悉分行註于下
餘倣此

一就便

第二卷三關錦紋門載八段錦脉形論歌水
鑑楊大鄴莊氏各為一宗而圖文不異頭緒
既繁觀者不便今總為八圖每圖下以水鑑
為主而楊大鄴莊氏與水鑑同者削去異者
分行註下餘倣此

一削車

第一卷求子方論門第一條云周南國風采芣苢后妃之美也和平則頌人樂而有子王氏以采芣為藥使人有子爾雅云采芣馬舄車前也夫立言以經為首固邇其本原然不切方論削之餘倣此

一削句

第一卷求子方論門第二條千金論求子必得下有若其本命五行相剋及與刑殺衝破

并在子休癯死墓中者則求子了不可得慎
無措意此數語與前當知夫婦本命五行相
生與德合等數語特相反耳今于求子必得
下着一不然字接下縱或得之終亦累人而
于若其本命五行相剋數語削去餘倣此

一削字

第一卷求子方論千金雜禁忌法削雜法二
字聖惠人無子條若墳墓不嗣年命相剋此
二者非藥能益削不嗣相剋此二者數字餘

倣此

一定方

古方與今方不殊豈人不同歟亦氣有厚薄也尚論古人漢世啗玉唐人餐石宋去唐不遠石藥未盡除方今氣漓雖草根樹皮不可輕用故人參養命藥也食之令人飽悶多致不救况其他乎故用藥者固宜慎觀書者尤當酌

一削方

古方多用金銀屑水銀輕粉硃等夫以腦麝
石藥尚不宜輕用况此輩乎哉存而不削甚
惑初學今皆刪去其或存一二者因病瀕死
萬一得中幸而獲全差有愈于死耳觀者審
之

一酌方

首卷千金白薇丸與聖惠白薇丸方同少有
不同者于千金方下書聖惠少石膏等多莖
蒲千金柏子仁丸與聖惠柏子仁丸亦此例

若干金秦梲丸與聖惠秦梲丸藥品一味不殊則削聖惠方餘倣此

一補遺

湯飲丸散如第三卷云益黃散見胃氣不和門當在第二十一卷第九門中求之下云瀉青丸見驚熱門而不見于驚熱者當在四十卷末附方中求于此不見必此方舊本元闕不必他求

一方書

此書萃內經顓頊巢氏千金聖惠等書詮次
成帙每條上貫以本書名叙論如素問云何
顓頊云何巢氏云何叙方如顓頊某湯某丸
千金某湯某丸聖惠某湯某丸若一書而錄
論三四條四五方者首條上冠以書名餘止
書論并方耳

一品方

方不合時與捍劑並削有去取間者則先書
病原後書湯散丸飲名若先書某湯某飲某

散其丸而後及病原者愚意為可用若天有寒暑地有南北歲運有陰陽人稟有厚薄及氣血之強弱性質之宜溫宜寒受病之深淺并寒熱之殊久新之異要當臨機酌用此非愚之所逆料也

一服法

藥有食前者有食後者有早服者有臨卧服者有早晚各一服者有宜早午而不宜晚者有宜午晚而不宜早者有日三四服者有夜

亦宜服者有不時服者悉具本方後其云更
量與者或以時之早晚量以年之大小量以
病之淺深量蓋量以施藥也在藥則湯飲以
合量散以錢匕刀圭量丹丸則以圓量而圓
者又以如粟量如黍量如梧子如雞頭量者
凡可意裁者悉以量書

幼幼新書目錄

第一卷

求端探本

凡一門

求子方論

第二卷

方書叙例

凡十三門

叙初有小兒方第一

叙小兒有病與大人不殊第二

叙小兒方可酌量藥品分兩第三

叙小兒有病宜早治第四

叙調理第五

叙修合藥第六

叙用藥第七

叙氣弱不可容易吐瀉第八

叙十五以下皆可以小方脉治第九

論初受氣第十

相壽命第十一

三關錦紋第十二

脉法第十三

第三卷

病源形色

凡十四

五藏所主病第一

五藏病相生刑剋第二

五藏病四時所不宜第三

胎中滋養第四

胎中受病第五

稟賦之殊第六

得病之源第七

病證形候第八

察形色治病第九

治病要法第十

第四卷

刑初保育

凡二十二門

胎教第一

兒初生將護法第一

擇乳母法第三

附下乳

乳兒法第四

乳母雜忌慎法第五

哺兒法第六

初哺日第七

浴兒法第八

拭兒口法第九

斷臍法第十

灸臍法第十一

裹臍法第十二

封臍法附

甘草法第十三

黃連法第十四

韭汁法第十五

朱蜜法第十六

牛黃法第十七

汞粉法第十八

豬乳法第十九

藏衣法第二十

剝頭法第二十一

襍謝法第二十二

第五卷

初生有病

凡十七門

不作聲第一

眼不開第二

初生輒死第三

不喫乳第四

吐不止第五

不小便第六

大便附

有懸癰病第七

重舌第八

重舌重齦第九

口中有虫第十

着噤第十一

犯風
紫附

戴口第十二

木舌第十三

撮口第十四

臍風第十五

脾腫濕第十六

氣脾附

臍瘡第十七

第六卷

稟受諸疾

凡十九門

解頤第一

頤不合第二

頤填第三

頤陷第四

滯頤第五

口中涎
漬頤下

齒不生第六

髮不生第七

髮黃第八

虫胞第九

胎中頭生瘡瘡有虫

鶴節第十

手拳不展第十一

脚拳不展第十二

語訖第十三

通睛第十四

俗呼
關睛

惛塞第十五

行遲第十六

語遲第十七

龜背第十八

龜背第十九

第七卷

蒸忤魁啼

凡九門

變蒸第一

中客忤第二

中人忤第三

犯入
噤附

中馬忤第四

被毆第五

繼病
附

喜啼第六

驚啼第七

軀啼第八

夜啼第九

第八卷

驚潮狂困

凡九門

驚候第一

胎驚第二

驚熱第三

驚積第四

驚虛第五

搐搦第六

狂語第七

驚悸第八

多困第九

第九卷

驚風急慢

凡三門

急慢驚風第一

急驚風第二

慢驚風第三

第十卷

驚癇瘵病

凡十二門

一切驚第一

慢脾風第二

慢肝風第三

驚退而啞第四

驚退而筋脉不舒第五

天癆第六

驚風內釣第七

盤腸氣釣第八

腹肚釣第九

灸二十四釣第十

胡孫噤第十一

白虎病第十二

第十一卷

癰論候法

凡十二門

癰論第一

癰候第二

驚癰忤是三候第三

瘰癧法第四

載癰法第五

五歲之癰第六

六畜之癰第七

一切癰第八

灸癰第九

癰差復發第十

成癰疾

癰差身面腫第十一

癰差不能語第十二

第十二卷

五癰異治

凡五門

風癰第一

驚癇第二

食癇第三

熱癇第四

亦名退癇除熱

顛癇第五

第十三卷

胎風中風

凡十門

胎風第一

一切風第二

中風第三

中風痙第四

中風口噤第五

中風涎潮第六

中風四肢拘攣第七

中風不隨第八

癱瘓附

中風口喎邪癱第九

中風失音不語第十

第十四卷

熱風暑寒

凡十一門

溫壯第一

壯熱第二

時氣第三

溫病第四

熱病第五

傷風第六

傷暑第七

傷寒第八

惡風傷寒第九

夾食傷寒第十

夾驚傷寒第十

第十五卷

傷寒變動

凡二十門

傷寒自汗第一

傷寒頭汗出第二

傷寒咳嗽第三

傷寒發喘第四

傷寒鼻衄第五

傷寒嘔哕第六

傷寒發渴第七

傷寒大小便不通第八

傷寒發狂第九

餘發狂附

傷寒結胸第十

傷寒腹痛第十一

腹滿附

傷寒下利第十二

傷寒口内生瘡并喉痛第十三

傷寒發斑第十四

餘發斑附

傷寒發黃第十五

亦名黃病
附餘發黃

傷寒餘熱不退第十六

傷寒勞復第十七

傷寒失音第十八

傷寒變疽第十九

傷寒變疹第二十

第十六卷

欬嗽諸病

凡十一門

欬嗽第一

欬逆第二

喘欬上氣第三

餘喘急附

欬嗽作呀呷聲第四

附觀

欬嗽聲不出第五

驚膈欬第六

驚差而嗽作

傷風欬第七

痰欬第八

寒欬第九

熱欬第十

久嗽第十一

第十七卷

寒熱瘡癰

凡二十二門

痰實第一

寒熱往來第二

寒熱五藏煩滿第三

寒熱腹痛第四

寒熱結實第五

寒熱食不消第六

寒熱能食不生肌肉第七

寒熱不食羸瘦第八

瘡疾第九

瘡疾熱而後寒第十

瘡疾寒而後熱第十一

瘡疾寒熱更作第十二

瘡疾熱而不寒第十三

瘡疾寒而不熱第十四

瘡疾熱多于寒第十五

瘡疾寒多于熱第十六

瘡疾寒熱相等第十七

瘡瘡第十八

久瘡第十九

瘡後引飲第二十

瘡後脅內結硬第二十一

瘡後頭面浮腫第二十二

第十八卷

斑疹麻豆

凡十六門

瘡疹論第一

瘡疹候第二

瘡疹未見乃可疎利第三

瘡疹初出第四

瘡疹已出未出第五

瘡疹出未快第六

瘡疹倒靨第七

瘡疹太盛第八

煩喘燥渴附

瘡疹愛護面目第九

瘡疹攻咽痛第十

瘡疹大小便不通第十一

瘡疹便膿血第十二

瘡疹膿汁不乾第十三

瘡疹入眼第十四

瘡疹後解餘毒第十五

瘡疹後滅癰痕第十六

第十九卷

諸熱痰涎

凡十門

胎熱第一

膈熱第二

亦名
墜熱

胃熱第三

風熱第四

煩熱第五

潮熱第六

積熱第七

實熱第八

極熱第九

痰涎第十

第二十卷

熱蒸汗疸

凡九門

虛熱第一

骨熱第二

病初則骨熱
病劇則骨蒸

骨蒸第三

盜汗第四

喜汗第五

勞氣第六

熱渴第七

黃疸第八

附胎疸

黑疸第九

第二十一卷

寒痛逆羸

凡十六門

胎寒第一

虛寒第二

胃中有寒第三

胃脅滿痛第四

心痛第五

腹痛第六

腹脹第七

冷熱不調第八

胃氣不和第九

脾胃附

乳食不下第十

膈氣第十一

氣逆第十二

肌膚羸瘦第十三

病後虛羸第十四

病後聲不出第十五

病後不能語第十六

第二十二卷

癰癤積聚

凡十門

積聚第一

癰癤第二

癰氣第三

乳癰第四

是妳脾

疰氣第五

痞結第六

宿食不消第七

傷飽第八

食不知飽附

丁翼第九

哺露第十

第二十三卷

五疳辯治

凡九門

五疳論第一

五疳候第二

五疳可治不可治候第三

五疳總方第四

風疳第五

亦名肝疳
風疳生核附

驚疳第六

亦名
心疳

食疳第七

亦名
脾疳

氣疳第八

亦名
肺疳

急疳第九

亦名腎疳又
名走馬疳

第二十四卷

無辜疳劇

凡五門

無辜疳第一

亦名無辜病
無辜疳附

無辜針烙法第二

一切疳第三

五疳出虫第四

諸疳
虫附

疳疾吹鼻第五

第二十五卷

諸疳異證

凡十一門

走馬疳第一

口齒疳第二

臍疳第三

亦名
蠱臍

眼疳第四

腦疳第五

脊疳第六

歷脊
疳附

妳疳第七

疳肥第八

疳瘦第九

乾疳第十

肉疳第十一

第二十六卷

諸疳餘證

凡十五門

疳熱第一

疳渴第二

疳勞第三

疳嗽第四

疳積第五

疳瀉第六

疳痢第七

疳痢久不差第八

疳痢腹痛第九

疳濕第十

疳痢濕
蠟附

蛔疳第十一

疳瘡第十二

疳腫第十三

疳後天柱倒第十四

他病天
柱倒附

疳氣灌入陰第十五

第二十七卷

吐噦霍亂

凡十二問

吐逆第一

吐衄第二

噦逆第三

霍亂吐利第四

霍亂第五

或霍亂吐而不利或霍亂利而不吐或止霍亂而不吐利

吐利第六

但吐利而不霍亂

吐利津液少第七

吐利心腹痛第八

冷吐第九

熱吐第十

挾驚吐第十一

毒氣吐第十二

第二十八卷

泄瀉羸腫

凡十五門

一切泄瀉第一

積瀉第二

驚瀉第三

傷瀉第四

冷瀉第五

熱瀉第六

洞泄第七

水穀瀉第八

暴瀉第九

亦名卒利
又名暴利

暴瀉第十

利久不止第十一

瀉利同

利渴不止第十二

瀉利同

下利腹痛第十三

瀉利同

下利羸瘦第十四

瀉利同

下利浮腫第十五

瀉利同

第二十九卷

滯痢赤白

凡十二門

八痢第一

一切痢第二

冷痢第三

赤白痢

熱痢第四

赤痢亦名

冷熱痢第五

赤痢亦名赤白痢

白膿痢第六

純血痢第七

膿血相雜痢第八

重下利附

五色痢第九

休息痢第十

蟲痢第十一

脫肛第十二

第三十卷

諸血淋痔

凡十九門

吐血第一

嗽血第二

衄血第三

大便血第四

小便血第五

大便不通第六

小便不通第七

大小便不通第八

大便失禁第九

小便數第十

大便青第十一

小便白第十二

小便淋瀝第十三

石淋第十四

氣淋第十五

熱淋第十六

血淋第十七

寒淋第十八

痔疾第十九

第三十一卷

三虫癰疽

凡九門

虫動第一

蛻虫第二

蛻音細

蟻虫第三

寸白虫第四

癰疽第五

偏癰第六

亦名羗癰
顧音積

陰腫第七

陰瘡第八

吊起外腎第九

第三十二卷

水飲鬼症

凡九門

痰飲第一

腫滿第二

水氣第三

中惡第四

卒死第五

鬼持第六

附鬼氣

疰病第七

尸疰第八

虫疰第九

第三十三卷

眼目耳鼻

凡二十四門

眼赤痛第一

附目腫

胎赤眼第二

緣目有瘡而赤者是

睛生障翳第三

眼痒第四

眼暗第五

睛高第六

青盲第七

雀目第八

疣目第九

目中有昧第十

目澀羞
明附

耳聾第十一

耳鳴第十二

耳中痛第十三

耳瘡第十四

月蝕瘡第十五

聾耳第十六

耳中有息肉第十七

底耳第十八

百虫入耳第十九

繩車第二十

車塞第二十一

車流清淨第二十二

鼻乾無涕第二十三

車有息肉第二十四

第三十四卷

口唇喉齒

凡廿四門

口瘡第一

口臭第二

口乾第三

鸛口瘡第四

脣口上生瘡第五

舌腫第六

舌上瘡第七

舌上血出第八

脣腫第九

緊脣第十

脣青第十一

咽喉腫痛第十二

喉中
瘡附

尸咽第十三

咽中噎第十四

喉痺第十五

馬痺第十六

纏喉風第十七

齒痛第十八

齒齦宣露第十九

齒齦腫痛第二十

齲齒第二十一

虫齒第二十二

附裂齒

齒落久不生第二十三

頰車挫閃第二十四

牙車急附

第三十五卷

一切丹毒

凡三十八門

丹候第一

一切丹第二

土虺丹第三

眼丹第四

五色丹第五

伊火丹第六

燂火丹第七

茱萸丹第八

赤丹第九

白丹第十

黑丹第十一

天雷丹第十二

天火丹第十三

殃火丹第十四

神氣丹第十五

神火丹第十六

神灶丹第十七

鬼火丹第十八

野火丹第十九

骨火丹第二十

家火丹第二十一

火丹第二十二

附丹火

螢火丹第二十三

朱田火丹第二十四

胡吹竈丹第二十五

胡漏竈丹第二十六

土竈丹第二十七

天竈火丹第二十八

癰竈火丹第二十九

尿竈火丹第三十

野竈丹第三十一

大孕丹第三十二

尔朱丹第三十三

赤流丹第三十四

赤遊丹第三十五

身有赤處第三十六

血疔

赤白溜第三十七

卒腹皮青黑第三十八

第三十六卷

癰疽瘰癧

凡十一門

瘡第一

疽第二

附骨疽第三

毒腫第四

癰第五

軟癰第六

惡核第七

惡瘡第八

癰瘡第九

癰癰第十

癰氣第十一

第三十七卷

瘡癰疥癬

凡十七門

一切瘡第一

瘡瘡第二

風熱瘡第三

熱毒瘡第
四

頭面身體瘡第
五

風搔癢疹第
六

疥第
七

癬第
八

附疥癬

癰瘡第
九

爛瘡第
十

尿灰瘡第
十一

酢瘡第
十二

魚臍瘡第十三

王灼瘡第十四

火灼瘡第十五

黃肌瘡第十六

浸淫瘡第十七

第三十八卷

頭瘡凍痺

凡十八門

頭瘡第一

禿瘡第二

白禿瘡第三

赤禿瘡第四

漏頭瘡第五

蠅蝮尿瘡第六

自懸瘡第七

代指第八

手足皴裂第九

脚瘡第十

凍瘡第十一

癰疽第十二

赤癰第十三

白駁第十四

漆瘡第十五

金瘡第十六

湯湯火燒第十七

瘡中風中水第十八

第三十九卷

鯁刺虫毒

凡十七門

惡刺第一

竹木刺狐尿刺并刺中風水附

骨鯁第二

附

食土第三

落水第四

遺尿第五

尿牀第六

狐臭第七

諸虫咬第八

頭多生虱第九

身有虱附

擗撲損瘀第十

誤吞銅鐵第十一

耳中有物不可出第十二

臍癰痕第十三

中食毒第十四

中藥毒第十五

中水毒第十六

百病第十七

第四十卷

論藥叙方

凡十五門

玉石部第一

草部第二

木部第三

人部第四

獸部第五

禽部第六

虫魚部第七

果部第八

米部第九

菜部第十

木草雖無而人可識者第十一

本草既無而未識者第十二

前代方書第十三

近代方書第十四

士大夫家藏第十五

附拾遺方

元本無不編入第

幼幼新書目錄

幼幼新書卷第一

求端探本

凡

後學古吳陳履端于始輯

錫山華承美以剞校

求子方論第一

素問岐伯曰女子二七而天癸至任脉通太衝脉盛

月事以時下故有子

癸壬癸北方水任脉衝脉皆奇經脉也腎氣全盛衝任流通經

血漸盈應時而下天真之氣降與從事故云天癸然衝為血海任主胞胎二者相資故能有子所以謂之月事者平和之氣常以三

旬而一見愆期則有病 丈夫二八腎氣盛天癸至

精氣溢寫陰陽和故能有子

男女陰陽之質不同天癸精血之形亦異陰靜

血氣未定
海滿而去血陽動應合而
泄精二者通和故有子

千金曰欲求子者當知夫婦本命五行相生與德合
并本命不在子休廢死墓中者求子必得不然縱得
之終累人

凡人無子夫妻俱有五勞七傷虛羸百病所其治法
男服七子散女服紫石門冬丸及坐道藥湯胞湯無
不有子

古者求子多用慶雲散承澤丸

陰陽調和二氣相感陽施陰化是以有娠而三陰所

會則多生女姪娘二月名始胎血脈不流象形未定見物而化是以男女未分不滿三月可服藥方術轉之令生男也

方術見本門

御女者當避丙丁日及弦望晦朔大風大雨大霧大寒大暑雷電霹靂天地晦冥日月薄蝕虹蜺地動犯之男損神女得病子必顛狂頑愚瘖聾瞶攣跛盲眇多病短壽不孝不仁至于日月星辰火光之下神廟佛寺之中井竈園廁之側塚墓尸柩之傍皆悉不可夫交合如法有福德大智善人降托胎中仍令性

行調順所作和合家道日隆禎祥競集又須待婦人
月經絕後一三五日擇旺相日及月宿在貴宿以生
氣時夜半後施瀉子皆男且壽而賢明高爵也六日
後不可不然反是

旺相日

春甲乙

夏丙丁

秋庚辛

冬壬癸

月宿日

正月一日

六日

九日

十日

十一日

十二日

十四日

廿一日

廿四日

廿九日

二月四日

七日

八日

九日

十日

十二日

十四日

十九日

廿二日

廿七日

三月一日

二日

五日

六日

七日

八日

十日

十七日

廿日

廿五日

四月三日

四日

五日

六日

八日

十日

十五日

十八日

廿二日

廿八日

五月一日

二日

三日

四日

五日

六日

十二日

十五日

廿日

廿五日

廿八日

廿九日

三十日

六月一日

三日

十日

十三日

十八日

廿三日

廿六日

廿七日

廿八日

廿九日

七月一日

八日

十一日

十六日

廿一日

廿四日

廿五日

廿六日

廿八日

廿九日

八月五日

八日

十日

十三日

十八日

廿一日

廿二日

廿三日

廿四日

廿五日

廿六日

九月三日

六日

十一日

十六日

十九日

廿日

廿一日

廿二日

廿四日

十月一日

四日

九日

十日

十四日

十七日

十八日

十九日

廿日

廿二日

廿三日

廿九日

十一月一日

六日

十一日

十四日

十五日

十六日

十七日

十九日

廿六日

廿九日

十二月四日

九日

十二日

十三日

十四日

十五日

十七日

廿四日

春甲寅乙卯

夏丙午丁巳

秋庚申辛酉

冬壬子癸亥

此与上月宿日相合尤益

黃帝雜禁人有怒血氣未定因以交合令人癰疽又不可忍小便交合使人淋莖中痛面失血色遠行疲乏入房為五勞虛損少子且婦人月事未絕交合令人成病得白駁

聖惠云人無子者其事有三一墳墓不嗣二夫婦年命相剋三夫病婦疹若墳墓年命非藥能益婦人無子由勞血血氣生病或月經澀閉或崩血帶下致陰陽之氣不和經血之行乖候故無子診右尺脈浮為

陰陽脉絕無子微澀中年得此為絕產少陰脈如浮
緊則絕產惡寒脉尺寸俱弱絕產

婦人將攝失宜飲食不節暴風取冷或勞傷過度致
風冷之氣乘其經血結于子宮故無子

肘後婦人崩中漏下青黃赤白致無子方

禹餘糧

赤石脂

牡蠣

桂心

烏賊魚骨 竈下黃土

等分為末粥飲服方寸七日三

乾薑經墨等分為末丸酒下日三

鹿茸當歸蒲黃等分搗篩酒服一錢七稍加至方寸七

燒露蜂房三指撮酒服之

常灸猪腎脂食或麵裹煮吞佳

千金七子散治丈夫風虛目暗精氣衰少無子

五味子

牡荊子

兔絲子

車前子

枌蓂子

附子

蛇床子

石斛

署預

乾地黄

杜仲

鹿茸

遠志

各八銖

芎藭

六銖

山茱萸

天雄

人參

茯苓

黃耆

牛膝

各五銖

桂心

十銖

巴戟天

十二銖

從蓉

十一銖

鍾乳粉

八銖

治末飾酒服方寸七日二不知增至二七知為度

禁如藥法不能酒蜜丸一方加覆盆子八銖

朴硝盪胞湯治婦人全不產及斷緒久不差

朴硝

牡丹

當歸

大黃

桃仁

生用各三銖

細辛

厚朴

桔梗

赤芍藥

人參

茯苓

桂心

甘草

牛膝

橘皮

各二銖

蜜虫

水蛭

枚十

附子

枚六

呔咀清酒水各五升煮取三升分四服日三夜一
相去三時如常覆被取汗冬日火籠之必下積血
及冷赤濃如赤小豆汁本子宮有此惡物或天陰
臍下痛或月水不調為有冷血不受胎若斟酌下
盡氣弱不堪再服二三服即止如大悶不堪可食
酢飮冷漿一口即止恐惡物不盡不大得藥力忍
服盡更好一日後仍著導藥

千金翼不用
甘草桔梗

著坐導藥方

皂莢

山茱萸

千金翼作苦瓠

當歸

各一兩

五味子

細辛

乾薑

各二兩

礬石

戎鹽

蜀椒

大黃

各半兩

末之絹囊盛大如指內婦人陰中坐卧任意行勿

急小便時去之更新者必下青黃汁止即御有子

未見出只安十日為服朴硝湯恐去未盡用之值

天陰冷不疼不必用一日外服紫石門冬丸

紫石英

天門冬

各三兩

當歸

萸薺

紫葳

卷柏

桂心

烏頭

乾地黄

牡蒙

一作牡荊

禹餘糧

石斛

辛夷

各一兩

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

乾薑

食茱萸

牡丹

牛膝

各三銖

柏子仁

一兩

署預

烏賊骨

甘草

各一兩半

為末蜜丸如桐子酒服十九日三漸增至三十九

腹中熱為度不禁房室不盡劑即有孕

夫不在勿服

白薇九主婦人有子

白薇

細辛

防風

人參

秦椒

白欬

一云白止

沙參

桂心

牛膝

秦朮

蕪荑

芍藥

五味子

白殭蚕

牡丹

蟾蜍

各一兩

乾漆

柏子仁

乾薑

菴柏

附子

芫薺

各三銖

紫石英

桃仁

各一兩半

鍾乳

乾地黄

白石英

各二兩

鼠婦

半兩

麻布叩腹頭

一尺

水蛭

蜜虫

各十五枚

吳茱萸

十八銖

為末蜜丸桐子大酒服十五丸日再加至三十九

當有所去小覺有異止

慶雲散主丈夫陽氣不足不能施化施化不成

覆盆子

五味子

各一升

天雄

一兩

石斛

白朮

各三兩

桑寄生

四兩

天門冬

九兩

兔絲子

二升

紫石英

二兩

治篩酒服方寸匕先食日三素不耐寒者去寄生

加細辛四兩陽氣不足而無子去石斛加檳榔十

五枚

承澤丸主婦人下焦三十六疾不孕絕產

梅仁

辛夷各一升

葛上亭長七枚 洩䟽三兩

藁本一兩

澤蘭子五合

為末蜜丸先食服如大豆二九日三不知稍增若

腹中無堅癖積聚者去亭長加通草一兩按酒送下

大黃丸主帶下百病無子服藥十日下午血二十日下

長虫及清黃汁三十日病除五十日肥白

大黃同黑豆熬黑

乾薑

柴胡

朴硝各一升

芎藭五兩

蜀椒二兩

茯苓如雞子

為末蜜丸如桐子先食服七丸米飲下加至十九

五日微下

吉祥丸治女人積年不孕

天麻

柳絮

牡丹

茯苓

乾地黄

桂心

各一兩

五味子

桃花

白朮

芎藭

各二兩

覆盆子

半

桃仁

一百枚

兔絲子

楮實

各一升

為末蜜丸豆大每服空心酒下五丸日中一服晚

一服

消石大丸治十二癥瘕及帶下絕產無子先服此下

之廼服寒食散此不下水穀但下病不令人困

消石

六兩朴硝亦得

大黃

八兩

人參

甘草

各二兩

為末三年苦酒置銅器中以竹筴柱器中一升作一刻置火上先內大黃攪不息使微沸盡一刻內餘藥微火熬使可丸如雞子黃欲合先齋戒一宿勿令兒婦奴婢等見欲下病用二丸若不能可分作小丸多不過四丸不分為善人羸少食強者不須二十日五度服和調半日乃下若下如雞肝或如米汁色赤黑或一升三升下後慎風冷作粥食

後作羹臠自養如產婦法六月有子禁生魚猪肉

辛菜

寒食散方未見

金太守白薇丸治月水不利閉塞絕產十八年服此二十八日有子

白微

細辛

各三銖

人參

杜蘅

一用牡蠣

牡蒙

厚朴

當歸

紫苑

白殭蚕

半夏

各十銖

蜀椒

防風

附子

各一兩半

沙參

乾薑

秦艽

牛膝

各半兩

為末蜜丸如桐子先食服三丸不知增至四五丸

覺有娠止用之大驗

崔氏有桔梗丹參十八銖

白薇丸主久無子或上熱下冷百病皆治

白薇

乾薑

蜀椒

乾地黄

車前子

各十八銖

石膏

紫石英

藁本

菴藺子

卷柏

各三十銖

芎藭

蛇床子

當歸

各一兩

白龍骨

太一餘糧

麥門冬

遠志

澤蘭

茯苓

赤石脂

各二兩

覆盆子

白芷

桃仁

人參

各兩半

細辛

三兩

蒲黃

桂心

各二兩半

橘皮

半兩

為末蜜丸梧子大酒服十五丸日再漸增以知為

度可至五十丸慎猪雞生冷酢滑魚蒜驢馬牛肉

等覺有娠止

聖惠少石膏石英菴蘭
澤蘭蒲黃多菖蒲

秦椒丸治婦人絕產生來未產盪滌府藏玉門受子

秦椒

天雄

各十銖

玄參

人參

白欬

鼠婦

白芷

黃蓍

桔梗

露蜂房

白殭蚕

桃仁

蟬蛸

白薇

細辛

蕪荑

各一兩

牡蒙

沙參

防風

甘草

牡丹皮

牛膝

卷柏

五味子

芍藥

桂心

大黃

石斛

白朮

各三銖

柏子仁

茯苓

當歸

乾薑

各兩半

澤蘭

乾地黄

芎藭

各一兩

八銖

乾漆

白石英

紫石英

附子

各二兩

鍾乳

二兩半

水蛭

七十枚

蜜虫

百枚

麻布叩帳頭

七尺

末之蜜丸如桐子酒服十九日再加至二十有所
去如豈汁皁涕此是病退覺有孕止

丹參丸主始覺有娠養胎并轉女為男

丹參

續斷

芍藥

白膠

白朮

柏子仁

甘草

各二兩

蕪荑

十八銖

東門上雄雞頭

一枚

當歸

吳茱萸

橘皮

各一兩十八銖

白芷

冠纓

燒灰各一兩

乾地黄

兩半

人參

芎藭

乾薑

各三銖

犬卵

乾一具

為末蜜丸酒服十九日再加至二十九如梧子

琴弦一枚絳囊盛帶左臂一懸腰下百日

雄黃一两絳囊盛帶要女用雌黃

以斧一柄置卧床下刃向下勿令人知不信待雞抱卵試之

大澤蘭丸治婦人虛損及中風餘病疝瘕陰中冷痛或頭風入腦寒痺筋攣緩急血閉無子面上遊風去來目淚出多涕唾忽忽如醉或胃中冷逆胸中嘔不止及瀉痢淋瀝或五藏六府寒熱不調心下痞急邪氣欬逆或漏下赤白陰中腫痛胸脇支滿或身體皮

膚中澀如麻豆苦痒痰癖結氣或四肢拘攣風行周
身或上氣惡寒洒淅如瘧或喉痺鼻癰風癰癩疾或
月水不通或菟兔不定飲食無味并產後衄無所不
治令人有子

澤蘭

二刀六銖

藁本

當歸

甘草

各一兩十銖

八銖

芎藭

乾地黄

柏子仁

五味子

各一兩半

桂心

石斛

白朮

各兩六銖

白芷

茯苓

厚朴

防風

署預

茯苓

乾薑

細辛

卷柏

各一兩

蜀椒

人參

杜仲

牛膝

蛇床子

續斷

艾葉

蕪荑

各十銖

紫石英

三兩

赤石脂

石膏

各五兩

禹餘糧

一兩一本有枳實
十八銖麥門冬掣

末之蜜丸如梧子酒服二十九至四十丸久赤白

痢去乾地黃石膏麥門冬柏子仁加麥蘖陳麴龍

骨阿膠黃連各一兩半有鍾乳加三兩良

柏子仁丸治婦人五勞七傷羸冷瘦削無顏色飲食

減少貌失光澤斷緒無子久肥白補益

柏子仁

黃蓍

乾薑

白石英

紫石英

鍾乳

各二兩

赤石脂

厚朴

桂心

白朮

茯苓

細辛

獨活

人參

五味子

石斛

白芷

芍藥

桔梗

各一兩

防風

烏頭

一作牛膝

地黃

各三銖

蜀椒

半兩

澤蘭

二兩六銖

藁本

蕪荑

各十銖

杜仲

當歸

甘草

芎藭

各四十銖

為末蜜丸如梧子酒服二十丸不知加至三十丸

聖惠無烏頭有龍骨防葵秦
尤各半兩并治產後半身枯

紫石門冬丸主風冷在子宮有子常隨或始為婦便
患心痛成疾月水未曾來服之肥充有子

紫石英

禹餘糧

天門冬

各三兩

烏頭

茯苓

桂心

甘草

五味子

柏子仁

石斛

人參

澤瀉一作
澤蘭

遠志

蕪荑

杜仲

各二兩

蜀椒

卷柏

桑寄生

石南

雲母

當歸

一作
辛夷

烏賊魚骨

各一兩

末之蜜丸如梧子酒服二十丸加至四十丸

鼈甲丸治女人小腹積聚大如七八寸盤面上下周
流痛難忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火炙玉門
冷如風吹經水不通或月前或月後服三十日差有
子

鼈甲

桂心

各一兩半

蜂房

半兩

玄參

蜀椒

細辛

人參

苦參

丹參

沙參

吳茱萸

各十八銖

麝香

乾薑

牡丹

附子

水蛭

皂莢

當歸

芍藥

甘草

防葵

各一兩

蟬蛸

二十枚

大黃

蜜虫

各一兩六

銖

末之蜜丸如梧子酒下七丸日三稍加知為度

牡蒙丸治婦人產後十二癥帶下無子皆冷風寒氣或產未百日胞絡惡血未盡便于懸圓上及久坐濕地寒入胞裏結在小腹牢痛小如雞子大如拳按之跳手隱隱如虫嚙或如針刺時槍入心兩脇支滿不食或食不消化上下流通或守胃管連玉門背膈

痛嘔逆短氣汗出小腹苦寒胞中創破引陰痛小便
自出子門不正令人無子腰膝疼痛四肢沉重滯躍
一身盡腫乍來乍去大便秘不利小便淋瀝或月經不
通或下如腐肉五色如豆汁夢想不祥

牡蒙

桂心

吳茱萸

芎藭

厚朴

消石

前胡

乾薑

麝香

牡丹

蜀椒

黃芩

桔梗

茯苓

細辛

葶藶

人參

各十
八銖

當歸

大黃

二兩
半

附子

一兩
六銖

末之蜜和更搗萬杵丸如梧子空心酒服三九日
三不知加至五六丸下赤白青黃物如魚子病根
出矣

女人腹中十二疾一經水不調二經如清水三經水
不通四不周時五生不乳六絕無子七陰陽減少八
腹苦痛如刺九陰中寒十子門相引痛十一經來凍
如葵汁十二腰急痛得病之時因與夫卧起月經不
去或卧濕冷地及冷水洗浴當時取快後生百病或
瘡瘻未差便合陰陽起早作勞衣單席薄寒從下入

耳服此

半夏

赤石脂

各一兩
六銖

蜀椒

乾薑

吳茱萸

當歸

桂心

丹參

白欬

防風

各一兩

瞿蘆

半兩

末之蜜丸如梧子空心酒服十九日三稍加知為度

外臺廣濟療無子令子宮內灸丸

麝香

二分

蜀椒

六分
去汗

皂莢

十分
酥炙
去黑皮

按篩蜜丸酸棗仁大以綿裹內產宮中留少綿線

出覺憎寒不淨下多即抽出一日一度換之無間
晝夜

白薇丸療久無子

白薇

牡蒙

藁本

各五分

當歸

薑黃

地黃

各七分

人參

柏子仁

石斛

桂心

附子

炮

五味子

防風

吳茱萸

甘草

牛膝

芎藭

桑寄生

各六分

禹餘糧

八分

秦朮

二分汗

搗篩蜜丸如梧子空腹酒下二十丸加至三十日

再不利忌生葱菜熱麵蕎麥猪肉葵菜蕪荑菰菜
海藻粘食陳臭物等

地黄湯瘰癧久無子斷緒小腹冷疼氣不調

乾地黄

牛膝

當歸

各八兩

芎藭

卷柏

防風

各六兩

桂心

牽牛

末各三分

切水六升煮取二升三合去滓分三服服別和一分牽牛末服如人行四五里更取一服以快利止
忌熱麵蕎麥炙肉生葱蕪荑菰粘食等物

茱萸丸瘰癧陰寒十年無子

蜀椒

去目汗

吳茱萸

各一升

末之蜜丸彈子大綿裹道腸中日再易無所下但

開子藏令陰溫即有子

聖惠杜蘅丸主婦人腹藏久積風冷血氣凝澀不能宣通故無子

杜蘅

防風

白茯苓

細辛

附子

炮去皮臍各一兩

白薇

牛溲

沙參

半夏

湯洗七次去滑散炒

秦艽

菖蒲

藁本

蛇床子

桂心

各三分

川椒

一分去目及開口者微炒去汗

羅為末蜜和搗五七百杵丸如桐子空心及晚溫酒下三十丸有子止

紫石英丸主久無子由于藏久積風冷陰陽不能施化

紫石英

二兩水飛

細辛

厚朴

去皮塗生薑汁炙令香熟

桔梗

川枳

去目及開口者去汗微炒

防風

硫黃

川大黃

附子

炮去皮臍

白薇

當歸

微炒

桂心

各一兩

鼈甲

一兩半生半熟

牡蒙

人參

桑寄生

各三

半夏

湯洗七次

白僵蚕

炒

紫苑

續斷

牛膝

杜衡

各半兩

羅蜜和搗五七百杵丸如桐子空心晚食前各一

服溫酒下三十丸

卷柏丸治子歲冷由風寒邪氣客于經血

卷柏

牡蒙

藁本

當歸

微炒

熟地

柏子仁

乾薑

炮

禹餘糧

燒醋

淨三遍

白薇

各一兩

芎藭

人參

石斛

桂心

五味子

附子

炮去皮臍

防風

甘草

炙至微赤

吳茱萸

湯浸七次焙乾微炒

牛膝

桑寄生

川椒

微炒各三分

羅末蜜和搗五七百杵丸如梧子空心晚食前溫

酒下三十丸

陽起石丸主血海久積虛冷

陽起石

二兩酒煮半日細研

熟地

一兩

乾薑

炮

白朮

牛膝

吳茱萸

湯炮七次焙乾微炒各三分

末之蜜和搗二三百杵丸如梧子空心晚食前溫

酒下三十丸

熟地黃散治婦人久無子是子藏積冷血氣不調

熟地

牛膝

當歸

微炒

柏子仁

白薇

各一兩

桂心

半兩

防風

芎藭

卷柏

各三分

為散每服三錢水一鍾煎六分去查空心服

靈苑內補丸治受氣虛弱及五勞七傷藏府積冷瘕癖癥塊虛脹或經脉不調疝冷赤白帶下口苦舌乾面色痿黃黑黥心煩驚悸頭目旋暈不喜飲食痰涕黏涎手足百節熱疼無力肌肉消瘦子息斷緒服一

月當姪娠百病皆愈

萆薢

四兩

牛膝

五加皮

各二兩

白朮

川烏頭

炮去皮臍

丹參

枳實

麩炒去

細末蜜丸梧子大溫酒下二十丸空心日午晚各

一服

阿膠煎丸治婦人血氣久虛胎孕不成大補虛損常服滋助血海

伏道艾

葉搗熟篩去查用茸二兩米醋煮一伏時候乾研成膏

阿膠

炙二兩

糯米

炒

大附子

炮去皮臍

枳殼

去瓢麩炒各一兩

為細末入前膏內杵勻丸如梧子空心溫酒下三十丸午食前再服忌藻菜羊血腥臊等物

千金婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸

婦人絕嗣胞門閉塞灸關元三十壯報之一灸胞門五十壯

婦人姪子不成若墮落腹痛漏見赤灸胞門五十壯在關元左邊二寸右邊二寸名子戶

婦人絕嗣灸氣門穴在關元傍三寸各百壯

婦人絕嗣漏赤白灸泉門十壯三報之穴在橫骨當

陰上際

千金翼方中帶下因產惡露不止中極穴在關元下一寸婦人斷緒最要穴四度針即有子若未有更針入八分留十呼得氣即寫灸亦佳但不及針日灸三七至三百止

莊氏腧穴婦人月水不利黃豚上下并無子灸四滿三十壯穴在丹田兩邊相去各一寸半
妊數隨胎妊娠三月灸臍下一寸七壯