

幼

幼

新

書

幼幼新書卷第十五 傷寒變動 凡二十門

後學古吳陳履端于始輯

吳江周之琦仲大校

傷寒自汗第一

東氏傷寒者寒氣客皮膚搏血氣使腠理閉塞氣不宣泄蘊積生熱故頭痛體疼壯熱也汗出者陽虛受邪邪搏于氣故發熱陰氣又虛邪又乘陰陰陽俱虛不能制其津液而汗

活人書病人藏無他病時發熱自汗不愈衛不和也

先時發汗則愈屬桂枝太陽病發熱汗出者為榮弱衛強欲救風邪者宜桂枝湯又病常自汗此榮氣和外不諧也以衛氣不共榮氣諧故爾以榮行脈中衛行脉外復發汗榮衛和則愈傷風自汗太陽病發熱汗出惡風脉緩為中風屬桂枝湯又太陽病項背強几几反汗惡風桂枝加葛根湯主之汗出而渴五苓散不渴茯苓甘草湯雖仲景云傷寒自汗用桂枝然須仔細假令傷風自汗若脉浮而弱設當行桂枝服湯後無桂枝脉息證候而煩者勿再服若自汗小便

數尤不可仲景云太陽病自汗四肢拘急難以屈伸  
若小便難者桂枝湯加附子小便數者勿與宜芍藥  
甘草湯若悞桂附攻表便咽乾煩躁厥逆嘔吐甘草  
乾薑湯以復其陽若厥愈足溫更與芍藥甘草湯腳  
即伸若胃氣不和讝語與調胃承氣湯微溏則止其  
讝緣芍藥甘草湯主脉浮自汗小便數者寸口脉浮  
為風大為虛風則微熱虛則兩脰攣小便數仍汗出  
為津液少勿用桂枝宜芍藥甘草補虛退風熱通治  
悞服桂枝後病證仍存陽明病自汗不惡寒反惡熱

濁濁汗出若陽明病汗多而渴勿與猪苓湯汗多胃燥猪苓復利小便故也故仲景云陽明發熱汗多急下之以汗多津液外出胃中燥大便必硬讞語者調胃承氣湯雖陽明汗多急下若小便自利為津液內竭勿攻湏審道大便陽明病汗出脉遲微惡寒表未解宜桂枝湯陽明法多汗若脉浮無汗而喘發汗愈且麻黃湯亡陽自汗太陽病發汗多遂漏不止其人惡風當溫經宜桂枝加附傷寒尺寸脉俱緊汗出者亡陽也屬少陰法當咽痛而復吐利其人熱不退內

拘急四肢疼厥逆而惡寒四逆湯主之汗多不止溫  
粉撲之若汗多不止必惡風煩躁不得卧者先服防  
風白术牡蠣湯次服小建中湯諸方見後

仲景桂枝湯

桂枝

芍藥各三兩

甘草二兩

剉麻豆大抄五錢七水蓋半薑五片棗二枚煎一  
盞溫服須臾微熱稀粥一盞以助藥力溫復時許  
微汗佳此湯西北二方人四時俱驗江淮間惟春  
冬可行春末及夏至前桂枝證加黃芩一分謂陽

旦陽夏至後加知母半兩石膏一兩或加升麻一分若人素虛寒者用古方或曰桂枝最難用雖表不解脉浮可發汗宜桂枝湯湏常自汗小便不數手足溫或手足稍微冷少頃溫身雖微似煩又增寒始可行若無汗小便數或手足冷不惡寒或飲酒家不喜甘者勿用

桂枝加葛根湯

桂枝

甘草

各一兩

葛根

二兩

芍藥

麻黃

半兩

剉麻豆大抄五錢七薑四片棗一枚水一盞半煎  
八分服覆取汗

五苓散

猪苓

白术

茯苓各三分

澤瀉一分

桂枝

去皮半兩  
不見火

篩散抄三錢白湯調各治秤

茯苓甘草湯

茯苓

桂枝

去皮各二兩

甘草

炙一兩

剉麻豆大五錢七水盞半薑五片煮八分溫服

桂枝加附子湯

桂枝去皮

芍藥各半兩

甘草炙一兩

附子炮淨半兩

剉麻豆大五錢七薑四片棗一個水盞半煮八分

溫服

芍藥甘草湯

白芍藥

甘草二兩

剉麻豆大五錢七水盞半煮八分溫服

甘草乾薑湯

甘草炙四兩

乾薑二兩

剉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分分減服

調胃承氣湯

甘草一兩

芒硝一分

大黃一兩

大黃二兩去皮

剉如麻豆服五錢水一盞煎七分服

蜜煎導若土瓜根及大猪膽汁亦可導

蜜四兩銅器中微火煎凝如飴攬勿焦捻作梃如指許內穀道中

麻黃湯

麻黃去節兩半

桂枝一兩

甘草炙半兩

杏仁生個五

剉如麻豆五錢七水盞半煮八分溫服取汗傷寒  
熱病藥性湏涼性熱夏月服有發黃班之失

四逆湯

甘草

炙二兩

乾薑

半兩

附子

生一個亦可

剉如麻豆服四錢水盞半煮七分溫服強人加附  
半個乾薑兩半

溫粉法

白术

藁本

無亦可

芎

白芷

等分細末一兩米粉三兩和樸周身

防風白朮牡蠣湯

防風

牡蠣炒黃

白朮

等分細末二錢酒調下米飲亦得日二三汗止服

小建中湯

小建中湯

桂枝

去皮兩半

芍藥

三兩

甘草

二兩

膠餽

半升舊有

微糖或嘔者去之

剉如麻豆五錢七水盞半薑四片大棗一枚煮八分去滓下膠餡兩匙許煎化溫服日三夜二尺脉

尚遲再服加黃蓍末一錢

傷寒頭汗出第二

活人書病人表實裏虛元腑不開則陽氣上出汗見于頭者五內乾枯胞中空虛津液少也復下之為重虛然頭汗有數證傷寒五六日頭汗微惡寒手足冷心下滿不欲食大便硬硬作鞶脈細為陽微結必有表復有裏也脉沉亦有裏汗出為陽微假令純陰結不復有外證為半裏半表脉雖沉緊不得為少陰病蓋陰不得汗今頭汗知非少陰也小柴胡湯傷寒五六日汗下

胃脅滿微結小便不利渴不嘔但頭汗往來寒熱心煩此表未解

柴胡桂枝  
乾薑湯

頭汗身無汗齊顎而還小便

不利渴引水為瘀熱在裡身必發黃

五苓散  
陳湯

陽明病

下之外熱手足溫不結胷心懊憹飢不能食但頭汗

梔子  
豉湯

心下緊滿無大熱頭汗

茯苓湯  
仲景名水

結在胷脅以汗頭出別水結

證  
小半夏  
加茯苓湯

### 小柴胡湯

柴胡

四兩

黃芩

兩半

腹痛去之

加芍藥

兩半

心

便澀去之

加茯苓

二兩

人參

兩半

不渴外微熱去之

加桂枝

兩半

加五味

一兩

一分

乾薑

一兩

甘草

兩半

半夏

一兩

一分

湯洗胃中煩不厭去

此并參加苦蘿蔴半枝用四分

之渴去此三分苦蘿蔴根二兩

加參

二兩

加桂皮

六枚脣下痞硬去

加牡蠣二兩

加桂皮

六枚脣下痞硬去

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一個水盞半煮八

分溫服日三

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡

桂枝

去皮

黃芩

各半

兩

苦蘿蔴根

二兩

乾薑

甘草

熬

各半

牡蠣

熬

各半

剉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服食頃載

服

茵陳蒿湯

茵陳蒿兩半

大黃去皮半兩

大梔子三枚半

剉麻豆大水二大盞煮茵陳次內二味煮八分溫  
服日三利尿如阜莢汁

梔子豉湯

肥梔子十四枚

香豉四合

剉如麻豆服五錢水二盞煎八分溫服得快吐止

後服

赤茯苓湯

赤茯苓

陳皮

焙各半兩

人參

各一兩

半夏

洗去滑

芋虀

白朮

炮各半兩

擣粗末服四錢水鍾半盞五片煎七分不時溫服  
小半夏加茯苓湯

半夏

五兩洗七次

白茯苓

三兩

剉如麻豆半兩水三盞煎一盞薑四錢取汁投藥  
中更煎一兩沸不時熱喫

傷寒咳嗽第三

傷寒附

巢氏肺應皮毛主氣寒邪客皮隨氣入肺故嗽盛有

濃血

寒搏氣入藏府故表裏俱熱熱退肺尚未知邪猶未盡隨氣入肺與肺相搏故傷寒後猶嗽

活人書太陽證嗽小青龍小柴胡少陰證嗽真武湯

四逆散猪苓湯大抵熱在焦必水停心下肺為之浮

肺主欬水氣乘之故欬而微喘仲景云傷寒表不解

心下有水乾嘔發熱而欬小青龍湯主之小便不利

麻黃加  
茯苓

往來寒熱胃脅滿痛或欬小柴胡湯小腹滿去參棗

加五味  
乾姜若小陰證嗽四肢沉重疼痛小便不利自下

利而歟真武湯主之

真武湯加五味散薑大抵治水

氣散病在陽青龍湯病在陰真

薑味竟

湯武四肢厥逆腹中痛或泄利而歟四逆散主之

加四五逆

湯四肢厥逆腹中痛或泄利而歟四逆散主之  
薑味竟下利六七日歟嘔渴心煩不得眠猪苓湯主之

錄驗陳橘皮湯治歟佳

石壁經

唇青一作白

單紫歎聲連肺胃于中養毒涎夜歎

脅高兼肚脹汗收體熱氣難宣食逆復齶言語  
重歎聲頻作豈能痊行風發汗方為妙定使風

除絕本源

內熱蘊積賦風所傳致寒熱相感便嗽久則胷高  
如覆盆旺脹聲重當汗行風次調氣化涎利膈若  
腹藏結當利

手金麻黃湯治傷寒發熱欬嗽頭面熱

麻黃

薑

黃芩各一兩

桂心各半兩

甘草炙

石膏

芍藥

桂心

各半兩

杏仁去皮

㕮咀水四升煮升半分二服兒小減

聖惠白朮散治內中冷外傷寒咳嗽或時寒熱頭痛

白朮

紫苑

麻黃去根

去節

厚朴薑汁

人参

杏仁

甘草

炙微赤

赤芍藥

陳皮

去白焙各一分

粗散一錢水一盞煎五分不時量服

貝母散治傷寒痰逆欬嗽不乳

貝母

煨

桔梗

甘草

炙

人参

乾薑

炮裂

半夏

洗七次去滑各一分

陳皮

去白焙

杏仁

半兩炒

桂心

一兩

粗散一錢水小盞薑少許煎五分不時溫服量兒  
枇杷葉散治傷寒吐熱欬嗽嘔吐

枇杷葉

一分 桃去毛 糯微黃

川升麻

人参

貝母

一兩 樞各半兩

茅根

一兩

竹茹

三分

粗散

一錢水小盞裏一枚薑少許煎五分不時量

溫服

杏仁散

杏仁

炒

貝母

一兩

川升麻

甘草

炙

麻黃

去根節各半兩

粗散

一錢水小盞裏少許煎五分不時量溫服

嬰孺貝母湯治傷寒壯熱加嗽

貝母

石膏

各八分

升麻

知母

黃芩

梔子

芍藥

各六分

杏仁

紫胡

各五分

羚羊角

射干

各四分

甘草

炙各二分

切水

四升

煮升二合為四服

一二歲量與

麻黃湯治傷寒嗽喘急

竹葉

八合

貝母

八分

紫胡

升麻

各七分

枳實

炒分

紫苑

各三分

梔子

大黃

各十

甘草

炙二分

麻黃

去節各二分

杏仁

各六分

切水

四升

煮升三合

暮歲兒為四服

四歲為二服

張渙麥門冬湯

麥門冬

款冬花

人參

紫苑

各一  
兩

桂心

半  
兩

甘草

一分

羅細末入杏仁廿粒炒細研拌服一錢水一鍾  
薑三片煎五分溫服

活人書小青龍湯

麻黃

一  
兩半微利去此加羌  
去此加附子大熱赤若噠

桔芩

二  
兩喘去此加杏仁一  
兩一分

半夏

一  
兩一分洗渴去此加  
苦蘿根兩半

芍藥

桂枝

細辛

乾薑

甘草

炙各半

五味子

一分兩

剉如麻豆抄五錢水一盞半煮八分溫服

真武湯

茯苓

三分小便利減

芍藥

三分十片利去此加乾薑二分

白术

二分細辛加咳加五味

附子

炮去一枚乾薑各三分

分

皮破去此加乾薑煎成三兩

剉如麻豆抄五錢薑四片水盞半煎八分溫日三服

猪苓湯

猪苓

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石

各一  
兩

剉如麻豆抄五錢水盞半煮七分溫服

四逆散

甘草

炙

枳實

炒黃

柴胡

芍藥

各一  
兩

咳加五味乾薑各半兩下利憚加桂半兩小便不利加茯苓半兩腹痛加附半枚炮梨泄利下重先濃煎薤白湯內藥末三錢七煮一二沸溫服或細散米飲下二錢日三

初印新書

卷十五

十一

庚

古今錄驗橘皮湯

陳橘皮

紫苑

麻黃

杏仁

當歸

桂

甘草

黃芩

各半兩

剉如麻豆炒五錢七水盞半煎一盞服

傷寒發喘第四

活人書傷寒喘只有太陽陽明二證太陽頭疼發熱

身疼惡風無汗喘宜汗麻黃湯

桂枝桂枝加厚朴湯誤下不

葛根黃芩黃連太陽誤下微汗後勿更行桂枝湯

醫誤下不

杏子石膏湯陽明汗出不惡寒腹滿而喘有潮熱宜下承

氣湯

脉浮無汗喘發汗愈宜麻黃湯

太陽陽明合病喘而胃滿勿下

宜麻黃湯又汗後飲水多效而微喘以水停心下腎氣乘心故喘小青龍去麻黃加杏仁小腹滿去麻黃

加茯苓

何去麻黃失治心下有水而喘不當汗  
小便不利小腹滿故去麻黃加茯苓

形證傳傷寒歌

身熱皆因積熱生至今潮熱變傷寒先除積熱方成路便作傷寒事轉難夾食夾驚湏下積辨他虛實與重着喘虛莫下熱當下更與調榮患

廻安

先潮熱後傷寒加喘急失調成驚難治用南星九  
傷寒變  
疹門或白丁香膏見未少退潮熱如下盡熱方調  
氣或虛驚邪與蝴蝶丸一二服一切病門用意調理  
聖惠人參散治傷寒心腎煩悶喘促

人參

麻黃

去根莖

甘草

炙各半兩

貝母

煨

杏仁

炒各一分

粗散一錢水小盞煎五分不時量溫服

活人書麻黃湯見傷寒自汗門夏至後加知母半兩  
石膏一兩黃芩一分蓋麻黃性熱故也冬春虛寒

者用正方

葛根黃芩黃連湯

葛根四兩

黃芩

黃連各一兩

甘草一兩

剉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服日三二

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝去皮

芍藥各一兩

甘草六錢

杏仁十七個

厚朴薑炙

六兩三字

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一個煎八分溫服

覆取汗

麻黃杏子甘草石膏湯

麻黃

二兩

杏仁

廿五個

石膏

四兩

甘草

炙一兩

剉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服

大承氣湯

大黃

生二兩酒洗

枳實

二枚半炒

芒硝

合半

厚朴

薑炙四兩

剉如麻豆抄五錢七水二盞煎八分去滓入芒硝再煎一二沸溫服利為度

傷寒鼻衄第五

巢氏肺應皮毛主氣開竅于單寒客皮膚搏氣成熟

熱乘血血得熱則流從鼻出為衄凡熱病應衄者社  
熱頻發汗不出或未及發汗而鼻躁喘息鼻氣鳴即  
衄凡衄兒止半升數合則熱因以歇若一二升死  
活人書傷寒太陽證衄血乃解陽氣重故也仲景謂  
陽盛則衄脈浮緊無汗服麻黃湯不中病發煩目瞑  
劇者必衄小衄脈尚浮緊者再與衄後脉微勿用若  
脉浮自汗桂枝湯不中病證尚在必頭疼甚而致衄  
小衄而脉尚浮再與衄後脉微勿用大抵傷寒衄血  
不可汗脉微故也

衄勿發汗汗出額上陷脈緊急直視不瞬不眠然無汗而衄脉尚浮

緊再與麻黃湯有汗而衄  
脉尚浮緩再與桂枝湯

脉已微黃芩芍藥湯犀角

地黃湯衄血不止茅花湯若衄而渴心煩飲水則吐  
先五苓散次竹葉湯陰證無熱不衄若少陰病但厥  
無汗強發之必動血或從口鼻或從耳目是謂下厥  
上竭難治

千金麥門冬湯治兒未百日傷寒鼻衄身熱嘔逆

麥門冬

十八銖

石膏

寒水石

甘草

炙各兩

桂心

八銖

㕮咀水二升半煮一升服一合日三

聖惠竹茹散治傷寒鼻衄煩熱頭痛

苦竹茹

甘草

黃芩

各半兩

麥門冬

倍

伏龍肝

石膏

各一兩

粗散一錢水小盞煎五分不時量兒溫服

治鼻衄數日不止

生地黃

汁

白蜜

各一盞

蒲黃

兩

和微煖服半盞量兒分減頻服

生乾地黃二兩剉銀器中酒一中盞煎七分不時溫

分三服

亂髮燒灰細研頻吹鼻中

張渙立應散治傷寒血熱妄行鼻衄不止

石榴花

培

乾葛根

蒲黃

各半兩

細末半錢生地黃汁調下

活人書黃芩芍藥湯

黃芩

三分

芍藥

甘草

炙各半兩

粗末三錢水一盞煎六分溫服

犀角地黃湯

犀角

無升麻代

牡丹皮

各二兩

芍藥

三分

生地黃

半斤

剉如麻豆服五錢七水盪半煮一盞有熱如狂加  
黃芩二兩脉大來逕腹不滿自言滿者為無熱不  
用

茅花湯

茅花大一把水三盞煎一盞分二服無花用根

竹葉居膏湯

淡竹葉半把

石膏四兩

半夏二分

半分

人参

甘草四兩

各半

麥門冬四兩

半

僵加蠶一兩

剉如麻豆抄五錢水盪半粳米百粒煮八分米熟

湯成溫服

張渙雞峰方治傷寒時氣衄血不止

松煙墨細末雞子清和如桐子白湯下十粒  
生蘿蔔汁半盞鹽少許攪勻頓服

傷寒嘔吐第六

巢氏傷寒胃氣虛熱承虛入胃胃得熱則氣逆故嘔  
活人書無陽則厥無陰則嘔嘔者足陽明胃經陽明  
氣下行令厥上行氣逆則嘔仲景云嘔雖多不大便  
勿下與小柴胡湯上焦得通津液得下胃氣決和然

汗出而解大抵嘔證不一各有治法要之小柴胡湯

尤當服胃脹滿而嘔日晡潮熱加芒硝若不止心下

急鬱鬱微煩與大柴胡若大便祕加大黃

大柴胡治嘔最妙為

枳實去穢壓虛嘔雖有陽明勿下

古人治嘔用半夏生薑孫真人云

薑嘔家勝藥仲景皆用

太陽陽明合病必下利若不利但嘔葛根加半夏湯胃有

熱胃有邪腹痛欲嘔黃連湯太陽少陽合病自利若嘔者黃芩加半夏生薑湯

金匱諸嘔吐

穀不下小半夏湯小半夏加茯苓小半夏加橘皮湯可選用嘔而發熱主小柴胡嘔而發渴主猪苓湯先嘔却渴為欲解急與之先渴後嘔為心停心下屬飲

家仲景云本渴飲水而嘔紫胡不中宜治膈間水主  
赤茯苓湯若少陰證而嘔真武湯去附子加生薑若  
汗吐下後虛煩不得眠若嘔者主梔子生薑豉湯傷  
寒差後嘔者餘熱在胃腕竹葉湯加薑主之大凡嘔  
者飲食不下乾嘔為喎或因汗出或因有水或下利  
脾胃有熱便乾嘔官局桔梗湯最佳仲景汗出乾嘔  
者桂枝證也表不解心下有水乾嘔發熱者小青龍  
也身涼汗出兩脇痛或乾嘔者十乘湯也少陰下利  
脉微白通湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者白通加猪

膽汁湯少陰下利裏寒外熱脉微欲絕或乾嘔通脈  
四逆湯乾嘔吐沫頭痛吳茱萸湯傷寒論食穀欲嘔  
得湯反劇屬上焦也仲景無治法大抵吳茱萸湯  
湯治少陽證較入胃而嘔屬陽明宜小柴胡湯若直  
嘔吐而復脚弱或疼作脚氣治

聖惠治傷寒煩熱頭痛嘔逆麥門冬散

麥門冬

石膏

各三分

甘草

炙中兩

粗散一錢水一小盞煎五分不時量溫服

傷寒吐逆不寒藿香散

藿香

丁香

木香

葛根

各一兩

人參

甘草

炙各半兩

粗散一錢水小盞煎五分臨時分減溫服

涼一方一溫

酌用

嬰孺治傷寒壯熱嘔吐蘆根湯

生蘆根

合五

知母

十二分

淡竹青皮

五分

水三升煮一升爲三服更用冬瓜汁一升減水一升煮

活人書紫胡芑硝湯

柴胡

一兩

黃芩

人參

甘草

各半兩

半夏

酒洗  
四錢半

苦硝

一兩

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八分去滓內苦硝微沸溫服

大柴胡湯

柴胡

四兩

黃芩

芍藥

各兩半

半夏

一兩

枳實

炒二枚

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水二盞半煮八分去滓溫服利為度

欲下加大黃二兩

官局桔梗湯

桔梗

半夏

陳皮

各一兩

枳實

半兩

粗末三錢七水一盞薑五片煎七分溫服  
小半夏湯

大半夏

七枚

薑

薄片五

水一盞煎半盞食後溫服

葛根加半夏湯

葛根

一兩

麻黃

去節三分

甘草

炙

芍藥

桂枝

去皮各半兩

半夏

二分半

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚煎八分溫服

覆取汗

黃連湯

黃連

甘草

炙

乾薑

桂枝

各三分

人參

二兩

半夏

二兩

剉如麻豆每十錢七棗二枚水二盞煮盡半分二服

黃芩加半夏生薑湯

芍藥

甘草

各二分

黃芩

三分

半夏

二分

剉每五錢薑四片大棗一枚水二盞煮八分溫服

小半夏加橘皮湯

大半夏

枝七

薑

薄切五片

橘皮

一大片

水一盞煎半盞食後溫服

梔子生薑豉湯

梔子

枝七

薑

二兩半

香豉

二合

分二服水二盞煮梔子薑至一盞內豉同煮七分

溫服快吐止

十棗湯

芫花

炒赤

甘遂

大戟

等分擣秤再杵二三百下先以水升半煮肥棗十  
枚取八合去滓內藥強人一錢七羸人半錢棗湯  
送下平旦服若下少病不除明日再服加半錢利  
後糜粥自養合下不下令脹滿通身浮腫死

白通湯

附生  
枝一

乾薑  
兩

剉如麻豆抄五錢七水盞半葱白四寸煮七分服  
白通加豬膽汁湯

附子  
生半  
枝

乾薑  
半兩

葱白  
二  
莖

漏  
二  
合

水一盞煮五分去滓內猪膽汁半合和溫分服

通脈四逆湯自汗門

面赤加連鬚葱九莖腹中痛去葱加芍藥二兩嘔  
加薑二兩咽痛去芍藥加桔梗一兩利止脈不出  
去桔梗加人參二兩未差急作一劑脉續續出愈

吳茱萸湯

吳茱萸

洗一兩二錢  
三次

人參

三

剉如麻豆服四錢薑五片棗一個水二盞半煮八  
分分二服

莊氏治傷寒頭痛和氣止逆止渴人參散

人參

白术

麻黃

去根透明

藿香

甘草

炙

乾葛

各一

石膏

半兩

末一錢水一盞葱白一寸豉卅粒煎五分溫服

傷寒發渴第七

巢云傷寒熱渴是熱入藏藏得熱則津液竭燥故渴

活人書傷寒脉浮而渴屬太陽

表不解心下有水氣而渴小青龍去半夏桂枝汗後煩渴白虎加人參脈

加苦蔥湯太陽病脈桂枝汗後煩渴白虎加人參脈

浮小便不利微熱消渴五苓散四五日身熱惡風脅

下滿手足溫而渴小柴去半夏加人參苦蔥根太陽證身熱而渴者為風溫苦蔥根湯

有汗而

渴屬陽明

白虎加人參湯

虛人老人春秋月與竹葉石膏湯

陽明病頭汗小便不利渴引水身

去半夏加人參苦蓼湯

傷風寒熱或發熱惡風而

利而渴屬少陰

少陽小柴胡湯

下鞶不大便而嘔舌上白胎而

自利而渴屬少陰

故渴而引飲少陰下利喉嚨而嘔渴

渴屬少陽

少陽小柴胡湯

下鞶不大便而嘔舌上白胎而

自利而渴屬少陰

故渴而引飲少陰下利喉嚨而嘔渴

太陽證無汗而渴勿與白虎湯

仲景

者有熱白頭翁湯

云渴欲飲水無表證白虎加人參湯脉浮發熱無汗

表未解勿與白虎湯意小青龍小柴胡湯也仲景云

表不解心下有水咳或渴小青龍去半夏加苦蓼四

五日身熱惡風脅下滿手足溫而渴小柴胡去半夏

加人參苦蓼

汗後脈洪大而渴與之陽明證汗多而渴者

易與五苓散汗多胃中燥猪苓復利小便故也意竹

葉湯與之仲景云陽明病發作有時汗

加人參苦蓼

多急

此仲景妙法

仲景猪苓湯證六脉浮  
發熱渴小便不利宜之

凡病非大

渴勿與水若小渴咽乾小小呷滋潤之令胃和若大渴煩躁甚能飲一斗與五升全不與則乾燥無由作汗發汗死人見渴飲水作汗小渴遂剝飲致停飲心

下滿結喘死者甚衆當五苓散或陷胃丸

金匱云時氣五六日

渴欲飲水不能當與何者以腹中熱尚少不飲消之便更作病至七八日大渴欲飲水猶當依證與之常令不足人見仲景云得病反能飲此為欲愈小渴強飲因成禍大抵傷寒飲水過多致水停心下氣上乘心為悸為喘結于胃脅為水結胃中虛胃冷為噦嘔冷氣相薄為噎上迫肺為欬瀉腸中為痢邪熱所薄畜于下焦為小便不利小腹滿或裏急溢皮膚為腫若陽毒倍常躁盛大

渴黑奴丸中暑伏熱深累取不差發渴不已酒蒸黃連丸

聖惠大青散治傷寒頭痛壯熱煩渴

大青

知母

柴胡

葛根

甘草

川升麻

黃芩

赤芍藥

梔子仁

各半兩

石膏

一兩

川芎

硝一  
分

粗散一錢水小盞煎五分不時溫服量兒

治傷寒壯熱頭痛口乾煩渴柴胡散

柴胡

麻黃

去根節  
各半兩

赤芍藥

黃芩

葛根

甘草

炙各一分

石膏

兩

粗散一錢水小盞鹽少許葱白三寸豉廿粒煎五分不時溫服汗為效量兒丁時發有前胡半兩治傷寒煩熱大渴不止赤瓜根

土瓜根

麥門冬

焙

紫胡

各半兩

葛根

枇杷葉

去毛炙

甘草

炙各一分

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫服

張渙葛根湯治傷寒體熱煩渴

葛根

人參

各二兩

麥門冬

甘草

炙

白茯苓

澤瀉各半兩

細末一錢水八分一盞薑二片薄荷三葉煎六分

溫服

活人書白虎加人參湯

石膏

四兩

知母

兩半

甘草

半兩半

粳米

合半

人參

三分

剉如麻豆炒五錢七水蓋半煮八分米熟為度溫  
服

苦蘿根湯

苦蘿根

三分

葛根

生兩半錢

石膏

二兩

人參

防風

甘草

半兩各

剉如麻豆服五錢水盞半煎一盞服

白頭翁湯

白頭翁

兩

黃藥

秦皮

黃連

各半兩

剉如麻豆分五服水二大盞煮八分溫服不差更

服

大陷胃丸

大黃

二兩

苦蘿蔔

熟

芒硝

杏仁

熟各三分

刀刀所

卷一

三三

文

羅研如脂丸彈子大服一丸甘遂

性猛虛實用

末一字

七白蜜一合水二盞煮一盞頓服一宿廻下不下

再服

黑奴丸

麻黃

去節泡一二  
沸結三兩

大黃

二兩

釜底煤

黃芩

芒硝

竈突墨

梁上塵

小麥奴

各一  
兩

羅末蜜丸彈子大新汲水研一丸渴與冷水盡足  
飲之湏臾當寒寒竟汗出差日移五尺不汗再服

一丸湏微汗麥奴麥未熟時叢中不成麥捨成黑  
勃無此亦得湏病人渴倍常可與不渴番成禍

酒蒸黃連丸

黃連

四兩無灰酒浸面  
上約一升重湯熱

羅末糊丸熟水下三十丸胃膈涼不渴效

傷寒大小便不通第八

巢氏寒搏氣而生熱熱流大小腸故澀結不通是內  
熱不歇或乾嘔或言語而氣還逆上則心腹脹滿  
聖惠大黃散治傷寒壯熱心躁頭痛口乾大小便赤

難

川大黃

炒兩

梔子仁

赤芍藥

甘草

炙

黃芩

各一分

粗散一錢水中盞煎五分量溫服利效

三黃散

川大黃

微炒

麥門冬

倍半兩

石膏

一兩

甘草

炙

川芒硝

黃芩

黃連

各一分

粗散一錢水小盞煎五分頻服利效

張渙犀角散治傷寒六七日大便不通熱甚

犀角

川大黃

炮

柴胡

各

人參

半

朴硝

甘草

炙各  
一分

細末一錢水八分蜜二片棗一枚煎五分溫服量  
加減

活人書治壯熱頭目碎痛背搏拘急大熱衝上口苦  
唇焦夜卧舌乾咽喉腫痛溼嚥稠粘痰壅喫食不進  
心神躁熱眼澁睛痛傷寒鼻塞四肢沉重語聲不出  
百節痛大小便不利豌豆瘡時行瘟疫狂語多渴及  
兒天癟夜驚洗心散

大黃

末用慢炒

當歸

炒

芍藥

甘草

炙

荆芥

各四兩

白朮

兩炒一

細末抄二錢水一盞薑一片薄荷二葉煎八分溫  
和滓服畧卧去枕少時如五藏壅實煎四五錢七

要治轉熱服

傷寒發狂第九

餘躁熱發狂附

活人書傷寒陽毒發狂畜血如狂證與脉俱不同病  
人煩躁狂走妄言面赤咽痛脉實潮熱獨語如見鬼  
為陽毒仲景云傷寒吐下後不解不大便六日至十  
餘日日晡潮熱不惡寒獨語如見鬼劇者不

承氣湯人猶衣摸床惕惕不安微喘直視但發熱譏語大

氣湯若一服利止脉弦者陽生瀉者陰死陽證見

脈陰脉死陽證

見

脉瀉勿下無表證不寒熱唇燥欲漱水不欲入咽

脉微沉小腹鞭滿小便反利大便秘黑身黃發狂血

證諦也

熱壯渴滿口燥脉反無熱為陰血證審矣仲景云太陽病不解熱結膀胱人如狂血自下

愈外不解者尚未可攻當先解表宜桂枝湯大抵傷

外已解但小腹結者杏仁承氣湯攻其結

桂枝湯大抵傷

寒當汗不汗熱在裏化為血喜忌如狂血上逆則喜

忘血下畜則內爭甚者抵當湯抵當丸輕者桃仁承

氣犀角地黃湯盡取黑物效

有畜血證而外不解未可便用抵當湯先用桂

桂湯以解外緣失汗然畜勝胱太陽經也

又火邪發驚狂者醫以火卧床

下或以火迫周身刲汗或熨成火邪其人亡陽煩躁  
驚狂卧起不安桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆  
湯桂枝甘草龍骨牡蠣湯凡灸及燒針後證似大胡  
者用刲法金匱風引湯尤

良驚痛門柴胡加  
龍骨牡蠣湯更捷

桃仁承氣湯

桃仁五枚

十

大黃四兩

桂枝皮去

甘草炙

芒硝各二兩

剉如麻豆服五錢七水二大盞煮八分溫服未利  
移時再服

抵當湯

即此丸

水蛭

十枚  
為害者甚須剉石灰炒耳熟

桃仁七枚

大黃

去皮一兩酒洗  
十枝去足熱

蜜蠅

剉如麻豆作二服水二盞煮七分溫服

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

桂枝

兩

蜀漆

洗去  
各兩半

甘草

炙一  
兩

牡蠣

二半煅

龍骨

二兩

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八

分溫服

桂枝甘草湯

桂枝

去皮半兩

甘草

炙

牡蠣

熬

龍骨

等分

剉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫服

紫胡加龍骨牡蠣湯

紫胡

二兩

黃芩

一兩

鉛丹

人參

桂枝

龍骨

牡蠣

煅各三分

半夏

湯洗半錢

大黃

半兩

剉如麻豆五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八分

溫服

傷寒結胃第十

活人書傷寒本無胃結應身熱下旱熱乘虛入痞結

不散便成結胃

若誤轉未成結胃頻與理中湯自解

薰四逆湯便安胃中雖和傷寒未退者候日數足可

下承氣湯再下之

其證心下繫滿

按之石硬而痛項強如柔症狀

發熱汗出不惡寒名柔症

脉寸口

浮關尺皆沉大率當下脉浮大下之死尚宜汗

仲景結胃

脈浮弱下只用小柴胡湯等發表

證罷方與結胃藥便安

崔行功

云傷寒絕胃欲絕心高手叵得近大陷胃湯不差是

下虛遂氣已不理毒復上攻氣毒相薄結胃中枳實

理中丸理氣次療諸疾然結胷有三種大結胷

不按而痛

胷連脅腹堅硬

大陷胷丸

小結胷

按之心不痛

水結胷

胷亦名結

胷

頭微汗加茯苓湯

但結胷無大熱

小柴胡去棗加牡蠣

又有熱實結胷

半夏

又有熱實結胷

胷

煩躁心內懊憹舌上燥渴脉沉滑者皆熱證

大陷胷湯

寒實結胷

無熱證

白散枳實理

中物

近世結胷多行金針丸硫黃陽起石寒實結胷或  
差若熱實胷行之死大陷胷湯用甘遂太峻須量虛  
實輕重大陷胷丸最穩聖餅子灸臍尤不可藏結仲  
景無治法大抵藏結如結胷狀飲食如故時時下利  
門脈浮關脉小細沉緊舌上白胎滑者難治

理中湯

人參

乾薑炮

甘草炙

白朮各三兩

腹痛加人參兩半寒加乾薑一兩渴欲得水加白  
朮兩半脾上築腎氣動也去白朮加桂四兩吐多  
去朮加生薑三兩下多用朮悸加茯苓二兩四肢  
拘急腹漏下利或轉筋去朮加生附一枚

剉如麻豆抄五錢七水盞半煮八分溫服日三

小陷胸湯

半夏

湯洗二兩半

黃連

一兩

剉如麻豆服五錢菰蘇半枚水二盞煎九分溫服  
未知再服利黃涎便安

大陷胸湯

錦紋大黃

半兩芒硝一兩

甘遂

赤連珠者二兩

末水三盞煮大黃至一盞去滓下芒硝一沸下甘  
遂溫服快利止

又方

桂枝

人參各一

甘遂

半兩

大棗

三枚

菰蘇實

一分之四一枚用四

剉五錢七水二盞煮八分溫服。胃中無堅物勿服。

枳實理中丸

枳實

炒六片

茯苓

人參

白术

乾薑

炮

甘草

細末煉蜜丸如雞子黃熱湯化一丸連進二三服。  
胃中豁然渴加苦蘿二兩下利加牡蠣二兩煅。

三物白散

桔梗

貝母

各三分

巴豆

熬黑研如脂一分

散白飲和服強人半錢羸減之病在膈上必吐膈

下必利不利進熱粥利不止進冷粥身熱皮粟不解引衣自覆若水啜并洗益令熱却不得出當汗不汗則煩假令汗出已腹中痛與芍藥三兩如上法

古方金針丸治結胷傷寒

陽起石

不灰木

各半  
丙分

硫黃

巴豆

杏仁

各三  
七枚

擣細末糯米粥丸如櫻桃以針劄竅子晒乾如患者以劄針用麻油紙燒烟盡細研炒生薑湯調一

丸患重夾轉藥兩三丸金針丸下不妨更量虛實

存此者欲人知湏審用

傷寒腹痛第十一

附腹滿

栗氏傷寒熱入腹傳于藏氣結聚故腹滿若挾毒者  
腹滿疑作痛心煩懊悶多死

活人書腹痛本太陽病反下之腹滿時痛是有表復  
有裏仲景用桂枝加芍藥湯主之痛甚加大黃即小  
建中  
太陰脉弱自利設當行大黃芍藥宜減之胃難經云  
虛陽氣易動故也下利者先煎芍藥十餘沸  
痛為實宜下外景云發汗不解腹滿痛宜大承氣  
湯逐積滿痛為實當下屬大柴胡湯腹

有熱痛有冷痛尺脉弦腸鳴泄利而痛冷也小建中湯仲景云陽脉瀉陰脉弦法當腹中急痛與小建中

湯不差與小柴胡湯

小柴胡去黃芩加芍藥

陰證腹痛即四逆

散通脉四逆加芍藥湯腹痛小便不利真武湯關脉

實腹滿大便秘按之痛實也桂枝加大黃湯黃連湯

大承氣湯主之腹脹滿陰陽不和也桔梗半夏湯最

良仲景論太陽證發汗後腹脹滿厚朴生薑半夏甘

草人參湯下後心煩腹滿卧起不安梔子厚朴湯附

後腹脹滿調胃承氣湯少陰病六七日腹脹不大便

急下承氣湯

桂枝加芍藥湯

桂枝去皮三兩

芍藥六兩

甘草二兩

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八分溫服下利先煎芍藥三四沸

桂枝加大黃湯

桂枝去皮兩半

芍藥三兩

甘草炙一兩

大黃各一兩

痛甚加大黃大實痛加兩半羸者減

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚煮八分溫服

桔梗半夏湯

枳實

半兩  
炒

桔梗

微  
炒

半夏

一  
錢  
製

陳皮

各一  
兩

厚朴生薑半夏甘草人參湯

厚朴

四  
兩

半夏

一  
錢  
分

甘草

一  
錢

人參

半  
兩

剉如麻豆

抄五錢七水鍾半薑五片煮八分溫服

梔子厚朴湯

大梔子

七  
枚  
擘

厚朴

二  
兩  
枝

枳實

二  
枝  
炒

初分二服

水二盞半煮八分溫服得吐止

傷寒下痢第十二

傷寒後  
下痢附

東氏傷寒表熱雖歇而裏熱猶停腸胃與水穀相併  
腸胃虛則泄痢痢色黃若熱不止變血痢若重遇冷  
熱相加變赤白滯痢

活人書傷寒下痢多種湏辯識陰陽

三陽下痢身熱  
太陰下痢手足

溫少陽脉証用溫熱藥緩黃生斑死

太陽陽明合病必

痢葛根湯主之

下痢頭疼腰痛肌熱身

太陽少陽合

病自痢黃芩湯主之若嘔黃芩加半夏生薑

下利頭痛脣滿

或口苦咽乾或往來寒熱而嘔脈浮大而弦

陽明少陽合病必痢脉不負

者順負者失互相刺賊名負

下痢身熱膚瘡滿乾  
嘔或往来寒熱脈長大

而弦蓋陽明土脉長大少陽木脉弦合病土被木  
更下痢為胃困若脉不弦者順為土不負負者死

自痢不渴屬太陰

四逆湯理中湯

自痢而渴屬少陰

白通湯  
加

猪膽湯通脈四逆湯猪苓湯  
四逆加人參湯可檢證用

餘下痢皆汗下後證大

抵傷寒下痢湏者脉與外證下痢脉大者虛脉微弱

者自止下痢日十餘行脉反實者逆下痢脉數滑者

有宿食下之愈脉遲滑者實痢未便止宜下下痢三

部脉皆平按其心下硬者急下挾熱痢臍下必熱大

便赤黃及腸間津汁垢膩

謂之  
腸垢

寒毒入胃則癥臍下

必寒腹脹滿大便或黃白或青黑或下利清穀濁毒  
氣盛則下利腹痛大便如濃血或如爛肉汁下利欲  
飲水者有熱下利讞語有燥屎寒毒入胃四逆湯理  
中湯白通加附子四逆散加薤白挾熱利黃芩白頭  
翁湯三黃熟艾湯薤白湯赤白脂丸濕毒下濃血者  
桃花湯地榆湯黃連阿膠散雖自利而渴屬少陰然  
三陽下利亦有飲水者有熱也三陰下利宜溫少陰  
自利清水心下痛口乾燥宜下此又不可不知

少陰利泄

下重多投熱藥濃煎葱白湯內四逆散用枳實芍藥之類尋常胃中不和腹中雷鳴下利生薑湯二

傷寒  
法不特

葛根湯

葛根兩二

麻黃半兩

桂枝皮去皮一錢

甘草炙一錢

芍藥各二兩

剉如麻豆抄五錢七薑四片棗一枚水盞半煮八分溫服覆取汗

黃芩湯

黃芩半兩

芍藥

甘草各一錢

剉如麻豆抄五錢棗一枚水盞半煮八分溫服

黃芩加半夏生薑湯

黃芩  
錢三

半夏  
二分半

芍藥

甘草各  
三分

剉五錢薑四片大棗一枚水二盞煮八分溫服

四逆加人參湯

甘草  
二兩

附子  
一枚

人參  
一兩

乾薑  
半兩

剉如麻豆抄五錢七水蓋半煮八分溫服日三

三黃熟艾湯

黃芩

黃連

黃蘖

各三兩

熟艾

半錢大

剉如麻豆水二盞煮七分溫服

幼新編 卷十五  
蓮白湯

豉

半斤綿裹

薤白

一握

梔子

七枚大者破之

剉如麻豆水二升半煮梔子十沸下薤白煮二升  
下豉煮升二合服一湯盞

赤石脂丸

黃連

當歸

各二兩

赤石脂

乾薑

各一兩

末煉蜜丸桐子米飲吞卅丸日三

桃花湯

赤石脂

四兩

乾薑

一分

剉如麻子四錢梗米二撮水盞半煎一盞去滓入  
赤石脂末方寸匕日三一服愈即止

地榆散

地榆

黃連

微炒

犀角

茜根

黃芩

各二兩

梔子仁

半兩

粗末四錢水一盞薤白三寸煎六分不時溫服

阿膠散

黃連

二兩微炒

阿膠

炒

黃蘖

微炒

各一兩

梔子仁

半兩

粗末四錢水一盞煎七分不時溫服

生薑洗心陽

黃芩

甘草炙

人參各半

乾薑

黃連

各半兩

半夏一

兩一分

剉如麻豆炒五錢七水盞半薑七片棗二枚煮一盞服

丁時發苦蔓散治傷寒煩躁大便不止身熱

苦蔓根

麥門冬

甘草炙

紫胡

葛根

各半兩

枇杷葉

一分炙黃

末一錢水一盞煎七分溫服

傷寒口內生瘡并喉痛第十三

巢氏傷寒口生瘡熱毒在巖上衝胸膈氣發于口故  
生瘡

咽喉痛者心胃熱盛氣上衝咽喉故痛若挾毒則喉  
痛結腫水漿不入毒還入心煩悶死

活人書咽喉痛有陰陽二證脈浮數面赤班班如錦

紋咽喉壅濃血者陽毒也

陽胸盛陰暴絕必躁狂走妄言面赤咽痛身如

錦紋或下利赤黃脉洪實或骨促宣酸苦藥令陰氣  
復而大汗解矣草薑苦酒湯陽毒升麻湯大黃散施  
子仁湯黑丸可選用近治傷寒脉洪大內外結熱  
舌卷黑車中如烟煤疊布數重新水潰稍換去水

搭胃上日數易熱甚置病人水 中亦良

脉沉遲手足厥冷或吐利咽痛

少陰證也病源云此下部脉都不至陰陽隔絕邪客足少陽脾毒上衝故咽不利或痛生瘡傷寒脉陰陽俱緊汗出少陽也屬少陰法當咽痛而復吐利汗下薰熨俱不可汗出者藁本粉傅之咽喉痛者甘草湯桔梗湯猪膚湯半夏散通脉四逆去芍藥加桔梗湯麻黃升麻湯可選用又有伏氣病謂非時暴寒中人伏氣于少陰經旬月乃發脉微弱怯先咽痛似傷寒非喉痺病次必下痢用半夏桂甘湯次四逆散只一

二日差古謂腎傷寒也

十物升麻湯治傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心脹  
堅急大小便不利或口瘡或壯熱因四肢攣掣驚仍  
作癇時發時醒醒後身熱如火

治胃中客熱口臭不思飲食或肌煩不欲食齒齦腫  
疼濃血舌口咽有瘡赤眼目臉重不欲開瘡疹已發  
未發甘露飲子

草蘆苦酒湯

苦酒即米醋  
升半合 草蘆熬一升 生艾汁半升無黃熟  
或根汁

煎七合作三眼

陽毒升麻湯

升麻二分

犀角

射干

黃芩

人參一

甘草

剉如麻豆水三升煎升半飲一湯盡食項再服溫  
覆手足出汗不解重作

大黃散

川大黃半

兩

桂心三分

一

甘草

炙

木通

大腹皮二

兩

川芒硝二

兩

桃仁廿一枚

炒

桂枝

一

粗末四錢水中盞煎六分不時溫服利為度

梔子仁湯

梔子仁

知母

赤芍藥

大青

各一  
兩

柴胡

半兩

川升麻

黃芩

杏仁

炒

石膏

各二  
兩

甘草

半  
兩

粗末抄四錢水中盞薑半分豉百粒煎六分不時溫服

仲景甘草湯

甘草

二  
兩

剉如麻豆四錢七水盞半煮六分溫服日二

桔梗湯

桔梗一

甘草二

剉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫分再服

猪膚湯

猪膚一

錢二兩半

水二大盞半煮一盞許去滓加白蜜合半白粉一

合

半夏散

半夏

洗湯

桂枝

去皮

甘草

炙

等分服三錢水一盞煎八分冷少少嚥

麻黃升麻湯

麻黃

去節二兩半

升麻

當歸

各一分兩

知母

黃芩

萎蕤

各三分

芍藥

天門冬

桂枝

茯苓

甘草

炙

石膏

綿裹

白朮

乾薑

各一分

剉如麻豆抄五錢水

盞半

煮八分

溫服一炊久進

一眼汗出愈

半夏桂枝甘草湯

半夏湯洗

甘草炙

桂心

剉如麻豆四錢七水盞半煎七分冷少含細嚥

十物升麻湯

升麻

白薇

麻黃

萎蕤

柴胡

甘草

各半兩

黃芩

一兩

朴硝

大黃

釣藤

各一兩

剉如麻豆服三錢水一盞煎七分去滓下硝煎溫

服

甘露飲

熟地黃

生地黃

天門冬

麥門冬

焙

枇杷葉

去毛

枳殼

炒翹

黃芩

石斛

山茵陳

甘草

細末

二錢水一盞煎六分食後臨卧溫服

傷寒發斑第十四

餘發  
附

東氏胃主肌肉傷寒溫壯熱挾毒蘊積于胃薰發肌肉狀如蛟蛇噬赤班起周匝遍體此或傷寒或時氣或溫病由熱不歇入胃變毒發斑赤者十生一死黑

者十死一生

漢東王先生斑瘡水豆宣麥湯散解之次透闕散更進敗毒散各三二服不退進槐花散一服微利觀音散調胃胃氣不和門再用七寶輕青丹單傷寒門

活人書溫毒發班冬冒寒毒至春始發

初在表或一發汗吐下表

證未罷毒氣不散故發班黑膏主之又冬月溫暖人感平戾之氣春或被積寒所折毒氣不泄至天氣暄熱溫毒始發肌肉班癩癰瘍如錦紋而紅心悶但嘔青汁葛根橘皮黃連橘皮湯並佳

發斑與時氣發班並同或未發汗或已經汗下而熱毒不散表虛裏實乘虛出干皮膚所以發班瘻如錦

紋俗名麁瘡素問謂疹

下卑熱氣乘虛入胃下大遲  
熱留胃俱發斑服熱藥過多

亦發斑大抵斑勿表蓋表虛裏實若發汗重令開泄更

增斑爛當用化斑湯白虎加人參湯中添萎蕤玄參升麻湯阿膠大青四物湯猪膽雞子湯紫雪尤妙可

下者調胃承氣湯

暑月病陽重者常宣體候見微有斑急治

寶鑑歌

傷寒毒熱胃中存勿作斑瘡出滿身若見口唇烏似墨只應長徃在逡巡

形證論歌

傷寒胃熱作斑瘡倒饅因風氣受傷損汗內虛  
多紫黑大者為陰小者陽

惠濟歌

斑毒常推是豆瘡肺兼腎藏有風傷渾身熱甚  
四肢冷肺裏煩冤痛莫當胃發連皮肌肉下好  
交心熱變清涼次與調脾仍趕趨體冷舌黑在  
隄防

聖惠治熱毒發斑心神煩悶大青散

大青

玄參

川升麻

川大黃微炒

甘草

炙

梔子仁

酒各半

篩散一錢水小盞煎五分不時量兒溫服

治陽毒壅盛發斑心躁皮膚焮痛犀角散

犀角

川升麻

白蘚皮

梔子仁

漏蘆

川大黃

炒

赤芍藥

甘草

炙各半兩

寒水石

兩一

篩散一錢水小盞煎五分不時分減溫服

治斑瘡大便壅滯心神煩躁大黃散

川大黃

炒微

甘草

炙

枳殼

炒熟

黃芩

各半兩

細散不時新汲水調一錢三歲下半錢

治癰斑散惡毒氣

生葵菜葉絞汁少服又黑豆汁徐服

治斑疹痘瘡心神煩躁眠卧不安青黛散

青黛半兩

細研煖磨刀水調半錢日三量兒服

瀋東王先生麥湯散治傷寒欬嗽溫壯水痘

地骨皮炒

甘草炙

滑石各半分

麻黃去節

人參

知母

羌活

大黃

煨紙

甜荳

隔紙炒各一分

末嬰兒服一字或半錢三五歲一錢水半盞小麥  
七粒或二七粒煎數沸服

通經透關散治斑瘡水痘心躁發渴大小便不通及  
赤色口舌生瘡

地扁竹

嫩半兩焙

山梔仁

炒半分

大黃

木通

車前子

並炒

滑石

瞿麥去粗梗

甘草

炙各一分

末嬰孩服一字二三歲半錢四五歲一錢水半盞

紫草三寸煎數沸溫服

活人書黑膏

生地黃半斤

好豉一升

豬膏二斤合露之煎三分減一絞滓內豆大雄黃  
麝榔和盡服之毒從皮出愈忌薰蒸

葛根橘皮湯

葛根

橘皮

杏仁

知母

黃芩

麻黃去節

甘草炙各半兩

剉如麻豆服五錢水盞半煎一盞溫服

苦楂皮湯

黃連

丙四

橘皮

杏仁

枳實

麻黃

葛根

厚朴

甘草

各一  
兩

化斑湯

人參

石膏

各半

萎蕤

知母

甘草

各一  
分

剉如麻豆抄五錢水盞半糯米一合煎八分米熟  
為度溫服

元參升麻湯

幼幼新書  
卷十五  
元參

升麻

甘草

炙各半兩

剉如麻豆抄五錢七水盞半煎七分溫服

阿膠大青四物湯

大青

四兩

阿膠

甘草

並炙一兩

各

豉

八合

剉如麻豆抄五錢水盞半煎一盞旋入膠煎

猪膽雞子湯

猪膽

苦酒

各三合

雞子

一枚

合煎三沸強人盡服羸人煎六七沸服汗出甚

傷寒發黃第十五

亦名黃病  
餘醫  
附

東氏熱入脾胃蘊積與穀氣相搏蒸發于外故皮膚悉黃眼亦黃脾胃肌肉俱象土故色黃或傷寒或時行或溫病皆熱不時解入胃也凡發黃下痢心腹滿死脈沉細死半歲內兒傷寒溫病身黃亦是胃熱將息過度所為薄其衣數與除熱粉散自歇不得妄與湯藥及灸

活人書寒濕在裏不散熱蓄脾胃腠理不開瘀熱與宿穀相薄鬱蒸不消故發黃漢贊南方暑濕近身病熱蓋痺者黃也古以黃為痺濕熱相薄民多病痺甚為明腫然發黃與瘀血外證及脉俱相似

但小便不利為黃小便自利為瘀血要之發黃心脾  
蘊積發熱引飲脉必浮滑而緊數若瘀血證即如狂  
大便必黑為異凡病人身體發熱頭面汗出身無汗  
癥頸而止渴引水小便不利必發黃茵陳蒿湯五苓  
分加茵陳散五分溫水調三錢日三小便利如皂莢汁赤一宿

黃減黃從小便出古云治濕不利小便非其治也梔  
子蘖皮湯麻黃連翹赤小豆湯可選用傷寒欲發黃  
急用爪帶末口含水搐一字入鼻出黃水用茵陳酒  
調五苓散白虎與黃證相近遍身汗為熱越白虎證

也頭面汗顎下無汗發黃證也又一身盡痛發熱身如薰黃此太陽中濕也仲景云傷寒發汗已身目為黃寒濕在裏不解故也勿下于寒濕中求之

風雨裏虛山溝

蒸氣人多中濕濕流關節渾身體頑痛脉沉緩為中濕脉細非也主一身盡痛發熱則黃小便自利木附湯若小便不利大便反快當利小便宜甘草附子湯五苓散麻黃加白朮湯

脉弦浮大短

氣腹滿脅及心痛久按之氣不通臚乾不得汗嗜卧身目悉黃小便難有潮熱時時欬嗽少陽中風也主

小柴胡湯

千金方

擣土瓜根汁三合服

聖惠  
安和

又韭根汁澄清灌鼻中出黃水差

外臺療天行三日外忽覺心上滿堅硬脚手心熱癢  
為黃不療殺人秦艽湯

秦艽

紫草

白蘚皮

黃芩

梔子仁

等分切水一大升半牛乳一大升煮七合分二服  
意量

經驗方治遍身金色

瓜蒂

六月六日收各四十九個

丁香

入甘鍋燒烟盡各半個

細研勻兒半字吹鼻內及揩牙

聖惠茵陳散治黃病身如橘色

茵陳

川朴硝

各一兩

梔子仁

川大黃

炒半兩

黃芩

犀角

寒水石

木通

各半兩

篩散一錢水一小盞煎五分不時溫服意量

治脾胃熱毒致肌肉變黃小便赤色心中煩懊茵陳

丸

茵陳

梔子仁

川大黃

炒

甘草

炙

秦艽

各一兩

川朴硝

半兩

末煉蜜丸如菉豆不時湯下五丸量與

治諸黃大黃散

川大黃

炒

黃連

苦蘿根

黃芩

梔子仁

各半兩

粗散一錢水小盞煎五分不時溫服意量

大黃丸

川大黃

炒

甜葶藶

隔紙炒紫

茵陳

各半兩

半

羅末煉蜜丸如梧子不時新汲水研三丸量服

治身面俱黃黃爪丸

黃連

一兩

胡黃連

半兩

羅末黃爪一枚去瓤留蓋子入藥末蓋定大麥麪  
裹燒焦去麪擣丸菉豆大一歲一丸量加

嬰孺茵陳湯

茵陳

升麻

黃芩

柴胡

知母

羚羊角

各八分

大黃

石膏

各錢二分

梔子

錢一

芍藥

六分

爪蒂

七個

藍葉

一升

甘草

錢二

切水五升煮升半一二歲為八服四五歲為四服

張漢蘆根湯

蘆根

一兩

茵陳

山楂

黃芩

甘草

炙各半兩

細末一錢水八分薄荷三葉煎五分溫服

活人書茵陳蒿湯

茵陳蒿

嫩者兩半兩

大黃

去皮半兩

梔子

大者三枚半兩

剉如麻豆水二大盞煮茵陳減半內二味煮八分

溫服日三

梔子蘖皮湯

梔子

八枚

黃蘖

一兩

甘草

炙半兩

剉如麻豆抄五錢水蓋半煮七分溫服

麻黃連翹赤小豆湯

麻黃

去節

連翹

用根

甘草

炙各一兩

赤小豆

半升

生梓白皮

二半兩

杏仁

廿枚

剉如麻豆抄五錢薑四片棗一枚水蓋半煮八分

溫服

术附湯

白术

兩二

附子

半個

甘草

炙兩

剉如麻豆抄五錢薑五片大棗一枚水盞半煮七分溫服日三一服覺身痺半日許再服三服都盡如冒狀是附术走皮遂水氣未得除耳法當加桂一兩大便堅小便自利不加

甘草附子湯

甘草

一兩

白术

各一兩

附子

炮一枚

桂枝

二兩

剉如麻豆抄五錢水盞半煮七分溫服汗出解身腫加防風二兩悸氣小便不利加茯苓兩半

麻黃加术湯

麻黃

半兩

桂枝

去皮一兩

甘草

炙

蒼术

各半兩

杏仁

卅枚

五

剉如麻豆抄五錢水盞半煮八分溫服

傷寒餘熱不退第十六

巢氏傷寒邪氣與正氣交爭正氣勝則邪氣散故寒  
熱俱歇若邪氣未盡時干正氣則壅痞還熱故餘熱  
往來不已其狀肉常溫溫赤熱

聖惠傷寒四五日熱入裏下後熱不除是餘熱未盡

漢東王先生日中可夜熱甚天明復涼為餘熱未解  
聖惠藏蕤散逐毒氣

歲蕤

川大黃

炒

川升麻

甘草

黃芩

大青

各半兩

羅散一錢水小盞煎五分不時量服

治傷寒汗利後熱不除口乾心煩不乳黃蓍散

黃蓍

知母

赤茯苓

甘草

黃芩

各一分

麥門冬

焙半兩

羅散一錢水小盞煎五分不時溫量服

麥門冬散治傷寒汗利後餘熱不解身體疼痛心神虛煩不思乳食

麥門冬

川升麻

紫胡

前胡各半兩

元參

犀角

子芩

葛根

赤芍藥

甘草

炙各一分

羅散一錢水一小盞薑少許煎五分不時溫量服  
治傷寒後餘熱不除心神不安茯神丸

茯神

麥門冬

焙

鐵粉

朱砂各半兩

犀角

梔子

白蘚皮

川升麻

外  
元參

車前子

摶羅煉蜜丸如菉豆不時湯下五丸量加

傷寒後餘熱不除四肢不利用浴湯

川大黃

甘草

防風

丹參

白朮

各半兩

雷丸

三分

散一兩水三升煎二升半去滓密室中浴兒宜避

風隔日再用

嬰孺豬脂和庫頭足遍身

醫局治傷寒汗後表證解心腎煩渴欲飲水反吐或  
下痢後七八日邪毒不解熱結在表表裏俱熱時時

惡風大渴舌乾燥煩欲飲水數升又治夏月中暑毒  
汗出惡寒身熱而渴白虎湯

石膏

洗廿五斤

知母

百十五兩

甘草

七十五兩

細末服三錢水盞半粳米三十餘粒煎一盞溫服  
或加人參食後服夏宜服春秋并亡血虛家勿服

治傷寒當取白虎湯此方叙  
邪毒不解熱結在裏故收之

嬰孺除熱粉散

雷丸

三兩

牡蠣

桂心

各一兩

為粉兒身

張渙解傷寒邪熱餘毒清涼湯

當歸

生地黃

各一兩

芍藥

甘草

炙半兩

細末一錢水八分竹葉薄荷各少許煎五分溫服

傷寒勞復第十七

活人書傷寒新差血氣尚虛津液未復因勞動生熱  
熱復入經脅名勞復仲景云小柴胡湯主之脉浮者  
汗解柴胡桂枝湯 脉實者下解大柴胡湯 又大病勞復枳實梔  
子湯千金起死麥門冬湯又大病新差脾胃尚弱穀

氣未復強食過多停積不化發熱名食復

新病差多  
因傷食作

病下乾嘔食夏腹中雷鳴下痢生薑瀉心湯

黃帝曰熱病已愈時有所

遺者何也岐伯曰諸遺者熱甚而強食故有所遺也

若此者皆病已無而熱有所藏因其穀食相薄兩熱

相合故有所遺也黃帝曰善治遺柰何岐伯曰視其虛實調其逆從何使必已食肉則復多食則遺此其

禁也廣濟療勞復確鼠屎散許仁則七味葱白湯可選

用

千金五味子湯治傷寒久不除差後復劇瘦瘠骨立

五味子

銖十

甘草

炙

當歸

各十  
銖

芒硝

五  
銖

石膏

一  
兩

大黃

麥門冬

黃芩

前胡

黃連

各六錢

㕮咀水三升煮升半服二合得下便止量加減

活人書紫胡桂枝湯

紫胡

二兩

半夏

三錢一  
字

甘草

炙半兩

桂枝

去皮

黃芩

人參

芍藥

各三分

剉如麻豆抄五錢薑四片棗一枚水盞半煮八分

溫服

枳實梔子湯

枳實

炒熟二枚

梔子

肥者七枚

豉

二兩

清漿水二盞半煮八分內枳實梔子取九分下豉  
再煮五六沸溫服覆汗出有宿食內大黃如博葵  
子五六枚同煎

麥門冬湯

麥門冬一兩

甘草二兩

剉如麻豆水二小盞粳米半合煎未熟去米約水  
小盞半入藥五錢棗二枚竹葉十五片同煎一盞  
服

雄鼠屎散

雄鼠屎

二七粒頭尖者

梔子

十四個

枳殼

一枚三枚

粗末四錢水盞半

葱白二寸豉三十粒煎一盞分

二服勿令病人知

許仁則七味葱白湯

葱白

連鬚半升

乾薑

三合

新豉

半合綿裹

薑

三分

麥門冬

兩

乾地黃

三兩

勞水

四升洋千遍杓

前三分減二分二服漸復取汗

傷寒失音第十八

聖惠喉嚨氣之道路喉嚨氣之門戶舌者聲之機口

者聲之扇風寒客嘆囁間故卒無音

茅先生方

金毛狗脊 甘草

等分末一錢煮臘指頭大水六分煎四分服

集效方

桂指面大含之漸漸聲音如舊

王氏三拗湯

麻黃

全

甘草

生

杏仁

全

等分服三指撮水一大盞煎七分時時溫呷

傷寒變疽第十九

石壁經歌

先前五日臉紅鮮一見生人怕又驚

一傷寒變疽七日前

兩臉唇青  
怕語言

驀覩胷前赤瘡起漸同梅李一般形

血光齒上時聞臭指甲無紅色似銀會者可醫  
無苦病不識言風道熱驚用藥表脾涼上膈心

涼疽伏始安寧

鳳髓經宜二聖散表

傷寒變  
疹門

形證論表發用參苓散涼心南星丸

傷寒變  
疹門

不退解

表散

慢驚門

去毒托裏散

傷寒變疹門

參苓散

慢驚門

治嗽化痰

人參

麻黃

甘草

欬花

小半夏

湯浸十一次

葶藶

各半錢

馬兜鈴

三個

末服半錢桑皮湯下

傷寒變疹第二十

石壁經歌

預先五日戰如寒不覺看來又似癟繞發有同  
梅李樣眼睛青碧臉紅鮮手心如火毛髮立睡

稟狂言卧不安躁熱嫌人撥手睡又生喘息氣  
相連二三歲時為疹子此候須知有病源智者  
莫令通藏府只將丸散表心間能催疹子添光  
大七日如期定却安

傷寒失表毒氣攻裏而未安凡冬月春夏初精明  
色候勿同驚風治

形證論先有蘊熱忽風傷腠理發熱狂言氣急生涎  
天南星丸退心間風涎微用解表退傷寒量虛實宣  
瀉托裏散勻氣如不宣卒未安

形證論初如傷寒或似驚風辦子細出在皮膚宜平  
和藥末解勻氣更量肥瘦聊通利關竅勻氣痘疹在皮膚中  
可通利已出通利內

鳳髓經治疹痘欲出不出二聖散

浮蘋      香白芷

等分服半錢或一錢麝香酒下

治疹痘不出用藥發出餘熱未退發渴熱水廻下血

牛蒡散

解班疹

甘草節

荆芥穗

牛蒡子

炒

等分末錢半解毒薄苛湯下未出紫草湯下進數  
服

形證論治急驚風因赤體或變蒸逐留不出因滯潮  
熱天南星丸

天南星

去皮一  
個

朱砂

錢一

蝎

半錢

輕粉

少許

末酒麪糊丸如菉豆服七粒薄苛湯下日二

治傷寒變瘡疹通關勻氣托裏散

人參

麻黃

甘草節

各一分

白术

夢荊子

紫草

錢各一

白茯苓

半錢

升麻

半錢

末一錢瘡未出好酒調已出香湯調下

卷中張仲景方見別門者不錄據此考本門

自汗門

五苓散

桂枝湯

四逆湯

小建中湯

調胃承氣湯

葛本粉

即溫  
粉法

頭汗門

小柴胡湯

門內某方去某加某湯其去其加者  
只據本方無別見餘倣此加減三方

赤茯苓湯

茵陳湯

欬嗽門

小青龍湯

加減  
一方

猪苓湯

真武湯

四逆散

加減  
四方

發喘門

麻黃湯

大承氣湯

承氣湯

鼻衄門

竹茹生薑湯

竹葉石膏湯

竹葉湯

犀角地黃湯

嘔哕門

大柴胡湯

白通湯

加減二方

黃連湯

發渴門

通脈四逆湯

加減一方

白頭翁湯

大陷胸丸

黑奴丸

結膏門

理中湯

下痢門

生薑瀉心湯

幼幼新書卷第十五