

幼

幼

新

書

幼幼新書卷第十七

寒熱癰癧 凡廿二門

後學古吳陳履端子始輯

長洲趙起鳳伯羽校

痰實第一

巢氏云兒飲乳冷熱不調停積胷膈間結聚成痰多則飲乳不下吐涎沫變結而微壯熱不止發驚癇

千金治痰實結聚宿癖羸露不能飲食真珠丸

真珠

半兩

麥門冬

一兩

蕤仁

去皮二百粒

巴豆

一枚

末蜜丸朞歲兒二丸如小豆二百日如麻子漸增

知為度下赤黃白黑葵汁病盡自止久服肥白

治熱結痰實不食

芍藥

知母

大黃

各二
兩

柴胡

二
兩
六
錢

升麻

黃連

黃芩

各二
兩
半

竹葉

切
升
半

桔梗

兩
半

細辛

十
五
錢

咬咀水六升煮升八合分四服十歲作三服外臺
有枳實杏仁各兩半無桔梗黃連

經驗治癰實久癧纏喉風駛嗽遍身風疹急中涎潮
等此不大吐只出涎

瓜蒂多少

細末壯年一字十五以下氣怯半字早晨并華水
下湏含砂糖一塊良久涎出年深涎盡有一塊布
水上如鑑涎盡食粥一二日吐多因甚即細研麝
溫水調嚥止

聖惠陳橘皮散治瘧癰結實欲嘔

陳橘皮

去白焙

桑白皮

各一

麥門冬

半兩各

川大黃

炒

前胡

川升麻

各一

粗散一錢水一盞煎五分不時量溫服

治痰實心胃不利欲嘔前胡散

前胡

各半兩

貝母

煨

白术

桑白皮

人參

各半分

陳橘皮

去白半分

焙

粗散一錢水一盞煎五分不時溫服

芒硝丸治痰實往來寒熱不飲食肌體羸瘦

川芒硝

川大黃

炒

代赭

各半兩

半夏

漫去謂

甘遂

炒各一分

杏仁

十粒炒

羅末蜜丸

如菉豆空心

溫水下

靈芝犀角丸治痰實結滯時發寒熱胃中涎壅及哮

呻喘急煩躁不眠

犀角錢一

白术

桔梗

陳皮錢各一

金銀箔各三片水銀一錢結砂

巴豆三粒裹燒香

研煉蜜丸如小豆服一二丸薄苛水研量增

張渙消宿食痰滯香橘皮湯

陳橘去白

木香各兩

草豆蔻

炒白术

炮

牽牛子

薑黃各半

羅末滴水丸如黍葱白湯下十粒大小便澀乳前服

卷十一
三
保生治膈實氣痞痰盛喘促逍遙丸

半夏

洗七次
焙二兩
枳實炒

檳榔

赤茯苓各一

兩

細末薑汁麵糊丸菉豆大服二三十丸荆芥湯送
下兒小丸

丁時發黑散子治涎壅欬嗽吐逆

天南星

半夏

猪牙皂角

巴豆

白礬

等分

瓦罐煅存性薑汁調半錢或麥門冬桑皮蜜湯下

鄭愈瓊涎丸治咽喉涎鳴如鋸魚傷寒身熱面赤

半夏餅

錢墨汗作
慢火炙

粉霜

鉛白霜

巴豆霜

雄黃

蝎梢

各半錢

末麵糊丸如黍服五丸燈心湯化涎未下再投燈心湯即吐如取涎連三服即瀉次補

寒熱往來第二

東氏風邪外客皮膚痰飲內瀆藏府致血氣不和陰陽更相乘剋陽勝則熱陰勝則寒陰陽之氣為邪所乘邪與正相干陰陽交爭時發時止故寒熱往來

張後寒熱往來甚者漸羸瘦實壯熱不除變驚癇夏
傷于暑至秋成瘡

寶鑑歌

邪入皮膚裏還歸歲府巡陰陽多爭鬪寒熱往
來頻

千金治乍寒乍熱

細切柳枝煮汁浴若渴絞冬瓜汁服

水鑑石室秘方兒百日內忽寒熱與冷藥即乳寒嘔
逆與熱藥病加甚

桃花蔭末一錢餘甘草充湯力更殊藍花只消

一兩字

陰乾灌之入口立消除湯調

聖惠紫胡散治寒熱往來面色痿黃

紫胡

十兩

石膏

一兩

川大黃

炒微

麻黃

去根

秦艽

常山

各一

粗散一錢水一盞煎五分溫日三服

醫局小紫胡湯治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急
胷滿脅痛嘔噦煩渴寒熱往來身面皆黃小便不利
大便秘鞕或過經未解或潮熱不除差後勞復發熱

頭痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如瘡發作
有時及產後傷風頭痛煩熱

紫胡

半斤

黃芩

人參

甘草

炙各三兩

半夏

湯洗七次

半兩

粗末三大錢水盞半盞五片棗一個擘煎七分稍
熱不時分二服

張渙秦艽湯

秦艽

鱉甲

醋炙各一兩

川大黃

炒

麻黃

去根節各

半兩

竹茹

甘草

炙各一分

粗散一錢水一盞葱白二寸煎五分溫服

人參柴胡散

人參 前胡

柴胡

各一兩

桔梗

地骨皮

甘草

炙

半夏

洗七次培各半兩

細末一大錢水一盞薑二片煎半盞溫服

芍藥湯

赤芍藥

黃芩

當歸

培

柴胡

各半兩

肉桂

甘草

炙一分

細末一錢水八分一盞薑二片棗一枚煎五分去

澤溫服

寒熱五臟煩滿第三

巢氏風客皮膚瘻潰藏府致血氣不和陰陽交爭故
寒熱往來熱乘五臟氣積不泄而煩滿

王訣寒熱虛積歌

頻頻發熱藏中圖有積因傷未退除頰赤口瘡
多躁渴痰生不食胃還虛

先調氣次取虛積下涎後補虛

先調氣次解虛熱有熱不去真珠丸取

真珠丸治五藏煩滿及下風涎積滯驚食疳積

南星

半夏

滑石

錢

輕粉

四錢

巴豆霜

二七粒

末麵糊丸芥子大服一二十丸葱湯吞

寒熱腹痛第四

巢氏風客皮膚瘡漬藏府血氣不和則陰陽交爭故寒熱往來而藏虛本挾宿寒邪入于藏與寒相搏而擊藏氣故腹痛

聖惠赤芍藥散

赤芍藥

當歸
炒

寒水石

甘草
炙

黃芩

各半
兩

桂心
一
兩

粗散一錢水小盞生地黃半分煎五分不時溫服
馬通粟丸治脅下氣塊腹痛喘逆氣息徃來寒熱羸
瘦不食

馬通內粟

細辛

杏仁
炒

各三

紫苑
分三

石膏

五味子

秦艽

白茯苓

半夏
各一
分

羅末煉蜜丸如麻子粥飲下五丸日三

寒熱結實第五

東氏風邪客皮膚痰飲漬府藏使血氣不和陰陽交爭則發寒熱而藏氣本實復為寒熱所乘則積氣在內使胃脅心腹煩熱而滿大便苦難小便赤澀

千金兒連連壯熱實滯不去寒熱往來微驚悸

大黃

一兩

葛根

二兩

甘草

炙

黃芩

各八錢

滑石

二兩

桂心

牡蠣

人參

龍骨

凝水石

白石脂

消石

各半兩

㕮咀水四升煮升半服三合一日夜令盡雖吐亦

與一紫石英半兩

聖惠柴胡丸治寒熱結實或熱攻衝心腑氣急晝夜有汗日漸消瘦不吃乳食

紫胡

川大黃

鼈甲

醋炙半兩

赤茯苓

人參

木香

桂心

枳殼

甘草

炙各一分

羅末煉蜜丸如麻子溫水下五丸日三

大黃丸治增寒壯熱發歇不定腹中結實不能乳食

川大黃

炒

柴胡

檳榔

各半兩

赤茯苓

人參

木香

桂心

枳殼
炒

桃仁

廷炒各
分

羅末

煉蜜丸如麻子溫水下五丸日三

鼈甲散

鼈甲

赤茯苓

枳殼

廷炒各半兩

川大黃
炒

川朴硝

各一
兩

粗羅一錢水一盞煎五分不時溫服

寒熱食不消第

巢氏邪客皮膚瘻潰府使血氣不和陰陽交爭脾

胃之氣宿挾虛冷表雖寒熱內冷發動故食不消
半金翼治寒熱咳逆膈中有癖吐乳不食

乾地黃

四兩

麥門冬

五味子

蜜各半斤

大黃

硝石各一兩

㕮咀水三升煮一升去滓內硝蜜煮沸服二合日
三有宿乳升許出兒大五合

聖惠訶梨勒丸治寒熱往來頭疼嘔吐及乳癖

訶梨勒皮

木香

人參

赤茯苓

桂心

川大黃

炒

陳皮

去白各半兩

羅末煉蜜丸如麻子薄荷薑湯下五丸日三四

寒熱能食不生肌肉第七

巢氏胃氣挾熱熱則消穀穀消則引食陰陽交爭為
血氣不和則不能充養身體故寒熱往來雖能食而
不生肌肉

外臺大黃丸

大黃

一兩蒸二斗米下

桂心

乾薑

炮各二分

巴豆

五十粒熟淨

消石

三分熬無芒硝代

篩擣巴豆如泥和蜜擣二千杵丸如梧子壞一丸

湯服熱在膈上當吐膈下當利兩食頃不吐下熱
粥飲動之又不動更服丸半能藥壯人二丸下多
冷粥解有瘡綿挺如指蜜和一丸塗挺頭旦內瘡
中隅出之不差更作溫病不大便宿食不消亦服
飛尸遁戶搽服半丸日一心腹脹滿痛服一丸瘡
發日宿勿食清晨服一丸壯人二丸得吐飢過發
時乃食婦人產後血結中奔走起上下或絕產無
子或月經不調面目青黃服半丸兒淋瀝寒熱隨
脹大腹不食食不生肌三四歲如麻子一丸日一

量加心腹諸病良忌野猪肉蘆筍生葱

寒熱不食羸瘦第八

聖惠鼈甲散

鼈甲

三分

淡竹筍

川大黃

炒各一分

常山

杏仁大

粗散一錢水一盞葱白二寸煎五分去滓研麝一

豆大煎一兩沸溫日三服

鼈甲散

鼈甲

一兩

赤茯苓

子芩

赤芍藥

當歸

炒

川大黃

炒

甘草

炙

知母

各半兩

紫胡

訶梨勒皮

陳橘皮

去白焙各三兩

檳榔

枝三

粗散一錢水一盞少許煎五分不時溫服利為度

紫胡散治寒熱往來乳食不下四肢無力腹脹滿上焦痰壅漸漸羸瘦

紫胡

鼈甲

製各一兩

人參

前胡

桔梗

訶梨勒皮

地骨皮

赤芍藥

杏仁

炒黃

甘草

炙

陳橘皮

半焙各兩

篩散一錢水小盞煎五分不時溫服

五味子散

五味子

當歸炒

人參

桔梗

前胡

白朮

赤茯苓

黃芩各一

甘草

炙半分

麥門冬

焙半兩

粗散

一錢水小盞煎五分溫日三四服

又參散

人參

黃蓍

紫胡

白朮

鼈甲製

木香各半

甘草炙

白朮

桃仁

炒各一分

訶梨勒皮

三分

細散不時粥飲調半錢

黃耆丸治往來寒熱多汗心煩小便赤黃不欲乳食四肢羸瘦

黃耆

麥門冬

焙

赤茯苓

白朮

子芩

甘草

各一分

柴胡

鼈甲

製各半兩

羅未蜜丸菉豆大粥飲下五丸日三四

瘡疾第九

巢氏夏暑客皮膚至秋因勞動血氣腠理虛而風邪

棄之動前暑熱正邪相擊陰陽交爭陽盛則熱陰盛則寒陰陽更盛更虛故發寒熱陰陽相離則寒熱俱歇若邪動氣至交爭復發故瘡休作有時發時漸晏者由邪客風府循督而下衛氣一日夜常大會于風府其明日日下一節故日晏發早者衛氣行風府日下一節二十一日至尾骶二十二日入脊上注伏衛脉其行九日出缺盆內氣既上故發更早間日發者邪氣內薄五藏橫連募原其道遠其氣深其行遲故間日蓄積乃發兒未觸暑亦病瘡者乳母抱持解脫

不避風故

聖患夏傷暑熱客皮膚至秋復為風邪所折陰陽交爭故發寒熱而成瘡欲解則有汗汗多則津液減耗又熱乘于藏則生虛躁差後藏府未得復內猶有熱故渴而引飲引飲不止小便澀者變飲癖

茅先生兒身發寒久後脾熱則身熱渴因傷寒三四日熱不退誤下冷藥脾氣不順遂至脾寒疾瘡

患眼春夏蘊積寒暑不常之氣久不宣泄至秋後陰陽交冷熱祚時故成瘡因宿疾在心脾間須常山飲

侵早喫吐下黃水後用勻氣散
和門胃氣不如此間服便
不吐

寶鑑歌

瘡病是邪成陰陽有競爭早期風府會晏發脊
俞停至速連朝發來遲間日行小兒還見此何
必問神明

水鑑百日內瘡

瘡是邪風寒熱攻宜湏術治免成空常山刻作
人形狀丁針孩兒生氣宮

孫尚藥治瘡

信砒二兩

寒水石三兩

用鐵鉗先鋪石末一半後堆砒末復以石末蓋厚
蓋覆之周圍醋糊紙封固約十重炭一斤燒紙條
黑取出置地冷開蓋淨刮末細研軟米飯丸如梧
子兒服如黍飛辰砂衣發日早臘茶清下一丸一
日不得食熱物合時洒掃淨室勿令婦人貓犬雞
鼠等見婦人患男着在口中男患亦然

聖惠牡蠣散治瘧癬瘻發無時

牡蠣

常山

烏梅肉炒

人參

各半兩

鼈甲

三分

知母

川升麻

甘草炙

豉心

桃仁

炒各一分

細羅

溫酒調半錢日二量加減

升麻散治瘧疾發後煩熱

川升麻

常山

蜀漆

川大黃炒

萎蕤

黃芩

桂心

各一分

川芒硝

半兩

粗散一錢水一盞煎五分溫服吐利為度量與

桃仁散瘧疾發歇寒熱小便黃赤

卷之二
一三
桃仁
燒

赤茯苓

鱉甲
各三

知母

黃芩

川升麻
各半兩

甘草
炙一

粗散一錢水一盞煎五分日三四溫服

治瘡疾痰壅煩悶常山散

常山

甘草
炙

川大黃
各半兩

桂心
一分

粗末一錢水一盞煎五分發前溫服吐利為度量
減服外臺無大黃酒煎

大蒜丸

獨顆蒜
心去皮

巴豆
去皮

一

巴豆內蒜中濕紙裹煨熟擣丸如麻子醋湯下一丸更量吐利為度端午合

茅先生脾寒鬼哭散

常山

大腹皮

白茯苓

鼈甲醋

甘草炙

等分前三味不見火末二錢水一盞冬取桃柳枝各二七寸煎五分臨發服吐涎不妨

嬰孺前胡湯治時氣兼瘧

前胡

黃芩

升麻

各四分

細辛

甘草

芍藥

各三分

大黃

常山

各二分

水一升六合為四服日二夜一

吉氏草薑散

草薑

半夏

各半兩

紫胡

厚朴

甘草

烏梅

棗

各一兩

常山

一分

末二錢水一盞薑二片煎七分服或去紫胡加鼈

甲

朱氏

上等臘茶硫黃飛

細末服一錢米飲調發日五更服寒多倍硫熱多
倍茶

襍臠灸刺法

千金翼肝瘡色花花然太息狀若死刺足厥陰見血
心瘡心煩甚欲得清水寒多不甚熱刺足少陰謂神
門

脾瘡病寒腹痛熱則腸鳴已汗出刺足太陰
肺瘡心寒甚熱間喜驚如有見刺手太陰陽明
腎瘡悽悽腰脊痛宛轉大便難目睭睭然手足寒刺

足太陽少陰

胃瘡旦病寒喜飢不能食肢滿腹大刺足陽明太陰
橫脉出血

岐伯曰瘡有十二種瘡鬼得瘡字便愈

寅時發者獄死鬼所為以瘡人着窪上灰火一周不
令火滅差

卯時發者鞭死鬼所為用五白衣燒灰三指撮着酒
中無酒清水服

辰時發者墮木死鬼所為令瘡人上木高危處以棘

塞木奇間差

巳時發者燒死鬼所為令瘞人坐篩周匝燃火差
午時發者餓死鬼所為令瘞人持脂火于田中無人
處以火燒脂香假拾薪去差

未時發者溺死鬼所為臨發時三渡東流水差
申時發者自刺死鬼所為欲發時以刀刺塚上使得
姓字祝曰若差我與汝擇却差

酉時發者奴婢死鬼所為令瘞人碓梢上捧上卧莫
令人道姓字差

成時發者自絞鬼所為左索繩繫其手脚腰頭差
亥時發者盜死鬼所為以刀一口箭一隻灰一筒刀
安瘡人腹上其箭橫着底下差

子時發者寡婦死鬼所為令瘡人脫衣東廂床上左
持刀右持杖打令聲不絕瓦盆盛水着路邊差

丑時發者斬从鬼所為令瘡人當戶前卧頭東向血
流頭下差

灸瘡法醫不能救者繩量病人腳圍統足跟及五指
一匝訖截斷繩取量繩置項上着反向背上當繩頭

處中脊骨上灸三十壯候復惡寒再灸三十壯至過
發一炊久雖飢勿食盡日此法神驗男左女右
外臺灸謹語在肩膊內廉俠第六椎下兩傍各三寸
手按之痛病者言噫嘻足太陽脉氣所發灸五壯主
液泡掌暴脉急引背痛內心肺從項引至脊以下至
十二椎應手灸之立已熱病汗不出肩背寒熱痙互
引身熱欬嗽上氣虛喘喘逆軌衄肩甲內廉痛不可
俛仰眇季脇引少腹而脹痛兒食晦頭痛引頤瘡瘍

風

寶鑑灸大指次指外

瘡先熱後寒第十

巢氏云溫瘡得之冬中風寒寒藏骨髓至春陽氣大
發邪不能出遇大暑腦髓爍脉肉消釋腠理發泄因
用力邪與汗皆出此病藏于腎氣從內出陰虛而陽
盛則病表氣復反入入則陽虛陽虛則寒故先熱後
寒名溫瘡先寒後熱由夏傷暑汗大出腠理開發遇
夏氣濟滄之水寒寒藏腠理皮膚中秋氣傷于風則
病盛亦以時作名溫瘡夫寒陰氣也風陽氣也先傷

寒後傷風故先寒後熱先傷風後傷寒故先熱後寒亦名溫瘡夫瘡六七日但熱不寒者溫瘡也

千金常山湯

常山

一兩

小麥

三合

淡竹葉

一升

外握

水升半煮五合一日至七日兒一合為三服量加
麻角末先發時服一錢

燒鼈甲灰酒服一錢先發時服并以火灸身

灸乳下一指三壯

瘡寒而後熱第十一

東氏疫瘡者夏傷于暑也秋則寒甚冬則寒輕春則惡風夏則多汗蓄作有時以瘡之如發先起于毫毛伸久乃作寒慄皷頸腰脊痛寒去則内外皆熱頭痛而渴欲飲此陰陽上下交爭虛實更作陰陽相移也陽升於陰則陰實陽虛陽明虛寒慄皷頸巨陽虛腰背頭項痛三陽俱虛陰氣勝則骨寒而痛寒生于內故中外皆寒陽盛則外熱陰虛則內熱内外皆熱則喘而渴欲飲此得之夏傷于暑熱氣盛藏于皮膚之內腸胃之外此榮氣所含令汗出空踈腠理開因得

秋氣汗出遇風而發及浴水氣舍皮膚內衛氣并居
衛氣者晝日行陽此氣得陽如出得陰如內薄是以
日作間日作者謂氣之舍寫內薄于陰陽氣獨發陰
邪內着陰與陽爭不得出故

千金常山丸治癰瘡

常山

知母

甘草

炙

大黃

各三

麻黃

去根節一兩

末蜜丸如桐子兒如黍三丸熟水下漸加差為度
活人書治瘡先寒後熱薰治支結

卷二十一

人參

半夏

黃芩

桂

去皮三兩

各

剉如麻豆抄五錢水一盞薑七片棗二個煎八分溫服日三夜一渴去半夏加人參苦薑根

瘡疾寒熱更作第十二

巢氏寒并于陰則寒風并于陽則熱陰陽二氣更竇更虛故寒熱更往來為熱瘡

指迷論寒熱不時腸滿膨脹起則頭暈大便不通或腹痛胃膈痞滿由宿穀不化結于腸間氣道不舒陰

陽交亂宜備急丸又云久不治成勞

荆芥散

荆芥

人參

白术

當歸

黃蓍

芍藥

桂

去皮各一兩

柴胡

甘草

炙半兩

粗末五錢水二盞煎一盞溫服

備急丸

大黃

濕紙裹煨

巴豆霜

乾薑皮

等分細末蜜丸如豌豆米飲下一丸羸人一丸如

菉豆利為度

瘡熱而不寒第十三

東氏肺素有熱氣盛于身厥逆上下中氣實而不外泄因用力腠理閉氣寒舍皮膚之內分肉之間而發陽氣盛而不衰則病氣不及陰故但熱寒氣內藏于心而外舍于分肉間令人消爍脫肉名瘡瘍陰氣先絕陽氣獨發則少氣煩惋手足熱而嘔

聖惠香豉飲治瘡瘍逆不食

香豉半合

葱七莖

常山

檳榔各三分

升麻

丙一

生地黃

鼈甲

火

知母

各半

兩

剉水

二盞半煎盞半

不時分三服一日盡兒一合

又方

常山

桃仁

炒

黃丹

炒紫各

香豉

炒一合

羅未蜜丸如桐子發日空心煎桃仁湯下十九發

時再服兒粟大五丸

治瘓熱發瘡知母散

知母

鼈甲

醋

各

牡蠣

常山

各半

細羅粥飲調半錢日二

牛黃丸

牛黃

杏仁

等分研如膏練蜜丸麻子大溫水下三丸日三量

與

張漢知母丹

知母

炒

鼈甲

炙

川大黃

炒

赤茯苓

朱砂

飛各一兩

川芒硝

炙

川升麻

各半兩

龍腦

一錢

末蜜丸如黍服五七粒薑湯下大便利愈

活人書

知母

六兩

甘草

炙二兩

石膏

一斤

桂

去皮三兩

粳米

合二

剉麻豆大五錢水盞半煎八分服

瘡寒而不熱第十四

巢氏寒瘡由陰陽相并陽虛則陰勝而寒寒發于內而并于外內外俱寒故病發但戰慄皺頤顧也

指迷論瘡寒從背起冷大如手不甚戰慄似欲熱而出汗出或即頭痛嘔吐時作脈遲小由脾胃素弱因氣寒而收聚水穀不能剋化變而成瘡伏瘡在內陽為

陰乘故陽作寒逼而成汗宜旋裹花丸半硫丸

聖惠雄黃丸

雄黃

硫黃

朱砂

桂心

乾薑

生

巴豆

煮去油

麝

半兩

阿魏

半分

研細醋煮麵糊丸如桐子未發前綿裹一丸安耳
中男左女右帛繫一粒于臂可治七人

聖惠方

獨顆蒜

一個

黃丹

半兩

端午午時擣千杵丸如黑豆發時溫茶下二丸兒

粟大

常山丸治瘧手足鼓顫心寒面青

常山

兩半

臭黃

雌黃

猢猻頭骨

天靈蓋

席頭骨

安息香

朱砂

野狸頭骨

砒霜

乳香

阿魏

白芥子

各一
分 菓豆

生擣羅軟飲和擣三二百杵丸如桐子忌孝子女
人見端午午時合緩急不擣日未發前絳囊盛中
指繫一丸男左女右三日不住湯服一丸孕婦兒

不得服忌熱物一方止虛糊息香天蓋砂碗魏等
分

張渙烏梅丹

烏梅肉

一兩

安丁香

乾漆炒

當歸

桂心

各半兩

麝

一分

蜜丸如黍米飲下十粒

指迷旋覆花丸

旋覆花

桂心

枳實炒

人參

各五分

乾薑

芍藥

白朮

各六分

茯苓

狼毒

烏頭

炮去皮

礬石

煅一伏時各八分

細辛

大黃

煨

黃芩

華靡

厚朴

薑炒

吳茱萸

炒

芫花

炒

橘皮

各四分

甘遂

炒分三

細末蜜丸如桐子米飲下三丸至七丸兒黃米大二丸

半硫丸

半夏

湯洗次三兩

硫黃

飛二兩

末薑汁糊丸如梧子米飲下三十丸兒黍大三五

丸

瘧熱多于寒第十五

指迷論曰寒熱戰慄頭痛如破身體拘急數欠飲冷或先寒後熱或先熱後寒或瞬時發或間日作至其時便發發已如常其脉弦弦數多熱弦遲多寒因冬中風寒藏于骨髓至春陽氣大發邪不能出遇大暑與邪合合而發熱多宜解常山湯苦蘿湯

常山湯

知母

甘草

炙各三兩

麻黃

淨一兩

粗散五錢水二盞煎一盞溫服糜粥一盃助汗

蘇蘇湯

蘇蘇根

四兩

紫胡

八兩

人參

黃芩

甘草

各三兩

粗末五錢水二盞薑三片棗一個煎一盞溫服

瘧寒多于熱藥十六

指迷論證周前而寒多者宜薑桂湯溫之

薑桂湯

乾薑

牡蠣

煅

甘草

炙各二兩

桂心

三兩

紫胡

八两

葛根

四两

黄芩

二两

粗末五钱水二盏煎一盏不时温服

活人书祛邪丸治瘧脉浮大寒热往来用此吐
瘰疬书云瘧寒多熱少者痰多也脉必浮可吐之若遲微
者惡寒瘧耳宜紫胡蜜桂

麻黄

四两淨泡一二沸

常山

甘草炙

大黄

知母各三两

末蜜丸如梧子服十五丸面東净水吞

瘧寒熱相等第十七

指迷論脉證見前瘡發寒熱等者宜調之

鼈甲湯

鼈甲

醋炙

白朮

常山

桂心

紫胡

各一兩

牡蠣

煅半兩

粗散五錢水二盞煎一盞溫服

瘡瘻草十八

巢氏山瘴生于嶺南帶山瘴之氣寒熱休作有時
由挾溪源嶺濕毒氣故也重于傷暑之瘴

千金大五補湯治時行後變瘴瘻

桂心

州銖

達志

桔梗

茅蕘

各二兩

茯苓

芍藥

人參

白朮

乾地黃

當歸

黃耆

甘草

竹葉

五兩

半夏

麥門冬

各一升

生枸杞根

薑

各一斤

大棗

廿枚

㕮咀水三斗煮竹葉枸杞取二斗內諸藥煎六升
分六服日夜令盡兒量與

鯉魚湯治乍寒乍熱乍有乍無山瘴瘡

鱗鯉甲

十四枚

鼈甲

四枚

烏賊骨

兩

常山

三枚

附子

炮
淨

㕮咀酒三升瀆一夕發前稍啜勿絕即吐煎塗身
斷食過時兒量與

大瘡草十九

棗氏瘡傷暑傷風所致熱甚時發汗吐下過度脉藏
空虛榮衛傷損邪氣伏藏引日不差瘡發至三歲連
日發不解脅下有痞勿攻但得虛其津液先時發汗
服湯先小寒寒者引衣自覆汗出小便利愈

水鑑方

水蛭

狗蟲

雄黃

阿魏

研細馬汗為膏塗手心立差

狗蟲既同水蛭用治虫

外臺常山散

常山

羚羊角

炙

烏梅肉

炙各三兩

黃芩

二兩

甘草

半兩

擣散竹葉煮飲取六七合調三方寸七發前服不差臨發又進老人小兒意量忌海藻菘菜葱

聖惠砒霜丸

砒霜

醋熬三次

朱砂

各一

相思子

巴豆霜

七枚

安丁香

阿魏

麵根半錢

常山

錢一

羅未蜜丸如黍未發冷水下一歲一丸

蜀漆丸治久瘧不斷脣脛瘡堅

蜀漆

杏仁

炒

黃連

桂心

甜葶苈

隔紙炒紫各一分

川芒硝

川大黃

炒各

丙半

羅未蜜丸如麻子粥飲下五丸日三

神效方

大蜘蛛

五枚去脚

蝙蝠

去頭

鼈甲

一枚

醋

炙

各

麝

半兩

蛇蛻一條

羅末端午午時蜜和丸如麻子空心溫酒下五丸

兒茶下二丸

嬰孺牡蠣散治癬瘡發無時服三錢飲後宜此

牡蠣

知母

常山

烏梅肉炒

人參

各三

鼈甲

分四

升麻

甘草

鹽豉

各三

桃仁

個七

末空心酒下二錢日再

三稜飲

三稜根

鼈甲

大黃

各三分

水八合煮二合半為三服乳母忌菟菜油膩
聖惠灸內庭一壯炷如麥足大指次指外間陷者中

瘡後引飲第二十

巢氏夏傷暑熱客皮膚至秋復為風邪所折陰陽交
爭故發寒成熱瘡凡瘡欲解則汗汗則津液減耗又
熱乘藏臟虛燥差後藏府未和津液未復內猶熱渴
而引飲不止小便澀者變癬

聖惠烏梅散治瘡發作不定多渴心煩

烏梅肉

炒半兩

常山

一兩

甘草

炙三分

粗散

一錢水

一盞

淡竹葉

七片小麥

丹粒

煎五分

溫服

瘡後脅內結硬第二十一

巢氏瘡正發寒熱交爭時熱氣乘藏藏則燥渴引飲
飲停成癖結脇下故差後結硬

肘後治心腹堅痞時時寒熱如瘡服紫丸六十日吐
下痞仍堅雞子湯去惡物數升遂愈

甘遂

七銖

甘草

炙半兩

黃芩

各三錢

水二升半雞子一枚少扣開出自白投水中熱攪吹
去滓內藥煮一升隨兒可下數合病未盡更與若
堅實多者加黃芩細辛各一兩

嬰孺知母丸除熱下氣

知母

甘草炙

常山各一兩

麻黃去節二兩

末蜜丸如小豆服五丸日三至欲發服畢抹發日
亦可服加大黃一兩治骨間熱卧不安

瘡後頭面浮腫第二十二

聖惠防癰散治瘡發後肚脹兼頭面浮腫

防葵

紫胡

桑白皮

川黃

炒各半兩

甘草

赤芍一錢

粗散一錢水一盞煎五分溫服日三量加減嬰孺
忌菘菜油膩生冷黏滑物乳母同

幼幼新書卷十七

燕翼堂梓

方略

幼幼新書卷第十八

斑疹麻豆

凡十六門

後學古吳陳履端于始輯

黃山夏九疇元錫校

痘疹論第一

聖惠論疹痘瘡是熱積藏府蒸鬱熱毒散四肢兒皮肉嫩弱多此疾乳孩少與湯藥童兒過劑有損蓋飲熱乳而成府熱生細疹藏熱生豆瘡湯藥宜療乳母絕乳者由積熱伏肺脾間不早以湯藥療熱行于四肢榮衛之中漸透皮表成疹痘出濃水也嬰兒性陽

盛陰微、藏府陰陽氣逆、大小便多秘不通、即便躁利輕患也。若疹痘已出、勿躁轉出、宜利大小腸、扁鵲倉公云、先和節陰陽、調治榮衛、方利藏府、即熱氣漸解、絕乳嬰孩、疹痘未出前、先以油劑服之、行解四肢熱極、已出不可以油、宜平和藥、療肝藏、解敗熱、慮熱毒攻肝、衝眼、目生障翳、時醫于疹痘未出前、誤認疾候、或餌燥藥涼藥、不無夭傷、惜哉。

養生曰、陽明主肌肉、瘡疹毒泄、肌肉始覺、必以利藥宣其毒、初與傷寒類、不可不審、兒身熱耳冷尻冷、歟

嗽瘡疹候一歲中瘡疹大小相類此疫氣也當作疾
治傷寒至陽明經亦用利藥湏未見瘡疹疑似間乃
可及見勿利

錢乙論面燦頤赤目胞赤呵欠頓悶乍涼乍熱欬嗽
嚏噴手足稍冷夜卧驚悸多睡並瘡疹證此天行病
用溫涼藥勿妄下及妄攻發受風冷五臟各有證肝
水痘肺膿疮心癰脾疹歸腎變黑惟癰疹後或發癧
木勝脾木歸心故也

兒在胎十月食五藏血穢生則毒當出故瘡疹皆五

藏液故瘡出有五、肝主淚、淚出如水、肝為水疮、色青
小肺主涕、涕稠濁、肺為膿疮、色白而大。心主血為斑
色赤而小、次于水疮。脾為累血為疹、小次癰瘍、色赤
黃淺、涕淚出多、故膿水疮皆大、血營于內、出不多、故
斑疹皆小、疮者、涕淚俱少、辟胞中容水、水去則瘦、始
發潮熱、三日以上、熱運皮膚、即發瘡疹、不甚多者、熱
留膚腠間也、潮熱隨藏出、如早食潮熱不已、為水疮
之類、瘡疹始出、五藏證見、唯腎見平證、耳及骯涼是
也、骯耳俱屬腎、居北方、故瘡黑、耳骯反熱為逆、百祥

丸、牛李膏、各三服、不愈者死。凡瘡癰、一發出盡者重、夾疼者半輕半重、出稀者輕、裏外肥紅者輕、外黑裏赤者微重、外白裏黑者大重。瘡端裏黑點如針孔者勢劇、青乾紫陷、昏睡、汗不止、躁熱渴、腹脹、喘、大小便不通者困、乳母慎口勿令饑、及受風冷、大熱當利小便、小熱宜解毒、黑紫乾陷百祥丸下倒醫、不黑慎下、更看時月輕重、大抵春夏順秋冬逆、冬月腎王又盛寒、多歸腎變黑、又辨春膿疮、夏黑陷、秋斑冬癰、不順、猶十活四五、黑者無問何時、十難救一、其族或寒

戰噤牙或身黃腫紫急以百祥丸下復惡寒不已身
冷出汗耳聾反熱死腎氣大王脾虛不能治故下後
身熱氣溫欲飲水脾生勝腎寒去而溫熱可治更宜
解毒妄下則內虛多歸腎若能食痴頭焦或未焦而
喘實可下身熱煩渴腹滿而喘大小便澁面赤悶亂
大吐當利小便不差宣風散下慢驚門若五七日痴不
焦是內熱蒸皮中宣風散導之生犀磨汁解之瘡疹
由內相勝也惟斑疹作瘍疹為脾所生脾虛而肝乘
之木來勝土熱氣相擊動于心神心喜為熱神不安

因燔成癟斑為心所生。心生熱。熱生風。風屬肝。二藏相搏。風火相爭。故燔。當瀉心肝補母。苦薑湯主之。慢驚

門瘡黑。雖腎用事。然脾氣本強。或藉服補脾藥。脾實能制之。瘡入腹忽瀉。膿及連痂皮得出。是脾強腎退病出而安。米穀及瀉乳不化。是脾虛不能制腎。難治論瘡疹標本云。瘡疹未出。若言胃熱。何以乍涼乍熱。若言母腹中瘡在脾胃。何以驚悸。不知兒在母腹。月至六七。已成形。食母穢液。入五藏。至十月。滿胃管中。口有不潔。產時拭淨。則無疾。黃連汁壓之下臍糞及。

穢涎也。本因微寒入而成瘡疹。未出五藏見證一歲受穢多者。乃出瘡疹。初欲病時。先呵欠。頓悶。肝也。時發驚悸心也。乍涼乍熱。手足冷。脾也。面目頰頰赤。噦嘔。肺也。惟腎在腑下。不食穢故無候。凡瘡疹五藏毒若出歸一證。則肝水疱。肺膿疱。心斑。脾疹。瘡黑。屬腎由不慎風冷而不飴內虛也。抱龍丸數服愈。風熱門

論熱傳痘疹云。四大王宮五大尉。因墜鞭轍。發急驚。後大熱。先退熱。以大黃丸。玉露散。惺惺丸。加牛黃龍麝解之。不愈至三日。肌尚熱。錢三分。發班瘡。蓋熱不

能出他醫初發散入表、表熱則斑生、初驚時當利驚
發散逐也。後二日果斑出、必勝膏倒壓門治、七日愈。

論瘡疹有誤、睦親宅一大王病瘡疹、錢留抱龍丸三
服、李下之、疹稠密、錢驚為逆、曰瘡疹始出、未有他證
勿下、當用平和藥、頻與乳食、不受風冷、三日不出、或
出不快、微發之不出、即加藥、又不出、即大發、大發不
多、脉平無證、瘡本稀也、有大熱利小便、小熱當解毒。
若出快、勿發勿下、止用抱龍丸、瘡癰若起、能食者下
之、宜大黃丸見未一二行、即止、今先下、一日瘡疹未能

出盡而稠密甚誤也縱安病有三一疥二瘧三目赤
經三日黑啞錢曰幸不發寒未困也用百祥丸藥牛
李膏為助倒醫門各一大服至五日間瘡復紅活七日

愈蓋黑歸腎也腎主勝脾土不克水故脾虛寒戰難
治用百祥丸以瀉膀胱之腑腑不實歲自不盛也不
瀉腎者腎主虛不受瀉也若二服不效即加寒死

瘡癰欲發未能辯認間服升麻葛根湯單傷寒門消毒散

疹攻咽門已發未發皆宜仍用胡荽酒疹初出門黃芩膏瘡熱門

面目暑月煩躁食後與白虎湯實熱門玉露散驚熱門熱

盛與紫雪門

攻咽

咽痛或生瘡與甘桔湯

實熱

甘露飲

門攻咽

張渙論兒瘡疹與大人傷寒相似雖療不同或愈或危在六七日間可不慎哉十歲外方可施湯藥然邪熱多在脾肺間若不求本早治養熱氣行四肢利害甚多童男長大肌體稍實毒氣難出覺似瘡疹便早踈利即熱輕易療瘡疹未出前或熱乘心心神易動即發驚癇不投湯藥即危若已出長快自不可利正如傷寒下早又兒十四歲內初覺頭痛壯熱腰背疼

重熱甚，則手足厥冷，却似挾寒，脉多洪數，甚大不定。
若小便多赤，大便多秘，宜先疎利。應瘡疹早出，若繞
出，皆不可轉利。

瘳痘論：瘳痘瘡者，因熱積藏府，蒸鬱毒氣而生。府伏
熱，生細疹，赤瘡，俗呼麻子。藏伏熱，生豆瘡，形如豌豆。
其始熱，積脾肺間，治不早，流注四肢，榮衛中而成。初
受病，似傷寒，身與四肢俱赤，壯熱，頭痛，腰脊疼，只臯
耳尖，足指冷，兼欬嗽，眼青黃色，大小便秘，兩手脈洪
數。是豆疹證。冬月天氣溫暖，仍感垂氣未發，至春被

積寒所折、毒不得泄。夏初得熱、春寒始解。冬溫毒氣、
方發。有不因冬溫、四時自天行者。又有兒熱毒之氣、
傷天令不時之氣而發者。有感寒邪伏熱毒真元之
氣、被熱毒邪氣渾雜而發者。巢氏呼發瘡、胞瘡、麁瘡、
皆分陰陽所受。凡覺冬有非節之暖、當瘡未發急下
其毒。春冬間天枉者十五六、醫死者太半。蓋證症形
色不同致有差誤。有三五日遍身粟生時、欬嗽、耳尖
冷、毛寒肌慳眼澀不開作寒、欲以溫暖覆者、初覺時
薄苛散微汗、或不汗、兼作調中散已出門未漸漸解若

寒熱脉反遲進脫齒散

出不快門或寒熱不定目澀耳聾

冷此邪毒不傳諸臟反攻皮膚而作或出遲者亦服
脫齒散凡三五日鼻壅咽喉不利欬嗽目赤毛焦肌
膚緊脈洪大而數此豆疹癥順者薄苛散發汗瘡自
出或鼻壅咽喉不利目赤額紅脈不甚洪大亦瘡疹
候皆宜脫齒散瘡如白珠子或紅小乃解也或鼻壅
唇焦脈細面痿黃時變青皮膚悞吐清涎者亦疹子
候皆誤下涼藥多致瘡難發凡瘡毒血氣順脾溫則
易發涼藥過多則血澀氣弱脾寒瘡毒難泄遂變惡

候亦服薄奇散脫齒散若面青氣粗大小便不通瘡
毒未癰宜清石散出不快門如大小便不通利服脫齒散

次觀色候調治或面赤亦瘡疹候若先赤後青為遂
或患數日面青或痿黃四肢微冷上喘不涎手足搐
縮以三焦氣壅血脉凝滯氣不得榮薄奇散發泄瘡
毒兒初病便驚狂身熱汗出不增寒不惡風脉洪數
者皆當下覺有此證服當歸散瘡未見可陳利門或先頭疼
口鼻熱氣增寒壯熱胃膈痞塞生涎心逆作渴不止
足指冷口臭兩手脈弦或微脾脉弦數因失飢傷邪

熱當發赤疹、及患頭疼身不大熱、口臯熱氣咽喉乾痛、口頰生瘡、兩目如火、耳尖手足稍冷、兩手脈洪大、後三二日必作渴面赤時增寒心逆口臭目忽如朱亦伏瘡疹候先去邪毒湏大黃湯蕩之或已結皮毛間誤利之毒反沒伏心間邪入肺瘡毒內壞而死若瘡疹既出太盛竇濃水者大黃藥微利除毒如未幾毒疹前曾經利者勿用但解熱除毒愚俗不以藥泄利致大小便不通停熱藏府攻衝眼鼻咽喉腫塞口舌壞爛只進涼藥或調氣藥恣其所措出後又猛利

用藥雖扁鵲難療又扁鵲覺有痘譙先用麻油劑初出

出

門解四肢熱毒良久就卧至三五服大小便利四肢

熱退邪毒漸解至出亦輕曾服大黃散不必服未解

利而毒已發服解毒必聖散或升麻散發散已出未

在肌膚三四日隱隱不發急用紫草飲初出數服凡

未發前用黃藥膏愛護面

目門

塗兒面頰眼目間仍用胡

荽酒初出噴背上四肢令速出若未出雖出躁渴者

宜甘草散太盛解利熱毒即住若出遲服紫草飲大

人針兩腕硯子骨間或灸一壯亦亟發痘若已發勿

用如未作膿心膈躁瞞不安者服青黛散黑豆汁未出利門可除毒盡宜黃芩散解餘毒嘔吐服之自止若赤口

下部俱有瘡自利者服黃連散或出後煩喘小便不利宜燈心湯瘀後解余毒門若煩喘甚者麻黃湯太盛門或咽

喉痛并嗽入麝服冷藥太過欬嗽手足冷脉遲者煎炮乾薑炙甘草各四錢水升二合取四合服或下痢赤黃膿血及渾身熱與薤白湯便血門解去惡積差有瘻疽安後眼生翳腫脹者皆肝藏敗熱停留所致切忌點藥惟利肺脾解肝熱仍於眼邊上下貼協藥散

毒服蕤仁散醫重薰蜜蒙花散量力服食

益入眼門凡天

行瘡豆預服豆湯不發瘡

黑豆汁

或發瘡因天行熱氣

瘡瘍身疼壯熱當以桂枝及去節麻黃黃芩各半兩

為末量大小一二錢煖水調覆汗又葛根散解肌

已出

未出門凡身疼壯熱頭痛不小汗無由表散大便久秘

毒氣藏伏心腹脹滿不微利無由釋去切在消息若

已出發表增瘡爛癰膿痛甚者用乾淨黃土末傅仍

數食蜜若勢稍輕猪膽汁調川芒硝塗分令動候痂

落有大段瘡發不通卧蓆者麥麸簾卧將息如作漿

戴白膿者、毒輕、紫黑、隱隱肌肉內者重、甚者五藏咽喉內皆有瘡、其不便便澀、出血瘡黑膿不出、膿者死舌臯黑者死、或疹豆未出前熱、毒內逼、目機上竄、驚叫、此瘡欲出矣、誤認驚風治、毒內畜邪熱不泄死、或惡瘡既出、譖語不止、是惡候、更以冷藥解利使聲瘡瘡疹反沒死、或用燥藥太過、咽喉腫痛猛發、臯血喘嗽死、或瘡作白疮忽然畜入藏府、漸作紫黑無膿、日夜煩悶者、服化毒散倒醫門、毒從手足心出差、此五死一生候、若便血瘡壞無膿者十死、大熱瘡毒頓出者。

然後依證調理。有患瘧毒。豆瘡不出者。一法以地黃雄黃令飲。勿太多。恐反有損。或飲啜熟乳。積藏府者。兼療乳母。嬰兒孩童之性。陽盛陰微。藏府陰陽氣稍差逆。大小便多不順利。自扁鵲倉公論療嬰孩藥性。有可餌者。皆先知節氣陰陽。調利藏府。則病勢漸解也。

張仲景兒生進地黃汁下黑糞。不患瘡疹。百日內遇天氣和暖無惡風時。抱日中使皮膚緊密。常柰風日。只在房室溫煖處。忽見風日使寒邪伏積藏府。遇天

氣不調多作瘡疹。瘡疹方得寒邪散。毒氣消也。兒患瘡。父母行房觸犯。使不出。毒入心。悶亂而死。已出。令黑爛痛如刀割。縱得安。癥經年色黑。瘡未生。燒赤朮猪甲。二物辟惡氣。勿令外人入房。恐令瘡難出。或得上喘。面青黃色。尤良。犯此死者不可勝數。又瘡癥雖落。癥猶壓肌肉。或凹凸。載作瘡疹。此安後不解利。毒氣留滯敗熱。肌肉間也。

活人書論瘡疹。傷寒疑似間。只與升麻湯。傷寒發班門縫緣升麻湯解肌。薰治瘡已發未發皆可服。傷寒身熱。固

不可下瘡癰發熱在表尤不可轉至已出或膿血太

盛用鍼利皆非大拉首尾慎下若身熱耳冷尻冷坎

喎輒利之毒入裏殺人但與化毒湯紫草木通湯並

出門未_出鼠粘子湯攻咽門太盛犀角地黃湯解之門

_{太盛}

若

出不快煩躁不眠水解散時氣門麻黃芩湯升麻黃

芩湯並傷寒門活血散主之出不快門黑瘡倒蟹猪尾無以散

龍腦膏無不驗也倒蟹門若熱毒攻咽如聖湯攻咽門

_痛

瘡

豆入眼決明散撥雲散蜜蒙花散通聖散蛤粉散主

之

_{瘡出}

指迷論瘡疹初出往往以胡荽酒葡萄酒及諸溫熱藥發之使快或隱皮膚間以火煅人齒調服又云始得勿投涼藥恐胃冷致瘡不發多以為瘡疹宜溫余見執此論者致病人耳目口鼻悉平咽中閉塞大便堅祕小便皆血而死又見疮瘡頭黑凹為倒黡由始失調解更增煖溫湯藥孤陽無陰鬱毒不散熱無從出反攻府藏其氣俱絕又加溫藥發之斃者不可勝數余究此疾亦時氣之一端有如癰疹癰片者有赤熱如斑者有豌豆狀者或大小不等皆出膿水者亦

謂膿疮蓋毒有淺深故發有異狀其先風邪外客皮膚熱不得泄則為癰疹但皮膚癰痒其疾輕熱蘊于內外風搏血則為赤斑毒氣深蘊伏藏府閉經絡内外相合熱畜血聚壅遏不行結而成膿則為疮瘡始發令頭痛發熱皮毛洒淅如寒手足耳鼻時冷胷中煩躁如針刺皮中時痒甚者昏睡譖語脈大小不定應指必疾甚者六七至淋必日數深而後見慎無惶惑亂治始覺頭痛發熱微寒煩躁咽痛者宜四味升麻湯已出未出門痘痒成癰疹者荆芥湯時嘔者小柴胡

湯不惡寒但煩躁小便赤澀多渴成赤斑點者竹葉
湯犀角飲子並已出未出門大便不通宜四順飲子溫壯昏門
甚譖語大便不通與大承氣湯大小便不通門若自利黑黃
色此毒出廣與湯劑忍增他病大便已利勿以溫藥
助之瘡稀少而自快利只升麻湯荆芥湯

董汲斑疹總論兒斑疹一候不惟脉理難辯治療比
他病尤重始覺證與傷寒陰癧相近醫視病不精投
藥暴妄况兒藏府嬌嫩易為傷動斑疹未出疑為傷
風即以麻黃等發汗使表虛裏實若陰癧治用溫驚

藥熱勢愈盛直至證候定方治班瘡所失多矣大率
俗醫班瘡欲出熱藥發之使胃熱極已出者變黑而
陷又謂不快熱藥熏蒸得熱則出愈難轉生熱證大
小便不通更以巴豆取積藥下之使藏府內虛熱又
不除邪氣益深變為喘滿便血或為瘍瘍體裂痛哉
然斑瘡本胎中積熱及將養溫厚偶胃熱乘時而作
外臺云胃爛發斑微者赤五死一生極者黑十死一
生府熱為疹淺也藏熱為瘍深也故證色論云大者
屬陰小者屬陽級當壬申歲冬無大雪天氣甚溫逮

春兒病斑疹醫類投白虎湯不知白虎湯本治大人
孫真人論大小為治不殊藥劑多少為異是未知其
用藥法多失誤也

瘡疹候第二

巢氏傷寒熱毒氣盛多發疮瘡色白或赤發于皮膚
頭作癰漿戴白膿者毒輕紫黑色根隱肌肉裏毒重
甚者五內七竅俱有如癰豆故名

茅先生麻豆各有說豆候早晨渾身微熱午後大熱
眼白黃兩脇下吸吸動更發甚如驚風遍身大熱手

足逆冷病屬藏治用獨勝散已出未門 豆蔻慎不得瀉
麻候渾身熱午後大熱眼不白不黃微赤手足冷吐
逆此屬府治亦依豆蔻

真珠囊豆瘡外應候

壯熱汗不流先躁而出者主心

先嗽而出如砂子形者主肺

先肚痛而出疹子者主脾

先如瘡發渴後為水疮或有黯血者主腎

先目赤如珠暗流羞明出瘡子或有硬膿而不破者

主肝

茅先生麻豆惡疾歌

斑疹出後熱難除冷藥先冰在腹居渴甚瀉多
便溺泄不餐躁發命須臾

玉訣斑疹候歌

傷寒胃熱作斑瘡倒蹙因風氣受傷太過損肝
多紫黑大為陰盛小為陽
未出多不辨之勿作傷寒治太過者解之

又歌

目澀語聲短

一云氣喘
一作聲多澀

發熱有時涼手耳如冰

冷三關洪且長

又宜

石壁經瘡子歌

風熱以爲
傷寒變麻

小兒瘡子候偏多欬嗽涎潮作久痢發熱發寒

驚

如怕物看燈停目眼光多

一驚如羊
眼白相遇
喉中

自響如齁齁吐後常添氣不和夢裡發來如急

搐唇紅臉赤脉交多渴水心煩多躁熱耳冷足

冷髮溫和舌上有瘡如粟子定知三日熱來多

此病變成麻子候只湏平藥病消磨

此因溫熱毒氣在人至春感寒邪陰陽相錯在府作細赤瘡疹在藏為豆瘡切看手足稍冷尻陰冷腹中痛硬是瘡疹候若投驚藥毒邪內攻瘡不出更服熱藥使瘡屬陷死調氣發散愈

瘡疹未見乃可疎利第三

聖惠斷乳兒患疹豆覺似傷寒面與四肢俱赤壯熱頭痛腰背疼足多厥冷眼睛黃色脈息多洪數絕大不定小便赤大便多秘雖是疹豆未攻皮毛可勺和藏府疎泄逐下若在皮毛微微似出勿疎泄或出太

盛豆穴膿水者可踈利

王氏論瘡疹者莫不以古書說繞覽便與踈利為非
以錢氏治以溫涼勿妄下為是蓋兒腸胃嬌嫩若妄
取轉內虛熱入能殺人故倒虧而死不知古謂踈利
者乃先和節陰陽調治榮衛方利藏府即熱氣漸解
又曰嬰兒之性自然陽盛陰微藏府陰陽氣逆大小
便多秘不通繞覽是此便與踈利即輕患也若已出
即不可踈轉曷嘗使瘡疹出便取轉耶况踈利者輕
涼藥微利之如青黛黃連類取轉用峻快藥極下之

如巴豆芒硝類愚醫輒以躁利為取轉得不誤耶况
取轉時曾先和節陰陽調治榮衛乎已大小便不通
乎繞覽之說即瘡疹未見醫者取轉知瘡疹之已出
未出乎又曾知疹豆出即不可躁利之語乎蓋庸醫
見是瘡疹便取轉使瘡疹出快所以多誤錢氏云此
天行病唯用溫涼藥不可妄下及妄攻發亦曷嘗有
此證不得躁利語乎妄下非躁利比至如初虞世猶
以瘡疹比傷寒至陽明亦用利藥不知傷寒至陽明
宜下庸醫既不曉古意又使善醫者即印證其說故

特辯之

聖惠治熱甚發瘍豆初發早覺者

黃連去鬚篩散一錢水一小盞煎五分去滓不時溫
服

波斯青黛如棗核大水調服

痘瘍論用
溫磨刀水

疹豆論瘍未作膿心膈燥睡不安

黑豆煮汁溫徐徐服

天行瘍豆急預之豆湯

小豆

黑豆

菉豆

各半升

甘草

一兩

九升水煮豆熟逐日空心任意飲七日後豆發快

瘡疹初出第四

聖惠未與疎轉急服紫草飲

紫草二兩細剉百沸湯一大盞沃便合定勿令氣
出量兒溫服至一合瘡雖出亦輕諸方以紫草為先

胡荽酒令疹豆速出

胡荽三兩細切酒二大盞煎沸沃胡荽便合定候
冷去滓微微從頂已下噴背脅及兩腳胃腹遍勿
噴面錢乙云左右常令胡荽能辟汙氣瘡疹出快

瘡疹忌外人及穢觸雖不可受風冷亦不可擁遏
令衣服得中并虛涼所坐卧

生油方兒藏府伏熱毒未成疹豆四肢微熱食物似
減頭髮乾立或額多微熱

生油一小盞入體熱水一小盞旋旋傾入油內以
杖不住手攬麻豆用楊柳枝候水盡打勺如蜜夜卧時三
歲內服二蚬殼五七歲三蚬殼十五歲以前半合
大人一二合服良久卧少時服三二服大小便利
四肢熱退疹豆不生

瘡疹已出未出第五

秦承祖治瘡疹漸身熱耳尖脚稍冷或腹痛

蟬蛻廿一個淨末水一盞慢火煎七分去滓量大小溫服如已出更服三五次冷服即有瘡痕悞服無害

晉王珉治傷寒時氣熱毒豌豆瘡

樟皮木煎汁溫服

水鑑治豌豆瘡

天麻

甘草各一

髮灰

黃丹熟各一分

馬牙硝

分三

各七

黃鹽

一分陶隱居北海
黃鹽草粧粗以作

鱗鮋及

鱗鮋

擣散空心冷水調服一錢利下瘡隙差

有十一味
字可疑削

祕錄治斑瘡豌豆瘡

髮灰飲汁服三錢七

藥性

臘月兔肉作醬食毛煎湯洗毛傳瘡甚良

聖惠犀角散治瘻豆瘡及赤瘡

犀角

川大黃

炒

桑白皮

鈎藤

甘草

炙

麻黃

去根節各一分

龍膽

半分

石膏

苦蘿蔔

黃蓍

兩各半

粗散一錢水小盞煎三分去滓溫分三服量加減
瘡退濃磨犀角水塗錢乙治瘡疹太盛令不入眼
名調肝散

博濟治瘡疮未勻透肌解毒必勝散

牛蒡子炒熟杵細末一錢荆芥二穗水一盞煎七
分溫服如泡出更服

養生升麻湯治瘡瘍與傷寒類頭痛增寒壯熱疑似
間先與解肌湯已發未發皆可

升麻

白芍藥

乾葛

甘草

等分末二錢水一盞煎七分去滓溫服日三四甚
即連夜服緩急亦可湯點身心煩熱溫服寒多熱
服

茅先生獨勝散

牛蒡子

半

白僵蚕

一

末一錢水六分盞紫草二七寸煎四分連三服豆

便出

張渙安斑散調理瘡疹

川升麻

赤茯苓

羌活

黃耆各一
兩

人參

枳殼炒

桔梗

甘草炙各半兩

羅末一錢水一盞紫草薄荷少許煎五分去滓量

兒溫服

紅花子湯平調瘡疹

紅花子

紫草茸各一

兩

麻黃去根

一節

升麻各半
兩

細末半錢薄荷湯入酒一滴同調

疹豆論葛根散治天行熱氣欲發豆瘡作熱疼宜解
肌出汗

乾葛

麻黃各一两

石膏二两

黃芩

甘草各半两

散四錢水盞半煎八分溫服自汗去麻黃
桔迷小紫胡湯

紫胡

八两

人參

黃芩

甘草炙各三两

半夏

二半两

粗末五錢水二盞薑二片棗一枚煎一盞溫服嗽

加五味子二兩

竹葉湯

石膏四兩

知母二兩

麥門冬

甘草炙各一兩

粗末五錢水二盞竹葉一握煎七分溫服

犀角飲

犀角

甘草炙各半兩

防風二兩

黃芩一兩

粗末五錢水二盞煎一盞溫服

活人書化毒湯

紫草

嫩

升麻

甘草炙各半兩

剉如麻豆水二盞糯米五十粒煎一盞溫分服劉氏云慙豆瘡欲出渾身壯熱不思飲食服此內消已出即解全出頭焦三服差

紫艸木通湯

木通

紫草

人參

茯苓

糯米

等

甘草

炙半
之

剉如麻豆四錢七水蓋半煎一盞溫服

萬全方

豬膽汁和朴硝塗

董汲治一切風熱中暑驚悸瘡疹欲出多疎嗽盛面
赤手足冷發溫壯睡中驚搐不寧脉洪數頭痛嘔吐
小便黃赤拖龍丸

膽星半

天竺黃二

朱砂錢

飛二

雄黃

飛半兩

麝錢一

牛黃一

研細滴水丸雞頭大二歲竹葉或薄荷湯化一丸
白虎湯治痘瘍疹斑瘡赤黑出不快及瘡毒餘熱
并溫熱病中暑煩躁熱渴

石膏

四兩

知母半

兩

甘草

炙三

人參半

兩

散二錢水一盞粳米廿粒煎七分溫服不時兒或

半服春夏秋冬寒有證亦服但加棗乳毋亦服

劉氏治內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腮項

結核瘡腫毒聚遍身風疹癰毒赤癟及瘡疹已出未

出不透服三錢水一盞煎七分消毒犀角飲子攻咽
痛門

活人書鼠
貼子湯同

張氏羌活散治風壅作瘡解熱敗毒

羌活

獨活

川芎

桔梗

蟬蛻

地骨皮

前胡

甘草

柴胡

苦蘿根

天麻

荆芥

防風

等分細末一錢水三分薄荷二葉煎二分通口服

大小加減

奪命散

升麻

糯米

紫草

甘草

各半

木通

二半錢

剉服一大錢水七分煎四分溫服量加減

瘡疹出不快第六

養生治瘡出不快倒蟹

紫草茸

木通

甘草

枳殼燼

等分末二錢水一盞煎七分溫日二服兒量与

錢乙紫草散治發斑疹

釣藤釣子 紫艸茸

等分細末一字或半錢溫酒調無時

孩豆論脫齒散

人齒脫落者瓷瓶內固濟煅赤末薄苛酒調半錢良久脉平和毒氣散瘡如粟米錢乙入麝少許

方正所著
卷之八
治瘡出不快活血飲

白芍藥末一錢酒調止痛溫湯調

衛生如聖散療斑疹不快欲倒黽黑凹者

赤芍藥末半錢煎葡萄酒冷調下

董汲紫草散治伏熱在胃暴發豆疮瘡疹一切惡候
出不快小便赤澀心腹脹滿即倒黽門錢
乙四聖散

王氏治藏府蘊熱毒氣薰發肌肉生疹豆喉舌生瘡
毒氣未快懊悶氣喘煩渴多睡精神昏塞已發未叢
門活人書

化
湯同

王氏治斑瘡不癢

乳香細研猪心血丸 櫻桃大水磨一丸

吳氏

旋取猪心血調麝少許塗兩手心并唇上即出極妙

趙氏治瘡出不快至聖木星飲

朱砂一
麝金半

細末一二字量兒入龍腦少許新汲水茶腳調後
刺破猪尾血滴三點入藥服一二時瘡出紅活兒

無他病

鄭愈治麻豆不快紫草膏

紫草

白附子

各一錢

麻黃

去節

甘草

炙各二錢

全蝎

十個

殭蚕

炒枝二

末蜜一兩酒半盞入紫草煎數沸和藥丸阜角子
大服一粒紫草湯化續用黃蓍散調治

後解餘毒門

瘡瘍倒巒第七

靈芝龍腦膏治時疾發豌豆及赤瘡子未透心煩狂

躁氣喘妄語或見鬼神

龍腦細研滴猪心血丸如雞頭肉紫草湯化一丸
服少時心神便定得瞞瘡疹發透依常將息仍于
小猪尾尖取血三五點研入生腦子少許新水調
名猪尾膏錢乙未省溫酒化下

譚氏奪命丹治瘡疹毒氣不散出不快及觸犯黑色
者

黑熟牛李子七八月內採盆內研汁生絹繩出津
銀器盛慢火熬膏瓷器收常令透風服一阜子大
煎杏膠化人行二十里更進一眼瘡疹紅色毒氣

慢錢乙名牛李膏又名叉勝膏秋結實黑丸成魏
或無生者乾者為末水熬用每膏二兩研入麝半
錢貯不津器中九籥衛生桃膠半兩牛李生一两
炒末一錢水七分煎四分溫服

錢乙百祥丸治瘡疹倒黓黑陷

紅牙大戟蔭乾漿水煮軟去骨曝乾復內汁中煮
汁盡焙末水丸如栗服一二十丸研赤脂麻湯下
吐利同無時

藍根散

板藍根

一兩

甘草

炒三分

細末半錢或一錢雄雞冠血三兩點同溫酒少許
食後調上二方無此證勿服

四聖散治瘡疹出不快及倒廝

紫草茸

木通

甘草

炒

枳殼

炒

黃蓍

焙

等分粗末一錢水一中盞煎八分溫服無時

張煥治蛇瘻斑毒狀如蚊蚤所咬若毒盛色黑者宜
山梔湯

薰服宣
毒膏

山梔仁

白蘚皮

赤芍藥

升麻

各一
兩

寒水石

甘草

炙各半兩

羅未一錢水八分一盞紫草薄荷少許煎五分溫
服

宣毒膏治毒盛瘡疹出不快倒蠶

獐猪尾血

臘月八月刺升新瓦盆盛

揀乳香

朱砂

飛各一
兩

甘草

馬牙硝

各半兩
分

脂麝

一

末猪血拌用寬礪竹筒一個底醫節入藥密紙數
重繫合筒口通一竅麻索繫大糞坑屋梁上至清

明取出曝乾入腦麝各一錢研勻滴水丸如皂子
人參湯化

瘳痘論化毒散

鬱金一枚

甘草半錢

水半碗同煮水乾去甘草鬱金為末入生腦子半
錢研勻生猪血研成膏薄苛湯化一錢二服後毒
從手足心出差一法蟬蛻末半錢好腦子一阜子
大猪心血三倍和膏熱酒浸紫草溫化服移時身
發熱瘡毒頓出後依證調治

良方療瘡疹欲發及已發面陷伏不速治毒入藏又

困

臘月猪血瓶盛掛風中令乾半棗大加龍腦大豆
許溫酒調潘醫加菉豆英粉半棗大驗

活人書治瘡疹惡候不快及黑瘡子無比散

朱砂一兩

牛黃

腦麝

膩粉

各一

細研兒一字大人半錢水銀少許同小犢豬尾血
三兩滴新汲水調服睡後下如爛魚腸葡萄穗之
類臭涎惡物便安兒妹汁

聚寶斑疹不出反入抵聖丸

臘月老鴟左翅風乾辰日燒灰用中等獐豬背上
刺血丸雞頭大服一丸獐豬尾血溫水同化未效
更服

董汲治瘡疹膿疮惡候危困陷黑救生散

獐豬血

臘月取新瓦罐盛掛屋東方陰乾

馬牙硝各一

鵝砂

朱砂

牛黃

腦麝各一

錢

研極細二歲兒一錢新汲水調大便下惡物瘡疖
紅色為度

治瘡瘍熱毒內攻紫黑色出不快玳瑁散

生玳瑁水磨濃汁一合積猪心血一皂子同研紫

草濃煎湯調服

張氏理脾虛吐瀉如班瘡未出醫用冷藥致瘡內伏
不出將此調理如無汗用控心散發後羌活散並已
出未
門此名胃愛散

糯米一兩

乾淡木瓜三分

甘草一分

丁香半粒

炒味同焦

藿香

紫蘇葉各一分

研末一錢粟米裏湯調下

脫殼散

雞抱出殼新瓦上焙去膜研如粉兒斑瘡倒擗不出或藏府糞血糞黑頭瘡昏睡不醒酒調一字塗兒唇令舐或塗風池背上心前或熱湯調喫

化斑散

石膏

煅

知母

焙

等分湯調一字服或塗唇上去頭疼除昏瘻瘡上二方極妙

莊氏斑瘡倒擗并黑色為鬼瘡

人齒炭火燒灰研細
積猪尾血調二錢移時再服
治瘡倒黓

臘月大糞燒灰為末入生龍腦少許細研新汲水
服半錢

王氏

牛蒡子炒半兩

紫草一升

末一錢入麝少許溫酒調三服愈

又

白花蛇

連骨慢火炙焦

大丁香

半升

末兒服半錢水淡酒調如黑漆者服移時重紅

又

橄欖核中截水磨服

趙氏麻黃湯

麻黃三十寸去節蜜拌炒香紫色水一盞煎六分

服神驗

瘡瘻太盛第八

煩喘
渴附
躁

活人書犀角地黃湯治傷寒溫病應汗不汗內有瘀血及蟲蛇吐不盡內有瘀血面黃大便黑此消瘀血

卷之三
十一
薰治瘡疹出太盛

犀角

一升兩無升麻代

生地黃

半斤

芍藥

三分

牡丹

一兩

剉如麻豆服五錢七水盞半煮一盞有熱如狂加
黃芩二兩脉大來遲腹不滿自言滿者為無熱不

用

瘳豆論治瘡未出及雖出燥渴甘草散

大甘草炙末服一二錢水一盞煎六分不時呷少
解利熱毒即止若瘡出遲當服紫草飲初出門大人
針兩腕硯子骨間男左女右取灸一壯亦助發毒

已發勿用

麻黃湯治瘡疹煩喘

麻黃

杏仁

桑皮

甘草炙各
三分

剉散藥一兩水七合煎四合溫服若脉數熱未退入竹瀝一半代水煎咽喉痛并嗽入麝少許

瘡疹愛護面目第九

聖惠黃柏膏治疹豆出後即愛護面目勿令沾染先用此塗面後用胡荽酒噴四肢

黃藥

一兩

菉豆

半兩

甘草

生四
兩

擣羅生麻油調薄膏耳前眼唇並厚塗日三五遍
早塗令不生疹豆縱出亦少疹豆論菉豆粉三兩
半

莊氏令瘡疹不入眼

白芥子末水調傅脚心

王氏疹豆初發便煎油渫繖子之類令兒看哺兒忌
醬醋五味馬牛雞鴨野味等物止食淡熟豬肉粥
飲食餅餌之類入少鹽無害又侵晨人未起時抱
兒井上令投菉豆七粒于井中云使兒斑瘡不入

眼又食熟雞等卯未有不損目者雖瘡愈宜數

月不食

瘡疹攻咽痛第十

錢乙甘露飲子治心胃熱咽痛口舌生瘡并瘡疹已
發未發又治熱氣上攻牙斷腫牙齒動搖

甘草

炒

山茵陳葉

石斛

枇杷葉

去毛

枳殼

燒

黃芩

去心

生熟乾地黃

焙

天麥門冬

焙

等分粗末二錢水一盞煎八分食後溫服齒牙病

并含嗽潔

治瘡疹未出已出或未勻又治一切瘡涼膈去痰咽

痛消毒散

牛蒡子

炒二兩

甘草

炒半兩

荆芥穗

一錢

粗末三錢水盞半煎

一盞溫服不時

活人書如聖湯治瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗

甘草

生

牛蒡子

炒各一兩

麥門冬

半兩

細末二錢沸湯點細細呷

竹葉煎尤妙

鼠粘子湯治疹豆欲出未透皮膚熱氣攻咽喉眼赤

心煩

鼠粘子

炒四兩

荆芥穗

二兩

甘草

炙一兩

防風

各一兩

羅末二錢沸湯點服食後臨卧日三服大利咽膈化涎止嗽春夏間常服免生瘡癧老幼皆宜衛生療斑瘡毒攻咽喉音聲不出舌頰生瘡渴逆煩悶潮熱面赤紫河車散

紫河車

茜草根

貫眾

各一兩

芍藥

甘草

炙各半兩

粗末一錢水七分薑二片煎四分溫服一加牛蒡

幼幼新書

卷一八

廿五

子一兩

董汲治一切熱毒胃熱發斑消豆疮癰瘍及傷寒入
胃發斑并兒驚癇誕厥走馬急疳熱疳黃瘦喉脾腫
痛及瘡疹毒攻咽喉水漿不下紫雪

黃金

一百兩

寒水石

石膏各三斤

犀角

羚羊角

各十兩

元參

一斤

沉香

木香

丁香

各五兩

甘草

八兩

升麻

六兩

㕮咀水五斗煮金至三斗去金入藥再煎至一斗
去滓投芒硝二斤半微火煎柳木罈候凝入盆

中下朱砂麝各三两急攪勻候冷貯密器勿見風
眼一錢溫水化下兒半錢一字咽喉危急少許乾
嚥

瘡瘍大小便不通第十一

附赤瀝

張渙川黃散治癰瘡斑瘡大小便不通

川大黃

炒熟

川芎

各一兩

甘草

黃芩

炒微

枳殼

炒炒各半兩

羅末一錢水一盞紫草少許煎五分溫服

敗毒牛黃丹治瘡瘍出定大便不通瘡出膿汁不乾

牛黃

川大黃

各一兩

粉霜

珍珠

各一分

研勻煉蜜丸如黍米服十粒人參湯下量兒

董汲治瘡疹欲出胃熱發溫壯氣粗腹滿大小便澀
睡中驚煩渴口舌乾手足微冷多睡時嗽涎實脉沉

大滑數利毒丸

大黃

半兩

膩粉

炒

大青

錢一錢

龍腦

朱砂

各半錢

檳榔

生牽牛

各半錢

黃芩

青黛

各二錢

一錢

研細麵糊丸如黃米每二歲八丸生薑蜜水下不

動再服量虛實

劉氏治斑瘡水豆心燥幾渴及小便赤色口舌生瘡
通心經通關散

山梔子

炒一
分半

大黃

錢一
錢半

木通

炒一
錢半

甘草

瞿麥

菝葜

人參

滑石

車前子

炒各
一分

地扁蓄

焙半
兩

細末服嬰孩一字二三歲半錢四五歲一錢水半
盞燈心煎數沸溫服

瘡瘍便膿血第十二

瘡痘論薤白湯治瘡痘或下痢赤黃膿血身熱

薤白

半盞

豆豉

一盞

山梔

一枚

水五盞煎薤白爛為度量服

董汲治瘡疹陽毒入胃便血日夜無節腹痛啼哭牛黃散

牛黃

一錢

礬金

一兩

研末一歲兒半錢漿水半盞煎三分和滓溫服日二量增減

瘡疹膿汁不乾第十三

疹豆論治麻豆瘡子已出太盛發潰膿水黏衣着蓆
不能轉動疼痛濕爛傳之便乾不成瘢痕

牛糞晒乾火煅取心中白者研細綿裹擦瘡處一
用烏牛糞一用黃牛糞

淨黃土羅傳

麥麸床上站卧持息

瘡疹入眼第十四

龍木論治斑瘡入眼外障初患時覺瘡入眼若不忌
口即疼痛淚出赤澀怕日難開腫便醫如銀色此熱

在肝上衝眼肝膈壅毒成腫宜秦皮湯洗眼涼肝丸
不宜鑿洗出血點藥搘撥痛定點退腫藥亦得

惠濟論歌

斑豆纔生眼不開淚流頻有熱橫顧如搘腫赤
如錐痛此疾應知奔眼來因與毒餐同熟麪或
因雞鳥與戴災急交製造威靈散百日無踰尚
可回

龍木論涼肝丸

防風二兩

黃芩

茺蔚子

黑參

大黃

知母

各二兩

人參

茯苓

各半兩

末煉蜜丸梧子大空心茶下十九丸

秦皮湯

秦皮

二兩

秦艽

細辛

防風

各一兩

甘草

半兩

末二錢水二盞煎三五沸淋洗眼

聖惠寶蒙花散治夢豆瘡并無辜氣入眼活人書
治諸毒八眼

塞蒙花

三兩

青箱子

決明子

車前子

各一兩

兩

羅末羊肝一大片切捲藥肝內濕紙裹煨熟空心
量食

譚氏仙靈脾散

仙靈脾 咸靈仙

末二錢食後米飲調下兒半錢趙氏治食毒睛突

外

養生治目暴赤腫痛兒斑瘡入眼

蒜子

炒

菟葵子

紺袋盛
蒸焙炒

上

甘草

炙

木賊去節

等分末沸湯點一錢食後服日三

又方

穀精草

蛤粉

等分末一錢豬肝二兩批開移藥青竹葉裹麻縷
札定水一碗煮熟收瓷瓶內薰眼候溫食日作不

十日退

錢乙蟬蛻散

蟬蛻一兩

豬懸蹄甲二兩

磗內鹽固燒存性

研入羚羊角末一分拌勻服一字百日兒半錢溫
水或新汲水調日三四夜一二食後服一年外難
治

治瘡瘍太盛宜調肝散令不入眼

已出未出門聖
犀角飲同

治瘡瘍入眼

馬屁勃

蛇皮

各半
丙

阜角子

枚
十四

入小罐鹽泥固濟燒存性研細溫酒調一二錢食

後服

治瘡瘍入眼成醫

蟬蛻末水煎華子肝湯調服二三錢凡豆瘡纔欲
着痂即用酥或面油不住潤可揭即揭不然瘡痂
硬即隱成瘢痕

張渙決明丹治瘍豆瘡後毒氣入眼

決明子

蜜蒙花

各二兩

青箱子

車前子

川黃連

羚羊角

各半兩

羅細末煮羊肝一具切破同擣一二百下丸如黍
服十粒荊芥湯下食後量與

謾目膏截斑入眼

黃藥

蜜

菉豆

紅藍花

各

一甘草

生

半

羅末脂麻油調如薄膏從耳前眼晝外塗時時用
惠濟威靈散治斑瘡雀目眼生翳

威靈仙

仙靈脾

甘草

炙

蒺藜

子芩

青箱子

大青

苦藥

大黃

蒸

等分細末半錢或一錢瀆猪膽宜肝二枚批開捲
藥麻纏米泔煮熟冷喫

良方治豌豆瘡入目痛楚忍傷目

浮萍陰乾肝一二錢羊子肝半個入盃內杖子刺
爛投水半合絞肝汁調食後服傷目者十服差神
驗

瘳豆論蕤仁散

蕤仁

炙

黃芩

梔子仁

黃連

黃蘖皮

川升麻

甘草

炙各一兩

細末二錢水一盞煎六分食後溫服量兒如生醫

薰蜜蒙花散

寒蒙花散

密蒙花

三

井泉石

青箱子

决明子

車前子

各二兩

細末同蕤仁散各半羊肝一片批開捲藥濕紙裹
煨熟空心量力食醫退止

活人書撥雲散治瘻豆瘡入眼生醫

桑螵蛸一兩炙焦細研入麝少許服二錢生米泔

調臨卧服

通聖散

白菊花

無甘菊代不如白者

菜豆皮

穀精草

根去

各二兩

羅末服一大錢乾柿一個生粟米泔一盞煎候泔盡乾柿去核食不時日喫三枚遠年者半月

劉氏目中痘瘡成醫

大黃炒二錢

水銀半錢

男津嚙化水銀為泥入大黃末冷水調塗顱如乾

水濕

羚羊角丸治眼昏澀赤脉侵睛淚多作障

羚羊角

黃芩

大黃

芥菜子

各二兩

半錢

當歸

元參

甘草炙

木賊

蟬殼

珍珠

決明子炒各

半

荆芥穗

川白芷

蒼朮米泔浸一

宿
二
兩
焙各

羌活

一

末煉蜜丸如彈子食後荆芥湯嚼一丸兒斑瘡眼
蟬蛻湯下

莊氏治斑瘡入眼及累黑睛
樟皮散

樟皮

頭髮

蛇蛻各半

剉淨罷內點火燒煙盡細研服半錢黑豆湯入酒

三滴調日五

又方

黃芩末內臘月黃牛膽中吊北陰中旋丸菉豆大
麵湯下五丸三年外不治

善化陶寧方

生鱠血點眼良

丁時發黃芩散

黃芩

山梔子

黃丹

等分末牛蒡子葉汁調塗項

丁安中蟬退散治斑瘡腎障

蟬蛻

蛇蛻炙

川升麻

蕷藜炒去角

黃連

炒

穀精草

大青艸

仙靈脾

威靈仙

井泉石

各半朱砂

螺粉各一分

細末半錢一錢蜜水調大小加減

聖惠灸大杼二穴各一壯項後第一椎下兩傍各寸半陷者中炷如麥

瘡瘍後解餘毒草十五

聖惠大黃散治瘍豆瘡出盡宜服

川大黃

黃芩

黑參

各半
丙

擣羅服一錢水小盞煎五分量溫服

瘳豆論多山

梔

苦氏治瘻豆不出或用藥發後餘熱未退渴飲水乃

下血斑

疼痛牛蒡散

攻咽門錢乙消毒散以
薄荷湯調未出紫草湯

瘻瘍後減瘢痕第十六

葉氏傷寒發斑是熱毒所為病折則瘡愈而毒尚未全散故瘡痂雖落癥猶壓或凹凸宜消毒減瘢藥傳

之

譚氏療兒面上瘡豆癩

黃明膠慢火煮末溫酒調一錢七出者服之無癩
未出瀉下

又蜜陀僧細研水調夜塗旦洗

聖惠治熱毒發疹豆瘡初愈宜塗

胡粉一兩

膩粉一分

和研入鍊子猪脂拌如膏夜薄塗癩上以漿水洗

去

又方

鷹糞白

一兩

衣中白魚

升

細研白蜜調如稀餳塗

又方

牡蠣

煅三兩

土瓜根

一兩

羅夜取二錢白蜜調塗面及瘡癩旦煖漿水洗

減瘢膏

馬齒莧

升

一鍊成猪脂

三兩

和慢火熬成膏日夜塗痕上

又方

羊脂

乙具酒乙升浸
一宿去筋膜

牛酥

四两

銀鍬

內慢火煎三五沸新絲滌淨器盛夜塗面旦

用生甘草

一兩漿水二大盞煎七八沸溫洗面

又用猪脰

一斤天鼠二枚製金同上

又鷄鷄糞

二兩臘月猪脂三合調金

洗方

豉升

羊糞合

和水

一斗煎十沸洗痕

良方減瘢

頻揭去痂勿令隱肌不成瘢縱有微血以面膏塗
無苦瘡家勿食雞鴨卵即盲瞳卵白尤速戒之

幼幼新書卷第十八

章禁之刑