

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元丙集二卷

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

男

龔定國
龔安國

校

南雍太學生龔印周文卿光霽堂編

痰飲

脉雙弦者寒飲也。○其脉偏弦者飲也。○肺飲不弦但喘短氣。○又云脉浮而細滑傷飲。○脉弦數有寒飲春夏難治。○脉沉而弦者懸飲肉菴。○其人短氣四肢歷節走痛脉沉者有留飲。○左右手關前脉浮弦大而質膈上有稠痰也宜吐之。○病人百藥不効關上脉伏而大者痰也。眼胞及眼下如炭烟薰黑者亦痰也。○久得滑脉痰飲膠固脉道阻滯也。卒難得開必費調理。

痰者病名也。生於脾胃。然脾胃氣盛。飲食易化。何痰之有。或食後因之。氣
喘勞碌。驚恐風邪。致飲食之精華。不能傳化。而成痰飲。夫有流于經絡。
皮膚者。有鬱于臟腑。支節者。游溢。遍身無所不至。痰氣既盛。必勝主。
或奪於脾之太絡也。氣則倏然止地。此痰厥也。升於肺者。則喘急咳嗽。
迷於心者。則怔忡恍惚。走於肝。則眩暈不仁。脇肋脹滿。關於腎。則哈而
多痰。漉流於中脘。則嘔瀉。而作寒熱。注於胃。則咽膈不利。肩後骨痛。入
於腸。漉漉有聲。散於胸背。則揪觸。一點痰痛。或寒如手大。或苦燥。下
散。則有燥聚。則不利。下身上下。變化百病。治當各從所因。是以虛宜補。
之火宜降之。氣宜順之。鬱宜開之。食宜導之。風寒濕熱。宜發散。清燥以
除之。故曰治病必求其本。

○一論有 濕痰 熱痰 風痰 老痰 寒痰 食積痰
宜後方加減。

三陳湯

陳皮

去白

半夏

湯泡

白茯苓

去皮

甘草

五分

右剉一劑。生薑三片。水煎。溫服。

一濕痰盛者。身軟而重。加蒼朮白朮。

一熱痰。加黃連黃芩。痰因火盛。逆上。降火爲先。加白朮黃芩。軟石膏黃連之類。○眩暈嘈雜者。火動其痰也。亦加山梔黃連黃芩。

一風痰。加天麻枳殼南星白附子殭蠶牙皂之類。氣虛者。加竹瀝。氣實者。加荆瀝。俱用薑汁。

一老痰。用海石半夏瓜蒌香附連翹之類。五倍子佐他藥。大治頑痰。宜丸藥。喉中有物。咯不出。嚥不下。此痰結也。用藥化之。加蘇藥。吹堅之類。宜瓜蒌杏仁海石桔梗連翹香附。少佐朴硝薑汁。煉蜜和丸。喻服之。脈滑者。辛難得開。必費調理。氣實痰熱結者。吐難得出。或成塊吐。咯不出。氣滯者。難治。

一寒痰痞塞胸中。倍加半夏。甚者。加麻黃細辛烏頭之類。痰厥頭痛亦加。

半夏

一食積痰加神曲麥芽山查炒黃連枳實以消之其苦必用攻之宜在兼血虛者用補血藥送下中焦有痰消食積也胃氣亦賴所養辛不便虛若攻之盡則虛矣噫氣吞酸此係食積而鬱有熱火氣動上加黃芩南星

一血虛有痰加天門冬知母瓜蒌仁香附米竹瀝薑汁帶血者更加黃芩白芍桑白皮血滯不行中焦有飲者取竹瀝加生薑汁非汁飲三五盞必胸中煩燥不寧後愈

一氣虛有痰加入參白朮脾虛者宜補中氣以運痰降下加白朮白芍神曲麥芽兼用升麻提起肉傷夾痰加入參黃芪白朮之類薑汁傳送或加竹瀝尤妙

一痰在膈上必用吐法瀉之不去膠固稠濁者必用吐脈浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就發散之義凡用吐藥宜升提其氣便吐如

防風川芎桔梗荅芽生薑薑汁之類或瓜蒂散凡吐用布緊勒吐於不通風處行之

一痰在腸胃間可下而愈積實甘遂巴豆大黃芒硝之類凡痰用利藥道多脾胃易虛則痰易生而多

一痰在膈下非白芥子不能達

一痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生薑韭汁膈間有痰或癲狂或健忘或風痰俱用竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荆瀝

一凡人身上中下有塊是痰也問其平日好食何物吐下後方用藥

一凡人頭面頸項身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消之

一凡痰之爲物無處不到爲隨氣升降故也

○一論竹瀝大治熱痰及能養血清熱有痰厥不省人事幾死者得竹瀝

灌之遂甦誠起死回生藥也

用水竹早筆竹截長三尺許六者每段劈作二片大者劈作四片入井水浸一小時許以薄磚二塊排定將竹片架於磚上兩頭露一二寸下以烈火迫之兩頭以盆盛滙每六分中加薑汁一分服之痰熱甚者止可加半分耳用此竹瀝加入湯藥內服之尤妙取荆瀝亦治熱痰亦照此法取之

○一論痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液瀾變為痰飲故曰痰因火動降火為先火因氣逆順氣為要

加減二陳湯

橘紅去白一錢

半夏製一錢半

白茯苓去皮一錢

枳實炒一錢

白朮去蘆一錢

連翹五分

黃芩酒炒一錢

防風去蘆五分

天花粉七分

香附便炒一錢

甘草三分

右剉生薑三片水煎溫服

○一論熱痰在胸膈間不化吐咯不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結
開結化痰湯

陳皮

半夏製

茯苓

桔梗

枳殼

貝母

瓜蒌仁

黃連

黃芩

梔子

蘇子

桑皮

枳朮

杏仁

甘草

右剉水煎入薑汁磨木香服。

○一論遍身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背心一點如冰冷脉來沉滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也。

清濕化痰湯

南星泡

半夏製

陳皮

去白茯苓

去皮

蒼朮

羌活

酒芩

白芷

白芥子

甘草

右剉木煎入竹瀝薑汁磨木香溫服。○骨體痛甚及有腫塊作痛者在

曰痰塊加乳香沒藥海石朴硝。○頭頂痛加川芎威靈仙。○手臂腫痛加薄荷桂枝南星等藥至痛處。

○一論肉傷七情痰迷心竅神不守舍神出舍空空則痰生以致習成壯熱頭痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫誦類傷寒兼治中風痰厥氣厥不省人事者。

清熱導痰湯

入參

白朮

去麩茯苓

去皮陳皮

去白半夏

姜製南星

姜製

枳實

姜炒桔梗

黃連

黃芩

瓜蒌仁

甘草

右劉生薑煎入竹瀝薑汁同服。

家傳清氣化痰丸 製造甚得法化痰清火開膈順氣消痞除脹醒酒消

食殊效

大南星 四兩

大半夏 四兩

二味先用米泔水各浸三五日以透

爲度洗淨切片以碗丁箇盛貯曬乾先薑汁次皂汁又次礬汁又取

硝水晒乾

一用生薑汁浸一日夕晒乾

一用皂角煎水去渣浸一日夕晒乾

一用白礬二兩菴朮浸一日夕晒乾

一用朴硝二兩水煮浸一日夕多洗晒乾

青皮去穢 陳皮去白

枳殼去穢

枳實麩炒

白朮去蘆

白茯苓皮去

蘇子炒

白芥子炒

蘿蔔子炒

香附薑水炒

瓜蒌仁

乾葛

桔梗去皮

杏仁去蘆

黃芩酒炒

神曲炒

麥芽炒

山楂蒸去子

白豆蔻去殼

前胡去蘆

甘草各一兩

右爲細末用前浸四味藥水加竹瀝下碗泡蒸餅爲丸如梧子大每服五七十丸或茶或薑湯任下

一論徒脾胃清火化痰頑痰能軟結痰能開寒風養血清上焦之火除

胸膈之痰清頭目止眩暈

千金化痰丸

膽星

四兩

半夏

姜磨牙皂同煮
半日用四兩

陳皮

去白
三兩

白茯苓

去皮
二兩

枳實

麩炒
一兩

海石

火煨
二兩

天花粉

二兩

片苓

酒炒
二兩

黃柏

酒炒
一兩

知母

酒炒
一兩

當歸

酒洗
四兩

天麻

火煨
三兩

防風

去蘆
二兩

白附子

炮二
兩

甘草

生三
兩

大黃

酒蒸九
大五兩

白朮

米泔浸
炒二兩

氣虛

加入參

八錢

右爲細末神麩二兩打糊爲丸如梧子大每服七八十九茶水任下

一秤金 一名金珠化痰丸治痰嗽如神又治勞嗽

用半夏十斤米泔水浸十日換水三次取泔切作兩半曬乾用白礬

五斤水一桶入鐵鍋內化開將半夏入礬水內浸二十日取出切作

四瓣曬乾用生薑十斤另研取汁再入半夏浸二十日取出曬乾爲

細末聽用粉草十斤去皮爲粗入鍋內添水煮數沸取出以布濾去

渣將淨水仍入鍋內熬成膏和成劑每病重者用藥二錢半輕者

一錢金箔十張和一大丸與病人嚼化忌房事此藥神效不可勝言
○一治痰壅方

梨汁一鍾

生薑汁半鍾

蜜半鍾

南薄荷末

三兩

右和勻重湯煮十餘沸任意吞降痰驗如奔馬

○一論痰飲為病或癩或狂或眩暈等症無不奏效

白丸子 中州傅明岐傳

川南星 四兩 半夏 十兩

白附子 五兩 小川烏 三兩

右俱切片春七夏三秋八冬十日水浸一日一換日晒夜露其星半另
放磁器內少加薑汁同浸去麻性次將前藥磨又將絹巾濾去汁將
粉晒乾白米糊為丸如梧子大每服五六十丸薑湯滾水任下其藥放
舌上不麻為度方妙

釣痰仙方 曾府秘方

硼砂 一錢

白礬 半生半

磁青 上細磁罈打下

瓜蒂 五分

青蒙石煨紅酒洗
汁內下錢

右共研細末每用二匙薄荷濃湯調入鼻內即愈

○一人氣短有痰小便赤澀足跟作痛尺脉浮大按之則瀉此腎虛而痰飲也用四物送六味丸不月而康仲景先生云氣虛有欲用腎氣丸補而逐之誠開後學之蒙瞶液無窮之天枉腎氣丸即六味丸也

○一儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳苓連蒸薑加桑皮杏仁益汗氣從加貝母枳殼不特發熱余以為脾肺虛寒用八味丸以補土母補中益氣以接中氣而愈

○一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物二陳苓連枳殼之類不應更加祛風之劑半身不遂筋漸牽縮四肢痿軟日晡益甚內熱口乾形體倦怠余以為鬱怒傷脾肝氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸調治喜其謹疾年餘悉愈形體康健

補中益氣湯

見內傷

六味丸

八味丸

俱見補益

咳嗽

脈咳嗽，所因浮風眩，寒數熱細濕，房勞瀆難，左關瀆者，飲食傷脾，左關短，疲極肝衰，浮短肺傷，法當咳嗽。五臟之嗽，各視本部。浮緊虛寒，沉實熱，洪滑多痰，弦滿少血，形盛脈細，不足以息，沉少伏匿，皆是死脈。惟有小浮大而嗽者，生。

夫嗽謂有聲，肺氣傷而不清，嗽謂有痰，脾濕動而生痰，咳嗽者，因傷脾也。而動脾濕也。病本須分六氣五臟之殊，而其要皆主於肺。蓋肺主氣而聲出也。故云：因風寒者，鼻塞聲重，惡寒者是也。因火者，有聲痰少，而無者是也。因勞者，盜汗出，兼痰者，多作寒熱，肺脹者，動則喘滿，氣急身重，痰者，嗽動便有痰聲，痰出嗽止。五者大槩耳，亦當明其是否也。治法須分新久虛實，新病風寒則散之，火熱則清之，痰涎則化之，濕熱則瀉之，久病便屬虛風，鬱氣虛則補氣，血虛則補血，兼鬱則開鬱，滋之潤之飲。

之降之則治虛之法也

○一論四時感冒發熱頭疼咳嗽聲重涕滯稠粘中脘痞滿嘔吐痰涎
中快膈不致傷脾此藥大解肌熱潮熱將欲成癘痰嗽喘熱並効用

參蘇飲

紫蘇

前胡

桔梗

枳殼 去穰

乾葛

陳皮

半夏 湯泡

白茯苓

去皮各一錢

甘草 三分

人參 五分

水香

三分 効病熱嗽

右剉丁劑薑棗煎服○若未寒感冒惡寒無汗咳嗽喘急或傷風無汗
鼻塞聲重加麻黃二錢杏仁一錢金沸草一錢以汗散之○若初感冒
肺多有熱加杏仁桑皮黃芩烏梅○胸滿痰多加瓜蒌仁○氣促喘嗽
加知母貝母肺寒咳嗽加五味乾薑○心下痞悶煩熱嘔穰惡心或停
酒不散加薑炒黃連枳實乾葛陳皮倍用之○鼻衄加烏梅桑白
草根○心盛發熱加柴胡黃芩○頭痛加川芎細辛○咳嗽吐血加升

麻牡丹皮生地黄。○人熱咳嗽久不愈加知母貝母麥門冬。○見血加阿膠生地黃烏梅赤芍牡丹皮。○吐血癆嗽加四物湯名茯苓補心功。○姪娘傷寒去半夏加香附子。

○一論上氣喘逆咽喉不利痰滯咳嗽口舌乾渴。

二母清順湯

天門冬

一錢

去心

麥門冬

一錢

知母

貝母

人參

當歸身

一錢

枯苓

一錢

山梔子

一錢

女參

桔梗

天花粉

一錢

薄荷

七分

生甘草

三分

右剉水煎服。

清熱寧嗽化痰定喘丸

橘紅

五錢

青黛

三錢

貝母

七錢

瞻星

一兩

桑白皮

七錢

杏仁

七錢

桔梗

七錢

黃芩

五錢

甘草

三錢

去皮尖

前胡

七錢

生甘草

三分

右爲細末煉蜜爲丸如龍眼大每服一丸淡薑湯化下。

○一論痰嗽服前方不効者多屬氣血虛弱四肢沉困宜八物湯加黃柏知母貝母麥門五味瓜蒌紫蘇陳皮等分薑棗煎服。

○一論咳嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐然早間多痰乃脾虛飲食所化夜間喘急乃肺虛陰火上衝以後方服之。

補中益氣湯方見內傷依本方加麥門冬五味子○六味地黃丸方見補益依本方加麥門冬五味子。

○一論傷風寒聲流清涕寒禁噴嚏此脾肺氣虛不能實滕理以補中益氣湯主之。

○一論咳嗽面白鼻流清涕此脾肺虛而兼外邪補中益氣湯加茯苓半夏五味而愈。

○一論咳嗽吐痰失音聲啞此元氣虛弱而致也。補中益氣湯加黃柏知母天門冬麥門冬五味杏仁黃芩瓜蒌仁。

○一論咳嗽吐痰手足時冷此脾肺虛寒以補中益氣湯加炮乾薑
○一論聲音不出用新棉花不拘多少瓦上慢火炒焦置懷中神中時時
將一二粒口中咀嚼嚙之使喉中常有味久聲自出
○一治語音不出用

真蘇子二兩 訶子三箇 杏仁三十 百藥煎二兩
右爲末每服二錢熱酒調服。

○一治久嗽語聲不出

訶子去核 杏仁炮去皮 通草二錢

右剉每服四錢煨薑五片水煎食後溫服。

○一論年老人日久咳嗽不能卧者多年不愈用

猪板油四兩 蜂蜜四兩 米糖四兩

右三味熬化成膏時時刻刻挑一匙口中嚙化三五片其嗽即止
○一論久年咳嗽吐痰。

銀杏膏

陳細茶

補腎壯陽

白果肉

四兩一半去白膜子

核桃肉

四兩糖

家蜜

半斤

右藥入內煉成膏不拘時服

○一治冬嗽不瘥并虛勞喘嗽

紫苑

去蒸頭

款冬花各一兩

百部五錢

右爲末每服三錢生薑三片烏梅一箇同煎湯調下食後臨卧各一服

○一論久嗽并連嗽四五十聲者用連皮生薑自然汁丁勻加白蜜二茶

匙同放茶碗內煎一滾溫服三四次即止

○一切咳嗽上氣者一道士專賣此藥不拘新久皆効

乾薑

桂心紫色辛辣者去皮

皂莢泡去皮子肥大無孔者

右三味並另搗下篩了各秤分兩和合後更搗篩一遍煉白蜜搜和又

搗一二千杵每服三丸如梧桐子大不限食之先後嗽發即服日進三

五服葱蒜油膩麩物

○一論年久近日咳嗽哮喘急等症

神吸散 國子博士顏心吾傳

鵝管石

火煨好醋碎
七念一錢

餘糧石

火煨醋碎
七次一錢

官桂 三分

粉草 三分

枯白礬 五分

款冬花

五分石膏煨五分

右爲細末每服三分三釐準秤至夜食後靜坐片時將藥放帛上以竹筒五寸長直插喉內用力吸藥速亦不忙吸藥令盡爲度以細茶下口嗽而嚥之忌雞魚羊鵝一切動風發物並生冷諸物惟食白煮猪肉雞子戒三十日宜用公猪肺一副加肉半斤梔子一歲下筒炒成灰桑白皮不拘多少用水同炊至熟爛去藥至五更病人不要開口言語令人將湯肺喫之病人嚼吃任用餘者過時再食神效

○一論久嗽痰喘百藥不效并久年不瘥者或能飲酒人久嗽尤效

清金膏 曲阜令孔桂慇傳

天門冬去心

兩

麥門冬去心

兩

貝母四兩

杏仁四兩

半夏四兩

半夏攪攪四兩

右五味切片。水熬去渣取汁。五碗入白粉葛末四兩。蜜一斤。共前汁入罈內。重湯煮六日。成膏取出。每日無時頻服之。

○一人時唾痰涎。內熱作渴。肢體倦怠。勞而足熱。用清氣化痰益甚。余曰。此腎水泛。而爲痰。法當補腎。不信。另進痰丸。一服。吐瀉不止。飲食不入。頭暈眼閉。始信。余用六君子湯。數劑。胃氣漸復。却用六味丸。月餘。諸症悉愈。

○一人咳嗽氣喘。轉寒流涕。余用參蘇飲。一劑。以散寒邪。更用補中益氣。以實。藤理而愈。後因勞怒。仍作。自用前飲。益甚。加黃連枳實。腹脹不食。小使短少。二陳四苓。前症愈劇。小使不通。余曰。腹脹不食。脾胃虛也。小使短少。肺腎虛也。悉因攻伐所致。按以六君子。加黃芪炮薑五味。二劑。諸症頓退。再用補中益氣。加炮薑五味。數劑。全愈。

○一治咳嗽秘方

款冬花三錢 石羔三錢 礪砂七厘 甘草三錢

右爲末吹入喉內用細茶漱下即好。

喘而急

脈滑而手足溫者生脈沉瀉而四肢寒者死數者亦死爲其形損故也。肺受邪則喘手太陰肺專主外感無汗而喘屬表實有汗而喘屬表虛凡久喘未發扶正氣爲要已發攻邪爲主太糜喘急甚者不可使用苦寒水氣盛故也。

○一論外邪在表無汗而喘者。

五虎湯

麻黃三錢 杏仁去皮尖三錢 石膏五錢 甘草一錢 細茶一撮

有痰加二陳湯

右剉一劑生薑蔥木煎熱服加桑白皮一錢尤良。

○一論在裏邪實不便脉實而喘者

三乙承氣湯

大黃

芒硝

厚朴

枳實

甘草

加木香

檳榔

右劉生薑三片水煎熱服

○一論痰盛而喘者此治痰喘不能卧入扶而坐數日一服而安用

干縉導痰湯

南星一錢

半夏

七箇火炮破皮分四片

赤茯苓

枳殼

麩炒各一錢

皂角

一寸炙甘草一寸炙

右劉生薑一握大木煎服

○一論七情鬱結上氣而喘者用

四磨湯

人參

檳榔

沉香

烏朮

右四味各用和磨汁合下處溫服之。

三子湯 治氣喘如神

蘇子

白芥子

蘿蔔子

水煎服立已

○一論腹脹氣喘坐卧不得者宜服

沉香散

沉香二錢半 木香二錢半 枳殼炒三錢

蘿蔔子三錢

右剉一劑生薑三片水煎溫服

○一論喘急因內傷元氣氣不接續而喘者宜用

補中益氣湯方見內傷

○一論陰虛火動火炎上攻而喘者宜此

清離滋坎湯方見勞瘵一用六味丸加黃柏知母亦效

○一論虛陽上攻氣不升降上感下虛痰涎壅盛喘促短氣咳嗽而喘

蘇子降氣湯

蘇子 五錢

陳皮

厚朴 姜汁炒前胡

肉桂 各二錢

半夏 五錢

當歸 三錢

甘草 一錢

右劉薑棗煎服。

○一論老人痰嗽氣喘宜服。

三子養親湯。

白芥子 研八分

蘿蔔子 研八分

蘇子 研八分

南星 水炮八分

半夏 水炮八分

陳皮 去白六分

枳實 炒六分

片苓 去朽八分

赤茯苓 去皮八分

甘草 二分

右劉一劑。生薑三片。水煎溫服。

○一入體肥善飲。仲秋痰喘。用二陳。苓連。益甚。加桑皮杏仁。盜汗氣促。加

貝母。枳殼。不時發熱。予以爲脾肺虛寒。用八味丸。以補土母。補中益氣

湯。接補中氣。八味丸。見補益。

哮喘

肝大抵脈浮而滑易治微細而澹難治

夫孝孔以聲響名喉中如水雞聲者是也專主於痰宜用吐法亦有虛而不可吐者治之有以紫金丹導痰小胃丹劫之而愈者有以六味地黃九補中益氣湯兼而進之而愈者必須量虛實而治之也

千金定喘湯 治哮喘如神

麻黃 三錢

桑白皮

杏仁 一錢

蘇子 二錢

白果

炒二十箇

款冬花 三錢

黃芩 一錢

分炒

半夏 五錢

甘草 一錢

水煎服

右剉白水煮食遠服

諸病原來有藥方

惟愁喘最難當

麻黃桑杏蘇子

白果冬花更又良

甘草黃芩同半夏

水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥

服後方知定喘湯

一論人素有喘急遇寒暄不常發則不已哮喘夜不得睡者用此

蘇沉九寶湯

壽世保元

百集三卷

紫蘇

陳皮

薄荷

麻黃

杏仁

去皮

桑白皮

大伏皮

官桂

甘草

右判用生薑三片烏梅一箇水二碗煎至八分食後服即效且佳服惟慎勞碌戒厚味節慾日間常服此順氣化痰九夜臥時服抑火潤下九如除根須修合六味地黃九加黃柏知母人參紫苑五味子百合各二兩浮小麥粉炒蜜四兩打糊爲丸每服百丸空心柿餅湯送下餅隨食之

二母九

治哮喘

知母

去皮

貝母

去心

百藥煎

一兩

右爲細末將烏梅肉蒸熟搗爛爲丸如梧子大每服三十丸臨臥或食

後連皮薑湯送下

○一論喘氣哮喘上喘不休或是鹽戩水絨肺癆俗謂之喘氣病用此

秘方

小商草一把用猪粉肉四兩入水同炊令熟食肉并湯並其草于
月生七八月有四肢莖葉尖秒有花子

○一論九遇天氣欲作雨者便發筋喘甚至平卧不得飲食不進此乃肺
竅中積有冷痰乘天陰寒氣從背且鼻而入則肺脹作聲此病有至
終身者亦有子母相傳者每發即服不過七八次覺痰腥臭吐出白色
是絕其根也用此方

紫金丹

白砒一錢
生用

枯白礬三錢
另研

淡豆豉

出江蘇者一兩水煎去其渣
研如泥

右揀作丸如葶豆大但覺拳揆用冷茶送下七丸甚者九九以不醒為
愈再不必多增丸數慎之小兒服二九

道痰小胃丹方見痰飲治哮喘經年不愈宜久久服之斷根

○一論哮喘氣急而不得息者宜用

均氣八仙湯

麻黃二錢

杏仁三錢

石膏三錢

桔梗一錢

片苓二錢

知母二錢

貝母

二錢用共研并三分煎海排等二分

生甘草一錢

右剉一劑水煎溫服。

○一治上氣喘急經年咳嗽胸膈久不愈遇發即服服三五次永不復發

奪命丹

人詳一錢

白礬二錢

白附子三錢

南星四錢

半夏五錢

右先用人言過白礬一處於石器內火烘紅出火黃色爲度切不可犯

鐵器却和半夏南星白附爲末生薑汁煮凝糊爲丸黍米大朱砂爲衣

每服七丸小兒三丸非化水下忌食熱物

孝乳靈秘丹

方上異人傳。

膽南星

二兩

大半夏

二兩用白礬五錢

牙皂五錢

赤茯苓

二兩

苦葶藶

二兩

大貝母

二兩

沉香

一兩

青蒙石

二錢

珍珠

三錢豆

羚羊角

一支

烏犀角

二錢

白礬

二兩

研末

烏犀角

一支

烏犀角

二錢

白礬

二兩

研砂

風化硝

五錢

花蕊石

五錢

孩兒茶

五錢

款冬花

一兩

鈴白霜

五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子六每服二三十九臨臥淡薑湯下外製六

味地黄丸空心服百發百中真仙方也。

○一治素患哮喘之疾發則喘急痰嗽上壅不時舉發令頑勞役成百傷

筋慾早服六味丸加黃栢知母人參紫苑五味百合各二兩浮小麥粉

蜜四兩打糊爲丸每服百九空心柿餅湯下餓隨食之夜以時服後另

各一料而愈

千金定乳丸

南星

各四兩

半夏

各四兩用生薑牙皂各二兩煎湯浸星半日切乾

貝母

各四兩

枳實

各四兩炒白礬二兩入湯同煎是半發均至湯乾去其湯

白附子

天麻

殭蠶炒

桔梗

瓜蒌仁各二兩

錦紋大黃

酒拌九蒸九晒一晒

青蒙石

用砂炒如金

沉香

五錢

右爲細末竹瀝薑汁和爲丸如彈子大每服一九臨臥口噙化下或丸

如黍米大盞湯下亦可

○一人嗜乳十數年發則上氣喘促咳嗽吐痰自汗四肢厥冷六脉沉細此氣虛脾弱。

黃芪

蜜水炒

人參

白朮

去蘆

白茯苓

去皮半夏姜炒

杏仁

去皮

五味子

麥門冬

去心

天門冬

去心陳皮

甘草

右剉薑棗煎服

○一人自幼患哮喘之症每遇寒即發發則上氣喘急咳嗽痰涎上壅年久不瘥已成痼疾百藥罔効予與此方一料全愈

清上補下丸

懷生地黃

砂鍋內酒拌

石棗

酒蒸去核

懷山藥

二兩

白茯苓

去皮一兩五錢

牡丹皮

一兩五錢

澤瀉

一兩五錢

遼五味子

一兩五錢

天門冬

去心一兩五錢

麥門冬

去心一兩

枳實

炒一兩五錢

貝母

一兩五錢

桔梗

去蘆一兩五錢

黃連薑炒一兩五錢

杏仁去皮一兩五錢

半夏薑炒一兩五錢

瓜蒌仁去油一兩五錢

甘草五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三錢空心淡薑湯下。

瘧疾

脈弦數滑實皆順沉細虛微爲逆。瘧脈自弦微則爲虛代散則死。

瘧症皆因先傷於暑次感於風客於榮衛之間發理不密復遇風寒閉而

不出合於腸胃之外與榮衛並行晝行於陽夜行於陰並則瘧作寒則

病止併於陽則熱併於陰則寒淺則日作深則間在氣則晝在血則

晏穠本經曰瘧脈自弦弦數者多熱弦遲者多寒弦短者傷食弦滑者

多痰弦而緊者宜下浮大者宜吐弦死者宜溫此治瘧之大法其治法

多寒少心煩少睡者屬心名曰瘋瘧用茱萸湯但寒少熱腹脹足少者

屬腎名曰寒瘧用桂附二陳湯先寒而後大熱咳嗽者屬肺名曰癘瘧

用參蘇飲熱長寒短筋脈揪縮者屬非名曰風瘧用小柴胡湯加烏藥香附寒熱相停嘔吐痰沫者屬脾名曰食瘧用清脾飲瘧愈後發熱兩虛弱遺咳嗽不盡保養遂成勞瘵若能清心養體節食適風加此調治無不愈矣。

一論瘧疾無汗要有汗散邪為主。大凡瘧疾初起宜服此發散出汗立愈。用此方。

散邪湯

川芎

白芷

麻黃

白芍

防風

荆芥

紫蘇

羌活

甘草

右劉生薑三片葱白三根水煎露一宿次早溫服。有痰加陳皮。有濕加蒼朮。夾食加香附。

一論瘧疾有汗莫無汗正氣為主宜用

正氣湯

柴胡

前胡

川芎

白芷

半夏

麥門冬

檳榔

草果

青皮

茯苓

桂枝

甘草

右劉蕡藥煎預先熱服。

○一論瘧疾不論先寒後熱先熱後寒諸瘧通用。
清脾飲

青皮

去穢

厚朴

薑炒

白朮

去蘆

半夏

薑炒

柴胡

黃芩

茯苓

草果

甘草

右劉生薑五片。水煎溫服。

○一論諸瘧寒熱交作陰陽不分口乾發渴小便赤澀或作吐瀉用。
加減柴苓湯

柴胡

黃芩

半夏

薑製

猪苓

澤瀉

蒼朮

米泔浸

青皮

厚朴

薑炒

檳榔

草果

烏梅

甘草

右劉蕡藥煎服。

○一論五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝結聚凝飲阻滯氣相搏發為癘疾并治諸癘

四獸飲

人參

白朮

去蘆

白茯苓

去皮橘紅

半夏

姜製

草果仁

烏梅

去核

甘草

生薑

棗子

各等分

右剉以鹽少許淹食頃用厚皮袋包裹以水濕之慢火炮令香熟焙乾每服一兩水一碗煎半碗溫服未發前連進數服神效

○一論人平素不足兼以勞役內傷挾感寒暑以致癘疾寒熱交作肢體倦怠乏力少氣或癘發經年不愈則氣血皆虛癘邪深入名曰癘癘此方主之

加味補中益氣湯

黃芪

蜜炒

人參

八分

白朮

去蘆

陳皮

六分

當歸

八分

柴胡

一錢

升麻

分

白芍

八分

黃芩

一錢

半夏

八分

甘草 五分

右剉薑棗煎空心服。○有汗加桂枝五分。倍黃芪。○熱盛倍柴苓。○渴加麥門冬天花粉。

○一治傷暑發癘宜服。

香茹散

香茹 四錢 厚朴 薑炒 扁豆 各一錢 烏梅 一箇

右水煎，離熟入薑汁一匙，溫服。

○一論熱瘧火盛舌卷焦黑，鼻如烟色，六脈洪弦而緊，此乃陽毒而深，先以青布摺疊數重，新汲水漬之，搭于胸上，須臾再易如此，三次熱勢稍退，即服此藥。

龍虎湯

柴胡 一錢 五分

黃芩 一錢

半夏 七分

石膏 二錢 五分

知母 一錢

黃連 一錢 五分

黃柏 一錢

梔子 八分

粳米 五十粒

右劉尊藥煎服。

○一治瘧瘧太熱煩燥宜用

地龍飲子。

生地龍 三條研入 生薑汁薄荷汁生蜜各少許新汲水調和服如熱

加龍腦少許。

○一治虛弱之人患瘧初起感寒者宜

五積散依本方用薑葱煎服。方見中寒。

○一論體虛之人患瘧寒多久不愈者不可用截藥宜用

分利順元散。

川烏

一兩去皮 半生半熟 附子

一兩去皮 半生半熟 南星

木香

五錢 不

右劉每服四錢生薑十片棗七枚水一盞煎七分當發早晨速進二三

服半生半熟能分解陰陽也。

○一論諸瘧不問先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日并發或間

日一發。頭疼惡心煩渴引飲。氣息喘急。口苦咽乾。諸藥不效者。宜服此
截之。

常山飲子

常山 二錢

草果 不去皮 二錢

良薑 一錢 五分

烏梅 一錢 五分

甘草 炙 一錢

右剉一兩。一劑棗五枚。未發時前連進二服。

○一論瘧疾夜發者。乃陰經有邪。此散血中之風寒也。宜此。

麻黃桂枝湯

麻黃 一兩 去節

桂枝 二錢

黃芩 五錢

枳實 一錢 去皮

甘草 炙 三錢 十分

右剉水煎服。桃仁散血緩肝之藥。

○久瘧腹中有癰。用冰磨沉香。下雄黃解毒丸。打下黑血如泥。極臭。是其

驗也。方見通治。

○一海外高僧傳于周少峰治瘧疾。不問新久。虛實寒熱。諸般鬼疰邪症。

瘰癧瘡。一服立愈。其効如神。

番木鱉

即馬錢子去殼。炒至黑色。一兩。

雄黃一錢

朱砂一錢

甘草一錢

右共爲細末。每服四分。其瘡將發。預先吃飯一碗。將藥水酒調服。被蓋

臥睡。即愈。

○一治瘡先寒後熱。熱多寒少。或單熱不寒者。

桂枝五錢

石膏五錢

知母五錢

黃芩一兩

右剉水煎服。

○一治瘡疾服藥寒熱轉大者。知太陽陽明少陽三陽合病也。

小柴胡湯加石膏知母桂枝水煎服。

○一治久瘡不能食。胸中鬱鬱欲吐而不吐。以此吐之。

雄黃

甜瓜蒂

赤小豆

各等分

右爲末。每服五分。溫水調下。以吐爲度。

○一論久瘡結成癰癧。癰在胸脇之間。諸藥不愈者。宜

痰癧飲

蒼朮醋洗

草果去皮

桔梗

青皮

陳皮

良薑各五錢

白芷

白茯苓

半夏湯泡
姜炒

枳殼熨炒

桂心

乾薑炮

蘇葉

川芎各二錢

甘草炙三錢

右每服一兩水煎入鹽少許空心服

○一治久瘧腹中痞塊用

阿魏丸

驚甲醋炙

三棱醋浸

莪朮醋浸

香附子未泔浸各

陳皮一兩

真阿魏五錢

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服三十九丸淡薑湯送下

○一論瘧疾一月一發或二日一發或三五日一發或經三兩月或半年

一載或誤用止截太過久不能愈者此元氣脾胃大虛以

補中益氣湯方見內傷依本方加常山檳榔知母貝母一二劑立已愈後

去四味只用本方調理多服自然正氣盛則邪氣自退矣

○一論患瘧寒熱用止截之劑反發熱惡寒飲食少思神思昏倦脉或浮洪或微細此陽氣虛寒以

補中益氣湯方見內傷依本方參芪歸朮各用二錢甘草一錢五分加炒

乾薑炮附子各一錢一劑寒熱止數劑元氣復

○一論經年久瘧氣血俱虛而三日五日一發者以

十全大補湯方見補益依本方益邪氣在陽分淺而易治邪氣在陰分深而難治宜多服為良

○一治三年久瘧不瘥用棟參乾生薑各五錢酒調服汗出立止

○一凡瘥後形體骨立發熱惡寒食少體虛補中益氣內參芪歸朮各加三錢甘草一錢五分炮薑二錢一劑而寒熱止數劑而元氣復

○一婦人瘥久不已發後口乾倦甚用七味白朮散加麥門五味作大劑煎與恣飲再發稍可乃用補中益氣加茯苓半夏十餘劑而愈凡瘥

余常以參朮各一兩生薑四兩櫻桃煎服即止或以太極丸中益氣加煨薑尤効生薑下味亦効。

○一凡久瘧多屬元氣虛寒益氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火下流則寒熱交作或吐涎不食戰慄泄瀉手足厥冷皆脾虛弱宜益氣湯諸症悉愈若手足厥冷加大附子。

○一婦人久患瘧瘵作則經不行形虛脉大頭痛懶食太便泄瀉小便淋瀝口乾唇裂內熱腹脹益由久瘧正氣已虛陰火獨旺以益氣湯治之尋愈惟不時頭痛加蔓荊子而止又兼六味丸而經行。

痢疾

脉宜微小不宜浮洪宜滑大不宜弦急身寒則生身熱則死。

痢者古之滯下是也多由感受風寒暑濕之氣及飲食不節有傷脾胃積滯結而成也其在大便窘迫裏急後重數至固而不能使腸中疼痛。

所下或白或赤或赤白相雜或下鮮血或如豆汁或如魚腦膿血相雜或如屋漏水此為感之有輕重積之有淺深也其濕熱積滯于血分則赤于於氣分則白赤白兼下氣血俱受邪也雖有赤白二色終無寒熱之分通作濕熱治之但分新久更量元氣用藥生痢初患元氣未虛必須下之下後去食隨症調之痢稍久者不可下胃虛故也痢多屬熱亦有虛與寒者虛者宜補寒者宜溫年老及虛弱人不宜下太便了而不了者血虛也致至固而不便者氣虛也○丹溪曰痢赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來

下痢不治症

下如腐爛斗生斗死

下若屋漏水者必亡

下若糜爛色者必死

下純黑者死

下如竹筒直出者死

下純紅者難治

身熱脈大者死是亦太槩言之耳小使絕不通為胃絕

續因將軍丸

治痢之總司也

錦紋好大黃一斤切薄片分作四處聽用。

一分用川黃連去毛一兩剉片水浸汁拌大黃同炒乾為度。

一分用吳茱萸去梗一兩用水泡出汁拌大黃同炒乾為度。

一分用人乳汁浸拌大黃同炒乾為度。

一分用童便浸大黃炒乾為度。

右四分共合一處為細末酒打米糊為丸如梧子大將一半子蒸一兩將一半晒乾各包聽用。

如白痢用吳茱萸煎湯送下三十九半生半熟。

如赤痢用黃連煎湯送下三十九半生半熟。

如赤白痢用吳茱萸黃連煎湯送下三十九半生半熟。

○一論赤白痢疾初起積滯不行裏急後重頻登圜而去少腹痛等症宜先用此下之。

香道化滯湯

當歸尾一錢

白芍一錢
生用

黃連一錢
去毛

黃芩一錢
去穢

黃柏一錢
去灰

枳殼五錢
去穢炒一

檳榔一錢

大黃三錢
虛滑石二錢

甘草二分

木香一錢

右劉水煎空心熱服

○一論下痢白多不拘新久或用前藥下後未愈者用此和之。

白木和中湯

當歸酒洗

白芍炒上

白朮去蘆
炒上

白茯苓去皮
陳皮中

黃芩炒中

黃連炒有紅
甘草下

木香少許

右劉水煎食前服

○一論下痢紅多不拘新久或用前藥下後未愈者用此調之。

當歸調血湯

當歸一錢
五分

川芎一錢

白芍三錢

黃連一錢

黃芩一錢

桃仁一錢
五分

升麻五分

右劉下痢水的望心服。○如白痢加吳茱萸炒下錢茶連用酒炒。○赤痢加白木茯苓陳皮香附各下錢。

○一治赤痢血痢痛不可忍。又治孤疔其效如神。病雖垂殆下服即愈。逐瘀湯

阿膠炒

枳殼炒 茯苓

茯神

白芷

川芎

赤芍

生地黃 莪朮

木通

五靈脂炒 薑

生甘草

各二錢 桃仁去皮 大黃各一錢

右劉一劑水一鍾半入蜜三匙再煎服。

○一治素有積熱下痢白膿腹痛膨脹晝夜無度漸至大便閉結小便不通。此三焦有積熱也服此即愈或下痢純紅或赤白相雜皆效。

清臘解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子

大黃

倍用

連翹

滑石

木通

車前子

海金沙

枳實

莪朮

右剉水煎，空心服。

○一治脾疴泄瀉痢疾，屬氣虛宜此。
加味六君子湯。

又參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮 黃芪 各一錢 懷山藥 二錢

砂仁 研一錢 甘草 五分

右剉，下劑棗三枚，水煎，空心溫服。○如腹痛，加炒黑乾薑、木香各五分。
烏梅一箇。

○一論下痢赤白膿血相雜，腹痛裏急，後重晝夜無度，日久不愈，不能起床，不思飲食，疲倦之甚，或服寒涼峻利之過者，宜

加減補中益氣湯。方見內傷。依本方去柴胡，加白芍、炒澤瀉、木香、砂仁、白豆蔻、地榆、御米殼、醋炒三分。

○一論曾經服推滌藥過，及又服攻擊殺伐等，他醫而不效者，以代形氣極弱，去無休息，精色愿候出者，並與抄之。

養臟復元湯

人參三錢

白朮

去蘆炒五分

白茯苓去皮一錢

白豆蔻

去壳研一錢

乾薑炒黑一錢

粟殼

去子蜜水炒二錢

製附子五分

烏梅三箇

木香一錢

甘草

炒五分

右剉一劑北棗三枚水煎空心溫服相再煎服謹節飲食

一論噤口痢其症有冷有熱有冷熱不調皆須先發散表裏如手心熱

目赤是熱宜敗毒散加陳米煎服如手心冷及純下白痢者是寒宜用

蓮肉不去心為末用米飲調服三錢敗毒散方見感冒又治痢疾

熱合境皆然者補效加白芍黃連尤効

一治虛弱人噤口痢飲食不下

參苓白朮散方見內傷依本方加石蓮肉石菖蒲各一兩或有氣滯

木香五錢

右共為末每服二錢棗湯調下噤口痢梗米湯下休息痢砂糖湯下

○一治下痢噤口諸藥不效者以

醇酒半盞，薑汁半盞，含米湯半盞，三味合一處入陳乾松葉一握，搗爛，一并食之，胃口立開，如口不開，用鐵筋撥開牙齒，灌下立已。

○一治噤口藥食俱不受用

田螺數枚，連殼搗爛，入麝少許，調勻，填滿臍內，引熱下降，服藥再不吐矣。

○一治噤口痢食不下

老蒼米炒香熟，爲末，淮塩火煨，每米粉三四匙，塩少許，白滾水下。

○一治下痢噤口點眼方 黃窮江傳

用首胎黃，炙乾，每一錢，加雄黃五分，胡黃連四分，片腦少許，共爲細末，羅過點兩眼角。

○一治下痢噤口 傳明岐傳

用首胎黃，磁器收入水銀，養佳，入麝少許，點兩眼角，即能食。

○一治下痢禁口，胡養恒傳

用雞丁隻去毛，葱切片入罐內，用胡椒末五錢，入水同炊，用炭焙重，重密封，待熟用，替子刺孔，冷患人鼻，聞孔之氣，立時思食。

○一治下痢禁口，飲食不下，多是胃口熱甚。

川黃連三錢，人參一錢，五分，甘草五分，一方加石蓮肉各一錢。

右用米煎，終日呷之，如吐，再強飲，但得一呷，下痢便好。

又方以秤槌燒紅，用好醋淋，冷病人，開口，吸氣吞之，即效。

○一治痢疾發，益元散，用人參白朮煎湯，調下，頻服，自止。

○一治久痢休息，不止，百方不效，用黃連末，木香末，十分之一，豬腦頭去油，入藥水，煮爛，搗為丸，如梧子大，每服五十九，空心米湯下。

○一人年老，久痢不止，肌瘦如柴，晝夜苦楚，命已垂危，用人參二兩，水煎服之，鼻有微汗而甦，後用十全大補湯調理而安。

○一人下痢，小腹急痛，大便欲去不去，此脾胃氣虛而下陷也，用補中益

氣送八味丸二劑而愈。此等症候因利藥致損元氣，肢體腫脹而死，皆不可救藥。

○一人停食，患痢，腹痛下墜，或用疎導之劑，兩足腫脹，食少體倦，煩熱作渴，脈洪數按之微細，予以六君子加薑桂各一錢，吳茱萸五味各一錢，煎熱冷服之，即睡，覺而諸症退，再劑全安。此假熱而治以假寒也。

○一人嘔吐不食，腹痛後重，自用大黃等藥，一劑腹痛益甚，自汗發熱，昏憤，脈大子用參朮各一兩，炙甘草炮乾薑各三錢，升麻一錢，水煎，一服而甦，又用補中益氣湯加炮乾薑二劑而愈。

○一人痢後兩足浮腫，胸腹脹滿，小便短少，用分利之劑，遍身腫脹，氣喘，予曰：兩足浮腫，脾氣下陷也。胸腹脹滿，脾虛作痞也。小便短少，脾不能生腎也。身腫氣喘，脾不能生肺也。用補中益氣湯加大附子，而愈。後因飲食勞倦，兩足浮腫，小便短少，仍服前藥，頓愈。

○一人下血，服犀角地黃湯等藥，其血愈多，形體消瘦，發熱少食，喜妄，後

重此脾氣下陷，余用補中益氣，加炮薑、丁剝而愈。

○一人血痢及下血不止，以六味丸加地榆、阿膠、炒黃連、黃芩、生地、芍藥。
○一人患痢後重，自知醫用芍藥湯，後重益甚，飲食少，患肢寒，肢冷，予以
為脾胃虧損，用六君子湯加木香、炮薑、丁剝愈。

泄瀉

脉多沉傷於風，則浮。傷於寒，則沉細。傷於暑，則沉微。傷於濕，則沉緩。泄而
腹脹，脉弦者死。反云脉緩時微小者生。浮大數者死。

夫泄瀉屬濕，屬氣虛，有火，有痰，有食積，有寒，有脾泄，有腎泄。凡瀉，水腹不
痛者，濕也。飲食入胃，不往完穀不化者，氣虛也。腹脹瀉者，如熱瀉，痛下
陣瀉，一陣者，火也。或瀉或不瀉，或多或少，或少者，痰也。腹痛甚，而瀉瀉，後
痛減者，食積也。肚腹痛，四肢冷者，寒也。常常泄瀉者，脾泄也。五更泄，在
腎泄也。宜分別而治也。木槩泄瀉，因濕傷其脾者，居多。以胃苓湯加瀝

主之。

○一論中暑傷濕停飲夾食脾胃不和腹痛泄瀉作渴小便不利水穀不化陰陽不分者瀉也。

胃苓湯 主方

蒼朮 米泔浸厚朴薑汁炒陳皮

猪苓

澤瀉各一錢

白朮去鹽炒白茯苓一錢五分白芍炒一錢肉桂

甘草各三分

右剉丁劑生薑三片棗二枚水煎溫服○泄瀉稍久加升麻防風○有熱者加酒炒黃連○有寒者加炒乾薑○暴泄水瀉加滑石○食積加山楂神麩○有痰加半夏烏梅○氣虛加入參白朮○氣滯加木香○久瀉加乾薑肉蔻○暴痢赤白相雜腹痛裏急後重去桂加檳榔木香黃連水煎服

○一論泄瀉飲食入胃不化完穀不化者氣虛也。

益氣健脾湯

人參

白朮

去蘆
土炒

白茯苓

去皮

陳皮

白芍

炒

蒼朮

米泔浸

乾薑

炒黑

柯子

煨

肉寇

煨

升麻

酒洗

甘草

炙

右剉薑棗煎服。○腹痛加桂。忌油膩。

○一論泄瀉腹痛瀉水如熱湯痛一陣瀉一陣者火也宜

加味四苓散

白朮

去蘆

白茯苓

去猪苓

澤瀉

木通

梔子

黃芩

白芍

甘草

右剉燈心十莖水煎空心服。

○一論泄瀉或多或少或瀉或不瀉者痰也宜

加味二陳湯

陳皮

半夏

炒

白茯苓

去皮

白朮

去蘆

蒼朮

米泔

厚朴

姜汁

砂仁

山藥

炒

車前子

木通

甘草

炙

各

等分

右劉一劑生薑三片烏梅一箇燈心十莖水煎溫服。

○一論泄瀉腹痛甚而泄瀉瀉後痛減者食積也用。

香砂平胃散

蒼朮

水泔洗

陳皮

厚朴

姜炒

白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮

半夏

姜炒

砂仁

香附

神麴

炒

白芍

炒

甘草

炙

右劉生薑煎服。

○一論劉草窓痛瀉要方。傷食腹痛得瀉便減。今瀉而痛不止。故青芍入土

敗木賊也。

白朮

炒三錢

白芍

炒一錢

陳皮

炒五分

防風

一錢

右剉水煎溫服。

○一論泄瀉肚腹疼痛四肢厥冷者寒也宜。

附子理中湯

白朮

去蘆炒

乾薑

炒

人參

白茯苓

去皮

砂仁

厚朴

姜炒

炒

蒼朮

米泔炒熟附子

甘草

右剉生薑水煎服。

○一論泄瀉氣弱易飽常常稀瀉者此脾泄也用。

扶脾散。

蓮肉

去心不去皮一兩半

陳皮

一兩

白茯苓

一兩

白朮

陳壁土炒三兩

麥芽

炒五錢

右爲細末每服二錢白砂糖二錢滾白米送下補脾助元氣令人能食

止瀉。

○一論滑瀉日夜無度腸胃虛寒不禁宜服。

八柱散。

人參

白朮

去蘆土炒

肉蔻

煨

乾薑

炒

柯子

煨

大附子

麩裹煨去皮麻

梁殼

蜜水炒

甘草

炙各等分

右剉一劑薑一片烏梅一箇燈心一團水煎瀉服。

補脾丸 症治同前。

白朮

去蘆十兩分四分一肉桂二小荷三枚

蓮肉

去心炒人參各一兩甘草炙

白芍

炒各

木香

煨日袋

山藥

陳皮

各七錢

乾薑炒三錢

右爲細末，煮粥，加炒神麩，未打糊爲丸。如梧桐子大，每服百丸，空心淡薑湯下，專治老人弱人脾泄，殄泄，殊中。

○一論泄瀉，脾腎虛弱，使晨五更作瀉，或全不思食，或食而不化，大便不實者，此腎泄也。凡飯後隨即太便者，蓋脾腎交濟，所以有水穀之分，脾氣雖強，而腎氣不足，故飲食下咽而太腑爲之，餐泄也。治法用二神丸。

二神丸

破故布

四兩炒肉豆蔻

二兩生用

右爲末，用大紅棗四十九箇，生薑四兩，切碎，同棗用米煮熟，去薑，取棗肉，和爲丸，如梧子大，每服五十九丸，空心鹽湯下，加吳茱萸泡炒一百五

味子二斤名四神丸治經年久瀉不止者神効

○一人善飲便滑瀉澁食減胸滿腿足漸腫症屬脾胃虛寒以金匱腎氣丸食進腫消更用八味丸胃強脾健而愈

○一人病瀉每至五更輟即利此腎泄也用五味子散數服而愈因起居不慎泄復作年餘不瘥此命門火虛不能生脾土法當補其母火者土之母也遂用八味丸補其母瀉即止食漸進東垣云脾胃之氣虛則能食而肥虛則不能食而瘦全賴命門火為生化之源滋養之根也故用八味丸委効只用六味丸亦可

○一論太便滑利小便閉澀或肢體漸腫喘嗽唾痰為脾腎氣血俱虛十全大補湯方見補益選卡四神丸

○一論腎虛久瀉不止用六味地黃丸加五味子破故昏肉豆蔻紫菜煎方見補益

○一論久瀉多由及用消食利水之劑損其真陰元氣不能自持遂成久瀉

若非補中益氣湯四神丸滋其本源後必腸痞腹脹小便淋瀝多致不起。

○下人患泄瀉日久不止以致元氣下陷飲食入胃不化定殺不化肌肉消削肢體沉困面自兩足腫滿上氣喘急此元氣脾胃虛之甚也宜補中益氣湯方見內傷依本方減當歸加酒芍茯苓澤瀉山藥蓮肉木香乾薑炒黑止泄瀉之良方也。

○一泄瀉因內傷勞倦飲食化運作瀉及脾胃素蘊濕熱但遇飲食勞倦即發而肢體酸軟沉困泄瀉者以益氣湯去當歸加炒芍茯苓木香澤瀉薑棗煎服。

按右諸方治泄瀉有濕瀉有氣虛瀉有火瀉有痰瀉有食積瀉有脾敗木賊瀉有寒瀉有脾瀉有脾腎瀉有元氣下脫瀉有腎瀉有虛寒滑脫久瀉不止者宜依病對方而用也。

○下人食下即響響而即瀉不敢食一匙為食之即瀉諸藥不效以生紅柿

枚。以水濕灰火煨熟食之。不三四箇即止。

○秘方治泄瀉

用雞子一箇將小頭破開。入胡椒七粒。搗糊。頂煨熟。好酒送下。燒酒更妙。將胡椒完吞下。

○一泄瀉二三日。或腹疼痛。生薑豆豉胡椒煎湯熱服立止。

○一治暴泄不止。小便不通。車前子炒爲末。每服二錢。米飲調下。其根葉亦可搗汁服。此藥利水道而不動元氣。

○一治泄瀉。用豬豬肚一枚。淨洗去脂膜。入大蒜在內。以米蕒爛搗碎。入蒼朮泔製。陳皮厚朴薑炒。甘草炙等分。爲末。同柱爲丸。如梧桐子大。每服三五十九。空心米湯下。薑湯亦可。

○一治許州黃太守患泄瀉二十三年。不愈。每飲燒酒三鍾。則止。二十三日以爲常。畏藥不治。召余診之。六脉弦數。先服此藥。以解酒毒。後服理氣健脾丸。加澤瀉。而愈。方見傷食門。

宜黃連一兩生薑四兩

右爲三處以慢火炒令薑乾脆色去薑取連搗末每服二錢空心麩茶清下甚者不過二服專治久患脾洩

○一治大便溏泄米穀不化用

黃連酒炒白芍煨吳茱萸炒各等分

右爲細末用小米飯爲丸如梧子大每服五六十丸空心米湯送下

○一治泄瀉手足冷不渴腹痛用入參白朮乾薑甘草水煎熱服中寒泄者加附子

○一治久瀉太腸滑泄五倍子炒五兩爲末麩糊爲丸如梧子大每服五九米飲下日三服

六味丸 金匱腎氣丸 八味丸 十全大補湯俱見補益

補中益氣湯見內傷

補遺

三白散 治一切泄瀉如神

白朮去蘆炒 白芍五分 白茯苓去皮澤瀉一錢 厚朴姜炒

黃連炒 各一錢 乾薑炒 五分 烏梅肉煎用三錢

如兼傷食加神麩炒麥芽炒各一錢

右剉生薑三片水煎食前服爲末神麩爲丸服尤効

霍亂

明大者生。○脉微弱而遲者死。○脉代者霍亂氣少不語舌捲囊縮者不治。

夫霍亂者推霍變亂也。其證心腹卒痛嘔吐下利發熱增寒頭暈眩或瀉而不吐或吐而不瀉先心痛則先吐先腹痛則先瀉心腹俱痛則吐瀉俱作甚則轉筋頰頓手足厥冷死生反掌間耳治宜霍毒正氣散如生薑爲上不惟可以溫散風邪亦可調理吐瀉蓋有吐瀉名爲霍亂

死者少也。若上不得吐，下不得瀉，名乾霍亂而死者多也。治之急須以
鹽湯灌之，令其大吐。庶有可生者。切莫與穀食，雖米飲一呷入，口即死。
必待吐瀉過，二三時，直至飢甚，方可與稀粥。慢慢調勻，可也。轉筋不住，
男子以手挽其陰，女子以手牽乳，逆兩邊，此千金妙法也。

○一論四時不正之氣，寒疫時氣，山嵐瘴氣，雨濕蒸氣，或中寒腹痛吐瀉，
中暑冒風吐瀉，中濕身重泄瀉，或不服水土，脾胃不和，飲食停滯，復感
外寒，頭痛憎寒，或嘔逆惡心，胸膈痞悶，或發熱無汗者，並治。

霍香正氣散

藿香 二錢

紫蘇

陳皮

厚朴

薑汁炒

半夏 薑汁炒

白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮

桔梗

去蘆

大腹皮

白芷 各一錢

甘草 五分

右剉二劑，生薑棗子煎服。○霍亂轉筋，加木瓜。○腹痛，加白芍。○寒
痛，加官桂。○吐瀉，加乾薑。○飲食不化，心下痞悶，加香附、砂仁。○未發全

化加神曲炒麥芽炒。○肉食不化加山楂。○心下痞加枳實青皮。○中
暑冒風加香茹扁豆。○時氣增寒壯熱加柴胡乾葛。○發熱加麥門冬
淡竹葉。○口渴作瀉小使不利合五苓散。○濕熱相搏霍亂轉筋煩渴
閉亂合黃連香茹散。○心腹絞痛加木香。○若頻欲登圜不通利者加
枳殼。

○一論霍亂之疾未有不由內傷生冷外感風寒而致也。余用藿香正氣
散治之百發百中。一歲之內常治百人未有弗効者。但有熱者須加薑
炒黃連寒甚者加乾薑萬無一失。又腹痛加桂枝痛甚去藿香加吳茱萸
小使不利加茯苓如乾霍亂加枳殼白茯苓官桂最毒。

○一治虛弱之人上吐下瀉霍亂手足厥冷腹痛脈微者乃陰症也。

理中湯

人參

白朮 去蘆炒 乾薑炮

甘草 炙各等分

若為寒氣濕氣所干者加附子一兩名附子理中湯下

若霍亂吐瀉加青皮陳皮名治中湯

若霍亂心腹作痛先以鹽湯頻服候吐出即進此藥

若嘔吐者於浴中湯內加丁香半夏生薑十片

若泄瀉加橘皮茯苓名補中湯

若溏瀉不已於補中湯內加附子一兩

若不喜飲食米穀不化加砂仁附子陳皮茯苓

若霍亂吐下心腹作痛手足厥冷去白朮加附子名回順湯

若傷寒結胸先以枳梗湯再不愈及諸吐利後胸痞欲絕心膈高起急

痛手不可近者加枳實茯苓名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯加天花粉○渴欲飲水加白朮

若霍亂轉筋理中湯加次瀉石膏

若膈上築者腎氣動也去白朮加桂腎益燥去白朮恐作赤脈故加官

桂

若情多加茯苓

若腹滿去白朮加附子

若飲酒過多或啖炙煖熱食發爲鼻衄加川芎

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血氣

○一論轉筋霍亂上吐下瀉腹內疼痛及乾霍亂俗名攪腸沙真陰証乎

足厥冷宜服

理中丸

人參 乾薑炮 白茯苓 去皮甘草 炙各等分

右爲末煉蜜爲丸每重一錢細嚼淡薑湯下忌食米湯此即理中湯改

爲丸取土能塞水之義若仍煎湯則不効矣

○一論乾霍亂者俗名攪腸沙其症因宿食不消心腹攪痛欲吐不吐欲

瀉不瀉揮霍撩亂所傷之物不得出洩故也死在須臾急宜多灌薑湯

探吐之令物出盡却服理中湯或理中丸亦可更刺十井出向井委中

出血

○一霍亂身熱口渴此熱暑中也宜
加減茹苓湯

猪苓

澤瀉

香茹

乾薑各七

赤茯苓一錢

天花粉二錢

白朮去蘆

黃連各五分

甘草三分

右判一劑生薑煎服。如熱極加石膏知母。泄極加升麻滑石。腹痛加炒芍藥五分。桂三分。寒痛亦加此。

○一霍亂吐瀉用生薑細切以新汲水調益元散頓熱服之立止。

○一論霍亂吐瀉因飲冷或冒寒或寒飢或太怒或乘車舟傷動胃氣令人上吐下瀉不止頭暈眼花手足轉筋四肢厥冷用藥遲緩須更不救。

百沸湯

吳茱萸五錢

木瓜五錢

食塩五錢

右三味同炒焦用百沸湯煎隨病人意冷熱服之。

○一方用枯白礬為末每服一錢百沸湯點服

○一治傷食吐瀉腹脹

順逆丹

白朮

去蘆
土炒

白茯苓 去皮 陳皮

川厚朴

去姜炒
破澤瀉各一兩

猪苓 八錢

蒼朮

米泔浸
炒七錢

神麴

炒七錢

麥芽

炒七錢

砂仁

三錢

木香 二錢

甘草

炙五錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每下丸米湯研化下

○一治脾虛氣陷吐瀉煩渴用

參朮散

人參

白朮 炒

白茯苓

去懷山藥

藿香

葛根

升麻

右為細末每服二錢米湯調下

○一論霍亂已愈煩熱多渴小便不利宜

麥門冬湯

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮 陳皮

半夏 姜炒

麥門冬 去心 甘草

小麥

烏梅

右剉生薑五片，水煎溫服。

○一論乾霍亂上不得吐，下不得利，出冷汗，氣欲絕者。

鹽一大把，炒令黃，入童便一碗，溫和服之，少頃吐下即愈。

○一治霍亂吐瀉，心腹作痛。

炒鹽二碗，布包紗護，煎其膠，煎并腹肚上截，以針穿火，氣透則甦，續又以炒鹽熨其背，則十分無事。

○一治霍亂轉筋，用皂角末吹入鼻中，得嚏即愈。

○一霍亂轉筋，用大麥一握，煎湯澀洗，北人以麥糖代之，使腠理開，洩陽氣散，愈也。河間云：熱氣燥燥於筋，則掣而痛也。

○一轉筋入腹欲死者，生薑一兩搗爛，以酒五盞煎服。

一霍亂上吐下瀉 鄧對峰傳

用韭菜搗汁一盞煎湯黃熱服之立止。

○一霍亂吐瀉腹痛藥即吐無法可施

用百沸湯半碗井泉水半碗合而服之即安名陰陽湯極效。

○一霍亂吐瀉。

樟樹皮一把水煎服立止。

○一論霍亂不拘寒暑吐瀉不出腹痛煩燥謂之乾霍亂死傷甚多

病人腿腕橫紋上蘸溫水拍打紫紅脈見以布針或磁石刺破出血即愈。

即愈。

○一治霍亂吐瀉。

藿香梗丁味煎水服立效一方加陳皮尤妙。

嘔吐

脈滑數爲嘔代者霍亂微滑者生滑數凶斷

嘔吐者飲食入胃而復逆出也。有聲無物謂之噦。有物無聲謂之吐。嘔吐謂有聲有物。胃氣有所傷也。中氣不足所致。有外感寒邪者。有內傷飲食者。有氣逆者。三者俱以藿香正氣散加減治之。有胃熱者。清胃保中湯。有胃寒者。附子理中湯。有嘔噦痰涎者。加減二陳湯。有水寒停胃者。茯苓半夏湯。有久病胃虛者。比和飲醫者。宜審而治之也。

藿香正氣散方見霍亂治諸嘔吐照後加減

○一論外感寒邪嘔吐者依前方

○一論內傷飲食嘔吐者依前方加砂仁山查神曲

○一論有亂逆嘔吐者依前方加木香砂仁白豆蔻

○一論胃虛有熱作嘔吐者宜後方

清胃保中湯

藿香一錢

白朮

土炒

陳皮八分

半夏

姜炒

白茯苓

去皮

砂仁 三分

黃連 二錢

黃芩 二錢

梔子 二錢

甘草 二分

加批把葉去穢

右剉丁劑生薑三片長流水和黃泥攪淨清淨二鍾入藥煎至一鍾備冷

服○吐逆甚加茯苓肝一塊○因氣加香附一錢枳實麩炒八分去

白朮○心煩不寐加竹茹○酒傷脾胃加乾葛天花粉白豆蔻各

○一論嘔噦痰涎者

加減二陳湯

陳皮

半夏薑炒

白茯苓去皮

甘草

人參

白朮

竹茹

砂仁

山梔炒

麥門冬去心

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎徐徐溫服不

○一論水寒停胃作嘔吐者

茯苓半夏湯

茯苓去皮

半夏薑炒

陳皮

蒼朮

米泔浸厚朴薑炒各

砂仁五分 藿香八分 乾薑炒三分 烏梅一錢 甘草三分

右到一劑生薑三片水煎徐徐服

○一論陰症嘔吐或手足厥冷腹痛屬虛寒冷甚者附子理中湯方見中
寒門

○一論久病胃虛嘔吐月餘不納水穀聞食即嘔聞藥亦嘔者
比和飲

人參 錢 白朮 一錢 白茯苓 去皮 藿香五分 陳皮 五分

砂仁五分 神麴 錢 甘草 三分 炙

右到一劑用陳倉米一合順流水二鍾煎沸泡伏龍肝研細搗薄漉淨
取一鍾生薑三片棗二枚同煎七分稍冷服別以陳倉米煎湯時啜之
日進藥二三服即止神效

一論卒暴嘔吐虛弱困乏無力及久病人嘔吐飲食不入口即吐者
人參一兩切片水煎徐徐服之立也

○一治胃氣冷吃食即欲吐白豆蔻五錢爲末以好酒下薑緩溫調服日三盞。

○一治冷涎嘔吐陰症乾嘔。

吳茱萸湯

生薑五兩

人參三分

大棗五箇

右剉水煎食前服。

○一治患嘔吐聞藥即嘔百方不効以茯苓爲末水丸寒兩粒打服

對症藥遂不再吐如神。

○一治熱症嘔吐或增寒發熱口苦。

小柴胡湯多加生薑人參須分兩或加烏梅。

○一治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱者是。

竹茹湯

半夏薑汁浸乾葛

青竹茹

甘草生

右剉薑棗煎服或加前胡。

○一治嘔吐屬新者

黃連姜炒 石膏火煨

右爲末，白滾水送下。

○一治熱嘔不止

梔子炒黑 朴硝各等分

右爲末，每服二三匙，白滾水送下。

○一論太腸結燥嘔吐不止，湯藥不入，老人虛人多有此症，幽門不通，上冲穀門，嘔吐泛滿之症，法須先以竅導前通其幽門，然後服藥，蓋人身之氣上下週流，不通必宜其上，如前吐法，是也。上不安必轍其下也。

藿香

厚朴姜炒

陳皮

白朮

去蘆炒 半夏姜製

白茯苓

去殼 砂仁炒 五分 枇杷葉煉法 片

甘草三分

生薑一錢

右坐水煎服。

○一治嘔吐宿滯，脘腹脹甚，手足俱冷，脈微細，用附子理中丸二服，益甚。

○一論陰虛於下，冷入多嘔者，乃諸陽氣浮無所依，從故嘔咳上氣喘，以六味地黃丸用鹽湯送下。

○一嘔吐不食，腹痛後重，自用太黃等藥一劑，腹痛益甚，自汗發熱，情脈大，予用參朮各一兩，炙甘草煨薑各三錢，升麻一錢，水煎服，而愈。又用益氣湯加炮薑二劑而愈。

翻胃

脈浮緩者生，沉濇者死。○脈濇而小，血不足；脈大而弱，氣不足。

夫翻胃之症，其來也未有不由膈噎而始者。膈噎者，喜怒不常，憂思勞役，驚恐無時，七情傷於脾胃，燥而生痰，痰與氣搏，升而不降，飲食不下，血氣留於咽隘，五噎結於胸膈者，為五膈。法當順氣化痰，溫脾養胃，如陽

脈緊而澹者爲難治之症。夫番胃即膈噎。膈噎乃番胃之漸。大法有四。血虛氣虛有痰有熱。血虛者脈必數而無力。氣虛者脈必緩而無力。氣血俱虛者則口中多出沫。但見沫大出者必死。有熱者脈必數而有有力。有痰者脈必滑數。二者可治。血虛者則以四物湯爲主。左手脈無力。氣虛者則以四君子爲主。右手脈無力。糞如羊屎者。斷不可治。大腸無血故也。痰以二陳湯爲主。寸關脈沉或伏。或大有氣結滯。通氣之藥皆可用。寸關脈沉而澹。大不可用。香燥熱劑。宜薄。滋味。又曰。膈噎番胃之疾。得之六淫七情。遂有火熱炎上之作。多升少降。又有外爲陰火上炎。番胃者。作陰火治之。大便必結。用童便竹瀝。韭汁薑汁。牛羊乳。分氣而用。一論膈有十般之病。其實同出於一源。皆因動性不能發洩。則鬱於肝人之膈膜。屬肝木。否則木乘土位。木曰曲直。作酸酸然。酸則能收。其胃腕因之而收。小室碍乃作膈。症宜用此湯。

當歸活血潤膈湯

當歸

酒洗五分

桃仁去皮尖

廣陳皮青色者

川厚朴一錢

黃連

湯炒一錢

大腹皮

甘草湯洗一錢

紅花七分

片白木搗末炒

炙甘草三分

善酒者加葛根七分

右剉子剉水煎濕服。

按五噎名雖有五原其四在於氣弱血枯之人思慮勞慾而成者也。氣弱則運化不開血枯則道路閉澁蓋心生血腎生氣任脈乃陰之根。任則精澆任脈不潤矣任脈循咽嗑胸中胃之三腕一直而下。腎虛則虛田清氣不升故中焦乏順下之化脾雖思味而愛食因升降不運而成噎矣宜絕慾以復精血須節煩志以和心脾用當歸活血潤腸湯去白木加入麥一錢白豆蔻七角黃柏酒炒七分知母七分梔子炒一錢瓜蒌仁炒一錢遠志甘草湯去心八分紅棗三枚水煎服。

○一論膈噎胸中不利大便結燥痰嗽喘滿脾胃壅滯此能推陳致新治膈氣之聖藥也。

人參利膈丸

人參三錢

當歸二錢

藿香五分

厚朴姜汁炒枳實麩炒之酒

大黃酒蒸

木香一錢五分

檳榔五錢五分

甘草炙三錢

右爲末滴水爲丸如梧子大每服五十九溫水下

○一論噎食轉食宜

加減不換金正氣散

蒼朮米泔浸陳皮去白

厚朴姜汁炒藿香

半夏姜汁炒

枳實麩炒白朮去蘆

白茯苓去皮白豆蔻去殼甘草

黃連土炒

右剉生薑三片水煎服

○一論噎膈番胃之症皆由七情之氣太過鬱則生火生痰而致病病則耗氣耗血以致虛氣虛不能運化而生痰血虛不能滋潤而生火或胡食而暮吐或暮食而朝吐或食已即吐者日久不愈候候香燥攻剋之藥

過多以致危殆宜以

補中益氣湯方見內傷

依本方去柴胡升麻加半夏白茯苓白芍

酒炒枳

實麩炒神麩炒黃連薑炒

○一番胃不食脾胃虛弱不進飲食宜

太倉丸

丁香

砂仁

白豆蔻

去壳陳倉米黃土炒米熟
去上不用

右爲細末生薑自然汁爲丸如梧子大每服百丸食後用淡薑湯送下

有怒氣加香附子姜汁炒

○一論五噎者氣鬱勞食思也

氣噎者心悸上下不通噎噦不徹胸膈苦痛

憂噎者天際苦厥逆心忡悸動手足厥冷

勞噎者苦氣隔膈下支滿胸中填塞冷言足逆冷不能自溫

食噎者食無多少胸中苦塞常痛不得喘息

思噎者。心悸動。喜忘。目視恍惚。皆憂患噎然。寒氣上攻胸膈。

五噎丸 治胸中虛寒日久。噎逆逆氣。飲食不下。結氣不消。

人參五分 白朮味薑四分 白茯苓四分 陳皮六分 細辛四分

川椒五分 吳茱萸五分 桂心五分 乾薑五分 炒 大附子洗去皮四分

右爲末。煉蜜爲丸。如梧子大。每三丸酒下。日三次服。

保和丸 治實熱番胃。

陳皮 半夏 薑汁炒 白茯苓 去皮連翹 神麩炒

山查肉 蘿蔔子炒各黃連 薑炒五錢

右爲末。稀米糊爲丸。胭脂爲衣。粟米大。每服六七十丸。人參煎湯入下。

○一論胃反不受。食食已即嘔吐出。

人參二兩 白朮去蘆 半夏湯洗 生薑三兩 白蜜一瓖

右五味。以水五升。和蜜。揚之二三百下。煮取一升半。分三次服之。

○一論反胃嘔吐無常。粥飲入口即吐。困弱無力。至死者。

人參二兩咀片水煎頓服立効再用入參汁煮稀粥與服

○一治番胃用六君子湯加炮薑白朮羌黃連用吳茱萸酒拌過宿炒去

○一治轉食方

反芻雞丁隻黃熟去骨入人參當歸各五錢為末再與取與食之勿令入共食

○一人年過五十得噎証胃脘作痛食不下或食下良久復出大便結燥人黑瘦甚診其脈右關弦滑而洪關後略沉小三部俱沉弦帶孔此中氣不足木來侮土上焦濕熱鬱結痰下焦血少故大便結燥除其上衝吸門故食不下用四物湯以生血四君子湯以補氣二陳湯以祛痰三合劑加薑炒黃連炒枳實枯蘆仁少加砂仁又間服潤腸丸百餘劑全安潤腸丸方見大便秘

○一治番胃

用大附子一個取入者坐於磚上四面着火漸逼浸入生薑自然汁

又依前火逼乾復淫之約生薑汁可盪半碗許搗末每服一錢用
粟米湯下不過三服立效

○一治噎膈大便燥結

橘杏麻仁丸

陳皮為末

杏仁

去皮尖

火麻仁

去壳各

郁李仁

去壳

右三仁俱搗為膏用棗肉和入石臼內杵為丸每服五十九粒實煎湯

送下

飢逆

脈浮而緩者易治弦急而按之不鼓者難治○脈結或促或微皆可治○

脈代者危○

右關脈弦者木乘土位難治

發飢者氣逆上衝而作聲也一名欬逆因氣逆奔急上行作訖發聲有數
者不同不可不辨有胃虛弱熱者宜橘皮竹茹湯有胃虛寒者宜丁香

柿蒂湯有腎氣虛損，陰火上衝者，宜六味地黃丸，有中氣不足，原虛數氣不相續，而發，恍惚宜補中益氣湯，加生脈散，黃柏以降虛火，或少加附子服之，立愈。有陽明肉實，失下而發，恍惚宜六一順氣湯，下之，補滿而飲水，太過成水結胸，而又發，恍惚宜小陷胸湯，或用小青蘆湯，去麻黃，加附子，治水寒相搏，發呃太妙。有傳經傷寒熱症，誤用葶藶等熱藥，助起火邪，發火相搏，而爲呃逆者，宜黃連解毒湯，白虎湯，及竹瀝湯。

○一論，飢逆因吐利後，胃虛膈熱而欬逆者。

橘皮竹茹湯

陳皮去白

人參一錢

甘草炙一錢

竹茹一錢

加柿蒂一錢

丁香五分

右剉，丁香、生薑五片、棗二枚，水煎，溫服。身熱發渴，加柴胡、黃芩，去丁香。

○一論，吐利後，大病後，胃中虛寒，欬逆至七八聲，相連，收氣不回者，難治。

丁香柿蒂湯

人參

白茯苓

陳皮

貝薑

丁香

柿蒂各一錢

甘草

五分

右剉一劑生薑五片水煎服。

○一論欬逆而無脈者用。

人參復脈散

人參

白朮

去蘆

麥門冬

去心

白茯苓

去皮

五味子

陳皮

半夏

姜炒

竹茹

甘草

右剉生薑五片水煎服。

○一論人因飽食後得氣發呃逆連聲不止者宜

順氣消滯湯

陳皮

半夏

姜炒

白茯苓

去皮

丁香

柿蒂

黃連

神麴

炒

香附

白朮

竹茹

甘草

右劉生薑五片水煎服。

○一論腎氣虛損虛火上衝而作欬逆者自膝下上衝直出于口者陰火
上衝難治

六味地黃丸方見補益依本方作湯加柿蒂沉香木香砂仁

○一論中氣不足脈虛微氣不相接續而作欬逆者宜
補中益氣湯方見內傷依本方加麥門五味黃柏酒洗少加熟附子

○一論傷寒陽明內實失下而發呃逆者用

六一順氣湯方見傷寒

○一治傷寒發熱而呃逆者用黃荊子炒不拘多少水煎服。

○一論傷寒發渴而飲水太過成結胸而發呃逆者用

小陷胸湯

黃連二錢 半夏洗 瓜蒌實二錢

右劉生薑三片水煎服。

一論傷寒表症未解，心下有痰氣，乾嘔欬逆，又治受寒喘急，以小青龍湯。

桂枝 乾薑 細辛 半夏 芍藥 五味子

熟附子 甘草

右剉水煎服。

一論傷寒陽証，吐逆潮熱，小柴胡湯加生薑、竹茹、橘皮。

一論有傷經傷寒，誤用葶藶等熱藥，助起痰火，而作呃逆者，用黃連解毒湯。方見卷四白虎湯。方見卷四

一論因服攻病藥，致傷胃氣，下陷而元氣將離，以致胃氣共井出之氣。

疲斃成久病，人而至於呃者，乃三焦元氣與胃氣相逆，乃危惡之兆也。

宜用。

大補元湯

鐵黃芪

蜜水炒棟參 去蘆一分

白朮 去蘆炒 二分

懷山藥 二錢

廣陳皮 七分

石斛 七分

白朮仁 研六分 廣木香 三分

沉香 三分

甘草 炙七分

右剉丁劑生薑三片紅棗二枚粳米一握水煎不拘時溫服

○一論一切呃逆用柿蒂燒存性爲末酒調服立止一方每服用柿蒂七箇焙爲末黃酒調下

○一經法治呃逆服藥無効者用硫黃乳香各等分爲末以酒煎能令人

○一方用雄黃二錢酒一盞煎七分急令患人飲其熱氣即止

○一灸呃逆法見之法

○一治噎逆欲死者其肺脈弱者不治用半夏生薑各一斤每服五錢水

煎服

○一治咳逆連咳四五十年者

生薑汁半合蜜一匙與煎令熱溫服如此三服瘥

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮

白朮去屑

香附

青皮去穢

黃芩炒

黃連姜炒

瓜蒌仁

砂仁

甘草

右劉生薑三斤水煎服

破鬱丹

一論婦人噯氣胸緊連噯十餘聲不盡噯出氣心頭略寬不噯即緊

香附醋黃

梔子仁炒

黃連姜汁炒

枳實炒

檳榔一兩

莪朮

青皮去穢

瓜蒌仁

蘇子一兩

右共爲末水丸如梧子大每服二十九食後滾水送下或以分心氣飲

服之立効

一上舍飲食失宜胸膈膨脹噯氣吞酸以自知醫用一士陳叔連蒼柏之類前症益甚更加足指腫痛指縫出水余用補中益氣加茯苓半夏之而愈若腿足浮腫或炊腫寒熱嘔吐亦用前藥

吞酸

脉弦而滑，兩手或浮而弦，或浮而滑，或沉而遲，或緊而洪，或洪而數，或沉而遲，胸中有寒飲，洪數者，痰熱在胸膈，時吐酸水，欲成潮胃也。

夫酸者，肝水之味也。由火盛制金，不能平木，則肝木自甚，故為酸也。如候食熱，則易於酸矣。或言吐酸為寒者，誤也。乃濕熱在胃，口上酸，必入胃被濕熱鬱，乃食不得化，故作吞酸。如穀肉覆蓋在器，濕則易為酸也。必用吳茱萸，順其性，析之，乃在活法。

○一論吞酸，饋雜酸水刺心者，乃痰火鬱氣也，宜

清鬱二陳湯

陳皮

半夏 薑炒

茯苓

梔子

炒各一錢

蒼朮

米泔炒

川芎

白芍

炒七分

甘草 三分

香附

黃連 薑炒

枳實

炒各八錢

神麩

炒五錢

右到丁劑生薑煎服。

○一論鬱積吐酸者用

柴連丸

蒼朮米泔浸陳皮一兩

半夏姜炒

白茯苓去皮黃連二兩半姜炒

吳茱萸炒一兩冬月倍用

右為細末蒸餅為丸如菉豆大每服三五丸食後白滾湯送下

○一論噫氣吞酸體雜有痰有熱有氣有食脚膈不寬飲食不化以

香薷和中丸

白朮去蘆炒山楂肉

連翹各四兩白茯苓去皮半夏姜汁炒

枳殼炒陳皮去白

神麴炒各二兩乾生薑二兩萊菔子炒

白豆蔻炒各五錢木香二錢

右為細末神麴糊為丸如梧子大每服百丸食後白湯送下

○一論婦人心酸乃痰飲積在脾胃間時時酸心或吐水宜

吳茱萸丸

大麥芽炒五錢 肉桂 五錢

吳茱萸一兩 薑洗 蒼朮 冰附各一兩

陳皮去白 五錢

神麴炒五錢

右為細末。水煮稀麴為丸。如梧子大。每服五七十九丸。飲送下。

一論醋心。每醋氣上攻。如酸醋不可留者。用吳茱萸一合。水一鍾煎七

分。頻服。縱濃亦須強飲。曾有入心。如蠶破。服此方效。

一治口吐清水用

蒼朮壁土 炒

白朮去蘆 炒

陳皮

白茯苓

滑石炒

水煎服

一儒者四時喜擇熱飲食。或吞酸噯腐。或大便不實。足指絲爛。此脾

氣虛寒。下陷。用上君子加薑桂治之。而愈。稍為寒宜。諸疾仍作。用煎藥更

加肉子錢許。數劑不再發。

一婦人吞酸噯腐。嘔吐痰涎。面色純白。或用大陳黃連枳實之類煎藥

熱作渴。肚腹脹滿。予曰。此脾胃虧損。未傷寒中。不信。仍作火治。服藥

服如燕，余以六君加附子、木香治之，胃氣漸醒，飲食漸進，虛火歸經，入以補中益氣，加炮薑、木香、茯苓、半夏，兼服全愈。

○一治食後吐酸水，用乾薑、薑黃、吳茱萸、荳蔻各二兩，爲末，每服方寸匙，酒調服，日二服，日冷服之，立効。

膈雜

夫胃爲木鏡，之海無物不受，若夫濕麵魚膈、水果生冷，以及烹飪調劑，皆滑難化等物，恣食無節，朝傷暮損，而成清痰，稠飲滯于中宮，故胃膈難受，吞酸痞滿甚，則爲胃膈，嗝即此之由也。夫膈雜之爲症也，以凡不飢似痛，不痛而有懊懣，不自寧之况者，是也。其症或兼噎氣，或兼痞滿，或兼惡心，漸至胃脘作痛，實發火之爲患也。治法以南星、半夏、橘紅之類，以消其痰，岑連、梔子、石膏、知母之類，以降其火，蒼朮、白朮、芍藥之類，以健脾行濕，壯其本元，又噎忘口，節慾，無有不妥者也。

○一論傳雜乃痰因火動也宜化痰清火湯

南星薑炒半夏薑炒陳皮

黃連

黃芩

梔子

知母

石膏

蒼朮米泔浸

白朮去蘆

白芍炒

甘草

右剉生薑煎服

○一論饋雜因血虛而作者宜養血四物湯

當歸

川芎

白芍炒

熟地黃芩炒

人參

白朮

去蘆

白茯苓

皮半夏姜炒

黃連姜炒

梔子炒

甘草

一方去人參加香附貝母

右剉生薑煎服

○一論婦人心胸傳雜多是痰症或云是血饋而用猪脰血炒食之則愈此以血消血歸原耳此方治中脘心腹冷痰心下嘈雜口出清水脇肋

急脹滿痛不欲食此胃氣虛冷脈沉遲弦細宜此

旋覆花湯

陳皮

半夏

姜炒

赤茯苓去心旋覆花

人參

白芍炒

細辛

桔梗

官桂

甘草

右剉生薑七片水煎服。

○一論婦人心胸膈雜用

茯苓補心湯，即四物湯合參蘇飲是也。

○一治心中膈雜坐臥不安，蔡完體傳

陳皮一錢

半夏八分

白茯苓一錢

赤茯苓八分

酸棗仁炒八分

益智仁三分

麥門冬去心一錢

甘草二分

右剉下剉生薑煎半空心溫服。

○一人多思慮以致血虛五更時膈雜是也宜以

四物湯加香附山梔黃連貝母

○一肥人備雜宜用

二陳湯少加撫芎蒼白木炒梔子水煎服

○一論備雜者痰火內動如粗食在膈令人不自安也用
痰火越鞠丸

海石 研水飛 膽星

瓜蒌仁 去油 山梔 炒黑 青黛 水飛過

香附 童便浸 蒼朮 米泔浸透搗去

撫芎

右各等分爲細末湯泡蒸餅爲丸如菘豆大每服百丸臨臥白泔湯送下

○一論備雜屬鬱火者宜

加味三補丸

黃芩 去朽 黃連 去尾 姜炒

黃柏 去皮蜜 香附 米 醋浸 透炒

蒼朮 米泔浸透搗去 黑皮切片炒

右各等分爲細末水杵稀糊爲丸如菘豆大每服七八十九臨臥茶清

送下

諸氣

脉五手脉沉便知是氣沉極則伏瀉弱難愈其或沉滑氣蒸痰飲病也
入稟天地陰陽之氣以生藉血肉以成其形一氣周流于其中以成其神
形神俱備乃爲全人故氣陽而血陰灌溉周身而無一毫之間斷也血
則隨氣而行氣載乎血者也。有是氣必有是血有是血必乘乎是氣一
者行則俱行。一息有間則病矣。今之人不知怒怒驚恐悲哀而損其身
憂愁思慮以傷其氣故人之疾多從氣而生。致有中滿腹脹積聚喘急
五膈五噎皆由于氣也。

○一論男子婦人一切氣不和。多因憂愁思慮忿怒傷神。或臨食憂戚。或
事不隨意。使抑鬱之氣留滯不散。停於胸膈之間。不能流暢。致心膈痞
悶。脇肋虛脹。噎塞不通。噫氣吞酸。嘔噦惡心。頭目昏眩。四肢倦怠。面色
痿黃。口舌乾苦。飲食減少。日漸羸瘦。或木腸虛閉。或因病之後。胸中痞

痰不思飲食並皆治之

分心氣飲

青皮去穢

陳皮

半夏姜炒

白茯苓去皮木通

官桂

赤芍

桑白皮

大腹皮

紫蘇

羌活

甘草

右剉作劑生薑三片棗二枚燈心十根水煎溫服○性急加紫胡○多怒加黃芩○食少加砂仁神麩○咳嗽加桔梗半夏○胸膈痞悶加枳實香附○三焦不和加烏藥○氣閉加蘿蔔子枳殼○氣滯腰疼加水瓜枳殼○上焦熱加黃芩○下焦熱加梔子○翻胃加沉香磨服○水氣面目浮腫加猪苓澤瀉車前木瓜葶藶麥門冬○氣塊加三棱莪木○一方去赤芍羌活加枳殼桔梗木香檳榔香附莪木藿香治憂思鬱怒諸氣

○一論七情之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出燕

不下或中脘痞悶氣不舒快或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲惡心嘔吐等症

加味四七湯

半夏湯泡

枳實二兩

甘草一兩

白茯苓去皮 川厚朴薑炒 紫蘇二兩

桔梗二兩

右剉作十劑生薑七片棗丁枚水煎熱服丁方治梅核氣加檳榔

○一論一切氣滯心腹滿悶疼痛脇肋脹滿難消嘔吐酸水痰涎不利頭目昏眩并食積酒毒及米穀不化或下痢膿血大小便結滯不快風壅積熱口苦煩燥涕唾稠粘此藥最能流濕潤燥推陳致新滋陰即湯散鬱破結活血通經治氣分之聖藥也宜此

利氣丸

大黃生用

黑丑頭末

木香一兩

檳榔一兩

枳殼薑炒

香附米炒

青皮去核

陳皮一兩

莪朮煨

黃連一兩

黃柏三兩

右為細末，水丸梧子大，每服五七十丸，或百丸，臨臥淡薑湯送下，以利為度，如不利，再加丸數，通利則愈。瑞竹堂加黃芩、當歸各一兩。

○一論脾胃不和，過食生冷油膩，麵粉濕麵，停滯不化，腹膈滿悶，嘔逆，心腹膨脹，心脾疼痛，增寒壯熱，或面目四肢浮腫，甚致臃腫，閉滯，上氣喘急，睡臥不安，但是有因氣所傷，寒氣咽氣，脹氣滯氣，寒氣痞氣，癰氣，氣塊，下切氣，並治用此。

沉香化氣丹

香附子 一斤炒內 黑牽牛 八兩頭末

陳皮 五兩 山藥 二兩

厚朴 薑汁炒 三稜 煨 三兩

木香 一兩 沉香 七錢

官桂 五錢 乾薑 炮 一兩

蒼朮 米泔浸 炒 四兩

枳殼 麩炒 二兩

莪朮 煨 二兩

丁香 二兩

良薑 一兩

青皮 去穰 炒 五兩

枳實 麩炒 二兩

紫蘇 二兩

丁皮 二錢

砂仁 二兩

草果

去壳一兩五錢

白豆蔻

去壳一兩

南星

炮一兩 半夏一兩

人參

五錢

白茯苓

去皮一兩

檳榔

一兩 石膏二兩

蘿蔔子

二兩

神麩

一兩

山查

去子二兩

右爲細末，醋糊爲丸，如梧子大，每服五十九丸，臨臥淡薑湯送下，物脫布氣，空心鹽湯下，如要大便通利，漸加至百丸，仍看老幼盛衰，增減丸數，此藥蠲積氣，化滯氣，逐風原立，見神効，藥性溫平，不損元氣，常服五九，疎風順氣，利胃健脾，消酒伏食，寬中快膈，消磨痞塊，孕婦不宜服。

○一論男婦中風中氣，牙關緊閉，口眼喎斜，不省人事，并傳屍骨蒸發，暴卒，症最能順氣化痰，神効。

蘇合香丸

沉香

木香

丁香

白檀香

安息香

去毒膏

麝香

香附米

白朮

去蘆

訶子肉

草撥

犀角

剉屑

朱砂 碎一片腦

蘇合油

入安色

右將各味咀成屑，得細末，入麻屑，安色，香蘇合油，同藥攪勻，煉蜜丸，每丸秤過一錢，用蠟包，裝每用大人一丸，小兒半丸，去蠟皮，以生薑自然汗化開，擦牙關，另煎薑湯少許調藥灌下。

○丁人飲酒太醉，後氣往外，仰頭出不盡，有出氣無收氣，此乃氣不歸元，死在須臾，諸藥不効，余以

韭菜根，搗損入陳醪，醱炒熟，絹包，煨下，此丁包冷，又另換一包，煨至膝下，溫氣漸降而歸元矣，妙不可言。

痞滿

脈來堅實者順，虛弱者逆。

痞滿與脹滿不同，脹滿內脹而外亦形痞，則內覺痞悶而外無脹急之形也。蓋由陰伏陽蓄，氣血不運，而成位心下之中，脹滿痞塞皆土邪之所

爲耳有因誤下，復氣心邪乘虛而入於心之分野，有因食痰積不能化，行而作痞者，有濕熱太甚上來心下而爲痞者，治之用黃連、黃芩、枳實之苦以泄之，厚朴、生薑、半夏之辛以散之，人參、白朮之甘溫以補之，茯苓、澤瀉之鹹淡以淡之。大槩與濕同治，使上下分消可也。

○一論按之堅而軟無塊，爲痞多，是痰氣鬱結，或飲食停滯者，加味二陳湯。

陳皮

半夏薑炒

白茯苓去皮 枳實姜炒

黃連薑汁炒

山查去子

木香

青皮去穢

砂仁

甘草

右剉生薑煎服。

○一論痞滿宜調中補氣血，消痞清熱，攻補兼施，而爲也。

平補枳朮丸

白朮

去蘆土

白芍

酒炒一兩五錢 陳皮

枳實薑炒

黃連酒炒各一兩

人參

木香各五錢

右爲細末，荷葉煎湯打米糊爲丸。如梧子大，每服五十九，食遠米湯下。漸加至六七十丸。

○一論內傷元氣脾胃而作心下痞者，宜大補元氣也。服加減補中益氣湯，方見內傷。

如脈緩有痰而痞，加半夏黃連。○脈弦四肢滿悶，便難而心下痞，加黃連柴胡甘草。○太便閉燥，黃連桃仁少，加大黃歸身。○心下痞，芩肉加白芍黃連。○心下痞，腹脹，加白芍砂仁五味子。○如天寒，少加乾薑或肉桂。○心下痞，中寒者，加附子黃連。○心下痞，嘔逆者，加陳皮生薑黃連。○冬月，加黃連少，加了香薷香。○能食而心下痞，加枳實三錢黃連五分。○如不能食，心下痞者，勿加之。依本方食飽，心下痞，則服前根末丸而愈。

一論一切心下痞，及年久不愈者，宜用

大消痞丸

黃連土炒六錢

黃芩土炒六錢

枳實炒五錢

半夏錢四

陳皮四錢

厚朴四錢

猪苓五分

澤瀉三錢

薑黃一兩

乾生薑二錢

人參四錢

神麴炒二錢

砂仁三錢

甘草錢二

白朮去蘆土炒一兩

右爲細末，蒸餅爲丸，如梧子大，每服五十丸，漸加至百丸，空心白滾湯送下。

○一男子胸膈作痞，飲食難化，服枳朮丸久而形體消瘦，發熱口乾，脈浮大而微，用補中益氣加桂薑諸症悉退，惟見脾胃虛寒，遂用八味丸補命門相火，不月而飲食進，三月而形體克此症，若不用前丸多服，則喘促腿足浮腫，小便淋瀝等症，急用加減腎氣丸亦有得生者。

○一治痞悶氣積食積宜服

內消丸

青皮

陳皮

三稜煨

莪朮煨

神麴炒

麥芽炒

香附炒各等分

右爲細末醋糊爲丸如梧子大每服三五十九茶清送下

○一腹中窄狹須用蒼朮若肥人自覺腹中窄狹乃是濕痰流灌臟腑氣不升降燥飲用蒼朮香附行氣如瘦人自覺胸中窄狹乃是熱氣薰蒸臟腑宜黃連蒼朮

○一論心下堅如盤者

枳實 麩炒一錢 白朮 去蘆三錢

右剉一劑水煎服

補中益氣湯方見內傷八味丸方見補益

鼓脹

經云其脈太堅以瀉者脹也。○關上脈浮則內脹。○遲而滑者脹。○脈盛而緊者脹。○脹脈浮大者易治虛小者難治。水病腹大如鼓脈實者生虛者死洪大者生微細者死。○中惡腹大四肢滿脈大而緩者生浮而

紫者死

丹溪云七情內傷六淫外感飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失職胃雖受穀不能運化故陰陽不交清濁相混隧道雍塞而爲熱熱留爲濕濕熱相生遂成脹滿經云鼓脹者是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓其病膠固難以治療又名曰蠱若蠱侵蝕之義陰陽愆伏榮衛凝滯三焦不能宣行脾胃不能傳布脹滿之所由生也曰穀脹曰水脹曰氣脹曰血脹謂之四病或寒或熱或虛或實又不可以無別也若久病羸乏卒病脹滿喘息不得與夫臍心突起或下利頻數百方調治未見一愈者矣

朝寬暮急者爲血虛暮寬朝急者爲氣虛朝暮俱急者氣血俱虛

脈經曰胃中寒則脹滿此論內傷不足之邪乃各病也寒者非寒冷之寒乃陰虛之義故用參朮以補脾爲君倉朮茯苓陳皮爲臣黃芩麥門爲使以制肝木少加厚朴以消腹脹氣不運加木香氣下陷加升麻柴胡

提之血虛加四物湯有痰加半夏經云寒因寒用者是也病脹久脾胃虛者雖有大小便不利之證乃氣不運血不潤也當大補氣血爲主慎不可用下藥也鼓脹爲病多端宜照後方加減調治毋得執泥以誤人也。

○一論病人初起心腹脹滿因于食傷脾胃濕痰氣鬱食積而作服也用此通治之劑宜。

香砂和中湯

藿香

砂仁

各一錢二分

蒼朮

炒一錢五分

厚朴

薑汁炒

廣陳皮

刮去白

半夏

薑汁炒

白茯苓

去皮

枳實

炒

青皮

去穢

神麴

炒

山查肉

各一錢

白朮

去蘆炒

甘草

三分

右剉下劑生薑煎服。

○一論脾虛鼓脹手足倦怠短氣溇泄者此調治脹滿王道之藥久病虛弱之人宜服。

六君子湯

人參

白朮 去蘆炒 白茯苓 去皮 半夏 薑製

陳皮

甘草

右劉生薑煎服。

一方加當歸白豆蔻蘇梗尤妙。

○按經曰寒因寒用故用補劑以治脹初服則脹久服則通此惟精達經旨者知之庸醫未定道也若朝寬暮急為血虛加當歸川芎暮寬朝急為氣虛依本方朝暮俱急亦加芎歸。

○一論男婦因於氣惱而心腹脹滿或痰嗽喘急者予常見因氣而作脹滿者甚多而用此方甚効。分心氣飲方見諸氣。

依本方加檳榔枳殼香附為藥。

木香消脹丸 治症同前。

木香 二錢 五分

檳榔 五錢

陳皮

大腹皮

枳殼 麩炒

桑白皮

蘇子炒

香附子炒

各一兩

蘿蔔子炒

二兩

右為細末水煮稀神麩糊為丸如梧子大每服五七十九淡薑湯送下

○一論腹脹發熱以陽并陰則陽實而陰虛陽勝則外熱陰虛生內熱脈必浮數浮則為虛數則為熱陰虛不能宣導飲食如故固致服滿者為

之熱脹宜用

枳實分消湯一

川厚朴去皮薑汁炒

五錢

枳實麩炒

五分

大黃酒蒸

一錢五分

官桂

一錢

甘草炙

一分

右剉一劑薑棗煎服嘔吐加半夏自利去大黃寒多加乾薑

○一論中滿鼓脹氣脹水脹熱脹宜

中滿分消丸

人參二錢五分

白朮去蘆

二錢

半薑黃

五分

猪苓去黑皮

一錢

甘草炙

一錢

砂仁

乾生薑各

二澤瀉

陳皮

知母去毛

各

二錢

酒炒

白茯苓 去皮 二錢 枳實 麩炒

半夏 姜炒

黃連 姜汁 各五錢 黃芩 酒炒 六錢

川厚朴 姜炒 五錢

右為細末。水浸蒸餅為丸。如梧子大。每服百丸。焙熱食遠。白湯送下。

○一論老人虛人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食脉浮遲而弱此名寒脹

香朴湯

川厚朴 姜汁炒 五錢 大附子 炮去皮脐 三錢八分 木香 一錢

右剉一劑生薑七片棗二枚水煎熱服

○一論中滿寒脹寒疝大小便不通陰躁足不收四肢厥逆食入反出下

虛中滿腹脹心下痞下焦躁寒沉厥奔豚不收宜

中滿分消湯

益智 半夏 姜炒 升麻 茯苓 去皮 木香 各三分

黃芪 炒 吳茱萸 炒 草豆蔻 川厚朴 姜炒 各五分 川烏 炮

人參 澤瀉 青皮 去穢 當歸 柴胡

黃連姜炒

澄茄

黃柏酒炒

乾薑

生薑各二分

右劉一劑水煎服忌房勞酒濕麵生硬冷物

○一論中滿腹脹內有積聚如石堅硬令人坐臥不寧一便澀滯上氣喘促或通身虛腫

廣茂消堅湯

川厚朴去皮

黃芩姜炒

黃連姜炒

益智仁

草豆蔻

當歸各五分

半夏姜炒

廣木

升麻

紅花

柴茱萸各二分

生甘草

柴胡

澤瀉

神麩炒

青皮去穢

陳皮各三分

口乾加葛根

四分一

右劉一劑生薑煎食遠溫服忌酒醋濕麵

一論濁氣在上則生腹脹清氣在下則生飧泄宜

木香順氣湯

木香三分

厚朴姜炒

青皮去穢

陳皮

益智

溼瀉

乾生薑

茯苓

半夏姜炒

吳茱萸湯洗

當歸

蒼朮米泔炒升麻

柴胡炒

草豆蔻三分

白朮一錢

右對一劑水煎服。忌生冷硬物。

○一治鹽脹

黑丑頭末

木香

甘遂各一錢

右為末用豬腰一對俱分破將藥撒在二腰子內合住帛包灰火燒熟

空心或食二箇或食一箇未便行膿血見效

○一論血鼓腹如盆脹積聚疔塊宜

化癥丸

三稜碾

莪朮須

乾漆炒

烟砂

信蟻糯米炒

水蛭石反炒琥珀

牛膝酒洗

肉桂

大黃酒洗

右為末用生地黄自然汁和米醋調勻為丸如梧桐子大每服十丸

心溫海下童便亦可

四炒枳殼丸

一治脾胃不和氣血凝滯腹內蟲脹

枳殼四兩去穢切作兩指有大塊分四處

一兩用蘿蔔子一兩炒去子不用

一兩用蒼朮四兩炒去蒼朮不用

一兩用乾漆一兩炒去乾漆不用

一兩用小茴一兩炒去茴香不用

右用原炒蒼朮四味用水二碗煎至一碗去渣熬稠爲丸如梧子六每服五十九食後米湯下

水腫

水腫之症有陰有陽。察脈觀色問症須詳。陰脈沉遲其色青白不利而流。小便清澀脈或沉數色赤而黃燥糞赤溺兼渴爲陽。水腫氣急而小

便澹。○血腫氣滿而四肢寒。

蠱毒大要有二。曰單腹脹。曰雙腹脹。喘急氣滿腫而不安。四肢微腫。此單腹脹。因內傷七情所致。取効微遲。四肢浮腫。肚大身重。此雙腹脹。因外感風濕所致。取効甚速。又有水腫氣腫之分。以指腫處有陷陷起。隨起者氣腫。先須理氣。陷指起遲者水腫也。只須導水立愈。凡年四十已上。氣血壯盛者。得効之後。善自調攝。終身不發。五十以後。氣血稍衰。調攝不謹。時或再復。此藥尚能治之。但屢復屢治。而元氣耗則難為矣。脈浮洪易治。沉細難治。浮洪者。只用全不換木香丸。沉細者。兼用沉香快脾丸。先服木香流氣飲。

○一論諸氣痞滯不通。胸膈膨脹。口苦咽乾。嘔吐不食。或有背腹脇走注刺痛。及喘急痰嗽。面目虛浮。四肢腫滿。大小便閉澀。又治夢思太過。怔忡鬱積。脚氣風濕。聚結腫痛。喘滿脹急。此藥調順榮衛。流通血脈。快利三焦。安和五臟。凡治蠱脹。當先用此。

木香流氣飲

木香七錢五分

丁香七錢五分

藿香七錢五分

半夏錢五分

人參五錢

白朮去蘆七錢五分

赤茯苓五錢

厚朴姜炒二兩

青皮去穢二兩

陳皮四兩

草果七錢五分

檳榔七錢五分

大腹皮七錢五分

香附二兩

紫蘇二兩

木瓜五錢

白芷五錢

麥門冬去心五錢

莪朮七錢五分

肉桂七錢五分

木通一兩

石菖蒲五錢

甘草二兩

右剉八錢生薑三片棗二枚水一碗半煎至七分去渣熱服本方加沈

香枳殼大黃去蘆香石菖蒲名二十四味流氣飲○蠱腫加白豆蔻○

腫滿加黑牽牛○頭面腫加葱白○肚腹腫加枳實倍青陳皮○勝至

脚腫加桑白皮

○一論金不換木香丸治蠱腫之神藥也先服木香流氣飲三五劑通加

白豆蔻次用金不換木香丸收功後用沉香化氣丸調理或心頭煩熱

者竹葉石膏湯熱甚加黃芩前賢論蠱腫之症有五不治者而黑如微

肚大青筋掌腫無紋脚腫無坑臍中凸起此羣症亦能治之開有得生
者如取下黑水者不治陽事不舉者不治其餘青黃紅紫皆能治之又
一証或腫或消或作泄瀉知脾弱即瀉名曰洪水橫流服此宜之其腫
自消其瀉自止忌一切生冷毒物油鹽醬醋魚鮮鵝鴨房事等件二百
日無有不效者

金不換木香丸

大戟 五錢

芫花 炒五錢

甘遂 五錢

黑丑 頭末二錢

巴豆 去壳半夫半熟五錢

大黃 生五錢 青皮 去穢三錢

陳皮 五錢

南木香 五錢

青木香 五錢

胡椒 一倍病用 川椒 去日五錢

益智仁 五錢

大腹皮 五錢

苦葶蘆 炒五錢 射干 三錢

桑白皮 五錢

木通 去皮五錢

連翹 五錢

砂仁 五錢

澤瀉 五錢

右二十二味爲末，醋煮，和稠爲丸，如梧子大，每服五十丸，壯歲人加七
八十九，第一消頭面腫，五更初用葱白酒送下，第二消中膈胸腹腫，五

更初用陳皮湯送下第三消臍已下脚腫五更初桑白皮湯送下
沉香快脾丸

青皮 四錢

陳皮 四錢

三棱 煨 四錢

莪朮 煨 四錢

蒼朮 米泔浸炒 四錢

白朮 去蘆 四錢

白茯苓 四錢

砂仁 四錢

草果仁 四錢

木香 四錢

沉香 二錢

丁香 三錢

藿香 四錢

軍薑 三錢

肉桂 三錢

連翹 四錢

商陸 白 四錢

黑丑 頭末 四錢

大腹皮 二錢

殭蚕 三錢

神麩 四錢

麥芽 四錢

益智仁 四錢

雄附子 五錢 看活虎骨 貴者不用

右二十四味爲末類糊爲丸如梧桐子大每服三四十九點前用之第一五更葱白湯下第二五更陳皮湯下第三五更紫蘇湯下第四五更

桑白皮湯下

沉香化氣丸 治蠱常服調理

青皮 去穢

陳皮

三稜 煨

莪朮 煨

人參

白朮 去蘆

白茯苓

山藥

砂仁

白豆蔻

丁香

木香

沉香

檳榔

石菖蒲各六錢

官桂一兩

蘿蔔子二兩 黑丑頭末二兩 八錢

右爲末，醋糊爲丸，如梧子大，每服五七十九，鹽湯下。

○一治前証服藥，息鹽醋一百日之後，用藥開鹽法。

猪苓

澤瀉

白朮

白茯苓

肉桂

鹽各等分

右每用七錢，用鯽魚一箇，破肚去淨，將前藥入魚肚內，加麝香少許，入瓦內，火焙黃色，存性爲末，薑棗湯調服。

○一論服脹緊硬如石，或陰囊腫大，先用甘草煎湯一鍾，熱服之後，即用此藥數之。

大戟

芫花

甘遂

海藻各等分

右爲末，醋糊和藥塗腫處，一加椒目尤効。

○按右諸方治諸鼓脹腫滿，殊効，其中有病人氣血虛，不敢服者。

又有服之而不効者此皆得病日久或快投攻擊太過以致脾胃元氣虛損之極宜服後諸方實有起死回生之功也。

○一凡看蠱識症○一朝腫暮消是陽蠱○二朝消暮腫是陰蠱○三腹上青筋起氣喘潮熱是氣蠱○四四肢不收無肉肚大是食蠱○五遍體肚不脹是翳油蠱○六遍身潮熱是脾蠱○七房室過多是腎蠱○八泄瀉潮熱是脾蠱○九屃墜上下小便不通是胃蠱。

○一論水腫四肢頭面皆浮而腫或單腹鼓脹皆屬脾虛不能制水氣盛不能運化治之補元氣養心血健脾胃以培其本清濕熱平肝木利水道以治其標此藥主之。

行濕補氣養血湯

大揀參去蘆不油白朮去蘆陳皮

白芍酒炒

白茯苓

蘇梗

當歸

厚朴姜炒

川芎

蘿蔔子炒

海金沙

木香

木通

甘草

大腹皮

右劉薑棗煎服。○氣虛倍參苓朮。○血虛倍芎歸芍。○小便短少加猪苓澤瀉滑石以消其腫也。○服後腫脹俱退惟面足不消此陽明經氣虛倍用白朮茯苓。

○一論單腹蠱脹只宜補中行濕利小便切不可下宜用行濕補中湯。

人參八分

白朮錢炒

白茯苓一錢

蒼朮米泔浸

陳皮一錢

厚朴姜炒

黃芩八分

麥門冬五分

澤瀉五分

柴胡升麻

氣不運加木香木通氣下陷加柴胡升麻。

朝寤暮急血虛加當歸川芎白芍炒香附黃連姜炒去人參。

朝急暮寬氣虛倍參朮。

朝暮急者氣血俱虛宜雙補之。

○一論腫脹之症因內傷而得者或慢脹攻擊殺伐之過以致元氣脾胃虛損之極腫脹尤甚于前此氣血兩虛腎水乾涸用此方以金匱腎氣

九兼進

加味補中益氣湯

黃芪 炒二錢

人參 一錢

白朮 去蘆炒二錢

白茯苓 二錢 陳皮 八分

當歸 酒洗一錢

白芍 酒炒一錢五分 柴胡 四分

升麻 三分 蘿蔔子 炒一錢

厚朴 姜炒一錢

甘草 炙二分 枳實 炒五分

右剉下劑生薑煎服

○一論脾腎虛。腰痠脚腫。小便不利。或肚腹脹痛。四肢浮腫。或喘息痰盛。已成蠱症。其効如神。此症多因脾胃虛弱。治失其宜。元氣復傷。而變症者。非此藥不能救。必以補中益氣湯。早晚兼濟。可收全功矣。

金匱腎氣丸

懷熟地黃 兩

白茯苓 三兩

牛膝 去蘆酒洗

肉桂

澤瀉

車前子

山茱萸 酒蒸去核

山藥

牡丹皮 各一兩 大附子 炮去皮脂 五錢

右為細末煉蜜為丸。如梧子大每服百丸空心米飲送下。臨卧服補中益氣湯。

○一論單腹脹及脾虛腫滿。腸間閉塞。或胃口作痛。此補中有消之意也。調中健脾丸。

黃芪 蜜炙 二兩

人參 二兩

白朮 去蘆黃土 拌炒六兩

白茯苓 二兩

陳皮 去水炒 三兩

半夏 泡七次 三兩

蒼朮 米泔浸炒 二兩

香附 童便浸炒 三兩

白芍 炒二兩

黃連 吳茱萸煎水炒 去葉更二兩半

蘇子 炒一兩

蘿蔔子 炒一兩

山楂肉 炒二兩

薏苡仁 炒三兩

澤瀉 炒一兩

沉香 六錢另研

五加皮 炒二兩

草豆蔻 酒拌炒 一兩

法製瓜蒌 一兩

○用大小薑二箇。鑽一孔。每箇入胡椒三錢。多者黃連二錢。炒米。均大。外用糝粉糊。用瓦器焙乾。封固。晒乾。炭火煨。漚紅。取出。去泥。其黑色。下并入藥。

右為細末。煎荷葉大腹皮湯。打黃米糊為丸。如梧子大。每服百丸。日進

三服。白湯送下。

右方法製水多，不便製，每不用此味，亦獲奇功，如有更妙。

○按右諸方治腫脹屬虛皆宜用此。王道之刻病者苦其脈腫難堪，予令朝服九藥，夕服湯藥，或三朝五日，間服蠲痺丸，或石鐘散，亦服謂之下棋打劫而治病者，暫據一時之寬，醫者一補一攻，亦善治之良法也。

○下人脾胃虛弱，肚腹鼓脹，遍身腫按之成窠，其脈沉細，右寸為甚。此脾肺虛寒之症，治以八味丸，或金匱腎氣丸以補腎陰，行生化之源。至春服之，小便通，又數劑腫消，即止前藥，復與六君子湯加木香、官桂、炮薑以燥脾，導氣而瘥。後因不戒，性病復作，但有氣惱，或飲食稍多，即泄瀉，仍用八味丸倍附子。

○下儒者失於調養，飲食難化，胸膈不利，或行氣消導藥，咳嗽喘促，服行氣化痰藥，肚腹漸脹，服行氣分利藥，睡臥不能，兩足浮腫，小便不利，大便不實，脈浮大按之微細，兩寸皆短。此脾腎虧損，朝用補中益氣加

蓋附女用金匱腎氣加骨脂肉果各數劑諸症漸愈再佐以八味丸兩
月乃能步履却服補中八味半載而康。

補遺

蟾桃丸

葶藶丸

治男婦渾身頭面手足浮腫肚腹脹滿疼痛。丸

喘急千金不傳之妙。

沉香三錢

木香三錢

乳香

三錢

沒藥

三錢

琥珀

一錢

白丑

半用頭末八錢

黑丑

用牙皂煎濃水浸半日鋪底煨

檳榔

下兩一牛生一牛熟取研末不錢

右爲細末牙皂水打稀麵糊爲丸如梧子大每服二錢七分五更後

砂糖煎湯送下。

○張靜虛道人治蠱脹神方 薛共勉傳

石幹散

石幹一錢

黑丑一錢

沉香五分

木香五分

檳榔一錢

壽世保元

丙集三卷

六十三

葶藶八分 琥珀五分 海金沙一錢

右共爲末聽用患者先服五皮散一二帖然後服此末藥實者一二錢虛者九分空心葱白湯下隔一日一服輕者二帖重者不過三帖余愈後服健脾養胃之藥永不發也服藥要忌葷葷腥二七則腸胃清病根拔

○一治腫脹仙方名金棗兒

紅芽木戟一斤紅棗三斤水麩下日夜去大戟用棗晒乾食之立消

○一治水腫黑豆煮去皮焙乾爲末每二錢米飲調服

○一治腫脹仙方名天命飲
白商陸根似人形者搗取汁下合生薑自然汁二合點黃酒下蒸和服空心三日服一次元氣厚者服五次薄者三次止忌葷葷凡人年五十以裏者可服五十以外者不必用

○一治腫用

粟米菘豆各下抄猪肝下葉切碎三味煮作粥食之至重者不過五

次其腫自消。切忌氣惱生冷之物。

○一治十腫水病不瘥垂死者。

用青頭雄鴨一隻，治如食法，細切和米并五味煮極熟，化粥食之。

○一治用鯉魚一尾重一斤，和冬瓜葱白煮食之。

○一治方用癩蝦蟆一箇，入猪肚內煮熟去蝦蟆，將肚一白俱食盡。

○一治蠱腫。

用田螺不拘多少，水漂加香油一盞于水內，其涎自然吐出，取其涎曬乾為末，每服不過三分，酒調下，其水自小便而下，其氣自大便而出，其腫即消，即服養脾胃之藥為妙。

○一治水氣腫滿腹脹者。

用黑白牽牛頭末每服二錢，太麥麩三錢，水和為餅，以灰煨熟取出，食之，茶湯送下，太便秘利後灸臍上一寸，臍下一寸半，各一七壯，効。

○一治十腫蠱脹輕者服此立効。

苦丁香去穢微焙爲末用棗肉爲丸如梧子大每服三十丸空心米湯下行水日進二服

○一治十腫水氣五蠱脹氣其効如神一人患腹脹陰囊腫大不一刻而病愈真仙方也。

甘遂赤皮細花不蛀者不刻多少用蕎麥麵水和作厚餅內糝神麩末將餅厚包甘遂在內灰火中燒熟取出晒乾爲末每用一錢二分以細麵約一兩許合和水調趕作麵片次用商陸二錢半巴豆一箇去殼水一碗半砂鍋內煎至一碗去渣再入鉄鍋內入煎麵片煮熟食之其商陸湯任其意服與不服不在其限服不一時水從大便出如見血點即下血氣盡即氣下當時腫消若有喘嗽盡皆妥貼若腹中塊刺消散只一服見効忌葷醬冬瓜香油筍腥之物半月後用鹽亦須炒過用之若蠱症加胡椒一錢與巴豆同煮其巴豆須看虛實加減其壯者加至二三箇無妨

積聚

脈來實強者生沉小者死。○脈來沉者骨節積也。在寸口積在胸中。在關上積在臍脘。在尺部積在氣道。脈在左積在左。脈在右積在右。積在中央。○脈來小沉而實者。臍中積聚不下。食食則吐。積者生於五臟之陰也。其發有根。其痛有常處。脈必結伏。聚者成於六腑之陽也。其發無根。其痛無常處。脈必浮結。由陰陽不和。臟腑虛弱。口乳七情失常。所以爲積聚。血久則爲癥瘕。成塊不能移動者。是癥。或積或無。或上或下。或左或右。積是癥氣不能成塊。塊乃有形之物。積則血死。此理。臍然在中。爲積。飲右爲食積。左爲死血。太法。以無之。以削之行。氣開。痰爲要。積塊不可專。用下藥。徒損其氣。動亦不。去。道。爲使之。鎔化。其。外血。塊去。須。太補。痞塊在皮。東膜外。須。用補。葯。其。六君子湯。加。香附。枳實。開之。

○一論五積六聚癥瘕疝瘕飲食積死血成塊也
化堅湯

白朮去蘆

白茯苓去皮 當歸酒洗

川芎

香附炒

山查

枳實麩炒

陳皮

半夏姜炒

梔仁去皮尖

紅花

莪朮煨

甘草

右劉剝生薑三片水煎溫服。○肉積加黃連。○麩積加神麩。○左有塊倍芎藭。○右有塊加青皮。○飽脹加蘿蔔子。○壯人加三稜。○弱人加人參。

○一論五積六聚癥瘕積血積食積氣積一切積塊或中或左或右或上或下久不愈者用此。

消積保中丹

陳皮去白

半夏湯泡切片 白茯苓去皮

白朮去蘆炒

香附醋炒

青皮去核 木香三錢不

檳榔七錢

莪朮

醋炒八錢

三稜

醋炒八錢

萊菔子

炒一兩

砂仁

炒四錢

神麴

炒一兩

麥芽

炒六錢

白芥子

炒一兩

黃連

姜汁炒一兩

梔子仁

姜汁炒一兩

地仁

去皮尖一兩

紅花

五錢

當歸

酒洗一兩

川芎

八錢

直阿魏

醋浸五錢

乾漆

炒煙五錢

右爲細末

薑汁酒

打稀糊爲丸

如梧子大

每服八十丸

食後

白湯送下

體虛人加入參

一兩

外宜化鐵骨貼之

○一論五積

木聚狀如癥瘕

隨氣上下

發作有時

心腹疼痛

上氣窒塞

小腹脹滿

大小便不利

宜以

大七氣湯

三稜

莪朮

青皮

陳皮

桔梗

藿香

益智

香附

肉桂

甘草

右剉剉生薑

三片

棗子

一枚

水煎

溫服

查再煎服

○心腹癰加烏藥

枳

殼

殼

殼

殼

殼

○一論心腹堅脹腸下緊硬胸中痞塞喘滿短氣癆瘵積塊化痰飲宜胸腹順氣進食消脹軟堅用此

三稜煎丸

三稜生細對半斤 枳殼炒末以酒三升 青皮去穢二兩 羅蔔子炒二兩

神麴炒二兩 麥芽炒三兩 乾漆炒三兩 杏仁湯泡去皮尖

礞砂用磁盞細研入水調坐于

右為細末三稜膏為丸如梧桐子大每服十五丸加至二十九食遠米

飲送下

○一論男婦五積六聚七癥八瘕破下切血下下切氣宜

消癥破積丸

三稜煨 大黃煨 乾漆炒去烟 礞砂入醋煎乾 巴豆去油各

右為末醋糊為丸如菉豆大每服三丸至七丸空心米湯送下量虛實

加減服之不可過服損人之真氣

○一論癥積心腹內結一塊如拳漸上撞心及腹脹痛
保安丸

大黃

三兩酒浸
一宿蒸焙

乾薑

炮一兩

大附子

炮去皮臍五錢

醋甲

醋煮一伏時炙
黃一兩五錢

右爲末陳米醋一升煮去四五合和藥爲丸如梧桐子大每服二十九

五更醋湯下天明時再服五丸取積如魚腸膿血爛泥而下

○一論虛弱之人腹中積聚癥塊脹滿疼痛面黃肌瘦肚大青筋不思飲食此藥消痰利氣扶脾助胃開胸快膈消痞除脹清熱消食久服積塊

漸消大效

加味保和丸

加味保和丸

白朮

去蘆炒
五兩

枳實

麩炒
三兩

陳皮

去白
三兩

半夏

泡姜炒
三兩

白茯苓

去皮
三兩

蒼朮

米泔浸
炒二兩

川厚朴

姜炒
二兩

香附

酒炒
二兩

神麩

炒三兩

山楂肉

三兩

蘿蔔子

炒一兩

連翹

二兩

黃連酒炒一兩

黃芩酒炒一兩

麥芽炒一兩

三稜醋炒一兩

莪朮醋炒一兩

木香五錢

右為細末，薑汁糊為丸，如梧子大，每服五十九，加至七八十九，食後白湯送下。

○一論五積六聚七癥八瘕，或左或右，或上或下，或腹中有時攻作疼痛，諸醫誤治，以攻擊太過，以致面黃肌瘦，四肢困倦，不思飲食，等症，宜以此方久服，則元氣漸復，脾胃漸壯，蓋養正積自除，譬如滿座皆君子，縱有一小人自無容地而出，此潔古之言，豈欺我哉。

加減補中益氣湯

黃芪

蜜水炒一錢五分

人參一錢

白朮

去蘆炒一錢五分

白茯苓

去皮一錢

陳皮

七分

柴胡五分

當歸

酒洗一錢

半夏

泡姜汁炒七分

山查肉

五分

枳實

炒五分

厚朴

姜炒七分

甘草

炙四分

右剉一劑，生薑三片，棗一枚，水煎溫服，與前加味保和丸兼而服之，久

則病根自拔

○按右諸方虛弱人患積塊久不愈者宜

化鐵膏

肥皂四兩 生薑四兩 葱半斤 蒜半斤

皮硝半斤 化水

○一治痞塊心下堅硬狀若覆杯者服此一料即愈

○一治痞塊心下堅硬狀若覆杯者服此一料即愈

三稜 莪木 檳榔 草果 陳皮

枳殼 山查 各二兩 小茴 甘草 各一兩 砂仁

木香 浮鐵皮 各五錢 厚朴 姜炒 蒼朮 未甘浸 沉香 三錢

枳實 一兩 神麴 酒炒 麥芽 炒 青皮 各二兩

若爲末酒糊爲丸如梧子大每服十五丸薑湯下

○一治痰塊痞塊血塊氣塊不拘冷熱諸塊皆效

莪朮 二兩 麥芽 二兩 神麴 二兩 鼈甲 二兩 山查 二兩

青皮 二兩

砂仁 一兩

枳實 一兩

香附 二兩

巴豆仁 一兩

去油

右巴豆仁同我木香附將水浸煮丁晝夜去豆不用炒乾爲末篩打米糊爲丸如梧桐子大每服五十丸空心酒送下如婦人腹內血塊氣塊作痛加紅花酒炒一兩當歸一兩荔枝核一兩烏藥一兩官桂五錢如痰塊加陳皮一兩半夏曲一兩

○一治腹中痞氣兩脇痞積血塊痰積等症。

琥珀 二兩

阿魏 二兩 五錢綿布包水浸曬乾爲度

青皮 四兩 去穢

三稜 二兩 取前青皮同三稜共一處炒乾之

赤藥子 三兩 童便炒

黃連 二兩 內一兩用吳茱萸一兩酒浸同炒去茱萸用黃連內一兩酒炒

片苓 二兩 微炒

辰砂 三錢 炭火炒過以紫爲度

陳皮 二兩 去白

枳實 二兩 五錢

白豆蔻 二兩

甘草節 五錢

瓜蒌仁 二兩 去油

沉香 一錢

右爲末神麩二斤打糊爲丸如梧桐子大每服五十九食遠白湯送

下

○一治諸氣食積及噎膈痞滿胸脇刺痛癥瘕疝氣並治
神仙一塊氣

青皮

陳皮

三棱

莪朮

香附

重便炒
各一兩

神麩

麥芽

蘿蔔子

白丑

頭末

檳榔

鬱金

黃連

各五錢

枳實

三錢

皂角

二錢半

百草霜

二錢半

右爲細末麵糊爲丸如棗豆大每服三五丸視疾上下爲食之先後
熱酒薑湯任下

○一中洲吳仰泉夫人年五旬患腹中積塊如盤大腹脹年餘後漸即不
倒床腹響如雷噎氣不送口乾吐白沫下氣通則腹中稍寬五心煩熱
不思飲食肌瘦如柴醫屢不效入並無寸效一家哭泣後事俱備束手待
斃而已召余至診六部脈數氣口緊盛余知是前醫誤以寒涼殺伐之
過使真氣不運而瘀血不行予以大物湯加半夏陳皮木香厚朴羅蔔

子大腹皮海金沙服三劑後小便使下血塊如雞肝狀服至十二劑打下
黑血塊益許腹中仍有塊又以六物湯加枳實香附五劑而痊正足
養正而積自除也信哉不誣

○一人腹中積塊面黃肌瘦腹大如鼓死在旦夕
用端午日收下菖蒲陰乾切薄片放碗內用滾米湯泡熟盡之待溫
飲之打下小蜈蚣百條內一太條長二尺餘病即愈

補遺

○一貼瘰癧妙方

照磨陳拓所傳

甘草五錢

甘遂五錢

硃砂五錢

沒藥五錢

葱白七寸

白蜜一小盞

右用馬齒莧同鱉肉搗成膏貼塊上効

○一手金貼瘰癧膏

薛英巡傳

黃丹十兩水飛七次炒紫色阿魏三錢

乳香三錢

沒藥五錢

當歸 三錢

兩頭尖 五錢

白芷 五錢

川山甲 十片

木鼈子 十箇

麝香 一錢

右俱爲細末，用香油一斤，槐柳桑榆各二尺四寸，巴豆一百二十箇，去油，鼓單麻子丁百二十箇，去殼，先將鐵鍋盛油，炭火煎滾，入巴豆單麻，在內熬焦，撈去渣滓，下前藥，用桃柳等條不住手攪均，稠然後下丹，滴水成珠，爲度，磁器收貯。一男子腹內有痞者，先以溫熱好醋將丹洗淨，量所患大小，用麪團圍定，用皮硝一升，放入麪團內，鋪定，用簋蓋硝上，剋半盛火，不住手熨，俟硝化盡，再用溫醋洗去，用紅絹攤膏貼於患處，用舊布鞋底灸熱，熨兩三時，每七日一換，貼藥重者，不過三七，腫血化去。一小兒幼女患痞者，臘醃蒜硝洗之，用紅絹攤膏貼患處，一人將小兒雙手抱佳，在肩上一仰，用木篋子搗爛，捺於雙腎上，後用膏貼於鞋底，屢之，腎腹內木熱，爲度。

一戴雷門，夫人年近三十，患腹左有一大塊，堅硬如石，有時作痛，肚腹

膨悶經水不調或前或後或多或少或閉而不通白帶頻下夜間發熱
脈急數予以

千金化鐵丸

當歸酒洗一兩五錢

白芍酒炒一兩五錢

川芎七分

懷生地黃酒洗一兩五錢

白朮去蘆炒一兩五錢

白茯苓去皮一兩

陳皮去白一兩

青皮去穢七分

半夏姜汁炒一兩

枳實炒七分

木香二分

香附炒一兩

檳榔五錢

羅蔔子炒五錢

三稜醋炒一兩五錢

莪朮醋炒一兩五錢

桃仁去皮尖五錢

紅花五錢

乾漆炒盡烟五錢

硃砂煑過五錢

琥珀五錢

右為細末醋打麵糊為丸如梧子大每服三錢白湯送下早晚各進一服服盡藥其塊潛消經即調而後即孕生二女也

五疸

脉經曰凡黃候寸口脉近掌無脉口鼻黑色並不可治。大抵脉大者死。微細者生。無脉鼻氣冷者不治也。沉渴欲飲水小便不利者必發黃也。內經曰諸濕腫滿皆屬脾土。夫黃疸爲病肌肉必虛腫而色黃。蓋濕熱鬱積于脾胃之中久而不散故其土色形于面與肌膚也。蓋脾主肌肉肺主皮毛。母能令子虛。母病子亦病是故有諸中者必形諸外。其疾有五。曰黃汗。曰黃疸。曰酒疸。曰穀疸。曰女勞疸。雖有五者之分。終無寒熱之異。丹溪曰不必分五。同是濕熱如益麴相似。故曰治濕不利小便。非其治也。又曰濕在上宜發汗。濕在下宜利小便。一法宜用使上下分消其濕。則病無有不安者也。

○一論治腎疸目黃甚至羸身俱黃小便赤澀者宜

腎疸湯

羌活

防風

藜蘆

獨活

柴胡各五分

白茯苓二分澤瀉三分

猪苓四分

白朮五分

蒼朮一錢

黃栢二分

人參三分

葛根五分

神麴

炒六分

甘草三分

升麻一錢

右剉下剉水煎稍熱服

○一論濕熱發黃汗黃尿赤及寒熱嘔吐而渴欲飲冷水身目俱黃小便

不利不思飲食用

茯苓溼湯

猪苓

澤瀉

蒼朮清浸

白茯苓

陳皮

枳實麩

黃連炒

黃芩

梔子

防己

茵陳

木通

右剉生薑三片水煎服○如飲食不思乃傷食加砂仁神麴炒麥芽炒

各等分

○一論黃疸專屬濕熱益麩相似

茵陳五苓散

茵陳三錢

白朮一錢

赤茯苓

一錢

猪苓一錢

澤瀉一錢

蒼木二錢 山梔二錢 滑石三錢 官桂二分 甘草二分
右剉燼心水煎服

○一論五疸俱是脾胃濕熱相蒸以致遍身發黃如梔子水染者是也病
起日久醫誤以寒涼之過損傷元氣脾胃以致身微黑瘦四肢沉困
寒發熱不思飲食等症宜以

加味益氣湯

黃芪錢五分 人參一錢 白朮去蘆炒 陳皮八分 當歸一錢

柴胡五分 升麻五分 茵陳 蒼朮米泔浸 梔子炒

猪苓 澤瀉 赤茯苓 黃連 滑石各一錢

甘草炙四分

右剉生薑煎服以六味地黃丸加蒼朮白朮茵陳黃柏各二兩各丸相
兼而進之

○一治發黃症身白俱發如蠶色小便如濃菟柏汁諸藥不効用

加味解毒湯

黃芩

黃連

黃柏

梔子

柴胡

茵陳

龍膽草

木通

滑石

升麻

甘草

右剉燈心煎服。○大便實加大黃。○目睛黃信龍膽草。

○一治發黃脉沉細而遲。肢體逆冷。腰已上自汗宜用加味葶附湯。

茵陳二兩

大附子一枚炙 乾薑炮五錢 甘草炙一兩

右剉四劑水煎服。

○一治黃疸 安陸馬進孫傳極效。

露珠飲

露珠即土豆形如薯蕷爛取汁半碗湯服立效。

○一治紫腫妙方 王少川傳

蒼朮一斤

廣陳皮半斤

川厚朴五兩

草果一兩

砂仁一兩

茵陳穗半斤

香附米一斤

青礬四兩

右青礬同附米炒燒過俱為細末醋打麩糊為丸如梧子大每空心酒下薑湯亦可

○一治黃蘆病最捷用此

綠礬丸

五倍子

炒黑、綠礬四兩姜汁炒白

針砂四兩醋

神麩半斤

右為細末薑汁煮紅棗肉為丸如梧子大每服六七十丸酒下不能飲酒米湯下終身忌食葷麵

○一治黃肌飲食無味四肢無力行步倦怠脈滿而濡或腹有積塊脹滿

加減胃苓湯

蒼朮 米泔浸反陳皮

厚朴 姜炒

猪苓

澤瀉

白朮 去蘆炒 白茯苓

藿香

半夏 姜炒

大腹皮

山查
甘草

蘿蔔子

三稜

莪朮

青皮
去穢

右劉生薑三片，棗二十枚，水煎溫服。

○一治黃疸倦怠，脾胃不和，食少小便赤，宜以。

平胃散合五苓散加滑石。

○一治黃腫腹中有積塊，脹滿者用。

退金丹 山東李西嶺傳

蒼朮

酒炒

香附 八兩

青皮

去穢

陳皮

四兩

厚朴

姜炒

厚朴

二兩

烏藥

四兩

三稜

一兩

莪朮

一兩

青礬

八兩

用百

草霜同炒

右爲細末，醋糊爲丸，如梧子大，每服五十丸，米湯送下。

○一治清疽食疽，五積六聚，七噎八瘕，心腹疼痛，潮熱等症，不問大入小

兒皆可用此。

○右爲細末，砂糖水調神麩，爲丸。如梧子大，每服五六十丸，砂糖水下。

○一治黃病，愛吃塵泥者，用

黃泥一方，砂糖四兩和。

○右爲細末，黃連膏爲丸。如梧子大，每服五六十丸，空心糖湯下。

○一治黃病，愛吃生米者。

陳皮

白芍炒

神麩炒

麥芽炒

山楂

白茯苓

去皮石膏各一錢，厚朴七分

蒼朮一分

藿香五分

白朮

一分 鈎五甘草三分

○右剉水煎熟，入砂糖，下蛤蜊殼食前服。

○一治黃疸秘方

大蝦蟆丁箇，黑礬三錢，猪肚丁箇，上二味裝入肚內，煮爛，蝦蟆去骨。

用煮湯，洗令肚淨，吃之即愈。

○一治女勞疸方

四苓散合四物湯去川芎加茵陳麥門冬滑石甘草。

○一治諸黃疸口淡怔忡耳鳴脚軟微寒發熱小便白濁此為虛症用八味丸方見補益用四君子湯吞下。

○一治黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣蓋胃中有乾糞使病用煎。

猪脂一小升溫熱頓服之。日三次燥糞下去乃愈。

新刊醫林狀元壽世保元丙集二卷