

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元壬集卷之九

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

男

龔定國

校

南雍太學生藍印周文卿光靈堂鑄

外
科
諸
證

癰
疽

夫癰疽者，皆由氣血不和，立晷不時，飲食不節，寒暑不調，使五臟六腑之氣怫鬱於內，以致陰陽乖錯，氣血凝滯而發也。亦有久服壯石，燥熱之藥，熱毒結深，而發爲癰疽也。夫此疾多生於膏梁富貴之人，以其平日所食肥膩炙煥，安坐不勞，嗜口慾無節，以致虛邪熱毒，內攻而成。

血而成也。癰者，壅也。大而高起，屬乎陽。六腑之氣所生也。其脈浮數，疽者，沮也。平而內發，屬乎陰。五臟之氣所成也。其脈沉數，瘡者，其總名也。癰者有頭，小瘡也。經云：諸痛痒瘡，皆屬心火。蓋心主血，而行氣。若氣血凝滯，夾心火之熱，而生癰瘡之類也。然所感有淺深，故所發有輕重。大小之不同也。六腑積熱，騰出於外。肌肉之間，其發暴甚。皮膚光軟，侵表廣大者，癰也。五臟風毒積熱，攻注於肌肉，其發猛惡。初生一頭，如痞瘻，白色，焦枯，觸之而痛，應心者，疽也。熱發於皮膚之間，是以浮腫，根小不過二三寸者，瘡也。夫癰生於六腑，若涼原之火，外潰肌肉。疽生於五臟，沉澱難療。若陶室之燧，內消骨髓。癰則易瘳，惟難消。而遲緩，疽則難瘳，而易瘻復。夫諸瘡之中，惟背疽疔瘡，最爲急証。其次莫如臍疽、腸疽、喉瘡之類，亦其急者也。至若瘰疬、癰瘡、瘻漏、諸瘡之類，其証可緩，而治也。夫癰疽之疾，須要察其是實，是虛，是冷，是熱，或或宜，或輕，對症用藥，無

失先後次序。凡人年四十已上，頭頂鬚頤、背脊腰腸或筋骨之上所視不見之處，稍有瘡癩，便不可輕易待之。若視之怠慢，以爲常疾，每是從微至頭喪命者多矣。便宜速急治之，庶幾得救。雖之救火初起，則易拔，至於燎原之勢，不可撲滅矣。其理亦由是也。凡瘡未破毒攻，服藥丁毫，辨藥斷不可用。若已破潰，臟腑既虛，飲食不進，一毫冷藥亦不可用。此是先後次第之要訣也。夫瘡有五善、七惡，不可不辨。若動息自寧，飲食知味，一善也；便利調匀，一善也；膿潰腫消，色鮮，不臭，二善也；神彩精明，語聲清朗，四善也；體氣和平，五善也。如煩躁時，歟腹痛渴甚，泄利無度，小便如淋，一惡也；膿血太泄，獄痛尤甚，臭惡難近，三惡也；喘急，短氣恍惚，嗜卧，三惡也。未潰先黑，久陷而青，客點便汚者，四惡也。項不使，四肢沉重，五惡也不能下食，服藥而嘔食，不知味，六惡也。聲嘶色脫，質幹青黑，面目四肢浮腫，七惡也。更有氣竇堵塞，咳逆身冷，自汗無時，目眩，耳聾恍惚，驚慄語言顛倒，皆是惡証，五善見三則善，十惡見四必危，五

善保至則吉而安。七惡全見必危而死矣。

審症處方訣

一凡大按乃痛者病深。小按便痛者病淺。按之處陷不復者無膿。按之處卽復者有膿。不復者可消。若按之都牽強者未有膿也。按之半軟者有膿也。又手按上下不熱者無膿。若熱甚者有膿。凡覺有膿急當破之。無膿但氣腫若有血慎之。慎之不可針破也。用諸拔毒之藥敷散四圍堅中軟者此爲有膿審也。一邊軟亦可有膿。都堅者此爲惡核或有氣也。都軟者此爲有血。血瘤也。當審鑿軟虛實爲要。若堅疽積久後若更變熱偏有軟處當軟處切不可針破也。軟疽者溫煖暴衣置之耳。若針灸刺破不可療也。

雜忌須知

一凡病時忌怒忌疑慮忌身體不潔人來看忌魚羊鵝肉燒酒麵食生冷瓜果醃物等物。瘡口愈百日後不作渴症者方可入房。

一凡一切癰疽瘡腫毒痛將好未好之時，如往有喪之家吊孝，并拜望等項，其瘡腫即復發切忌切忌。

用藥治法

一凡癰疽等項，太瘡毒初起一二三日內，卽服飛騰神駿膏。此藥治瘡初起，至將潰之際，俱可服。服後汗出，將惡毒盡皆發散，腫痛立消。其妙如此。若瘡已潰爛，勿服。如無神駿膏，初起卽服槐花酒或千金消毒散。二三劑，患處卽用灸法灸之。瘡初出，至七日內，皆可灸。七日外，不可灸。瘡未及灸，祕起，卽以葱塞鼻。或金蟾膏貼之，卽消。至四五月，腫痛未消，用芙蓉膏敷之，立効。敷之至六七月，作膿，將潰未潰之時，不得頂破。用替針丸，頻點瘡頭，自然皮破而出。膿瘡自消起至此，膿將出未出之際，卽服真人活命飲一二劑，漏下膿血。其瘡頭爛，用猪蹄湯洗淨，以三神膏擦之。內服子金內托散，以托毒，出外，間服蠶藥丸，以護肺膜。一藥相應，服之勿間不計。其數再看潰爛流膿不止，此氣血衰憊，脾胃虧損，肌肉

不生瘡不歎口用猪蹄湯洗淨將生肌散搽上外貼神異膏內服十全大補湯兼進八仙糕久服自愈好後再服加減八味丸可以絕根庶免再生若平日無瘡時首預服之尤爲防患於未然也以上治法俱要依次第而行未有不奏効者皆予百發百中之良法也。

○一論飛龍奔命丹乃外科惡毒第一方也。方見後諸瘡

○一論癰疽發背瘰疬鼠癧氣癰等症此專門之方其効捷如奔馬。

飛騰神駿膏

麻黃二兩去節取丁几角

杏仁四兩熱水泡去皮尖同搗碎去濁渣用清酒

地骨皮去骨淨四兩甘草四兩

木鼈子去殼十四箇

頭髮一大把溫水

燈草一大把

黑鉛一塊

右熬膏法不用柴燒用白炭五十斤用大銅鍋一口將前藥入鍋內注清水二三桶煮至五六分看藥水濃時藥渣濾起藥水另放缸注又將

○前渣入鍋內再入冰丁一桶又熒至五六分藥汁又注前形內如前法三次去渣將前二次汁并作一鍋熟至乾去黑鐵頭髮燈草三味不用被蓋出太汗爲度徐徐去被不可被風吹次早用猪蹄根食汗後以酒虛入以跑補之以復元氣好酒調服隨人酒量以醋爲度汗出立愈此治瘡毒初起至潰破時前後皆可服神妙

○一論凡人初創患癰疽發背已結未結赤熱腫痛卽用灸法先以紙裹其上立視後其紙先乾處卽是結疽頭處取大蒜去皮橫切三片不錢厚安在頭上用太炎炷於蒜上灸之三壯換一蒜片復灸痛者灸至不痛不痛灸至痛方止最要早覺早灸爲上方發一二百者十灸十愈三四日者亦七愈五六日者三四愈過七日則不可灸矣若有一數頭一處生者用大蒜搗成膏作餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦可若背上初發赤腫內有一粒黃如粟米者卽用獨蒜切片如前法灸之次日去痂膜

自漬矣。

○一論凡癰疽發背一切無名腫毒初起

葱蜜膏

生葱生蜜猪膽一箇傾石鉢內共搗成餅貼患處日換三四次卽消
金蟾膏 治症同前

生白芥末五錢加麝香一分取活蛤蟆一箇去腸肚同搗爛如泥四
圍留頂出氣不過一夜卽愈

○一論發背及一切疔腫毒不問已成未成但燙痛者

槐花酒

○一論癰疽發背無名腫毒疼痛醫所不詳初起壯盛人宜
黑豆牽牛各一兩搗碎好酒一碗煎八分飲一宿次日溫服本便下

膿血卽愈

○一論初起一切惡瘡毒腫疼痛丹瘤瘰疬疔腫魚口。五發癰疽初覺二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體疼痛四肢沉重恍惚亂坐卧不寧皮膚壯熱大便閉結小便赤澁等証並治妊娠勿服

千金消毒散

連翹二錢

黃芩一錢

赤芍一錢

當歸尾一錢

金銀花分一錢五

皂角刺一錢

天花粉一錢

牡蠣一錢

麻黃一錢

防風一錢

大黃一錢

芒硝一錢

○右剉丁剝酒水各半煎服。

○一論腸癰便毒疔腫癰疽初起卽消已腫卽潰血從大便中出瘡肉後勿服。

加減真人活命飲

又名千金內消散

當歸尾酒洗一

五分

赤芍一錢

白芷一錢

木鼈子去殼一錢

穿山甲三

大片

炒金銀花三錢

皂角刺一錢

白僵蠅一錢

瓜萎仁

去殼一錢

天花粉一錢

乳香一錢

沒藥五分

大黃

三錢

甘草節五分

右剉一劑水酒煎服

○一論癰疽發背腫痛如錐劄不可忍者登時痛止。

芙蓉膏

芙蓉菜

黃荊子各等分爲末

右二味入石臼內搗極爛用雞子清調敷患處，背項如烟起此方用在未潰之先或將潰之際。
○一治癰疽發背已潰爛者。

三神膏

草麻子仁一合

陳醋一大碗

鹽一撮

右三味置鍋中用槐條攏成膏先將猪蹄湯洗淨或米泔水洗淨用鷄翎續續掃上其皮卽皺其肉卽生。

○一論諸瘡惡毒發背癰疽痛不可忍者此藥能衛護內膜驅解諸毒自然內消。

加味蠟礬丸

黃蠟一兩

枯白礬一兩

乳香一錢

沒藥一錢

雄黃二錢

右爲細末用蠟鎔化爲丸朱砂爲衣如梧子大每服五十丸視瘡上下密水送下。

○一論瘡疽瘍瘻皆由氣血凝滯風毒壅結此藥發散外邪流行氣血排膿止痛生肌長肉之劑當用於五六日間已潰未潰而作痛者宜服之加味千金內托散

黃芪益水炒人參

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

白芷

防風

川厚朴

姜炒

桔梗

官桂

瓜蔞仁去殼金銀花

甘草節

右剉每服一兩水煎入好酒半盞去渣溫服日進二三服之後瘡口有黑血出者及有汙出此藥之功也不問証候猛惡未成者自散已成者卽潰矣○痛甚加乳香沒藥倍當歸芍藥

○一論癰疽潰後須當大補氣血和脾胃托毒外出實爲切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令醫者當鑑類而長之可也或見腫平痛寢遂以爲安漫不知省無補接調養之功愈後虛証復見因而轉爲他病而危劇者多矣。

收功萬全湯

黃芪蜜水炒一錢
當歸身五分
官桂三分
川芎七分
白芷三分
陳皮五分
甘草三分

白朮去蘆炒一錢
白芍酒炒七分
懷熟地黃一錢

防風五分

右剉一劑生薑

一斤水煎溫服

如作渴加麥門冬五味子○如煩躁

加生薑

加生地黃麥門冬。如有痰加薑或半夏。如泄瀉加厚朴薑炒。如小便不利加澤瀉。如怔忡不寐加遠志酸棗仁炒。如胸膈不寬加厚朴薑炒山楂肉。

右方治癰疽發背諸瘡毒潰爛後毒氣已盡氣血虛弱不長肌肉不合。丘膿清熱作餘症者宜之。

○一論患癰疽發背出膿後脾胃虧損不思飲食或嘔吐泄瀉四肢沉困無力者。

八仙糕

人參去蘆四兩

白茯苓去皮四兩

乾山藥四兩

芡實去壳四兩

蓮肉去心四兩

不油白朮去蘆米此後四兩

白糖霜一斤半

白粳米二升水淘淨磨極細末

右將藥末米粉糖霜和處搓揉極勻篩放籠內竹刀劃成小片蒸熟入鍋再焙乾任意食之。

斂瘡止痛生肌散

官粉火候一錢黃色

黃柏一錢

黃連

乳香

沒藥一錢孩兒茶各五分

右爲末，擦瘡上，并治下疳。黃水熱泡等瘡。
○一論癰疽發背，潰爛便要此湯溫洗。

猪蹄湯

當歸

赤芍

白芷

羌活

露蜂房

生甘草各五錢

一方加黃芩

右細剉看瘡大小，用藥如瘡大，加料用之。先將猪前蹄兩隻一斤，只
用白水三升煮軟，將汁分爲兩次，擦去上面油花，并下面皮肉，每次用
藥一兩投於汁中，再用文武火煎十數沸去渣，以故帛蘸藥湯溫溫徐
徐薄揩瘡上，死肉惡血隨洗而下，淨洗訖，以布帛拭乾，貼膏藥，仍避風

忌人用氣吹之，有胡臭入，并月經見行婦人及猫犬並不許入病人房內洗瘡切勿以手觸着。

○一論一切惡瘡癰道發背等症。此藥能追毒去死肉，有腹無頭，用此點頭上自然皮破出膿。

替針丸

人言爲宋人錦內上益明藥燒不響爲度一錢

硇砂五分

巴豆十粒

乳香三分

沒藥三分

白雄丁香七分

右爲細末，熬糊爲丸如豆大，用時以溫水磨化，頻點瘡頭上，神効。

替針散

用木鼈子川烏二味磨水以鷄翎蘸掃瘡上，留口大一處，出膿如漿水乾再刷上，不一時即穿。

○一論治癰疽發背癰項發脳等太毒，不拘已潰未潰俱用此敷貼如膿

毒未潰通敷自消。如已潰將此敷周圍腫掀之處其破口處以神異膏貼之。每日換兩三次不許見風神効。

三合消毒散

文蛤搗碎炒黑色爲末三兩六錢

輕粉研三錢

黃柏去皮蜜炙爲末寒水石煅爲末一兩

右末合爲一處用新涼水一半蜂蜜一半調令不稀不稠如瘡毒尚未
開將腫處遍敷之用綿紙覆手心但乾卽以水掃之朝夕更換二次如
夏月或午時再換一次亦可若已破將此藥敷于周圍掀腫處正有膜
破口處用神異膏滿貼之不必留口亦一日三換。

一論癰疽發背潰爛久不生肌肉用此立効但此方用之不可太早。
合口收功散

血竭二錢

乳香

沒藥

輕粉

龍骨各一錢

赤石脂二錢

朱砂

海螵蛸各五分

右共爲細末散，在膏上即生膚肉。

○一論，痘頭發背，諸處不癰，已成已膿，未溃者皆可用之。發毒甚者，日換兩三次，中毒換一次。其藥力方能勝。若諸毒潰後，不長肌肉，不合口，惟神効。

神異膏

當歸尾五錢

川芎五錢

赤芍二錢

生地黃四錢

防風五錢

羌活五錢

白芷五錢

玄參五錢

黃芪五錢

官桂三錢

桃仁四十个

杏仁四十五個

木蠶子十四箇

何首烏三錢

牛蒡子五錢

穿山甲四錢

露蜂房三錢

蛇退二錢

大黃二錢

黃柏二錢

亂髮男者一團
如婦子大把

抑枝四十九節，每長一寸

右用花生油二斤，四兩將藥入鍋內，熬春、夏、秋、冬十日，以穿繩，文武火煎油，墨色以穿山甲片起墨，爲底，續油，去渣，熬油滴七成冰。

薩續下黃丹十四兩柳條攬不住手成輪轉硬得所再下乳香沒各
三錢與蝎三錢降真香末三錢次冷定下射香末二錢水浸三百去
火性攬用。

○一論癰疽瘡瘍。發後及將痊口乾渴甚舌或生黃及未發先渴此腎水
枯竭不能上潤以致心火上炎水火不能統濟故心煩棄作渴小便頻
數或有濁陽痰飲食不動脾虛泄利或腰腹先瘦服此以生腎水陰
心火諸症頓止及治口舌生瘡不繼。

加減八味丸

懷生地黃八兩好酒拌砂糖內蒸半日搗膏

山藥一兩

桂心去皮五錢

石棗淨肉四兩酒蒸搗膏

澤瀉切片蒸燥乾

白茯苓去皮各五錢

遼五味子二吊五錢

牡丹皮五錢

右爲末入二膏加陳蜜少許丸如梧子大每服六十七丸等、空心

○凡人久服加減八味丸，必服之而多子。摩本此不生癰疽，亦不患消渴等症。

○一患癰疽之人，雖云有熱，皆因虛而得之，愈後發渴。及先渴而發癰疽，非八味丸不能治。

○一人病癰疽多，有愈發發，而不救者，治之惟八味丸，最妙。疽安而渴者，服此則渴止。疽安而未渴者，預服此丸，則永不生渴。氣血壯盛或未癰而先發渴者，服此不惟渴止，症亦不作。

○一人平日口乾作渴，因飲酒食，炙燭，房勞，心君火類，過多致之。腎水枯竭，不能上制心火，故有此症。後必有癰疽也。宜先服八味丸，以絕其源，及癰疽後服此丸，尤有益也。

○一論癰疽發背，諸瘡出膿潰爛，日久不愈，飲食少思，身體倦怠，口舌乾燥，或寒熱往來，驚悸少睡，以補中益氣湯去柴胡，加荅木、麥門冬、神曲五味、黃柏、少腫加炒酸棗仁、滑肉生透加白薇一錢、肉桂五分，如癰多或

清倍加參芪歸木

○一加味十全大補湯治癰疽，潰後補氣血，進飲食實爲切要。凡膿血出多，陰陽兩虛，此藥有回生起死之功，但不分經絡，不按時令，而長之可也。或見腫平痛寃，遂以爲安，漫不知省，無補接調養之功，愈後虛症復見，因而轉爲他病，而危劇者多矣。

附骨疽

丹溪曰：附骨疽者，皆因久得厚味及勞役，與酒後涉水，得此陽滯於陰之証也。又曰：環跳穴痛不止，生附骨疽，以蒼朮爲君，佐以黃柏之平行，以毒皮、冬加桂枝，夏加條芩，體虛者加杜仲牛膝，以生甘草爲佐，作木料煎，入薑湯飲前飲之。痛甚者，先煎藥十數劑，發不動，少加麝薰丁，刺又不動者，恐疽將成，急掘地坑以火燬坑，通紅次以小便浸其瘡，亦可坐于坑中以廣，或綿衣圍包下體，使熱氣宣發，則可也。

○一論癰生腿筋側或因寒濕得附骨疽於足少陽經分筋侵足陽明經堅破慢腫行步作痛或不能行

內托黃芪湯

柴胡

連翹

肉桂

大力子

黃芪

當歸尾

黃柏

升麻

白芷

甘草各八分

右剉一劑水酒各一盞煎至一盞食前溫服。

○一治附骨疽

黃連消毒飲

羌活各一錢黃芩

黃柏

藁本

防已

桔梗

歸尾各五分生地黃

知母

獨活

防風

連翹各四分黃芪

澤瀉各二分

甘草

陳皮各三分蘇水

澤瀉各二分

右十九味切作一劑水煎服。老人年七十因寒濕地氣得附骨疽于

左腿外側少陽膽經之分微侵足陽明經分潤六七寸長一小尺繫硬慢腫不辨肉色皮澤但行步作痛以指按至竇大痛與此藥一服即止次日堅軟腫消而愈

○一論頑瘡惡毒年久不愈多有附骨在內先用貝母濃煎湯洗淨刮去膚肉用刀撥去附骨或用蛻蟬腦子五六箇搗爛敷上其骨即出然後用大言五厘研細末入黃銅燈蕊內用好醋一小鍾慢火熬乾收起過三日卽生出銅線來研極細用雞翎蘸藥搗瘡上即痛出水膚肉去淨然後用後藥

珍珠象牙膏 楚黃膏江傳

珍珠胡豆膚研細切薄片將熟燒在內兩斤合生蠔定入水煮三炷
象牙末一錢 天花粉末五分官粉末一錢 白堊一錢

香油五錢

右共合十處入碎內重湯煮化濾成膏藥貼瘡神效

○一治諸瘡大疼痛不辨肉色漫腫光色名曰附骨瘡。治瘡由久不愈酒調服燒灰略存性。

二生散

露蜂房

蛇蛻

亂髮洗淨各等分

右三味燒灰存性研末酒調服一錢上

腰癰

丹溪曰腰癰者，腎居小腹之後，任下之陰中之陰道也。位傍離曰太陽，多血，然氣運不到，血亦半來中年後尤慮患此。總有腫癰癥之脉症，但見虛弱便與滋補，氣可保終，若無滋補之功，其禍多在結癰之後，或半年以來，乃病多致尖手慎之慎之。

○一論足太陽經中左右尺脉俱緊，按之無力，尻脣生癰，堅硬腫痛大作，內托羌活湯。

羌活

黃柏

酒炒各一錢
防風

藁本

歸尾

各一錢

黃芪

錢五

蒼术

米泔水

陳皮

甘草

炙各五分

肉桂

三分

連翹

右剉下剝酒水同煎。心溫服以衣覆蓋患處。使藥力行。常不可更衣。

腸癰

丹溪曰：腸癰當作濕熱積治。不風難治。

子金謂：腸癰妄治必殺人。其病小腹重強。按之則痛。小便如流。時時停汗。此復惡寒。身皮甲錯。肚腹緊急如脹之狀。脉數指微。有膿也。果矣。洪數已。有膿脉若連繫者。未有膿甚者。腹脹大轉側。有水聲。或透脅生瘡。或膿自膚出。或大便腹血急。服蠟參丸酒下兼進後方。

○一論腸癰便毒癰疽。初起卽消。已腫。卽潰。血從太便中出。宜

千金內消散。方見癰疽。即加減真人活命飲。

○一論肚內生癰及癰道惡毒宜
內消沃雪湯

當歸身

白芍

黃芪

甘草節

麝香

連翹

香白芷

貝母

陳皮

乳香

沒藥

穿山甲

天花粉

金銀花

右剉酒水煎服。秘方是世所奇授之妙神。

○一論腸痙腹痛不安，或腹滿不食，小便赤。婦人產後虛熱多有此疾。但
婦忽間便不服，服亦無害。視其右闊脉花者是也。

薏苡仁二兩

牡丹皮一兩半

瓜萎仁一兩

右剉一兩水煎服。○丁左加川芎桃仁。

○一婦人腹痛如錐劄，每痛至死，不敢着手。六脉洪數，此腸痙也。用
穿山甲炒白芷

貝母

殼蠶

大黃

右剉一木剉水煎服，打下腹血，有小便中出即愈。後每無此宜少服。

炒熟勿生。

○一治腸癰日久，潰爛出膿，腹內刺痛，不可忍者。

用鐵折丁尺長，三稜針打鴨腸一條貫針，在內捲鴨腸曲轉，繫住入糞門內，送到瘻處方是瘻瘍之處，即將鴨腸扯動，針尖出刺，其瘻膜隨針而出，用手重按，痛處膿出盡而愈。此仙傳秘法也。

裹瘻

丹溪曰：瘻瘍者，濕熱下注也。有作腹者，此濁氣順下，將流入滲道，則陰道或處水道不利，而然腹盡自安，不藥可也。惟在善於調攝，又每因之壅，流注入瘻，甚而瘻目裂開，等丸懸根，水出以消炎，未數日死。以示蘇葉包裹，仰臥之。

○一益瘻疽入糞者，當沿數尺，悉由濕熱入肝經處治而用，補陰藥尤妙。

足形積皮脫翠尤懸者皆不死。

○丁方用野紫蘇葉面青背紅者是也。焙乾爲末，如蠶以香油調敷
瘡脫無皮者，外以青荷葉包之，其皮自生。



○一論懸瘡此瘡生於竇道外歸之間，初發甚瘡狀如松子四十日赤腫如
桔核，治過則破而木小便皆從此出，不可治矣。

國老湯

用橫紋大甘草二兩，截長二寸許，取出山潤串流水一斤，不用芥末
河水以甘草蘸水，水武火慢煮不可急性，須用三兩久水，搗爲末，剪
視，草中潤透却以無灰酒二碗，熬至一盞，溫服一百服半月，准驗方

將軍散

大黃殼

貝母去心

白芷

甘草節各半

右爲米酒調空心服。虛弱加酒歸丁半。

○一論肝經濕熱玉蓮患癥或便妄懲難養潤滑或潰爛作痛小便澀滯或壅蒙腰背

龍膽瀉肝湯

龍膽草酒甘草拌炒溼瀉各一錢

車前子炒

木通

生地黃酒洗

當歸尾酒洗

山梔炒

黃芩炒

甘草各五分

右剉水煎空心服

瘰癧

瘰癧偶血氣瘀熱必起於少陽一經。不守禁忌延及陽明。太過食慾過度
鬱氣之積曰風。日熱皆此一端。柘引變換須分虛實。實者易治。虛者固
處。此其屬膽經。主次斷有相人。且氣多血少。婦人見此。其月經愆期。不

○作寒熱者易治。積火轉爲潮熱，危矣。自非斷然仙流，神仙不治也。

○一論瘰疬者，經所謂結核是也。或在耳前後，及頤領下，連缺盆，骨髓為瘰疬，或在胸前及胸之側，下連兩腋，皆爲馬力半足，少陽主之，獨形而小者，爲結核，續數連結者，爲瘰疬形長，如線者，爲馬力也。

○一論選項起核，名曰蟠蛇癰，延及胸前，連腋下者，名曰瓜藤癰。左耳根腫核者，名曰惠袋癰。右耳根腫核者，名曰蜂窩癰。

○一論瘰疬馬力生耳前後，或項下胸腋間，累累如珠者，未破已破者，治消毒化堅湯。

當歸一錢

白芍六分

黃芪一錢

玄參六分

天花粉六分

連翹一錢五分

柴胡一錢

黃芩五分

牛蒡子七分

龍膽草四分

升麻七分

桔梗一錢

陳皮八分

羌活七分

薄荷四分

海昆布七分

甘草四分

右剉丁剗生薑煎服。一方加甘草節知母貝母海藻更佳。

升陽調經丸

升麻八錢

葛根五錢

芍藥三錢煨

連翹五錢

黃連五錢

黃芩酒炒五錢

生黃芩四錢

黃柏酒炒五錢

桔梗五錢

歸尾三錢

三棱酒炒五錢

莪朮酒炒五錢

草龍膽酒洗五錢

夏枯草五錢

甘草炙五錢

○右藥秤一半另研爲末，煉蜜爲丸。如豆大。每服一百二十丸。白湯下。一半作咀片。每服五錢水煎服。半月即痊。

○一論久患癰疽流注，以致氣血兩虛，懷抱抑郁，飲食少思，或四肢患瘡，肉色不變，或日晡發熱，或潰而不癥，久不愈者。

益氣養榮湯

黃芪多

人參

白朮

去蘆炒各當歸酒洗
一錢五分

川芎

白芍炒黃

棟生地黃

陳皮

香附

桔梗

貝母各一錢

柴胡

地骨皮

甘草各五分

○右剉下劑水煎食。遠服。○如氣痰加橘紅。○如腸下刺痛加青皮或木香。○如午後有熱或頭微眩加黃柏炒。○如腹水滯停人參黃芪當歸。○如女人有鬱氣胸膈不利倍香附貝母。○如月經不調加牡丹皮當歸。○一論癥瘕兼諸癥皆治。

抑氣內消散

當歸

川芎

白芍炒

白术去蒼炒

青皮去穢

白芷

半夏姜炒

陳皮

桔梗

羌活

獨活

厚朴姜炒

防風

黃芩

烏藥

香附

樟榔各一兩

蘇子一兩五錢沉香三錢

木香

人參

粉草各五錢

右剉水煎。溫服十餘服即消。若再發照分兩製爲末。酒糊爲丸。如梧子大。每服五十丸。酒送下。

○一論瘻癰未破。在左爲瘻癰。宜

內消調經散。山東李西嶺傳。

升麻八分

葛根

龍膽草

黃連

桔梗

連翹

黃芩

黃柏

莪术

三稜

甘草各五分。當歸尾

白芍各三分

加柴胡四分。

右剉水煎服。稍虛加夏枯草。有癰加天花粉知母各五分。○少陽。

○一論在右。名馬刀瘻。未破宜。

柴胡通經湯

柴胡

連翹

歸尾

甘草

黃芩

紫苑子

二稜

桔梗各二分。遠志五分

紅花

右剉丁剉水煎服

○一論癰瘍已破者

補中勝毒湯

黃芪一錢

人參三分

甘草五分

當歸

生地黃

熟地黃

白芍各三分

陳皮三分

柴胡各五分

連翹一錢

防風五分

升麻

右剉水煎服。

○一治瘰疬并頸項結核。或腫或痛。宜夏枯草水煎食後頓服。

○一方用夏枯草一捆水煎三次去渣熬成膏貼患處立消。

○一治瘰疬元氣無虧。用此以去之。若瘰既去而不收斂。服前益氣養榮湯。若元氣怯弱。宜先補後服。瘰毒已後仍服。則湯庶無他疾。此方治瘰瘡未成者。消已潰者。效須元氣壯者可服。

必效散

南硼砂二錢半輕粉一錢

射香五分

巴豆五箇去皮心膜

白檳榔一箇

斑蝥四十枚去頭足翅搗米炒熟去米

右研極細末取雞子二箇去黃用清調藥仍入壳內以濕紙收重糊口
入板龜壳臍取肉曬乾爲末每服五分用炒生薑酒五更初調服如符
小腹痛用益元散一服其毒俱從大便出

○一治遠年鼠癰瘍神方

千槌綠雲膏

松香半斤溶七次瀝去渣

乳香二錢半

沒藥一錢半

血竭一錢

銅綠一錢半

杏仁去皮一錢

孩兒茶三分

草麻子去殼半錢半

麻油二兩

乳汁二盞

○右爲細末合作一處同乳汁油攪勻搗千下成膏用紙上藥貼患處
○一婦人患癰瘍久而不發或以爲水蛭之症不宜於春預用散肺消腫
湯解破瘀血余以爲肝經虧損用六味九補中益氣湯逐日而愈此症

若肝經風火自病，元氣無處可用，散聚虧損之劑，若肝自靜，則木生，不用六味丸，若金來，耗水須補脾土，生腎水，若行亥戌，肺脾胃陰虛，反致木耗土矣。

○一婦人項移腫，初急，其氣虛，虛者，先以少火散一服去之，更以益氣養榮湯三十餘劑，補之而消盡。此症初起，而真氣虛弱，當先用益氣養榮湯，待其氣血稍充，乃用少火散，以去其毒，仍用補氣藥，不致勞若已成癓者，即針而補托之，氣血復而核不消者，服散之劑，尚不虛而無益，如故仍以少火散養榮湯，又不應矣。凡大病偶一失，用平逆藥，寒熱兼愈，若氣血虛實不用追蝕，亦能自癒，用藥以處之，苟便易外收效耳，若血虛而用追蝕，不惟無益，適以取敗，凡不慎飲食，情有不治。

疔瘡

夫疔瘡者，由四時寒熱陰陽之變，此土氣互相擊盜，遂成聚氣，然聚氣卒

然大風木移木寒大熱若不能避而屢見於皮膚入於肌膚傳注經絡遂使腠理結滿陰陽一氣不得宣通遂成疽癰但疽癰之名有十種必發於手足間生黃泡其中或紫色有一帶紅線直入者用針於線處刺去毒血水銚時以細痛出血為妙否則紅線入腹攻心必致危也凡治疗毒先以麯蘖水飲之吐則是不吐則非也太抵脉搏而致者難愈也

○一治疔瘡惡毒神效

飛龍奪命丹赤見諸醫

○一治疗腫及無名瘡毒搘頭去白水以葱密鴉貼神效

○一論無名腫毒疔瘡手指無故生蛇頭指腫痛不可忍有紅筋入心者

蜈蚣二條

歸尾二錢

雄黃一錢

土赤芍二錢

白芷稍二錢

右剉爲末。酒浸服神效

初見者

趙府小寧丹

乳香

沒藥

輕粉

血竭

朱砂

川烏尖

草烏尖

細辛

巴豆霜

蟾酥

麝香減半

草烏尖

細辛

巴豆霜

蟾酥

○一論一切癰毒疔瘡諸般無名腫毒及因時傷風外寒增寒壯熱等症
右爲細末糊米糊爲丸如黃米大雄黃爲衣紙服止丸小兒五七丸
用葱白三根劈開入丸在內細嚼好酒送下以被蓋出汗避風婦人有
孕不可服

類聖散

川烏

草烏

蒼朮

細辛

白芷

薄荷

防風

甘草各五錢

右爲細末，雞清調金走處，卻頭
一尺，起疔瘡癰疽，此藥能令肉消盡，化爲黑水，從小便出，萬無
一失，不可輕視。

知母

貝母

白芨

半夏

天花粉

皂角刺

金銀花

穿山甲炒

乳香各一錢

○右剉丁，用無灰酒一碗，煎至半碗，去渣，只作一服。溫服，不得加熱，再
將渣搗爛，加秋過芙蓉葉二兩，搗爛，同蜜，調井花水和敷瘡口上，如萬
毒用蜜水潤過，一宿自然消，不必用第二服藥也。忌發物。
○一人脚面生疔形，雖如粟，其毒甚大，宜峻利之藥攻之。因其快，以蒜
灸五十餘壯，疔遂止。再發片時，乃知痛，更用膏藥封貼，再以人參敗
毒散，漸愈。夫至陰之下，道遠位隔，且怯弱之人，用峻利之劑，則勢力未
到，胃氣先傷，虛羸之病，有所不免。不如參之爲宜。

便毒

便毒一名躡馬癰。此竒經衝任爲病，而癰見於厥陰經之分野。其經多血，又名血癰。或先有瘡瘍而發，或卒然起核，疼痛而發，背熱發血聚而成也。初發宜疎刺之，卽散。或臘後如鴨川，托裏內補之藥。

○一論便毒是厥陰經濕熱因勞倦而發。用射干三子以聖丸煎食前服。得利二三行立效。射干開紫花者佳。

○一論便毒極力方

追毒散

當歸尾

赤芍

白芷

金銀花

天花粉各一錢。白姜炭炒六枚。木鼈子十箇。川山甲三片。

大黃三錢

芒硝二錢

丁香加五靈脂更妙。

壽世保元

壬集九卷

二十

右剉丁刺好酒煎露一宿五更趁服原發汗利一二行卽愈其硝黃
待群癩煎將熟方入再三沸用之○丁方加射干去苦硝

○一論急口便毒方

神異散

金銀花

天花粉

木鼈子各二錢甘草三分

連翹

黃芩各八分

山楂子七分川山甲炒二錢

皂角刺三錢

木香五分

大黃三錢

右剉丁刺酒水煎空心服

○一治便毒腫痛神方 徐完學傳

大黃

全蝎

蟬退

苦參

穿山甲土炒成白芷梢

貝母

當歸尾各二錢

右剉丁帖水煎後加入本草搗爛丁沸去沫入好生酒上火不
加鹽鰲丁條同煎服

○一治魚白瘡方

用豬腰子一枚，炒熟酒一碗，溫服，即內消入。

○一治魚肚便毒方

木鳖子去壳三巴豆去壳火燒二錢川山甲四片炒姜參三箇

五倍子五箇

右爲米黃酒調下。

○一治魚肚便毒方

陳雲岳傳

姜參炒三十六

川山甲土炒三錢

蜈蚣二條

甘草節一錢

大黃三錢

杏仁去皮尖一錢

五靈脂二錢

金竭一箇

皂角子炒一錢

金銀花一錢

右剉丁，剝酒水各半煎服。

下疳

下疳瘡乃男子玉莖生瘡皆因所欲不遂或交接不潔以致邪毒浸淫而
成瘡毒日久不愈或成便毒或損陽物多致危篤又魚口瘡如精瘡
皆其類也俗云疳瘡未已便毒復來生也。

姑精瘡此蓋因婦人陰中先有宿精因而交媾虛無竊食既成此病初發
在陰頭如粟類拂之痛甚兩目赤濶脹作目孔触之大痛婦人有生於
玉門內正似疳瘡不痛爲異耳。

消疳敗毒散專治下疳瘡

防風六分 獨活六分 柴胡一錢五分連翹七分
荆芥七分 黃柏八分 知母七分 黃連七分
赤芍九分 蒼朮七分 赤茯苓九分 木通九分

龍膽草九分 甘草三分

右剉丁剉燈心二十四寸水煎空心服如有便毒者入麝香加太黃一
二錢煎服

○一治下疳瘡

天靈蓋

紅蟳

小紅棗各燒存性各等分

右爲粗細末先用好細茶煎濃洗淨擦之
一治下疳痛不可忍如神

官粉

取五錢

水片二分

水銀三分用錫三分裹

右爲細末擦瘡上

一治下疳潰爛

珍珠

燒存性

片腦各一分

人手指甲

足指甲燒成灰各一分

右爲細末擦患處

一薰下疳方

皮硝一碗

乳香

雄黃

孩兒茶各五分

右入小鍋內外用牛糞火燶熱燶其硝自化薰之晚上使以心口涼

○一治陰頭上瘡

何和宁傳

五倍子

燒灰存性七分

朱砂

七分

孩兒茶

五分

冰片

半分

輕粉

二分五厘

水銀

一分

右共爲細末撒患處

○如從一邊爛起加狗骨燒灰二分

○如從週圍

爛起加僵蠅燒灰二分

○一治瘡瘍秘方

八寶丹

乳香

沒藥

孩兒茶

紅褐色灰

海巴培一箇

珍珠炒

象牙根

龍骨煅各五分

右爲細末先用米泔水洗瘡拭乾搽上

神效

○一癰瘡膿清不結痂不合口久不愈者用

六味地黃丸加黃柏知母麥門冬四五劑而愈

○一治下疳瘡

陳鍾岳傳

水片二分

珍珠另研三錢

黃柏

以生者爲上，火炙者爲次，鹽水炙者爲第三，各一錢

蘆薈一分

輕粉炒三分

天靈蓋

火煅白色一分

右共研細末，擦患處，如有發香油調搽。

○治瘡瘍

黃柏去皮，以豬臍炙透，爲末，擦瘍上。

○治陰癰上生瘡

用甘草煎水溫洗，却用麻茶末敷之。

○治陰頭生瘡

用溪港中螺蛳，入乾鍋內，煨過，先以鹽水洗五七次，後以此藥燒之。

○治婦精瘍

用大田螺兩箇，打破，煅過，存性，爲末，入輕粉，熬之。

○治外腎生瘡

用荊豆粉一斤，蚯蚓屎二十分水，研末，乾，又熬。

○一治腎臟風發瘡疥

用紅椒去目水浸半日，和生杏仁研爛擦兩手掌，擦外腎極妙。一治下部生濕瘡，熱而痛，寒熱太小便澁食，亦減身面微腫。馬齒莧四兩研爛入青黛一兩，再研少點上。

○一治下疳瘡

白朮一兩

黃丹八錢熟蜜紫色

右研爲細末，以潔渠中惡水洗過拭乾敷上。

○一治蠅燭發神方

鍾乳石二分 朱砂三分 珍珠三分 琥珀一分五厘

片腦一分五厘

右爲細末，每用土茯苓四兩，豬蹄一隻，煎水三碗，早間服半碗，調前藥末四厘，午間服半碗，調藥末四厘，午夜服半碗，調藥末四厘，次日服三次，共二分二厘，十日服盡，其瘡必愈。其猪蹄隨用之，忌動火，存物半

肉燒酒最良之神藥之秘方也

楊梅瘡

夫鴟瘡者，一名楊梅瘡。因形相似，乃氣受之，故堅實凸起，又名繡花瘡。並受之其形扁窄而潰，又名累子瘡。亦類其像，而俗呼之也。北人曰：不治瘡者，一名異，而實同源。治療當別。自致者，重傳者，輕益自致者必謂淫慾太甚，以至陰處起火，及繼口次味，三焦皆熱，精竭血結，遺滯諸經而成者也。俗傳以母猪大羊肉雞鰐等物，發出謂毒蟲，殊不知在火上添油矣。又有怕露，而求速効者，追服敗毒散，則傷五內，力氣盡，歸伏以築線，薰消致使出，不得收，不能延遺，不得杜絕，手足心皮皆似白鵝掌風，及後筋骨疼痛，風塊惡候皆未獲良治，而然也。凡遇此，思托裏解毒湯外，用千里光明湯，頸項洗浴，大功。

托裏解毒湯

當歸

一錢五分

川芎

一錢

赤芍

一錢五分

生地黃

一錢

連翹

一錢

黃芩

一錢

黃連

一錢酒炒

防風

一錢

荆芥穗

七分

苦參

酒炒二錢

羌活

一錢

防風

一錢

皂角子

二十
角子

防已

一錢

木瓜

五分

生甘草

三分

土茯苓

二兩溫者四兩

右剉水二碗煎一碗溫服。痘瘡服。○虛弱人加入參一錢，自生者加黃柏一錢川牛膝一錢川獨活一錢宜服三十帖每帖煎三次。百服一帖。

服一帖。

千里光明湯

青木香

黃連

荆芥

苦參

升麻

麻黃

甘草各五錢

雞腸草

倍

東青柴

倍

右作一劑用布包水竟於舞風處服下前藥即以此湯浴洗涼了又加

水

水

水

水

水

水

水

蒼耳子

蛇床子

羌活

防風

水

水

水

水

水

熱藥湯，燒着實燒，微注拭乾，日後不必頻洗。燒法，并入前藥，再洗雞腸草。一名千里光明草，又名九里明，俗名馨芳草。其葉稍大，而岐間花白色處處有之。

○一治楊梅發初起，先服防風通聖散十錢，後服此方，勿舞拳頭。
才全丹 雲來弟驗

雄黃

朱砂

乳香

沒藥

孩兒茶

當歸

白芷

丁香

梔角各一錢

輕粉

用花椒一錢，熟水調成膏，入白粉

右爲細末，飯爲丸，如梧豆大，每服三十丸，王孫全處方。

○一治楊梅癰，先服防風通聖散，加紫草二兩，同研服後，敷此。

白蘇皮

二兩

鬼角子

一百二十粒

防風

二兩

細辛

一兩三錢

川烏

二兩

麝藥粉

四兩

右剉十劑，每劑用土茯苓一斤，豬肉半斤，同煎服。

卷之十一

三十六方

二三

杏仁二十箇

金銀花一兩五錢

連翹四兩

金銀花四兩

芍草二兩

黃芩川傳

蟬退二十一箇

肥珠子三十箇

令飯圓一斤

杏仁二十一箇

右俱剉用酒拌炒上帖水煎服

○一治楊梅發毒

黃仲溪傳

青藤二兩

當歸尾二兩

皂角刺二兩

金銀花一兩五錢

五加皮一兩

白蘿皮二兩

右剉分作十二劑每劑用生茯苓四兩水煎服先服通聖散

○一治楊梅瘡

南塘經驗

漢防已七錢

梔花二錢

五倍子四錢

右三味搗末用生熟各半斤研爛豬肉半斤切碎共作一服用鴻鵠

通濟丹內通服

○一治楊梅瘡

胡璽發傳

歸尾

一兩三錢

牛膝

一兩三錢

黃芩

一兩三錢

水汎

一兩

金銀花

一兩三錢

皂角刺

八錢

瞿退

五錢

土茯苓

二斤

右剉分作十帖每帖用紅棗白果皂角子各十枚涼白三塊水煎服之

○治天泡瘡神方

用鐵秀鉆頭磨湯擦瘡上立已

○一論凡人患楊梅天泡棉花箭瘡針灸成一切難狀之疾或楊梅瘡見骨經年不收口者或筋骨疼癰聚發無時或遍身疙瘩不消或手足後破出血或氣血起皮破膿如丁脣瘡一層或赤綫白癧狐掌風癩或皮好骨爛口臭腎及年久腰痛不愈一切望養恩好並皆神功

通仙五寶丹

鍾乳粉三分

大朱砂一

分五

琥珀一分五厘

冰片一分五厘

水片一分五厘

珍珠一分五厘

右爲細末，用白飛麪炒三分，共一錢二分，分作十二帖。每百日一帖。用土茯苓一斤水煎十碗，每碗分作十二碗，和服其十二碗。俱要吃盡，不可別用茶湯。丁日一服，有不善病而愈者，有發癰而愈者。如病重未愈，須再服一料。忌雞鵝魚牛羊發物及房勞。

○一治楊梅風塊，作腫作痛，及瘡疽癰癧，一切無名腫毒。

煎虎骨

芍藥四兩

南星二兩

半夏二兩

五味子

三兩同上
五味子五錢

大黃一兩

黃柏一兩

姜黃一兩

乾生姜

五錢

右各爲細末，共和勻，用熟米泔調成膏，貼背上，時常以熟醋潤之，勿令乾燥。其背丁日又取下，加些新的，復研再貼，以消癰毒。

○一治楊梅瘡，愈後遺癰毒一層，丁層頑皮，不可當。

牛油

香油

柏油

黃蠟

一兩共三錢

銀砂一錢 五分官粉二錢

麝香五分

右爲末，入內攪勻。先將火燒通心洋，打破擦上藥，再燒再擦如神。○一治楊梅瘡，不論遠近，先服防風通聖散十數劑，後服此丸，收功神妙。

輕粉一錢

孩兒茶一錢

糯米飯一錢

芝麻一錢

右共搗成丸，作一百粒。每早空腹，吞下十九粒，臨晚再搗，要齊成。

○一治楊梅瘡

雄黃二錢 五分真輕粉一錢

杏仁去皮尖三十箇

右研爲細末，入杏仁再研，如泥。用雄豬膽汁調搽。瘡癥先洗淨，拭乾，藥干，方有效。

疥瘡

夫疥與癬，因熱客於皮膚之所致。風毒淫移，皆爲疥也。毒之深者，名癬也。多因風寒夾熱，得之疥瘡，於手足，或至頭身。癬則肌肉痕瘡，或則

得取如膏瘍者，故內瘡汗而外瘡者，皆日久癰者，瘍風毒也。瘍風毒以瘍之深淺，不尚有蟲者，瘍去風毒動是也。

○一論風瘡粉癰者，瘡素白，皮膚亦癢，風氣風濕，兼發於皮，破傷風在上部者，加桔梗一錢，在下部者，加木瓜牛膝各一錢，如瘧氣成瘍，而在下部者，去蟬退瘍者。

祛風敗毒散

枳殼

赤芍

前胡

柴胡各五分

荆芥

薄荷

牛蒡子

荳朮各六分

獨活

姜參

連翹各七分

川芎

羌活各八分

蟬退

○右剉丁剉，生姜三片水煎服。

一萬病加補

銀珠二錢

雄黃一錢

木鼈子一箇

好蠅香一錢

艾葉三錢

右五味爲末，以蜜捲條，陰陽互感，兩頭燒，以砂盆之鉗頭而保其先。

以布包裹二兩

一薰疮瘡癰瘍，

花椒

雄黃

斷艾

右三味共爲末，將帛捲筒放彼內薰之。

○一洗勿如玉

防風

荆芥

馬鞭草

白礬

花椒

苦參

野菊花

右剉水煎湯洗神效

○一治疥如神

徐金坡傳

大風子五錢 水銀渣三錢 槟榔一錢五分

右用油核搗同搗爛綢帛包擦粉上

○一薰疥癩方

油核搗去蕊丁半留丁半搗爛入木炭八厘燒令仍合于處，勿

上火燒爛藥之卽已。

○一治諸瘡疥癩一掃光。又名玉蝴蝶。

大楓子肉四十九箇

杏仁泡去皮甲十九箇二味同研

花椒去目四十九箇另研

白礬生用另研二錢

水銀三錢

茶葉另研末一錢

樟腦二錢另研巴豆三朱同研

輕粉一錢

右和匀再研取用先以楊柳桃楮桑五木核煎湯洗疥拭乾將前藥點
痕多少用柏油入鹽少許擦熱和藥擦上一日搽三次忌羊雞魚肉頭
等毒物

○一治乾瘡瘍

香油四兩用花椒一兩熬熟去渣研細入大楓子去壳七箇輕粉下
鐵碗黃一錢人言三分爲末入油內搽之

白藜姑

輕粉

水銀

雄黃

川椒去目炒研

樟腦各一錢

檳榔一箇研末

杏仁四十箇去皮男

大楓子取白肉四十箇另研

大待瘡癩破將藥丸于患處滾過

右共和勻用柏油八錢俱入乳鉢內研至不見水銀星爲度丸如棋子

○一治遍身風癰生瘡疥

土桑藜苗煎湯洗之

○一治老人生皮風疥瘡癩痒

藜蘆根爲末脂油調擦則愈

○一鼻聞香疥藥 後山李懷旅傳

大楓子三十箇去壳 朝臘三錢研極勻再入

水銀丁錢研末不見水銀星爲度後入

右共一處再研用龜碗盛在內用蓋蓋口勿令泄氣用竹擦平心內以

油核桃仁十箇

第十一卷
二十一
鼻聞數日即已或搽亦可

癬瘡

○一風癬瘡抱瘡血風諸瘡癩瘡

歸尾一錢五分赤芍

黃芩

黃連

黃柏各一錢大黃三錢

防風八分

木鼈子去壳一錢

金銀花

苦參各二錢

右剉丁齊水煎露宿五更服○若腸風膿毒下血去木鼈子加槐花
丁錢

○一治一切癬瘡瘡瘍者

胡粉另研

雄黃另研

硯黃另研各五分

大黃烏三錢生用

斑蝥一錢

砒霜五分

全蝎梢三錢

麝香三分

右爲細末先用羊蹄根醤擦擦勤次用藥少許擦患處

○一治癰瘍不癒

天南星

草烏各一箇生用。

右爲末用羊蹄根搗絞汁調塗。

○一治遍身癩癬

大楓子四十九川槿皮一兩

班獨去翹足五川椒一錢

輕粉二錢

杏仁三錢

海桐皮二錢

右共爲末。河水井水各一盃。浸一宵。蘸汁擦之。

○一治癰瘍勃方

萬嵩鵝傳

用馬蜂窩一箇仰放炭火上。用枯蓼末漸漸填滿。下面火炎。令焦化。未蠟脚醋謂金瘡膏上即愈。

○一切疥癬癩瘍及諸瘡不能收口者立見收口

腥腥草更乾爲末爲主

雄黃一錢

銀硃一錢

木蠟子去壳一箇

艾葉不拘多少

右爲末，捲捲燒烟薰處立效。

○一治疥癬坐臥血風痛痒神妙。

孫方李存吾傳

大楓子去壳四十九個蛇床子二錢

木鼈子去壳一錢川椒二錢

枯礬二錢

輕粉一錢

水銀一錢

朝朏一錢

右爲末，相油搗勻，先將艾湯洗令淨，待痒抓破，擦患處大効。

○一治牛皮癬極痒，抓爛

牛脚水燒灰存性，爲末，香油調搽立效。

○一治癩瘡

用鉤針局令極尖快，薑汁於癩上，各刺百針，血出盡，用溫水洗，未愈再刺，再洗。

癩瘡

自然之候，頭上白點斑剝，初似癩而上有白皮膚，久則生痂，成瘡，遂至

偏頭洗刮除其痂，頭皮瘡孔如筋頭，大裏有膿汁出，不痛而有微癢，時其裏有蟲甚，細微難見。九蟲論亦云：是蟻蟲動作而成此瘡，乃至自小及大，不瘥。頭髮悉落，故謂之白秃也。宜以後方而治之。

○一治瘡瘍方

藜蘆二錢

枯礬二錢

苦參二錢

五倍子二錢

右爲細末，香油調擦。

○一治瘡瘍方

脣頰楊子登傳

仙人塔即埋葬過人棺槨處上培土也所觸，不拘多少。

○一治瘡瘍
右用鯽魚以香油煎熟去魚，將油調仙人塔塗上，二錢厚，工一次愈。

○一治瘡瘍
先用冰洗，令淨，用燒酒和芥末調塗，處立已。

○一治瘡瘍

臍薑二錢

乳香二錢

沒藥二錢

紫蘇五錢

食鹽三錢 本柏油一兩

右同草薑煎久下前一味，荆芥方擦

○一治瘡瘍如神 雲松弟驗

紫草三錢 水柏油一兩 膽礬一錢 沒藥二錢

石乳二錢

樟腦二錢

淮鹽炒三錢

右爲細末柏油調勻，先將頭髮剃淨，再洗令淨，擦藥一日抹一次，神妙。

○一治水兒白癩瘡

黃柏皮五錢 枯禁一錢五分流黃

韶粉

輕粉各一錢

右爲細末，臘月猪油調日擦二次，又用太極草揩，日處

○一治癰疽瘡

用鯉魚一箇，重三四兩，去腸肚以亂髮填滿，紙裹燒存性，雄黃二錢，共爲末，清油調敷，先以藥洗拭後用藥。

又方以苦練皮燒灰用清脂調敷

癥風

紫癥風白癥風乃因心苦汗出及醉飽並浴後毛髮開時乘風按扇得之
扇風傷透皮膜所致宜服胡麻散或追風丸外以涼擦藥酒之
一論紫白癥風并癬及面上酒瘡又名粉瘡面刺俱可服之

胡麻散

胡麻子赤色扁者佳另研五兩

何首烏二兩

防風二兩

葵刺子一兩五錢

甘菊花一兩

苦參酒炒三兩

威靈仙二兩

升麻二兩

川當歸二兩

小芎穹二兩

牛蒡子

微炒二兩另白蒺藜三兩

荆芥穗三兩

薄荷葉

研二兩

片黃芩酒炒二兩

黃連酒炒一日炒二兩

白芍

酒炒二兩

右爲細末。每服三錢。食遠服。秋分後至春分。白酒調服。春分後至秋分。茶清調服。用米糊細末。左食遠。白湯下亦可。

○一治白癲風

追風丸

何首烏

四兩 荆芥穗

四兩

蒼术

米泔浸

苦參

四兩

白芷

四兩

荆芥

四兩

防風

四兩

白芷

四兩

白芍

四兩

白芍

四兩

右爲細末。好肥皂三斤。去皮弦子。入砂鍋內水熬成膏。細研爲丸。如梧子大。每服五六十丸。空心溫酒或茶任下。忌一切動風之物。

○一治白癲風

用雄鷦鷯白果仁。搗爛擦患處。

○一治汗斑方

白蓮花

半夏

右各等分爲末。飛麪糊爲丸。如彈子大。用薩摩茶擦之。

○一治紫癰風白癩瘡節如今汗斑之類，

白附子

雄黃

密陀僧

右各等分爲細末用帶皮生薑自然汁調以茄子搗藥擦之即愈。

○一治紫白癩風神方

雄黃二錢

雌黃二錢

硫黃二錢

白砒二錢

白礬二錢並用透明者佳

右共爲末每用時先一浴後通身出汗次以搗生薑搗藥布包裹處擦
乏良久以熱湯淋洗

○一治白癩風方

用杜葵子生搗爲末作湯服之每服三錢

厲風

夫癘風者天地殺物之風燥金之氣也故爲而不膚燥而不濕燥金之

體盛故一客于人則蒙衛之行漏，令人不仁而麻木也。毛落眉脫者，風伐其榮衛而表氣不同也。遍身癰瘍者，上氣下血俱病也。諸痛葛諸痒，屬虛羸風之痒固多有蟲而衛之虛不可誣也。是証也。玉屏風以主之。白花蛇血氣之屬也。用血氣之屬以驅風，豈不油然而獨乎？然其性中有毒，同氣相求，直達癘風毒舍之處，豈不居然而効乎？臭角之性，善於燻毒，則亦可以燻病苦為之性。善於去熱，則亦可以去風。昔人吞以防風通聖散，此方乃汗下之劑也。非榮衛虛弱者所宜。今以玉屏風散，更之則黃芪可以壯腰，補長防風可以利氣，疎邪白朮可以實脾，而補肌矣。

補氣燻藥湯

- | | | | |
|------|--------|------|-------|
| 黃芪三分 | 人參二分 | 當歸三分 | 生地黃四分 |
| 黃連三分 | 黃芩四分 | 翹翹六分 | 升麻六分 |
| 桔梗五分 | 甘草一錢五分 | 全蠅三分 | 地龍三分 |

梔仁二箇

蘇木三分

胡桐淚一分

蜜蠟炒去頭足殼

水蛭三枚炒鹽

射香少許

右剉一劑水煎溫服。

○一論治癩風手足麻木。毛落眉脫遍身癩疹。搔痒成瘡等症。
愈風換肌丹

白花蛇

丁條頭尾全者酒浸二三日去骨陰乾，

苦參內附

皂角

五斤去皮弦酒浸十宿取出以水熬膏，

右爲末。以皂角膏和丸如梧子大。每服七十丸。以防風通聖散送下。

苦參酒

用苦參五斤。好酒三斗。漬一月。每服一合。日三服。

苦參丸

苦參一斤

金銀花

防風

荆芥

羌活

獨活

當歸

川芎

赤芍

連翹

黃連

黃芩

梔子

滑石

白朮

甘草各一兩

右爲末藥，糊爲丸，如梧子大，每服百丸，苦參酒下。

○一治癩風

如聖丹

全蝎

五錢

一兩

天麻

一兩

五錢

僵蠶粉

一兩

蟬退

一兩

苦參

一兩

防風

一兩

五錢

荆芥

一兩

羌活

一兩

細辛

一兩

白芷

一兩

五錢

川芎

一兩

當歸

一兩

白芍

一兩

人參

五錢

黃連

五錢

白术

去蘿

一兩

枳殼

一兩

大黃

一兩

芒硝

五錢

一兩

鬱金

五錢

一兩

麻黃

一兩

石膏

一兩

滑石

一兩

皂角刺

一兩

大楨子

去壳

一兩

獨活

五錢

一兩

連翹

一兩

大楨子

去壳

一兩

大楨子

去壳

一兩

大楨子

去壳

一兩

大楨子

去壳

一兩

右三十味爲粥。用粳米糊爲丸。如梧子大。每服五七十丸。用六安茶清送下。日三服。半身全愈。小便尿如龍水黑色。此病之深者。只用此藥二料。如眉毛鬚髮脫落。日漸生長。切不可食羊肉。鵝雞。猪頭蹄。鯉魚生冷。如背食淡。百日全愈。始瘡破裂。只用大榧子壳煎湯洗。春夏石膏滑石依方。秋冬一味減半。過春分秋分。服防風通聖散一帖空心服。利三因次以粥補之。方見中良。

○一治癩風眉髮脫落者，

取皂角刺九蒸九晒爲末。每服一錢。溫酒送下。久服。眉髮再生。肌膚潤滑。眼自倍明。

○一治太風惡疾。雙目昏暗。眉髮自落。並染崩倒。肌膚瘡爛。此方特妙。皂莢刺三斤。灰火蒸炙。晒乾爲末。煎大黃湯。調服。數日間。髮生。肌膚自明。諸病立瘥。

○一治太麻風，即太風瘡。

用人頭一升，細布袋盛之，放在急水內，流之，乾淨取起，以麻指頭，將轉運布袋綻之，良久，取起晒乾，再用甘草煎湯浸晒乾，又用苦參煎，浸晒乾，又用蜜便，浸晒乾，又用薑葱煎湯，拔虫入內，不必取起，就放鍋內煮乾，就焙乾，爲末，每虫一兩，加射香二十錢，蟾酥三錢，共爲一處，入磁器內，每服一錢，石斛花煎湯下。花即山中石上生，白蘚如錢樣，以蒼耳草煎湯，洗浴，然後服藥。七日見効，服原者十日一服，弱者二日一服，神妙。

臍瘡

夫臍瘡者，皆由腎臟虛寒，風邪客氣外攻，三里之有，灌於陰爻之側，風熱毒氣並注，兩脚生瘡，肺癰疼痛，臭穢，並腹難忍。此病生於臍脣，爲並，以其骨上肉少，皮薄，故難忍。至者多，年無已。瘡口開潤，皮爛肉現，臭穢可畏。治法當先取虫，然後敷藥，須足端坐，勿多行履，庶可痊矣。

○一論臘腮生瘡或癰瘍等症。

四生散

白附子

黃茋

羌活

沙苑蒺藜

右各等分爲末。每服一錢。用豬腰子批開入藥。濕滑者包煨熟細嚼。鹽湯下。風癬酒下。

○一論臘腮乃瘧病所致。及治遍熱瘡。

黃白散

黃柏去皮一兩。輕粉三錢。

右爲細末。用猪膽汁調全濕。則乾擦。

○一論遠年近日。一切臘瘡潰爛至骨。疼痛當歸止痛。生肌如神。

三香膏

乳香二錢。松香三錢。

右爲細末。真生香。調用。包粽子。穿葉。刺孔。放藥。撻其上。用針刺孔。放藥。撻其上。用

等藥，貼在皮藥居中，上用完銀葉蓋藥，上帛扣住，即效。

○一方用松香爲末，入芻根、蕷葉等分，同搗爲瓶外，用石乳香爲末，少摻藥瓶上，搭在瘡口布帛緊扎一日，換鹽茶洗淨。

○一治臙瘡方

密陀僧八錢 石乳二錢 血竭一錢 銅背八分

右爲末，將油帶刺孔，搘油，燒帛上，捲藥在油上，隔帛貼之，妙。

○一治臙瘡方

許敬吾傳

柏油二兩 黃蠟三錢 白蠟三錢 香油三錢

密陀僧一兩五錢爲末

右將上四味，入瓷碗內，火上煎化，頻以入陀僧在內，搘不住者，盛藥膏，度將油帶刺孔，上藥油帶反，指以孔，在下貼之。

○一治兩足生臙瘡諸毒久不已。後山李懷威傳

輕粉一錢 官粉二錢

○右用猪板油同搗爛，用油紙上貼瘡外，帛包緊。一日換一次。先用雄黃、

洗淨貼藥。

○一泊臘瘡燭脚方

○先用米泔水洗淨，再用川椒艾葉，置盆中水洗淨。用黃丹不拘多少，真
香油調搽，碗裏以文燒烟薰至黃色，上布臘紙，貼之妙。

諸瘡

○專治疔瘡發背、膿疽、附骨疽。一切無頭、腰毒、惡瘡，服之便有
頭不痛者，服之便痛已成者，服之立愈。此乃醫家秘中至寶。病危者立
可復甦。萬無一失。乃家傳之秘方，不可輕視。寶之勿忘。

飛龍奪命丹

雄黃三錢

朱砂二錢爲衣

輕粉五分

血竭一錢

乳香二錢

沒藥二錢

銅綠二錢

膽礬一錢

寒水石一錢

蜈蚣

一條酒浸炙黃
去頭足

蝎牛二十一箇

麝香五分

蟾酥

二錢乾者好酒化
水

右爲組末。先將蝎牛連壳搗爛，和前藥爲丸如棗豆大，如丸不就，入酒打碎糊爲丸。朱砂爲衣，每服二丸。先用葱白三根，金病人避爛吐於男左女右手心，將藥丸聚於葱白內，用無灰熱酒送下。於避風處以衣蓋護之。約行人五七里之久，再飲熱酒數杯，以助藥力。發汗，度病初發二十九日，即治。如汗不出，重者再服二丸。汗出即効。三五百日，病重者再服二丸，即愈。如有瘡走黃過心者，惟治之。汗出冷者亦難治。如病人不能飲茶，搗爛亦可。瘡在上食後服，瘡在下食前服。服藥後忌冷水、王瓜茄子、猪雜魚肉、溫麪。一切發風發瘡之物，數物校正，無差。

○清毒百應丸 單水雲傳

錦紋大黃

一斤切片用

蒼术

黃柏

當歸

槐花

金銀花

皂角各四兩

右將六味細切水二十碗煎至十碗去渣浸太黃令透取出晒乾又浸
又晒以汁盡爲度爲末麵糊糊丸如豌豆大每服六十四丸白湯送下
以木便下瀉物爲効

○一切無名腫毒疼痛疽孔硬等發初發時即將
真杏油一杯溫熱飲之則毒不攻心可以緩治

○一切無名暗毒瘡

須臾腫起痛難當

急將炒藥頻敷貼

免使猖狂作禍殃

○治無名腫毒發背瘡疽疔瘡等毒

白礬不拘多少爲末入新汲水內用粗帛三張浸內將三張擦處
頻貼之更貼十數次立消

○一方用葱頭搗爛炒熟鐵匙處冷則易之

○一方用五倍子炒爲末，醋調塗患處。

○一方用大黃爲末，醋調塗患處。

○一方以端午日取白蘋研爲末，但遇瘡毒初起，每服三錢，加葱頭切拌勻，酒調服。

○一切無名腫毒初起。

牙皂七箇燒存性爲末，入真蛤粉炒過，七錢攬勻，用生酒調服。

○一敷諸瘡腫未破者。

蠅蟻丁箇先以石灰炒過，後將蠅蟻剝爛同研如泥，用綢帛蘸上貼患處，自破。

○治諸瘡疾，臍瘻，瘻瘍，疔瘻等症。

葱白一片

馬齒莧一片

石灰一片

右三味搗搗爲細末，貼疎即効。

○外消腫毒方

○猪苦膽三箇

生薑

半斤取自然汁

好醋一盞

右三味合和，子處以好京墨研濃，抹腫處立消。

○一治外科諸毒腫痛初起未破。

用連翹、葱數根，用稻稈燒過半熟，搗爛入蜜一匙，再搗勻成餅，敷患處，立消。內服白礬熔化爲丸，朱砂爲衣。每服三錢，用葱酒送下，汗出立已。

○一治無名腫毒，

用家園生地黃搗爛敷之立已。

○一切無名腫毒癰癧。

樹上馬蜂窩二錢

壁蠍扯破一錢

乳香

沒藥

孩兒茶各八分

雞膜皮一錢

右各爲末，布綿扯破一錢，擯香三根，共鋪綿筋上，捲作筒，線縛，塞入香油點着，照患處，如腫盛加艾少許。

○一治諸般惡毒腫痛不可忍者，廣昌知縣刊行于世，活人多矣。

一枝箭

白芨

金銀花

半夏

天花粉

穿山甲

附子

各一錢

五分

牙皂

乳香

右剉丁剗酒二鐘煎，一鍾溫服，汗出即愈。

○一切瘀毒腫痛成膿未成膿，用火罐須三次，則將膿水拔出而消散矣。

洪寶骨

天花粉三兩

赤芍二兩

白芷一兩

姜黃一兩

右爲細末茶，調敷之。此藥一涼而已，能化血爲水，涼肌生肉，去死肌，爛肉，及能破血退腫，又能止痛，出膿或用三分姜汁，七分雞清，調敷能使血退，善平性熱，能引血，故血破散而後成膿，如熱盛，瘀毒甚，恐隨軄時痛，亦應不退者，用雞清調敷取其鷄草，如湯火燒療，亦同也。

○一敷治一切腫毒疼痛如神。

鐵瘡散

南星

黃柏

草烏

白芨

白芷

名一兩
芙蓉葉二兩

白薇

天花粉

吳茱萸

白芷

名一兩
芙蓉葉二兩

右爲末，雞清調敷。

○一治血風瘡，並濕熱生癩，其形如釘，尚起寸許者。
追風解毒湯

連翹

黃連

黃芩

黃柏

防風

荆芥

羌活

獨活

全蝎

姜羣

蒺藜

金銀花

威靈仙

歸尾

赤芍

甘草

右剉各等分，水煎服。

○一治血風瘡，並瘻瘍、癰癧、癰癧、癰癧、癰癧等症。徐完初試驗。

大楓子

去壳一兩

樟腦五錢

冰銀二錢

輕粉一錢

核棗肉十箇

右共研爛爲丸。如彈子大。放手掌心。揉擦其瘡自己。連擦四五次以愈。
爲度。或將藥擦瘡上亦可。

○一治軟瘡癩毒久不能開口。腫痛不可忍者。
巴豆用簪穿燈上燒存性爲末。放瘡頂上。以膏藥貼之即潰。

○一治坐枝瘡。瑞四九兄傳。

花椒一錢炒
胡椒七分

枯礬一錢

人言一分

右爲末。柏油調搽。

○一治坐枝瘡痛痒經年弗愈。中州傳愛氣傳。

人言一分

密陀僧三分

硫黃二錢

石膏一錢五分

○一諸瘡口難愈。及多年惡瘡。百方不瘥。或痛極走不已者。

馬齒莧搗敷口。并周圍立効。

○一諸癰瘍不消者

雄黃

生白藥

右各等分煎水洗

○一治濕瘡方

黃蠅一錢

白朮一錢

銅綠一錢

黃丹一錢

童女髮一錢

○右用香油二兩入湘竹內熬入藥，同研細作十數隻入鍋內，熬沸

○一治癰瘡

○用茄子根，浸前湯，洗去皮，兒脂道塗之。

○一諸癰瘍久不消者，以鹽不歇者，擦後用藥，然後腫毒出，膏水不止。

○用雄黃一枚，搗碎，黃蠅各等分，清酒或半升，以竹子於瓶中，經年，患處如治脚手癰瘍，用紙糊瓶口，取藥敷之，日久無效，亦可入輕粉，糊上。

○一治頭上風瘡，臘瘤，頭癩。

用包銀砂粗研，燒熱，點綻，置

○一治蛇頭指

用雞子開二竅，將指入內，待鵝化水，旋之而退，此夜即平。

○一手足患癰，爪黃，腫痛作脹，不可忍。

○一蛇頭指痛不可忍，馬不離。

○一用蠶加石灰，搗爛敷上，立已。

○一白芨末一錢，蟾酥三分。

○一石膏分。柏油調搽。

○一右共和爲一處，用雞清調，常服，腫消，痛止。

○一治疽風瘡，

石膏
硫黃

右各等分。柏油調搽。

百草霜

○治脚上諸般癰瘍

紅冰糖及

甘草

升丹

官粉

松香各一袋

銀紙三分

右爲細茶

水銀一錢

沒藥五分新瓦焙乾黃丹五錢

細茶三錢

大柏子十箇去壳

輕粉一錢

黃蠅五錢

石乳膏五分瓦焙

片腦三厘

真麻油一盞

右藥俱研極細末篩過用真麻油同煎用文武火慢煎鎔成膏稍冷方下片腦再煎一刻取退用細蜜油春薄末加猪大小爲度不宜太潤一百一換每貼用後藥煎水洗脚瘡西方貼

大黃

苦參

黃柏

荳蔻

防風

金銀花

艾葉

茶葉

右各等分煎湯洗瘡也

○一年多，疎瘻久不愈者，用諸藥未收口者

黃蠟二兩

黃丹四兩

輕粉

乳香

淡藥各二錢

血竭
孩兒茶各一錢

右爲細末，先將真麻油半斤，熬熟濾淨，成藥。下黃蠟化開，再入黃丹，研起離火，方下諸藥，搅勻，入罐收用。

○一審花瘻及似花之瘻

胭脂

貝母各三錢

胡粉二錢五分硼砂

淡藥各二錢

右爲細末，先用溫藥水洗淨後，敷之。

○一月，飲酒或生小耳內

胡粉炒微黃

枯白藜

黃丹煅

黃連

輕粉

胭脂白三錢

射香少許

右爲末以麻油洗之拭之

上月麻油調敷即愈。

○一腳生雞眼作痛者以

擦藥油洗效。

○一腳指縫白刺者

○用鴉青黃及燒存性伍勿炒之如水出用飛黃丹入花蕊石粉擦之
○一治脚前胛上二月脚病須擦數次久不已。

隔蠅膏

陳雲岳傳

柏榔三錢

密陀僧三錢

龍骨煅二錢

黃丹水飛三錢

○右用油爲漿布針刺孔相泄調敷止貼處。

○一治脚癰方

○用牛膠將滾水泡軟半留半刮出氣貼患處久之自落。

○一人足底遍生瘡疥屬瘧熱難禁此方服之永不瘧疥
瘡疥不復言。

當歸酒洗二兩

白芍乳汁炒二兩

懷生地黃酒洗二兩

防風去蘆二兩

熟地黃酒蒸二兩

川黃柏鹽水炒一半童便

知母去毛二兩酒炒

白朮壁土炒一兩

土茯苓六兩

苦參去粗皮四兩

甘草一兩

右爲細末用猪肚一箇好酒悶壺。文武火煮爛搗和藥末爲丸。如梧子大每服五十丸酒送下。忌雞魚牛羊肉。

○一治癰疽久不癒

黃芪二兩

當歸一兩五錢白芍二兩

白茯苓一兩

白芷三錢

川烏一兩

厚朴五錢

原桂七錢

陳皮一兩

炙甘草二錢

右剉裏裏服

○一治一切風寒濕氣。手足拘掣。骨節酸疼。男子齷齪。婦人血瘕。及腰脇
俱貼患處。肚腹疼痛。泻痢癩癆。積年不愈。腫毒初發。楊梅腫塊未破者。
寒惡心胸。膈脹悶。面色痿黃。心疼氣痛。俱貼前心。肩重。傷力。漏身痛者。
貼後心。腰眼痛。小腸氣等症。貼腋下。治無不効。

神異膏 傳叅將方

木香	川芎	牛膝	生地黃	細辛
白芷	秦艽	歸尾	枳殼	獨活
防風	大楓子	羌活	黃芩	南星
草麻子	半夏	蒼朮	貝母	赤芍
杏仁	白芍	茅香	甘草節	艾葉
連翹	川烏	兩頭尖	肉桂	良薑
續斷	荆芥	丁香		
威靈仙				

金銀花

丁皮

獐牙

紅花

青鳳膠

烏藥

蘇木

玄參

白蘚皮

姜黃

草烏

桃仁

五加皮

山梔子

牙皂

苦參

穿山甲

五倍子

降真節

骨碎補

蒼耳頭

蟬退

蜂房

鱉甲

全蝎

麻黃

白芨各一兩 大黃二兩

蜈蚣升一條

蛇退三條

右用桃柳榆槐桑練指七色樹枝各三七二十一下俱切粗片用真麻油十二片浸藥及三宿春五秋七冬八十宿後煎藥枯油黑爲度用麻布濾去渣貯磁器內另以松香不拘多少先下淨鍋溶化後取起每膏二斤用藥油四兩拭水軟硬得法仍濾入水缸中食入扯抽色如黃金即成膏矣。

○一治風寒濕氣所侵跌撲閃挫傷損一切疼痛皆貼患處心腹痛俱貼痛處牽吼咳嗽貼背心漏病貼臉上頭疼眼痛貼太陽穴及治一切舞

名腫毒疔疽發背瘡濕毒癰瘡始發時便貼患處即消已成亦能根
除畏肉止痛甚効不能遠達。

神秘萬金膏

草烏 川烏 大黃各六錢當歸

赤芍

白芷

白芨

白蔹

烏藥

官桂

木鼈子各八錢

槐柳桃桑棗各四錢

一方加苦參皂角各五錢

右剉散用真麻油一斤浸藥一宿。用火熬至藥焦色。以生絲絹濾去油。
不用濾油再入鍋內。以文武火熬至滴水成珠。不散方下。飛過黃升十
二兩。要炒過降綱下。勿滴水成珠。不散爲度。後入乳香沒藥末各四錢。
攪勻。聽用。

一方加蘇合香二錢。一名萬應紫金膏。

○一治杖撲湯火傷損瘡毒不問已潰未潰肉雖傷而未壞者用之自愈。

肉已死而用之，自潰新肉易生。擦至肉色漸白，其瘡始盡。生肌最速。如
棍杖者，外皮不破，內肉糜爛。其外皮因內熱乾縮堅硬，不潔爬連，好肉
作痛。故俗云：疔痴皮致，膿瘍無從而治。內愈，脹痛難以消散。法弱之人，
多成破傷風症。每致不救。若杖瘡內有瘀血者，即用有鋒芒磁片於患
處，破去塗以此藥，則疔痴死肉自潰，膿瘍自出。所潰亦淺，生肌之際亦
不結痂。又免皰揭之痛，殊有功效。

當歸膏

當歸一兩

生地黃一兩

黃蠟一兩

麻油六兩

右先將當歸地黃入油煎黑去渣，入蠟熔化候冷，攪勻即成。膏矣。蓋當
歸地黃麻油二味主生肌止痛，補血續筋，與新肉相宜。白蠟尤妙。

○一治諸瘡腫毒及諸病等症。神効。

神効萬靈膏 五臺山無窮禪師秘藏方

當歸

川芎

赤芍

生地黃

熟地黃

防風

羌活

獨活

連翹

山梔

黃連

大黃

玄參

苦參

白芷

五倍子

兩頭尖

皂角

桔梗

白芨

白薇

紅牙大戟

山慈姑

天花粉

官桂各六錢

草麻子

八十箇

木鼈子四十箇

杏仁四十箇

巴豆肉四十箇

穿山甲十片

巴豆肉四十箇

穿山甲十片

右剉散用真麻油一斤四兩姜絲四兩入藥浸春秋三百夏二千日冬五百日油藥放鐵鍋內文武火熬用槐柳枝長寸許各三十根同熬焦色用麻布濾去渣再放油鍋內熬滴水成珠不散傾出瓶內秤準油二斤下山東薰丹一斤松香二兩姜汁煮過黃蜡二十兩桐油二兩葱至不老不
極。冷了下乳香沒藥血竭孩兒茶。附魏百草霜各三錢射香五分或一
錢輕粉三錢馬糞膏三錢俱爲細末藥油將好拔下早了恐涼藥氣再
熬不粘手爲度。將膏藥埋土內三兩日出火毒磁瓶內收貯隨意擦貼。
倘膏嫩加杭粉不拘多少不粘手爲度。

○貼諸瘡毒疔瘻發背治諸病法子後。

○一癰疽發背瘻漏瘡毒純起，一日貼將火焙雙手，丁上丁摩百條次出汙爲度。如有膿血之瘡，貼上背藥，便罷不用手摩。

○一疥瘡癬瘡搔癢，貼上不用手摩。

○一風癩皮膚先用木鼈子火煨熱搗爛，放腫上貼之。

○一咽喉喘嗽貼膏肓焙手摩百次。

○一無名腫毒貼患處，瘡初起焙手摩出汙，諸毒發陰陽。男子貼丹田，婦人貼命海，焙手摩百次。

○一打破損刀傷貼患處，如虛腫貼腫處，焙手摩百次。

○一熱嗽冷嗽傷力，貼肺俞焙手摩百次。

○一風痰壅塞貼心坎痛處，焙手摩百次。

○一男婦諸瘡塊用麪作圓，放焙上用皮硝一兩，鵝糞五錢，大蒜一瓣，荳粉一處，用膏貼瘡上，硝糞蒜放圈內以熨手，火候藥上要透，熱煨本

鼈子肉放膏內，小兒痘塊不用硝粉，燒手摩百次。

○一男婦偏正頭風，俱貼太陽穴，燒手摩百次。

○一男子遺精，女人白帶，煅木鼈子肉，男貼丹田，女貼血海，燒手摩百次。

○一虛脈貼心下，膀上，煅木鼈子肉，燒手摩百次。

○一左癱右瘓，濕鎮疼痛，貼患處，煅木鼈子肉，燒手摩百次。

○一暗風貼肺俞穴，并心口下三寸，燒手摩百次。

○一月經不調，貼血海，燒手摩百次。

○一醉後嘔吐，貼肺俞心口，燒手摩百次。

○一冷氣沖心痛，肚腹疼痛，依病大小，貼燒手摩百次。

○一四時傷寒，貼脊心，焙手摩百次，出汗為度。

○一已上諸般疼痛惡法，貼之，燒手摩百次，其處即愈。

杖瘡

○一枝打破席腿，腫痛。

金鳳花科一根搗爛，加泥敷處，如乾，又塗上。一夜血散而愈。

○一枝瘡久不愈者。

雄豬骨髓日夜搽，破腫處立已。

○一枝打血侵腦，腫痛。

石灰三錢入水，攪澄，再入香油五錢，用金環脚攪打成膏。以雞翅插上，使血水長流，須臾腫消痛止。

○一枝之先

用白蠍細切，入碗內，滾酒泡服。打着不痛。

○一枝癩方

用麻油二分，水一分，黃丹一錢，入碗內，用銀簪攪成膏。用鴨毛，倒上外，用帛貼住四五次，效。血正行，立時腫消痛止。

○一治枝瘡及遠年近日一切癩瘡。

黃蠅二兩

黃香

二兩爲未去黑渣不用

香油三兩頓溫

乳香末五分

沒藥末五分

右先將蠅入磁碗內慢火化開用筋敲碗邊續入黃香乳沒取碗離火入溫香油於內攪匀待冷入水缸內去水毒三百取出沖畢研末貼患處

○一杖打傷重敗血攻心欲死

蘇木三錢

紅花三錢

歸尾三錢

大黃二錢

○右共爲末童便一木鍾煎至一鍾不拘時熱服
○一杖打後潰爛久不愈者此氣血虛也

人參

白朮

去蘿沙倍

白朮

苓去皮

白芍

陳皮

熟地黃

香附子

貝母

桔梗

甘草各芽分

右剉一劑水煎空心服○往來寒熱加柴胡地骨皮○口乾加五味子

麥門冬一錢。膽清加黃芪。膽多加川芎。肌肉遲生。加白芍肉桂。

白龍棒瘡膏 方外異人傳

臘猪油

一兩七錢

白蠟

輕粉

定粉各五錢

黃蠟

三錢

朝腦

二錢五分

乳香一錢

沒藥

二錢

冰片一分

右爲末。先以豬油同二蠟化開。入羣藥末調攪貼之。

寄叔神丹

何和宇傳

此藥服後任打無妨。且血不侵補。

乳香

沒藥各五分

血竭

孩兒茶

三七各一錢

木茸培乾

白蠟各二錢

辰砂七分

青木香一錢

海螵蛸五分

琥珀三分

天靈蓋火煅三分

右爲末。沙糖爲丸。如苦珠大。每服三丸。好酒送下。即打着甚痛。若未受實。用兩手撻背。即消。

○一林瘞潰爛。生蛆。用皂礬。煅過。爲末。乾摻其內。蛆即死。

折傷

夫折損墜墮皮不破而內損者必有瘀血若金刃傷皮破出血或致亡血過多二者不可同法而治有瘀者宜攻利之若亡血者兼補行之又察其所傷有上下輕重淺深之異經絡氣血多少之殊唯宜先逐瘀血通經絡和血止痛後調氣養血補益胃氣無不効也

○大凡傷損不同壯弱及有無瘀血停積俱宜服熟蠶殼以酒佐之椎陳致新其功甚大

○一論跌傷骨折用藥丁厘薰酒調下如車行十里之候其骨接之有聲初跌之時整理如舊對性綿衣蓋之勿令見風方服藥休移動端坐日製忌婦人雞犬等物

丁厘金

大梁孫都督秘傳神功

土鳖
乾一箇新瓦上焙巴豆一箇去壳

半夏一箇生用

右爲細末每服一厘舒酒送下不可多用多則補得過熟妙不可言
○被打傷重是血攻心或木石壓死并跌磕傷從高墜下跌死氣絕不能言語取藥未便急穿開口以熱童便灌之一方用牛膝燒灰調酒服
○一凡跌傷打傷腫痛不可忍者以生葱搗爛熱敷之甚妙
○一傷肢折臂者即將折處轉上挾定用好酒一碗旋熱將雄雞一隻刺
血在內搗碎乘熱飲之仍將蓮根葱搗爛炒熟數粒包綿冷再換亦治
刀刃傷痛與血隨此

○一折傷先用止痛法

白朮爲末每用一匕沸湯一碗化之以蘸熱敷傷處少時痛止然

後撲整筋骨貼藥

○一治傷損瘀痛紅腫屬熱毒者并接斷

癰陰丹

天花粉三兩

葛黃

白芷

赤芍藥各一兩

右爲末，濃茶調擦患處。

○一治跌打傷損，先用手扯伸，後用小奶奶丁，裹鴨膽，搭上外用。杉木搗次之，次日再搗取，効如神。至死者，此藥通不可瘀血，方可服補損藥。

大成湯

大黃二錢

芒硝二錢

枳殼二錢

厚朴一錢

當歸一錢

桃仁一錢

蘇木一錢

紅花五分

木通一錢

甘草少許

右剉水煎，溫服。

○一論從高墜下，惡血流於脇下，痛不可忍。

復元湯

柴胡五錢

當歸六錢

穿山甲一錢炒二桃仁去皮五十個

紅花二錢

瓜萎仁二錢

大黃酒浸一兩甘草二錢

右剉一兩水一盞酒一盞煎水分溫服以利爲度。

○一論墮墮挫閃氣血凝滯攻刺腰痛。

羌活桃仁湯

羌活

蒼朮米泔炒

當歸尾

桃仁去皮

紅花

牛膝去蘆

破故紙炒

小茴香酒炒

乳香

官桂

右剉一劑半水半酒煎服。

○一治跌撲傷損

真牛膠一兩

乾冬瓜皮一兩

右二味剉碎入鍋內同炒焦枯在性爲細末每服五錢好酒一鐘調服後仍飲熱酒二三盞厚蓋得微汗痛即止。丁宿擗完如初可効。

○一論跌撲所傷爲敷藥或人元氣虛寒腫不消散或不潰散及癰疽堅硬不痛肉色不變久而不潰濃而不散或筋斷骨節一切冷症並治回陽玉龍膏

草烏二錢炒

南星一兩炮

均薑一兩炒

白芷一兩

赤芍一兩炒

肉桂五錢

右爲末熟湯調擦熱酒亦可

接骨止痛神方

楮根皮

葛花枝又名合歡樹又名夜合花

右二味用冰丁碗煎至七分加酒一鐘調入米椒過天靈蓋丁二錢服當時痛止

○一治跌撲傷損

蟹二隻連殼搗爛好酒一碗煎去滓服渣敷患處

○一治打撲青腫疼痛

用青槐核，麝香、阿膠、共首尾立題。

○一論打撲跌損傷牙咬刀傷出血，諸般腫毒出處後，肌肉不生痛不紅，止血定痛生肌散。

乳香三錢

沒藥三錢

血竭二錢

黃丹飛過五錢

白芷二錢五分龍骨火煅三錢軟石膏

煅去火母兩朝腦少許

右爲細末，磁器盛，每以擦患處，血止痛定，肌生。

○一治傷折等症失血過多，或因戰伐氣耗損，髮熱煩躁作渴。

八珍湯

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍

熟地黃各一錢

甘草炙五分

右剗碎，水煎服。

○一治被人打傷筋骨，跌撲損傷氣血虛弱等症宜。

葛根無根消方見補益。

○一治打撲損傷落馬驟車一切疼痛
乳香定痛散

乳香

沒藥

川芎

白芷

赤芍各一兩

生地黃

牡丹皮各二兩

甘草五錢

右爲細末每服三錢溫酒并童便調下
○一治風損如神膏 謝臂風傳

用生薑汁葱白汁好醋各一碗下黃丹末半斤同熬又下杏油四兩再入柏油四兩熬至滴水成珠不斷下黃丹一兩再熬成珠入麝香五分貼風疽如神

破傷風

夫破傷風者有因穿暴傷損風襲之間傳攝經絡致使筋肉拘急作身體不張口噤不開齒緊都須入脈有因諸瘡不瘥榮衛虛弱肌肉不生瘡眼

不合風邪亦能外入於瘡爲破傷風之疾。有諸瘡不瘻舉世皆言斯文爲上是謂既瘡而不知火熱客毒壅經諸變不可勝數微則發熱甚則生風指或角弓反張口噤目斜亦有破傷風不灸而病者因瘡有白痴瘡口閉塞氣壅於陽故熱易爲鬱結熱甚則生風也古方猶云論甚少以此病與中風同論故不另立條目惟河間論病同傷寒証治通於表裏分別陰陽有在表有在裏有在半表半裏者在裏宜治在裏宜下在表裏之間宜和解不可過其治也故发脉浮而無力者太陽也脉長而有力者陽明也脉浮而弦小者少陽也若明此三法而施治不中者難矣但中風之人尚可淹延歲月而破傷風始雖在表隨即轉臟多致不救大抵內氣虛弱而有熱者得之若內氣壯實而無熱者雖傷而無害也。

○一論破傷風邪初在表者急服此藥以解之稍進則邪入於裏與此藥不相合矣。

羌活防風湯

羌活

防風

藁本

川芎

白芍

當歸

地榆

細辛

甘草各一錢

右剉水煎熱服

○一論破傷風在半表半裏急服此湯稍緩邪入於裏不可用矣
和解湯

羌活

防風

川芎

菊花

麻黃

石菖

前胡

黃芩

細辛

枳殼

白茯苓

蔓荆子

甘草各五

薄荷

白芷各二分半

○右剉水煎熱服

○一論破傷風邪傳入裏。一孟嘗口噤項背反張筋惕搐搦痰涎壅盛胸腹滿悶便溺閉赤時或汗出脈洪數而弦也宜導之
通裏湯

川芎

羌活

黃芩

大黃名二錢

活剉水煎溫服。臟腑通和爲度。

○一論風傷腎而腰痛者。或左右痛無常處。牽引兩足。宜五積散加防風全蝎二箇。方見中寒

○一論破傷風及金刃傷打撲傷損并癩狗咬傷能定痛生肌玉真散

天南星爲防風所制服之不麻。

防風

右各藥分爲細末。破傷風以藥敷。然後以溫酒調一錢。如牙關緊急。角弓反張用藥一錢。童便調下。○打傷欲死。但心頭微溫。以童便灌下二錢。并進二服。○癩狗咬破。先口噙淡水洗淨。用綿拭乾。貼藥更不消發。無驗大効。

○一治破傷風

初發者。風急取熟糞堆內蟻增蟲一二箇。用手捏住。待虫口中吐出。

水就抹破處。身穿稍厚衣裳。待少時。瘡口覺麻。兩脇微汗出。立交如風。腹急。遂取此蟲三五箇。剪去尾。肚內黃水自出。塗瘡口。再滴些少熱酒飲之。汗出立止。妨爛草房上亦有此蟲。

○一治破傷風。五七日未愈。已至角弓反張。牙關緊急。服之神效。

蟬退去頭足土淨五錢

右爲末。用好酒一碗。煎滾服之。立止。

○一治破傷風

奪命丹

川烏火煅去黑皮一兩 雄黃一錢

右爲末。葱汁爲丸。如蓮子大。每服一丸。用熟葉一片。捲藥裏。內火微燒嚼爛。童酒下。衣蓋汗出即愈。

參法 治破傷風及風火除傷方見灸法

○一治破傷風牙關緊急。

立効散

雄黃

香白芷

右各等分好酒煎服。如牙關緊急者灌之即活。

湯火

凡遇湯火所傷切勿用冷物冷水冷泥，蓋熱氣得冷氣則退，深摶深入筋骨慎之慎之。先以鹽末和米醋調敷瘡上，次以醋泥塗之，仍用醋全不絕，暫救痛苦。正面急搗生地黃醋調敷瘡上，直俟疼止，雖厚至數寸，不

○一切湯火傷沈云：龍樹王如來授吾行持北方壬癸禁火大法。

龍樹王如來云：是北方壬癸水，收斬天下火星辰，千里火星辰陰陽。

急急如律令。

兜耳，卽搗真武印，吹之，卽用少許水洗，雖火燒手足成疮，亦可療。一治湯盃被火燒破，瘡毒疼痛，三方俱効。

○一方用大黃末蜜和塗之立愈。

○一方用雄子清磨成墨末之上用二萬蠟錠蓋之。

○一方用生白藥爲末香油調掃瘡破處不拘時。

○一治湯火傷。

用擣蕕毛不拘多少焙乾燒灰存性研細末真香油調並處處太小周圍厚敷於上中留一孔一日一次慢火圍捲如敷無遮及不留山則潰而有疤痕矣。

○一治湯盞火燒此藥止痛解毒生血。

清涼膏

生地黃二兩 黃連

山梔子

白芷各一兩

葱白十根

右剉細用香油四兩煎至地黃等焦黑瀝去渣再煎入黃連五錢慢火熬蠟化傾磁盞內以雞翎掃瘡上

○一治湯盃火燒瘡

家園生地黃旋取新者搗取，自然汁入香油薰蜡少許，砂鍋內熬成膏以雞翎掃敷瘡上。

○一湯火傷用冰片、辰砂末，或青土朱塗，或用眞桐油塗。

○一方用蘋頭切開水磨濃藥敷之立効。

○一方用薑根爲末，香油調擦立已。

重疊獸

○一癩狗咬方

斑貓

丁日二日三日，至七月止用七箇，以七日外計，日每服一箇，日百箇。

雄黃

二錢

麝香三分，小兒不用，亦可或用二三厘。

滑石

五六錢或一二兩亦可

右俱觀人氣虛實，用糯米一勺與斑貓同炒，以赤爲度，斑貓去頭尾。

翅膀各爲細末。每帖用十三茶匙酒調服。如不飲酒米湯亦可。腹痛去毒物於小便中出。或口吐出都是大小便中毒出後於瘡凹下者三寸灸三壯。效○先喫香油一碟。次用油洗瘡口。○又沙糖水調塗。仍服沙糖水二兩碗。

○一被虎傷

用生葛根汁服。并洗傷處。或白藜末納瘡口。痛即止。

○一被驛馬咬

用馬鞭草燒灰。油調敷之。

○一百蟲入耳

用藍汁灌之。或葱汁尤良。或豬肉少許。參差置耳邊亦出。或蘆管入耳內口吸之。虫隨出。

○一癩狗咬傷

番木鼈即馬錢子磨末吃。即看脣頂上有紅頭髮。宜扯去。

○一湯藥方

朱砂

雄黃

臙藜

右各等分。射香減半。端午日取。蝦蟇。新落酥。和爲丸。下擦。立止。

○一癩狗咬傷神方

斑蝥去翅足七箇

香附七分

右共爲細末。作二服。燒酒調下。如腹痛不可忍者。吃豬肉湯一兩口。解之即止。不一時。小便出如狗形下來。即已。避風。後風。十七日。

○一蜈蚣入耳。以雞肉。置耳邊。自出。

○一蜈蚣咬痛。不可忍。用燒紙捲緊燒。烟薰咬口立止。○一方。用紡線根。搗酒吃。立止。

○一蜈蚣咬痛不止。獨蒜摩處。痛止。○又宜。薑雞糞水調塗之。○又宜。蠍鱗研。敷之。

○一蛇咬

卷之三

五
重
指

白
玉

見

右名等分爲末，每服一錢，酒調服。又以白繖加蕊，泡化洗傷皮，加

雄
蕡

白雲生稿

右各等分爲第十二等。每等九如梧子大，每服七丸。念慈王哲薩樂王著
薩七道瓶水送下。

卷之三

雄鷗蠍入痛在一處。雌鷗蠍入諸處穿痛。但將蠍牛初附。未發。水浸。水痛亦止。

卷之三

天南星 三錢

隱書五錄

右用硝石片化成末。入二味末搅匀成锭。每管约重一钱。又治牙疼。用烧酒。此锭小者漱口敷穴。即止。

卷之三

卷之三

○治瘧疾

用苦参、礬石研生酒服。凡被所傷，將細帛丸住，勿令氣上行。服後，當解去。不然，則所傷之處必潰爛矣。

○風火咬人，急於無風處以冷水洗淨，即服韭菜汁一盞，隔七日，又下碗四十九日共七碗。百日忌食魚肉，終日忌狗肉，方得保全。否則，五陽九死。丁酉大丁日咬三尺，止一人用此方，得活。親試其驗。因名之曰：傳世處立翁。

○辟蟻蟲法

蠶益主多練花 菊花 苦參 藜蘆

川烏

右共爲末，聚肉爲丸，日乾燃之。○又方用翼鱗骨同鋸末，捲作團，用紙包，一時燒化，即化爲水矣。

用燒殘魚骨，搗於室內燒之，即化爲水矣。

○一凡蛇入室，斂房開蛇尾，納川椒數粒，以紙封之。其蛇自出，更煎人參湯飲之。或飲酒食蒜，以解內毒。如被蛇咬，食蒜飲酒，更用綠柳根莖處，加艾於蒜上灸之，其毒自解。凡毒傷並妨。

○一金猫辟鼠法

椿樹葉 冬青葉 絲瓜梗葉

右各等分，每四季燒烟薰室中，其虎遠避。一年燒鬥尖。

○一治蟲入耳

用獨角消耳虫即出。取貓尿以牛糞擦，其尿自由出，或用牛糞，則蟲死難出。或用炒芝麻，按之，則虫亦出，更不如貓尿之速也。

○一治百蟲入耳

鳩糞并灌耳中即瘥。○又宜川椒末一撮，以鹽半勺調，塞耳中，十四步即出。○又宜少耐，搗葉捲之，取葉卷鼻孔。○又宜葱白搗，中蟲即出。

○一治蟻入耳

用穿山甲燒存性，爲末水調服之即出。

○一百蟲入耳不出

以雞冠血滴入耳中即出。

○一蜒蛇入耳

地龍一條納葱葉中化水滴耳中。其蛇變亦化爲水。

○一黃蜂螫

以熟酒洗之立効。或用清油搽上即愈。

○一辟蚊蟲

用荊芥子爲末入人膏末加艾以紙捲燒烟薰之。

○一辟蠅虱臭蟲

用蟻蛇燒烟薰之。一方青鹽水蘸鴉尿帳不絕其迹。