

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元普濟集卷之八

太醫院吏目金彭雲林葉廷賢子才著

男 葉集國

葉集國 分校

南雍太學生葉即周文卿校刊

小兒科

○小兒形色論

論歌脉症十五條

夫小兒半週兩歲為嬰兒三四歲為孩兒五六歲為小兒七八歲為幼童
九歲為童子十歲為稚子矣小兒半歲之間有病當於額前偏陷髮際
之間以名中食三指輕手滿額按之兒頭在左用右手在右用左手食
指為上中指為中名指為下若三指俱熱主感受風邪鼻塞氣粗發熱
欬嗽若三指俱冷主外感內傷發熱吐瀉若食中指熱主上熱下冷名

中指熱主火驚食指熱主肺肺氣滿乳食不消又要觀形察色假如肝之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要分別五臟形症次看黑標本而治之無不可也

○月閏審候歌

觀形察色辨因由

陰弱陽強髮硬柔

若是傷寒雙足冷

耳冷應知風熱症

要知有熱肚皮求

鼻冷便知是瘧疹

耳冷應知風熱症

○觀形察色面自圖

眼胞絡屬脾

赤主肝有驚

眼烏珠屬肝

青主肝有驚

眼瞳人屬腎

不瞳睛腎虧

眼尾角屬心

紅主心有熱

眼白睛屬肺

白主肺受冷



左腮屬肝

右腮屬肺

額屬心

鼻屬肺

頰屬腎

面部部

左腮屬肝其色青者爲順白者爲逆若色赤主肝經風熱發熱拘急青黑主驚風腹痛淡赤主潮熱痰嗽

右腮屬肺其色白者爲順赤者爲逆若赤色甚者主咳嗽喘急悶亂飲水傳於腎則小便赤澀或淋閉不通

額上屬心其色赤者爲順黑者爲逆若青黑主驚風腹痛瘰癧啼哭微黃主盜汗頭暈乾燥驚悸骨蒸

鼻屬脾其色黃者爲順青者爲逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便閉而鼻燥咽血

頰屬腎其色黑者爲順黃者爲逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

又

面赤心家熱 面黃脾有積 面白肺家寒 面青肝有風
唇赤心家熱 唇黃脾有積 唇白肺虛寒 唇燥脾有熱

脈赤心經熱 脈青肝有驚 脈黃脾有積 脈白肺有驚
鼻青主吐瀉 入中青感風 入赤肺家痰 入黑腹邊痛
風池紅多啼 風池黃吐逆 風池紫驚風 風池青主驚
風池面赤傷寒 風池面黑驚風 風池面青驚風 風池面黃驚風
痢下眉頭皺 驚風面頰紅 渴來唇帶赤 熱甚眼朦朧
面黃多食積 青色是驚風 面白多成瀉 傷寒色紫紅

○手指脈紋式

夫小兒三歲以下有病須看男左女右手虎口三關紋理兩手食指本節
為風關中節為氣關第三節為命關其紋曲直不同如紋只在本節病
易治透過中節則病重過第三節則難治驚則紋青淡紅則寒熱在表
深紅必主傷寒痘疹紋亂則病久紋細則腹痛多啼乳食不消紋亂直
射指甲必主驚風惡候紋黑如墨必困重難醫此乃神聖王巧之也

○虎口三關脈紋圖

虎口又手處是也。三關在第三指
反脊三節第一節風關第二節名
氣關第三節名命關

○脉指歌

小兒食指辯三關男左女右一般者皆知初氣中風候末是命門易亦難
要知虎口氣紋脈倒指看紋分五色紅黃紫青五臟和紅紫依稀有損
益紫青傷食氣虛煩青黑之時証候逆忽然純黑在其間好手醫人心
膽寒若也直上到風關粒米短長分兩端如鎗衝射驚風至分作枝叉
有數般弓反裏順外爲逆順逆交連病已難又頭長痘尤可救如此醫
人仔細看初看掌心中有熱便知身體熱相從肚熱腳冷傷損定脚熱
額熱是感風額冷脚熱驚所得瘡疹發來耳後紅孩兒無事忽大呌不
是驚風是天癰大呌氣促長聲驚誤吃熱毒則心竅急須吐下却和脾
若將驚藥真堪笑痢疾發氣冒頭緩不努不發腸有風冷熱不調分赤



白勝肚因毒熱相攻十二種痼何爲忌禁口刮腸大不同孩兒有病不可下不熱自汗兼自瀉神困顛陷四肢冷乾嘔氣虛神怯怕吐翻白眼毛焦穗赤氣潮熱食不化鼻塞咳嗽及虛痰脈細腸鳴煩燥訝方將積與球通下了之時必生詫孩兒實熱下無辜面赤睛紅氣壯強脈大弦洪肚上熱臍腹疼痛尿如湯屎硬腹脹脇肋滿四肢浮腫夜啼長遍體生瘡肚隱痛下之必愈是爲良

○小兒脈理

小兒一歲變蒸已足方有脈自寸口而生予見小兒初生未滿月手望靜骨之際亦有脈息啜啜而動脈有氣血之波瀾既生乃成人必有氣血焉得無脈只不比大人察其端的之之意也

○小兒脈歌

小兒有病須憑脈一指三關定息數遲冷數熱古今傳淨風沉積當先敲左手人迎主邪証右手氣口主府疾初候風寒暑濕侵以候乳食痰積

致咽紫無汗是傷寒浮緩傷風有汗液浮洪多是風熱盛沉細元陽
食積滯聚腹中痛不休弦緊喉間作氣急紫促之時疹生緊數之際
驚風至劇轉慢驚作瘰癧緊實風癰發搐搦而細者為邪盡平而實
考因便閉脈洪大小便中血崩漏有氣兼驚悸滑主遺尿冷所傷因急
客忤若煩詘太小不勻為惡候二至為脫三至卒五至為厥四至損六
至平和曰無疾七至八至病尤輕九至十至病勢急此訣舊中無

○小兒五臟主病脈歌

心脈

心脈浮數驚悸熱

傷者焦啼明白誤

吊腸疝氣及盤腸

應結口瘡小膽泄

心脈沉遲臟腑寒

諸氣有冷痛難當

小便頻數腸中冷

下指端詳仔細者

肝脈

肝脈浮數定主風

目赤翳膜又主筋

流淚出血眼生翳

或痒或痛怕羞明

脾脉

肝脉沉遲主有寒
良醫仔細要察脾

面青唇白眼喜淚
諸病傳以候候候

脾脉浮熱熱痰涎

能食胃惡脾臟堅
滯順口瘡停壅結

唇紅臉赤胃中熱

脾脉沉遲主風吹

更加吐瀉腹脾傳
氣虛胃弱不能食

滯順嘔惡醒脾也

肺脉浮數主便血

傷寒咳嗽遍身熱
氣急喘盛或瘧疹

瀉痢潮熱木腑溢

肺脉沉遲主虛寒

臟腑滑腸或洞泄
仍有咳嗽與痰涎

下根不定即無根

腎脉浮數實有熱

偏墜脇肋痛又赤
口臭咬牙是腎驚

停身齒內出鮮血

腎脉沉遲定有寒

臟腑停滯入腎囊
偏墜膀胱尤不痛

腎脉

肺脉

光浮虛火最難當

○小兒死証真訣

黑色如針懸眼下，虛驚也。須怕忽然腹痛，鼻青時，不必更求醫，面色退，目橫入耳，此候必死。又黑色繞口，及連目，看者定不足。黑起眉間，也不良。十日必然亡。人中黑色入口，來孩子入鼻，埋水腫之病，準頭黑，報君腎氣滅，咳嗽切忌白入眉，肺絕要君知。孩子吐時，鼻色白，命斷難再得。中風切忌面如靛，焉能得久長。目爛無光，兼直視，必定三朝死。更有瞳人不動時，死候要君知。目似開，如又不開，此是死之媒。口禁全然不進乳，此病終不起。漏下之物如溺血，孩兒不得活。長吐不止，止又吐沫，要勞心，顧爾久不食，更嘆久終與死爲隣。瀉痢不歇，歇又來，指目下泉白，小便艱難，又太渴，畢竟難得活。太便用藥全不通，通也無功。耳上生瘡，黑斑出，醫人無此術。久嗽四肢皆逆冷，無由難得醒。體熱多應，應不醒，休要藥，精神瘡疹出，後熱不退，此候應爲害。下藥青黑不止時，不用煎。

良醫文惠之後加燥渴命必難得活腹腫脹時氣又虛終久命不甦

○小兒死候形症

太衝無脈滿口粘涎身出黑汗舌縮生瘡五心凸腫瀉出黑血丹毒遍身
消止又瀉直視看人面黑狂燥驚叫咬入吐瀉不止魚口氣急身乾黑
燥忽作鴉聲啼哭無淚兩眼半開四肢癱瘓氣喘無煙肚大青筋四肢
逆冷汗珠不流唇反舌縮用手撮入搖頭動身顫門作坑涎如牽鋸拘
腰凸肚鼻內氣冷患者皆然已上並是死候難以醫救不可順情

○看兒眼法

小兒諸病但是兩眼無精光黑睛無運轉自曉無蜂芒如魚眼貓眼之狀
箇箇不治或神藏於內外若昏困者無妨其有病焉而眼中神氣不脫
者可以活眼者五臟六腑神氣之所發神氣已脫脈雖僅存亦未能保

○相兒命短長法

兒初生呼聲連延相屬者壽聲絕而復揚急者不壽

喘聲散不成人。

喘聲深不成人。

臍中無血者好。

臍小者不壽。

通身軟弱如綿骨者不壽。

衣大者壽。

自開自者不成人。

目視不正數動者大非壽。

汗血者多死不壽。

汗不流不成人。

小便疑如脂者不成人。

頭四破不成人。

常搖手足者不成人。

頭毛不周匝者不成人。

早坐早行早齒早語皆惡性非佳兒。

髮稀少者強不聽人。

作不聽。

額上有旋毛者早貴妨父母。

兒生枕骨不成者能言而死。

尻骨不成者能偃而死。

掌骨不成者能匍匐而死。

踵骨不成者能行而死。

脛骨不成者能立而死。

身不收者死。

唇口者死。

股肱無生肉者死。

頭下破者死。

陰不起者死。

陰囊下白者死。

卵縫通達黑者壽。

壽世保元

卷八

六

○急驚馬

脉訣啓蒙曰：小兒脉促急爲虛驚。○直挺云涼數洪緊爲急驚。○沉遲散緩爲慢驚。○虎口脉紋青紫爲驚風。○紅者風熱輕。○赤者風熱盛。○青者驚積。○紫者驚熱。○青紫相半驚積風熱俱有。主急驚風。○青而淡紫伸縮來去主慢驚風。○紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出而不出主慢脾風。○形勢滑入裏者順。○出外者逆。

夫急驚風者因內有鬱熱外挾風邪心家受熱而積驚肺家生風而發熱夫木制在金火盛則金受尅金衰不能平木木能生火火得風則煽煽起故子母縱橫血亂氣併痰涎壅塞關竅不通風火蕃盛而不得泄爲烈而盛急驚也其症牙關緊急壯熱深潮寤視反張搐搦攣動唇口撮眼眦引頻併六脈浮散洪緊治先搐鼻通關痰涎壅盛以吐風散吐後次用敗毒散保命丹或雄黃解毒丸下之驚退而神志未定投安神散

一但噴嚏不下通關不曉眼睛垂轉口中出血兩足攣跳肝風偏動或神緩而摸床尋衣症篤而神昏氣促心中熱痛忽大呼聲者不治

噫散

半夏

牙皂

等分藥末用豆許吹入鼻中

○一論小兒急慢驚風發熱口噤不少人事手心伏熱痰涎咳嗽上壅肺急並宜湧法

吐風散

全蝎炒一箇瓜蒂炒十箇赤小豆三十箇

右爲末每一歲兒服一字溫米飲調下未吐再服

○一論小兒急驚風初起發熱手足搐搦眼上視等症并一切感冒風寒頭疼發熱咳嗽鼻塞聲重及痘疹欲出發搐并時行瘟疫等症宜加味敗毒散

羌活

獨活

前胡

紫胡

白茯苓

去皮人參

枳殼 煨 橘梗

天麻

全蝎

姜發

白附子

地骨皮

川芎

甘草

右作二劑 生薑三片 水煎熱服

○一論小兒急驚搐搦 眼番口噤 搖頭天吊 痰嗽喘熱服

商極薄星湯

膽星

防風

白附子

蟬退

薄荷

甘草

右剉水煎服

○一論小兒潮熱驚啼

木通

車前

赤茯苓

麥門冬

蟬退

防風

白芍

甘草

燈草

水煎服

○一論小兒驚風咳嗽痰喘

天南星

一箇 大者炮去裂爲末 每服一錢 生薑三片 水煎溫服

○一論小兒胎驚內串 肚腹堅硬 目睛上視 手足搐搦 用弓反張 痰嗽喘

熱一切急慢驚風並皆治之

至聖保命丹

南星

炮去皮用白熱水浸一宿取出

半夏

同上製青黛

薄荷

各一兩

全蝎

去尾尖

天麻

白附子

各炒

姜

姜汁

少

防風

鬱金

甘草

各五錢

麝香

少許

朱砂

爲末

五錢

右爲細末煉蜜爲丸朱砂爲衣次實大每服一丸燈心薄荷湯化下

○一論小兒痰喘急慢驚風至死但能開口灌下無不活者用

千金散

內閣秘傳

全蝎

炙熟

直姜

各三

朱砂

四分

牛黃

六釐

冰片

天麻

黃連

各四分

膽星

甘草

各二分

右爲末每服五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○一論驚風退後恍惚虛怯安神定志調理之劑

安神散

人參

茯苓

去皮

遠志

去心

天麻

白附子

麥門冬

去心

全蝎

去尾

連肉

茯神

去皮

朱砂

分

右爲細末，每服燈心湯調下。

○一小兒沉困發熱驚搐不乳，視其脈紋如亂，魚骨此風熱急驚之症也。先用抱龍丸少許祛風化痰，後用六君子湯加柴胡、枳實、平肝，遂熱退而驚定愈矣。

○一小兒痰癆啼叫，額間青黑，此驚風肝木乘脾，腹中作痛也。先用六君子湯加木香、柴胡、釣藤、鉤吻，啼叫漸緩，更加當歸，又二劑而安。

○一小兒目內色青，發搐目上視，啼哭不已，或用牛黃清心丸，不愈反咬牙，頓悶小便自遺，此肝經血氣虛甚故耳。余用補中益氣湯及六味地黃丸，九劑而痊。

慢驚

夫慢驚風者，因外感風寒，內傷乳食，而作吐瀉，或得大病之餘，或誤吐下，

之過脾胃兩虛脾與肺母子也母虛亦令子虛而生粘痰胃虛則能生風風能動能開故其症目偏喜開痰涎咽喉如牽鋸狀口鼻氣冷唇緩面青涎流口角將復垂危是也治宜祛風活痰健脾生胃不可妄用腦麝巴粉等藥其有眼閉四肢厥冷者名曰慢脾風極危焉速用回陽之藥手足漸溫復以醒脾散理之其服藥不效太衝脈尚有者灸百會穴但面黯神慘魚口鴉聲胃痛脇動身冷粘汗頭搖髮直睛定口瘡喘噤片時唇縮氣絕者不治也

加味和中散

治小兒慢驚風

人參

白朮

去蘆各一錢

白茯苓

去皮

陳皮

各五分

半夏

七分

全蝎

炒五分

天麻

七分

細辛

三分

薄荷

薄荷

甘草

各二分

右到一劑生薑棗煎服乳母亦宜服之

○一論小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沈默默不食宜

醒脾散

人參

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

木香

金蝎

姜蚕

白附子

天麻

甘草

○一方去天麻姜蚕加泡南星半夏麴陳倉米二百粒水煎旋旋服之
右劉生薑三片棗一枚水煎服

○一論慢驚乃元氣虛損而至昏愎急灸百會穴若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總歸虛處惟脾受之無風可逐無驚可療此因脾虛不能攝涎而作痰也此方專治慢驚涎潮發搐或吐或瀉不思飲食神昏氣弱宜用
紫金錠子

人參

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

白茯神

去皮

山藥

炒

乳香

赤石脂

煅辰砂

各三錢

麝香

一錢

右爲細末以糕下兩爲丸如彈子大金箔爲衣每下粒薄荷湯研化服
○一小兒嘔吐不食手足搐搦涎涎上壅手足指冷額黑唇青此腎水勝

心火也。用五味異功散加木香炮姜頓安。乃去炮姜再劑而愈。

○一小兒潮熱發搐，痰涎上湧，手足指冷，左腮至中酉時青中隱白，手足時搐，此肝經虛弱，肺金所勝，而潮搐脾土虛弱，而手足冷也。用補中益氣湯以調補脾肺，用六味地黃丸以滋補肝腎，而愈。蓋病氣有餘，當認爲元氣不足。若用瀉金伐肝，清熱化痰，則誤矣。

○一小兒慢驚睡多驚，啼九面黃，脈細者，難治。用此藥與乳母服之，釀乳法。

木香

沉香

藿香

丁香減半

陳皮

人參

神麴炒

麥芽炒

右劉每服四錢。紫蘇十葉，生薑十片，棗子枚，水煎先令乳母食後，搗去宿乳汁服之，即便臥。要時令藥入乳之，脈次令兒吮，不可過飽，亦服法。五味異功散方見脾胃補中益氣湯方見脾胃六味地黃丸方見諸疳。

慢脾

慢脾之症面赤額汗舌短頭低眼合不開睡中搖頭吐舌頻嘔腥臭禁口咬牙床手足微搐不收或身冷或身溫而四肢冷其脉沉微陰氣極虛胃氣極虛十救一二蓋由慢驚之後吐瀉損脾病傳已極續歸虛處惟脾所受故曰慢脾風若還風則無風可逐癰驚則無驚可療但脾間痰涎壅滯而然耳世所謂慢驚難療者慢脾風是也宜服
加味四君子湯

人參一錢

白茯苓五分 蒼朮三分

炮乾姜四分 白朮炒六分

製附子一分

羌活三分

炙甘草四分

右劉生薑三片棗一枚水煎服

○一論慢驚慢脾虛惡之症藥力不到者但看兩脚面中間陷處有太冲脉即灸百會穴三五壯炷如小麥大灸後仍與醒脾之劑調之

○論小兒慢脾風肉虛昏迷不醒宜
加味大醒脾散

人參

白朮去蘆炒 白茯苓去皮 橘紅

丁香

木香

南星炮 金錫去毒炒 天麻煨

白附子煨

山藥炒

石蓮肉去殼 石菖蒲 肉豆蔻

砂仁

甘草炙

右劉生薑三片棗二枚水煎服回陽加附子

○一論小兒驚風後聲啞不能言及諸病後不能言

天南星一箇炮去皮爲末每半字五歲兒半錢獾猪膽汁調食前服

○一論治慢驚慢脾之聖藥也一錢卽有起死回生之功頃刻奏效故名
回生錠真海上仙丹也急驚亦効

回生錠

人參五錢

白朮去蘆油 白茯苓去皮 懷山藥

桔梗各一兩

甘草三錢

膽星五錢 赤石脂煨 五辰砂三錢

乳香二錢另

蒙右

三錢 金 色

牛黃一錢

麝香一錢

右爲末

五月五日午時取

粽搗勻

印作錠子

金箔爲衣

陰乾

每服三五

分薄荷湯化下

諸疳

脉訣啓蒙曰小兒脉卑細爲疳勞○虎口紋白色白色者爲疳

夫疳者甘肥無節乳哺不調或稟賦怯弱血氣不足蓋十五歲已前爲疳

已後爲勞也書載五疳病關五臟要亦脾家有二臟有積失治而傳其

餘也脾家病去餘臟皆已症雖分乎冷熱治當以補爲先宜用地黃丸

五疳膏肥兒丸之類

○一論小兒疳病面黃肌瘦肚大青筋太便色疳白小便便澀或澀之如米泔此疳病也

消疳湯

山查

白芍炒

黃連姜汁炒白茯苓

白朮

夫藟

澤瀉各一錢青皮四分

甘草生三分

右剉子剉薑薑煮煎服

○一治小兒疳積發熱肚大青筋骨瘦如柴消疳退熱飲

山查去子

烏藥

燈心

竹茹

檳榔尖

史君子去殼 蕪夷仁

淮水通

黑牽牛

大黃

柴胡

莪朮煨

枳殼去穢

黃芩

甜葶藶

右剉水煎溫服

○一論肝膽經熱毒癰癰或耳內耳下生瘡發熱潮熱或肝經濕熱下生囊癰便毒腫潰或小腹脇股結核九肝膽經部分一切瘡瘍發熱並用九味柴胡湯

柴胡

黃芩炒

各五人參

山梔

半夏

龍膽草

當歸

芍藥各三分甘草二分

水煎服

○一論小兒肝疳白膜遮睛肝經虛熱血燥或風客淫邪而肝經凝結核

或四肢發搖眼目抽動痰涎上壅凡傷損出血多由搖發熱又治腎症
腦熱消瘦手足如水寒熱往來滑泄肚脹口臭乾澀齒齦清血黑而
驚遍身兩耳生瘡或耳內出水或發熱自汗盜汗便血諸血失瘡或小
便淋閉咳嗽吐血或咽喉燥痛口舌瘡裂或稟腎不足肢體痠弱解頰
鶴節五遲五軟或畏明下竄或早近女色精血虧耗五臟齊損凡屬腎
肝諸虛不足之症皆宜用此以滋化源其功不能盡述

六味地黃丸

懷生地黃

酒浸砂盆內焙乾盛熱至極黑搗碎入

山茱萸

酒蒸去核取肉

乾山藥

略切

牡丹皮

去骨

白茯苓

去皮

澤瀉

去毛

各三兩

右忌鐵器為細末和地黃膏加煉蜜為丸如梧子大每服三五十丸空

心白滾水下

○一治小兒五疳潮熱面黃肌瘦煩渴壯大青筋手足如柴精神困倦
試有效無疾預服此藥則諸疾不生元氣虛弱者服半月身體健壯

保嬰五疳膏

青皮麩炒 破橘紅 五錢

白朮去蘆蜜水炒一兩半

白茯苓 七錢半

麥門冬去心 兩 史君子肉炒七錢半

山查肉 五錢 麥芽炒五錢

金櫻子肉炒五錢

芡實仁二錢 蓮肉心 甘草一錢半

右爲細末和勻重七兩每次用藥末一兩煉蜜四兩調成膏每日中晚間各服一二茶匙溫水漱口○身熱咳嗽加地骨皮百部○肚腹飽

脹大使稀水腹鳴作聲或蟲出不知加檳榔二錢木香一錢而受氣

弱加入參二錢半

○一論消疳化積磨癰清熱伐肝補脾進食殺蟲潤肌膚養元氣真也

肥兒丸

人參 三錢半 白朮去蘆

白茯苓去皮 黃連錢半 胡黃連 五錢

史君子去殼神麩炒

麥芽炒

山查肉各三錢 甘草各三錢

蘆薈二錢半 碗底泥封固置坑中四面皆搗少煨透用

右爲木黃米煨爲餅白湯化下或作丸黍米大每服二三餅九歲見木

癖疾

夫癖塊者嬰兒飲食失調三焦關格以致停滯腸胃不得宣通初得爲積久則氣血與痰熱積塞于腹脇及癰家縱飲生冷漿水亦能成之其症作痛傷時面黃肌瘦倦怠無力或生潮熱寒熱是也治先定去寒熱次用消堅故結和脾益胃之劑理之更用次去貽藥又之自効

○一論小兒腹中癖塊發熱增寒口乾小便赤或太便秘澀或腹脹腫滿或痰嗽喘熱不思飲食面黃肌瘦四肢困倦等症。

淨府湯

柴胡一錢

黃芩八分半夏姜炒八分

人參三分

白朮

去蘆炒八分

白茯苓

去皮猪苓五分 澤瀉二錢

三棱煨七分 莪朮煨七分

山楂肉一錢 胡黃連三分 甘草三分

右剉下剉生薑三片棗二枚水煎服

○一論小兒癰積日久不消元氣虛弱脾胃虧損肌肉消削肝大青筋絡熱口乾肚腹脹滿。

抑肝扶脾散

人參五分

白朮

土炒

茯苓八分

陳皮六分

青皮

香油炒

龍膽草

酒洗

白芥子

炒

柴胡三分

山查肉八分

神麴

炒

六分

黃連

姜炒

胡黃連三分甘草三分

右剉一劑生薑三片棗二枚水煎溫服

黃龍丸

扶滿劑小兒傳

雄黃

一錢半

蜈蚣

二條

砂鍋內炒去

蘆薈三分

阿膠

三分

牛黃一分

天竺黃

三分

右爲末化黃蠟二兩爲丸如葶豆大先服七丸則熱退次服九丸則

消三服十一丸則病根除每用黃蠟煎雞子清入藥于內黃酒下

肥兒丸方見前

治疳積如神

○一專貼癰積氣塊身腫發熱口内生疳此藥用狗皮攤貼患處每箇重七錢貼三日止熱七日覺腹微痛十日大便下膿血爲驗大有神効忌生冷腥葷發物百日

神仙化癰膏

真香油

吐所秦尤五錢

三棱五錢

黃丹

一片二兩水飛過炒紫

黃栢五錢

穿山甲片四

當歸三錢

莪朮五錢

全蝎十四箇

大黃三錢

蜈蚣五錢

木鱉子七箇

右將藥入油內煎黃色爲度濃去渣搗爛待用油冷時下黃丹用文火熬槐柳條不住手搗黑烟起滴水成珠手試軟硬方可離火次下五味細藥並入搗爛粗渣於內

真阿魏

一兩乳香五錢

沒藥五錢

麝香一錢

皮硝二錢風化

攪勻以磁器內盛之如用坐水中鏤開不可火上化如用馬刀攪平

加琥珀一兩，在內無不効驗。

○一將軍百戰百勝膏

貼癰疽神

大黃

白芷 各二兩三錢

我朮 各一兩 木鱉子 十箇

蜈蚣 十條

穿山甲 片五巴豆 十箇

五 草麻子 十箇 梔子 五箇

黃連 五錢

槐柳條 三百寸

香油一斤。入藥熬黑色去渣，淨再加生肌丹一斤，熬滴水成珠，再加血

竭五錢，蘆薈五錢，天竺黃五錢，輕粉五錢，阿魏五錢，麝香五分，胡黃連

二錢，硼砂二錢，爲末，下油爲妙。

○一治小兒癰疾發熱之甚，及眼瞽方。

明目化癰丹

牛黃 一分

片腦 一分

熊膽 一分

麝香 三錢

乳香 三錢

右共爲細末。先將乳汁於銅杓中炭火上滾，黃色下，煎藥忌厚，出攪勻，於油車紙上，丸如米粒大，男左女右，肝時點入，大眼角內，令眼自化，頭

上出汗至胸前第二九汗至膝上第三九汗至膝下再點三九腹痛下膿血即愈妙不可言。

化癖金丹

內閣秘傳

蟾酥水泡

黃蠟各二錢 羚羊角

牛黃各五分 麝香三分

巴豆肉一錢 硃砂

冰片各一分

右爲末丸如菜子大每用一粒用扁頭針在患處刺破皮入之用清藥貼上丁伏時揭起其癖化膿血出盡服調理脾胃之藥而愈。

○一論小兒患癖年深不愈諸醫以攻冠殺伐之劑屢投不愈以致元氣耗傷脾胃損傷血氣乾涸肢體羸瘦面色萎黃肚大青筋身熱自汗喘急氣促泄瀉腹脹浮腫不思飲食予以補中益氣湯入服而愈。

熱證

小兒之病惟熱居多天熱有虛有實實則面紅目赤寒熱只乾燥渴小便

赤澁。太便秘閉。五心煩熱。日夜焦喘。發壯熱。宜太連翹飲主之。虛則回
白眼青氣微。口中清冷。恍惚神緩。太便秘。而小便頻夜。出盜汗。發虛熱。
宜惺惺散主之。其有身體乍冷乍熱。佛髻驚惕。上盛下虛。此冷熱不調。
候也。如熱在裏。宜汗在裏。宜下。表裏俱熱。則宜解散。其或表裏已解。熱
又時來。此表裏俱虛。氣不歸元。而陽浮於外。不可再用服涼藥。必使陽欲
於內。身體自涼。宜參苓白朮散主之。又有潮熱。則發熱有時。驚熱。顛叫
恍惚。夜熱多發。且止。餘熱寒邪未盡。食熱。肝腹先發。熱。骨蒸盜汗。
壯熱。一向不止。煩熱。心燥。不安。積熱。煩赤口瘡。風熱。汗出身熱。虛熱。困
倦。少力。客熱。來去不定。瘧熱。凝嗽。飲水寒熱。發如瘡狀。血熱。已午時發
熱。瘧熱。身熱。大冷。十六者。大同而小異。諸症得之。各有所歸。其間或
有三兩症交互者。宜隨其輕重而處治之。蓋小兒氣稟純陽。臟腑生熱。
陰陽氣變。蒸於外。致令身熱也。若肝熱。則兩眼赤痛流淚。羞明。或生
翳。若心熱。則口内生瘡。小便赤腫淋瀝不通。肺熱。則鼻衄不止。太腑閉。

結脾熱則多涎沫。日內長流。心脾熱則生重舌。舌本舌胃熱則作口臭。腎熱則耳聾。或出膿汁。此五臟所生。主熱各不同。是不可以舉論也。木抵熱則生風。風則悵矣。

○一論小兒心經邪熱。心與小腸受盛。乃水實之處。常宜通利。壅則結滑。則脫。熱則溢。盛則淋。平涼心火。三焦自順。不待疾作而解。証成而療者。踈待有之矣。十五味加湯使用。緣於熱客熱寒邪風邪冒之肺經。心將受之。不受觸傳于小腸。或閉或泄。或赤或白。淋瀝不通。榮衛不通。壅之作疾。其發多端。以致膈熱。眼目赤腫。唇白。口瘡。津液不生。涕唾稠盛。須在表裏俱得其宜。驚風悉能散之。痰熱亦自消除。連翹之功可謂大矣。

大連翹飲

連翹

蜜麥穗

滑石

車前子

牛勞子

赤芍藥

各八分

山梔子

木通

當歸

防風

各四分

黃芩

分錢一

柴胡

甘草

各一分

荆芥穗

二錢

燈心五分

右劉作下痢竹葉十箇燈草十莖水煎服之風厥熱發熱加麥門冬
○實熱丹熱加大黃○胎熱瘡瘍條毒加薄荷葉○癰疽疔毒加黃
一論小兒頭積熱毒唇口腫破生瘡牙齦出血口臭煩熱咽乾煩燥不
寧并疳積餘毒未解或頭面身體多生瘡癰宜
五福化毒丹

犀角 另三錢 桔梗 一兩

生地黄 酒浸 赤茯苓 去皮 鼠粘子 微炒 各

粉草

林硝 各三錢 連翹

玄參 各六錢 青黛 二錢

右爲細末煉蜜爲丸如龍眼大每服一丸薄荷湯研化下兼有
一論小兒驚風一症乃小兒蒸皮長骨變爲精神不須服藥其有
風咳嗽痰涎鼻衄聲嘶連綿蒸發熱宜服此方

惺惺散

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮 甘草 炙

桔梗

白芍 炒

天花粉

細辛

薄荷葉

右劉每服二錢水煎溫服

感冒

○一論小兒感冒或冒寒。

用老葱三四根，春破爛以手抹來，相搽遍身，烘溫，晚間病者遍身搽之，通氣處，再偏搽幾遍，脫處出汗立愈。又不相效。

出痘疹，屢驗絕妙。

○一治小兒面青身冷，默默不語，用熾火通身，手足按穴，燂之立醒。

○一論小兒傷寒頭痛，壯熱惡寒，咳嗽鼻壅，聲重，痘疹欲出，發熱驚風，嘔吐，手足攣攣等症，宜服。

人參敗毒散

羌活

獨活

柴胡

前胡

枳殼

桔梗

白茯苓

川芎

薄荷葉

人參

甘草

右剉姜葱煎服

○一論小兒風寒。外感驚風。內積發熱。喘促咳嗽痰涎。潮熱搐搦。并痘疹初作。

人參

羌活

獨活

前胡

川芎

枳椇

天麻各五錢薄荷

地骨皮各三甘草一錢

右爲細末。煉蜜爲丸。如芡實大。每服一丸。薑湯研化下。

○一論小兒四時感冒傷風。瘟疫身熱。昏睡氣粗。喘滿痰壅。驚風潮搐。蠱毒中暑。并瘡疹欲出。發搐皆可服之。壯實小兒。三五日服一丸。可免驚風痰嗽等疾。宜。

抱龍丸

南星

時辰月貴牛。胎中陰毒。

天竺黃

雄黃

辰砂

研各四錢。

麝香一錢

石爲細末。炙甘草膏爲丸。如皂角子大。每服一丸。薄荷湯研化下。百發百中。作三服。或用臘雪水。煮甘草膏。和藥尤佳。

按右方若風熱痰嗽或急驚發搐昏睡咬牙形病俱實宜用此方若初
冒風寒咳嗽痰盛氣喘者屬客邪內作也先用十一味參蘇飲若邪既
解而腹脹吐瀉或發搐咬牙睡而露睛屬脾肺氣虛也用四君子湯加
陳皮名異功散切忌祛痰表散若過服而致前症者尤宜溫補脾肺
參蘇飲方見咳嗽

脾胃

一論小兒諸病因藥攻伐元氣虛損脾胃衰憊惡寒發熱肢體倦怠飲食
少思或兼飲食勞倦頭痛身熱煩燥作渴尿赤大弦虛或微細軟弱
右關寸獨甚亦宜用之大力久病或過服攻伐之劑腐損元氣而前症
悉具者最宜此湯調補若無前症致兒為患者尤宜用之

補中益氣湯

黃芪 蜜水炒 揀參 各八分 白朮 土油 當歸身 白朮 各一錢

康皮

甘草

炙各五升

柴胡各二分

右剉碎棗煎空心溫服

○論小兒脾胃虛弱或因就伐之劑致飲食少思或食而難化或飲作嘔或大便不實脾胃虛損吐瀉少食宜用

四君子湯

人參

白朮

去蘆炒白茯苓去皮甘草各等分

右剉碎棗煎服

六君子湯

治脾胃虛弱飲食少思或大便不調肢體消瘦面色萎黃

卽四君子湯加陳皮半夏

○論小兒脾胃虛弱吐瀉不食或嘔噎痞盛或臍而露臍手足冰冷或脾肺虛弱咳嗽吐痰或虛熱上攻口舌生瘡弄舌涎涎若母有痰兒患此者母亦當服之

異功散

人參

白茯苓 去皮 白朮 去蘆 甘草 炙

一陳皮 各等分

右剉姜棗煎服

傷食

經云脉滑者有宿食也。○虛口脉紋黃色爲脾家有積。○小兒脉乳者爲夫小兒傷食皆因乳哺不節過養生於堅硬之物脾胃不能消化積滯中脘外爲風寒所熱或因夜卧失蓋以致頭疼身熱面黃目胞微腫腹痛脇脹足冷肚熱喜睡神昏不思飲食或惡食或惡心或嘔或噦或口噤酸氣或大便敗水臭或氣短痞悶或胃口作痛或心下痞滿按之則痛此皆爲陳積所傷也宜以藹億丸利之若內停於食或外又感寒邪積則小迎氣口俱緊盛頭疼惡寒拘急兼前等症宜以太和散去積利之曰乳者奶也哺者食也乳後不可與食食後不可與乳緣小兒脾胃未弱乳食易傷難以消化初得成積久則成癖成癖變爲百病可不慎乎

萬應丸方見通治治傷食百病

○一論肉傷乳食肚腹脹痛外感風寒頭疼發熱宜服

太和散

紫蘇

陳皮

香附

羌活

蒼朮

川芎

枳殼

山楂

神麴炒

麥芽炒

甘草

生薑三片水煎溫服

○一治小兒食積腹痛膨脹肚硬青筋 塔山王景明傳

黑丑

炒生半檳榔各三錢木香五分

右爲細末每服五分黑砂糖調入滾水服立消

○一論小兒時常傷食皮黃肌瘦肚大腹脹用此焦餅令常食之

消食餅

蓮肉去皮

山藥炒

白茯苓去皮去實去殼炒

神曲炒

麥芽炒

扁豆炒

山楂去子

右各等分爲末，每四兩入白麴一斤，水同和，焙焦餅用。

○一論此藥消食止泄，止吐，消疳，消黃，消脹，定腹痛，益元氣，健脾胃。

啓脾丸

人參

白朮

去蘆炒白茯苓

去皮山藥

蓮肉

去心

皮各

山查肉

陳皮

澤瀉

甘草

炙各五錢

右爲末，煉蜜爲丸，如蠶豆大，每三四十丸，空心米湯送下。小兒常患傷食諸疾，服之立愈。

○一論小兒傷食，肚大腹脹。

用蠶酒小麴一收爲末，打入雞子一箇攪勻，入鹽少許，蒸熟食之，每早服一次，可數次而愈。

○一論健脾胃，進飲食，消積滯，殺疳蟲，長肌肉，乃保嬰第一方也。

保嬰丸

臨川徐培鴻試驗

人參三錢

白朮

去蘆

五兩

橘紅

剉淨五

白茯苓

去皮

四錢

甘草

炙二錢

青皮

錢三

砂仁

二錢半

木香

二錢五分

山藥

五錢

蓮肉

去皮

史君子

去殼

山查肉

二錢

三奇

神麴

炒三錢

右共爲細末，用生荷葉包，陳米煮熟，去荷葉，將米拌爛，以淨布扭出，再煮成糊爲丸，如麻仁大，每二十五丸，或三十五丸，至五十丸，陳米炒熟煎湯，不拘時服。

○一小兒食積後，嘔吐，欲吐，頃間腹脹，昏憤，鼻青黃赤，此脾土傷，而心肝所動，食積發厥也。先令雞翎探吐，出酸物，頓醒，節其飲食，勿藥而愈。

○一小兒好，吃粉，成腹脹，痛，用白酒麴，末同煮，連末爲丸服之，愈。

○一小兒因停食，腹脹，服峻利之藥，後患癰，日晡而作，此元氣下陷，以補中益氣湯治之。

千金肥兒餅

小兒無病

日常食

三五餅

可防患

於未然

妙不可言

嬰孩恒關乳

飲食不消

停

胃脾一傷損

吐瀉兩相能

痰嗽加喘喘

熱積致疳驚

面黃肌瘦削

腹脹肚青筋

赤子焦啼呼 慈母苦傷情 吾心懷幼切 家蓮子茯苓
芡實乾山藥 扁豆薏苡仁 已上各四兩 神麴麥芽陳
人參史君子 山查國老并 木味每二兩 占糯米二升
藥米均爲末 布裹甑內蒸 白糖二斤半 調和餅印成
每食二三餅 諸病卽安寧 肥兒王道藥 價可擬千金

吐瀉

夫小兒吐瀉皆因不氣未充。大產易侵。兼以調護失常。乳食不節。遂使脾胃虛弱。清濁相干。蘊作而然。太繁有冷有熱。有食積三者之不同也。蓋冷者脾胃虛寒。水穀不化。小便利。而大便青。或如糟粕。手足厥冷。或吐或瀉。宜助脾胃。去之。如上之症。或兼有外感風寒。內傷生冷。身溫乍涼。乍熱。作吐瀉者。宜藿香正氣散主之。熱者脾胃有濕。大便黃。而小便赤。口乾煩渴。四肢溫暖。或吐或瀉。宜甘露散主之。如上之候。有兼中暑者。

熱作吐瀉者宜如苓湯主之。或益元散亦可。食積者因傷食過多積成
脾胃則吐脹發熱若吐如酸醜氣若渴口敗卵臭宜用傷九微利即愈。
利後不愈乃脾胃虛弱仍以助胃膏主之。凡吐瀉初起即服燒針丸即
固之即効。太抵吐瀉之症多因乳食過傷脾胃乳食停滯則為嘔吐乳
食傷脾則為泄瀉。吐瀉不止漸至日久深重則胃氣之虛而傷及脾氣也。

吐瀉不愈症

小兒瀉不定精神好者脾敗也。○吐瀉唇深紅者內熱故也不與必死。○
面黑氣喘者不治。○大瀉不定止之又瀉腎敗也。○遺瀉不愈者死。

燒針丸

治吐瀉如神

黃丹

水飛過朱砂

白礬

火煨各等分

右為末。棗肉為丸如黃豆大。每服三兩丸。鐵針尖上放燈焰上燒過。性
性研爛。涼米泔水調服。瀉者食前吐者無時外用。棗豆粉以瀉十粒和
作膏塗兩腳心。如瀉塗顙門止則去之。

○一治脾胃虛弱吐瀉不食凡虛寒症先服此以正胃

五味異功散

人參

白朮 去蘆

茯苓 去皮

陳皮

甘草 炙

右劉散姜棗煎服。

○一論小兒吐瀉脾胃虛弱飲食不進腹脹滿腸鳴久瀉虛寒等症助胃膏

人參

白朮 炒

白茯苓

去皮丁香

木香

砂仁

白芷 剉

肉豆蔻

官桂

藿香

甘草 各一錢 陳皮 四錢

山藥 四錢

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服丁九米湯化下兼治乳便泄或時夜啼胎寒腹痛。

○一論四時不正之氣寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛胃風吐瀉中濕身重泄瀉脾胃不和或飲食停滯復感外寒頭疼身重或嘔

逆惡心膈膈痞悶或發寒熱無汗

藿香正氣散

藿香一錢

紫蘇八分

陳皮

厚朴姜炒

半夏姜炒

白朮

去麩炒

白茯苓

去皮

桔梗

大腹皮

白芷

甘草

炙各五分

劉涓子藥方煎服

○一論小兒夏秋之月霍亂吐瀉身熱口渴

加減茹苓湯

猪苓七分

澤瀉七分

白朮

去麩五

赤茯苓

去皮

黃連

五分

香茹七分

乾葛七分

天花粉二錢

甘草

五分

右剉生薑煎服

○如熱極加

石膏知母

○瀉極加

升麻

○腹痛加

炒白芍

芍一錢

桂三分

寒瀉亦加

○一論小兒五種泄瀉赤白痢疾宜用

鐵門全

文蛤

一兩 炒

白礬

二錢 半生牛括

黃丹

二錢

右爲末用黃蠟二兩化開爲丸如菽豆大每服大人十五丸小兒五七丸用茶下錢姜二錢煎湯下

○一小兒水瀉痢疾用蜜三匙枯礬末三錢蘿蔔汁調服出微汗忌酒
○一論小兒脾胃久虛嘔吐泄瀉頻仍不止津液枯竭發熱煩渴多寐但欲飲水乳食不進疏因失治變成慢驚風癇不問陰陽虛實並宜服之
七味白朮散

人參

白朮

去蘆炒白茯苓

去皮黃耆

木香

乾葛

甘草

右剉薑棗煎服○如小兒頻頻瀉利將成慢驚加山藥扁豆肉豆蔻各一錢姜汁一匕煎服○若慢驚已作加細辛天麻各一錢全蝎三箇白附子八分○若小兒冬月吐乳多是胃寒胃虛所致加丁香二粒○若胃虛不能食而太渴不止者不可用淡滲之藥乃胃元氣少安也○白

水散補之。○如不能食而渴者。倍乾葛加天花粉。○如能食而渴者。倍黃連。○一論小兒嘔吐不止宜。

金粟兒

水香

半夏麴

南星

湯泡麴薑汁炒

丁香

陳皮各二錢砂仁

藿香各五錢

人參一錢半

右為細末薑汁打糊和成錠辰砂為衣淡姜湯送下。

○一論小兒久瀉久痢不止及滿口生瘡白爛如泥痛哭不已諸醫罔效

巴豆

去殼

瓜子仁

七箇

燒紙錢

一箇

共搗

一處

如泥

津調貼在兩

眉間正中待成泡揭去即愈。

○一論小兒泄瀉用巴豆研末為膏貼在額門上燒線香丁

○一論小兒泄瀉不止用山藥炒為末不拘多少入粥同煮食之立止

○一論小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或暴青者藥到

口即嘔吐審乳母愛傷脾太便不實先用補中益氣湯後用五味異

壽世保元

辛集八卷

二十四

功散及四神丸調治其母不兩月而子母俱痊。

○小兒傷食嘔吐服尅伐之藥嘔中見血用清熱涼血之藥又太便下血唇色白而或青問其故於余余曰此脾土腐損肝木所乘而然也令空心用補中益氣湯食遠用異功散以調補中氣使瘀血各歸其處而

○小兒吐瀉不止或取轉過多四肢發厥虛風不省人事用此即肢漸暖神識漸省。

回陽散

禾南星爲末每服三錢入京棗三枚同煎溫服。

○一治小兒吐不定

五倍子二箇丁生丁熟甘草一搗用濕紙裹炮過同爲末每服半匙米

痢疾

天小兒八痢者乃飢飽勞役風寒暑濕因觸冒天地八風之邪而得故以

命者止大抵多由脾胃不和飲食過度停積於脾胃不能消化又為風寒暑濕干之故為此症候則赤白痢則白傷風則純下清血傷濕則下如豆汁冷熱交并赤白兼下若下迫後重裏急後迫急痛者太性急速而能燥物故也或夏末秋初忽有暴折於盛熱無所發散客得肌膚之中發於外則為癰發於內則為痢內外俱發則為癰痢危痢病久則令腫滿下焦偏冷上焦偏結則為上實下虛若脾胃濕熱之毒熏蒸滯滯而上以致胃中閉塞而禁口之症又有丁方丁家之內上下傳染毒幼相似是疫毒痢也當先抽其歲運以平其外察其鬱結以調其內審其所傷別其虛實冷熱以治之條然明白不致妄投也。

痢疾不治證

凡小兒下痢如豆腐色者死○下如屋漏水者死○下痢日久太孔如孔者死○下痢如竹筒注水者死○又小兒赤白同下久而不禁小便赤澀腹痛發熱唇紅舌胎氣促心煩坐卧不安狂渴飲水穀道頻陷時復

面赤似粧飲食全不進和血不治

清熱化滯湯

治痢主方

黃連

吳茱萸煎湯拌炒

白芍藥

陳皮

白茯苓去皮

枳殼去殼炒黃芩

甘草

右剉生薑一片水煎穿心溫服○初起積熱正熾加大黃芒硝○血痢加酒炒黃芩當歸地榆○白痢加厚朴枳殼○赤白並下加川芎歸尾桃仁紅花滑石陳皮乾姜炒黑○白痢久虛加白朮黃芪茯苓去黃連枳殼○赤痢久虛下後未愈去芩連加川歸白芍白朮川芎阿膠珠○裏急後重加水香檳榔○腹痛加白芍川歸玄胡索枳殼○小使赤少加水通格苓澤瀉○下如豆汁加白朮蒼朮防風○食積加山楂枳實麥芽神曲○久痢氣血兩虛加人參黃芪當歸川芎升麻肉蔻○下後子便流利惟後重不去者氣陷于下也以升麻提之

○一論小兒痢疾屬熱居多用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅

花印煎加滑石末同煎

關板丹

黃丹

飛過

二黃蠟一兩

乳香一錢

沒藥一錢

杏仁

去皮尖

巴豆

去油八

右將四味爲細末將黃蠟鑊開後將末藥同蠟拌勻攪令成丸如粟
豆大每服一丸空心服紅痢令甘草湯下白痢冷乾薑湯下水瀉冷米
湯下忌生冷油膩

一治休息痢及痢瀉日久不能安

用鷄子一枚打破用黃蠟一塊如指大銚內銘以雞子拌和炒熟飲之

一治小兒痢疾方

用雞子一箇冷水下鍋煮二三沸取出去白用黃研碎以生薑汁半小
鍾和勻與兒服之不用茶神効

一治小兒患痢脰肚色赤或痛以補中益氣湯送香連佐而愈後傷食

作瀉復脫肛不入仍以益氣湯服更以葦麻仁研末填肛

○一治小兒久痢裏急後重欲去不去手足並冷皆因氣虛藥下陷也以補中益氣湯加木香補骨脂倍加升麻柴胡

○一治紅痢及噤口

用田螺搗爛盒脐中填刺效

○一治痢不拘赤白

白蘿蔔汁蜜各等分攪勻服三四匙效

○一治小兒噤口痢用甜梨一個挖去心塞填補紙筒火煨熟切上止

○一治噤口痢湯飲米穀不下者

石蓮子去殼并內紅皮及心爲細末每服搗兒木小或五分或一錢二

錢用陳倉米湯調下如嘔加生姜汁一二匙

○一治血痢用苦參炒爲末每服三分或五分米湯調下

○一治白痢用肉豆蔻麝香包煨乳香丁粒共爲末每服二三分米湯調服

○一治久痢不止用陳蘿蔔煎湯下服立止○一方用葛葉煎湯服效
○一治漏痢久不止不肯服藥用肉苳燕煨去油獨赤三錢麥麴四兩同
和切麴入葱搗煮如常食之

瘧疾

夫瘧者外因感受風寒暑濕內因飲食飢飽而作也其症不一先寒後熱
者名寒瘧先熱後寒者名溫瘧寒而不熱者名牝瘧熱而不寒者名癘
瘧不寒而熱骨節疼痛身重腹脹自汗善嘔者名濕瘧瘧氣吞酸胸膈
不利者名食瘧一日一發受病一月間自一發受病半年連發五日謂
丁且者氣血俱病也起于三陽者多熱而發于三陰者多寒而
發于夜發于日者隨症而治發于夜者加無聲并用升提暫瘧可截久
瘧加補經久不愈縱兒飲水結癖中脘名曰瘧母此最難痊一二發間
用截太早必變浮腫疔利之疾然嬰兒之瘧自飲食得之居多治須以

消導扶胃氣為本。此秘訣也。

○一論食噎嘔吐聚沫及時行癰瘡不問先寒後熱諸瘡通用。

清脾飲

青皮

厚朴姜炒

草果

白朮去蘆

白茯苓

去皮

柴胡

黃芩

半夏姜炒

甘草

右剉薑煎服。○小便赤加滑石澤瀉。

○一論傷食感寒發瘡及中脘虛寒嘔逆惡心等症。

養胃湯

蒼朮米泔浸厚朴姜汁炒陳皮

半夏姜炒

白茯苓

去皮

人參

草果

藿香

甘草

右剉烏梅丁箇。生薑水煎服。

截瘡飲

白朮去蘆

蒼朮米泔浸陳皮

青皮去穢

柴胡

黃芩

猪苓

澤瀉

常山

甘草

右剉薑棗水煎露一宿溫服○有汗而熱多者加入參黃芪前胡知母
○無汗熱多者加乾葛紫蘇○寒多者加乾姜草果○痰多加半夏貝母
○食積加枳實山楂神曲麥芽○夜多者加附子加當歸止麻○二日
三日一發者加入參黃芪白朮烏梅去蒼朮○單寒加乾姜附子人參
去柴芩猪苓澤瀉○腹痛加厚朴枳實○室女熱入血室加小胡湯
截癰仙丹

五月五日午時用雄黑豆四十九箇先一日以水泡去皮研爛入水
五分同搗爲丸如黃豆大雄黃一錢爲丸陰乾收貯即發日早晨面東
無根水下下丸忌熱酒熱物一時仍忌魚腥生冷之物三日黑豆圓是
○一乳見癰疾瘡癤

川芎

生芩

白芍藥各一錢陳皮

生薑

炒芩各一錢甘草

右作一服薑三片煎下帶甲未生錢

壽世保元

三集八卷

二八

○一治風痰邪盛用天靈蓋煅存性爲末每服三錢溫酒調下立已

痰喘

痰者風之苗然生於心痰生於火火者痰之根靜則伏於脾土動則發於肺金水澄則清水沸則渾小兒痰嗽乃心火剋制肺金或寒邪停留肺喻寒化爲熱必生痰喘咳逆上氣肺脹動搖爲馬脾風又爲風痰若不速治立見危殆

奪命丹

治小兒風痰灌膈利痰去風

青礬石煨爲末煉蜜爲丸如粟豆大每七八丸薄荷湯下

○一治小兒風痰吐沫氣喘咳嗽肚腹膨脹不思飲食

小兒肺脹喘嗽 多人看作風喉 太黃攪脾二藥

人參分兩等分

五味研成細末 蜜水調量稀稠 每將一掌下咽喉 不用神針灸

右其證肺脹喘滿肚高氣急山脇攪動陷下作坑兩鼻竅張口亂喘

聲裏不鳴，喉涎潮塞，俗云馬嘶風，若不急治，死于旦夕也。
定喘湯 治喘喘氣急

麻黃 六分

杏仁 三枚

去皮尖

半夏 六分

甘草 水炮

黃芩 微炒 三分

桑白皮 三錢

蘇子 四錢

款冬花 六分

甘草 二分

白果 五枚

打碎炒黃

右判水煎，溫服，不必用生薑。

一論小兒脾胃虛寒，久嗽不已，咽膈滿悶，咳嗽痰涎，嘔逆惡心，肚腹膨脹，腰背倦痛，虛勞冷嗽，諸藥無効者，服。

人參款冬膏

人參 八錢

紫苑 一兩

款冬花 八錢

桑白皮 三兩

貝母 二錢半

桔梗 二錢

紫蘇 五錢

檳榔 五錢

木香 五錢

杏仁 錢

去皮炒八

五味子 八錢

馬兜鈴 二錢半

右為末，煉蜜為丸，如龍眼大，每一丸薑湯化服。

一論小兒喉中痰壅，喘甚，神効方。

書上 六二

下 六二

六二

用巴豆一粒搗爛作一丸以綿花包裹男左女右塞鼻痰即墜下

咳嗽

夫咳嗽者肺爲嬌臟外主身之皮毛內爲五臟華蓋形寒飲冷燥熱鬱蒸最爲傷也而肺實肺虛皆能壅痰而發咳也咳嗽二症難作一途咳謂無痰有聲肺氣傷而不清嗽謂無聲有痰脾濕動而生痰咳嗽謂有聲有痰因傷肺氣兼動脾濕也其症感風寒者鼻寒聲重停寒者悽悽怯寒夾熱者則焦煩受濕者爲纏滯停水者則怔忡若痰飲則咳有痰聲痰出咳止火極則咳聲不轉而赤痰結肺氣則喘滿氣急息重風痰壅盛則咳至極頻吐乳食與痰俱盡方得少息而或實或虛則視痰之黃白唾之稀稠而可知也以二歲論之春乃上升之氣夏乃火氣炎上秋白濕熱傷肺冬則風寒外束以一月論之清於本日痰火午後皆曰虛夜間或有食積其咳而吐膿血者肺熱感也久痰不已必傷驚悸頑

涎甚至眼眵紫黑如物傷損。味征赤如血大可畏。久治風寒。此藥散頑執。宜清利受濕。用勝濕之藥。停水。且瀉水之劑。痰飲即除。痰久積則降入肺。肺則養血。味辛風痰壅盛。宜春胃而去風痰也。況肺生胃門更能溫中與表順。助其氣。滋潤肺經和順三焦。一將是氣壯。則咳嗽止。胃復則痰不生。肺滋則咳不有。乳母忌食。慎風寒。咳何從而生乎。

○一論春夏秋傷風咳嗽痰熱喘急非夾驚傷寒等症宜雄朱九

牛膽南星

天花粉

各一薄荷

荊芥

防風

羌活

天麻

朱砂

雄黃各六錢麝香三分

右爲細末粳米飯煮。薄荷湯送下。

○一論冬月感寒咳嗽夜不得睡以此發之

九寶飲

薄荷

紫蘇

大腹皮

麻黃

桂枝

桑白皮

杏仁

陳皮

甘草

右剉生薑二片，烏梅一箇，水煎溫服。

○一論小兒四時感冒，發熱頭疼，咳嗽喘急，痰涎壅盛，鼻塞聲重，涕唾稠粘，及肉傷外感，一切發熱等症，宜服。

參蘇飲

紫蘇

陳皮

桔梗

前胡

半夏

乾葛

白茯苓

去皮枳殼 去穢

人參

木香

甘草

右剉生薑煎服。

○一論小兒咳嗽吐痰。

用甜梨一箇，空小孔，入硼砂一分，燒熟與服，或搗汁亦可。

○一論小兒一切咳嗽，不用。

寧救膏

麻黃

杏仁

去皮尖桔梗 去蘆

甘草

知母

貝母

款冬花

黃芩

紫苑各五錢黃連四錢

香附

二錢童便炒牛膽南星一兩

右爲細末煉蜜爲丸如芡實大每下丸白湯食後化下

○一論小兒身熱感冒鼻流清涕或鼻塞咳嗽吐痰輕者不藥候一二日自愈重者服此方治痰爲主輕輕和解之

白朮

去蘊

一白茯苓

去皮七分桑白皮

蜜炙七分川芎

五分

桔梗

五分

薄荷

三分

橘紅

五分

半夏

泡五分防風

四分

甘草

三分

薄荷

三分

枯芩

炒三分

右判下劑生薑水煎服

○一治小兒傷風咳嗽發熱服解表之劑如喘促出汗此脾肺氣虛以補中益氣湯加五味子

發沙

小兒發沙有陰有陽陰沙則腹痛而手足冷陽沙則腹痛而手足溫或甚

症似寒非寒似熱非熱四肢厥逆飲食不思容顏慘起爲症不一俗呼爲沙病非沙也多由感冒風寒而裏水傷濕得之其治之法宜用熱水醃搭臂膊將苧麻頻頻刮之候紅色出爲度其右宜以針刺其十指背近爪處一分許仍先將兒兩手自臂持下令血聚指頭方刺或視其身背有紅點以燈草蘸香油照燈燒之已上諸法使腠理開通寒邪易散氣血通暢而已矣

○一論小兒攪腸沙心腹腰諸痛用

火龍丹

雄黃

焰硝各二錢

共研細末每用簪挑些點眼角太背男左女右立愈

通治

神效萬應丸

朱砂

巴豆去殼

寒食麵

右先將朱砂研爛，卽將巴豆同研極細，却以寒食麵、好酒打成糕，入藥中，仍同研百餘下，再揉和爲丸，如黍米大，凡所服，不過三五丸而已。看虛實，加減，照後引下。

一感冒風寒，薑蔥湯下，出汗。

一心痛，艾葉煎湯，入醋少許，送下。

一心膨氣脹，淡薑湯送下。

一痢疾，空心茶清送下。

一瘡疾，薑湯下。

一切雜病，茶清下。

太乙混元丹

紫河車焙乾二錢

白梅花三錢辰砂一兩甘草一兩水煎下

滑石六兩用杜丹皮二兩煎水去

香附米一兩蜜水煎送

粉草

生半兩

甘草四錢

莪朮

少

三砂仁

去皮

三益智

去殼

六錢

山藥

二錢半

人參

去蘆

一錢

黃芪

蜜水炒

白茯苓

去皮

白茯苓

去皮

神

二錢半

遠志

甘草水

泡去心

一錢

牛黃

三分

天竺黃

一錢

一方

無混

衣梅花

桔梗

去蘆

一木香

一錢

麝香

三分

右共爲細末

煉蜜爲丸

如龍眼

大金丹

爲衣

每服量

見

大小

加減

大人

婦人

諸病

並皆治之

一中風痰厥

不省人事

薑湯

研下

一傷寒來驚發熱

薑葱湯

研下

宜出汗

一停食嘔吐腹脹

太便酸臭

姜湯下

一泄瀉米湯下

一咳嗽喘急

麻黃杏仁湯下

一蟲痛苦練根湯下

一夜啼不止

薑黃湯下

一霍亂紫蘇木瓜湯下

一赤白痢疾

陳倉米湯下

一積聚腹痛

薑湯下

一疝氣偏墜

大小茴香湯下

一急驚搐搦

薄荷湯下

一慢驚人參白朮湯下。

一小便不通車前子湯下。

一發熱金錢薄荷湯下。

一中暑煩渴燈心湯下。

一疳熱身瘦肚大手足細或淋或瀉或腫或脹或喘或嗽陳倉米湯下。

一論小兒諸病有餘壯盛者宜服萬應丸小兒諸病不足虛弱者宜服

雄黃解毒丸

雄黃二錢半 麝金二錢半 巴豆二十四箇去油

右爲末醋煮糊爲丸如菉豆大每服七丸熱茶清吞下。

一中風卒然倒仆牙關緊急角弓反張不省人事茶清送下吐瀉立止。

一小兒急驚風痰熱等症加牛黃五分硼砂一錢水糊丸薄荷湯下。

一纏喉風急喉閉每七丸研化以熱水研白梅花調下或熱茶下卽甦。

則流通之意纏喉風卒死心頭猶溫者灌下卽甦。

一瘡疾中有毒用沉香磨水送下泄下黑血如泥極其立効

一諸積下痢魚五苓散送下

一疔瘡加全蝎下錢皂角下錢麝香少許滴水丸每服二十丸茶下若始不覺是疔瘡不肯發汗過數日方覺即寒熱體痛皆罷毒氣入裏須用利藥使肉中毒氣下泄此藥主之

一瘰癧瘡加斑猫七箇去翅足糯米炒冷茶下

一切熱毒癰盛又能取積消食下熱茶下

小兒初生

小兒五宜

一小兒分娩初離母體口有穢毒啼聲未發急用軟綿裹指拭去口中惡汁倘或不及預煎甘草黃連濃汁灌之待吐出惡沫方授乳吃或用好朱砂冰飛過煉白蜜調和成膏如小豆大乳汁化服三日內止進三粒

以除胎毒痘疹之患也

一初生三五日宜紉縛令臥勿豎頭抱出免致驚癇

一乳與食不宜一時混吃兒生疳癖痞積

一兒衣宜用年老人舊裙舊襖改作小兒衣衫令兒有毒雖富貴之家切不可製紵絲綾羅縐絨之類與小兒穿不惟生病抑且折福

一兒生四五箇月止與乳吃六箇月以後方與稀粥哺之周歲已前切不可吃葷腥生冷之物令兒多痰苦待二三歲後臟腑稍壯方與葷腥庶可若到五歲後食之尤嘉一云小兒永無雜疾大忌雜肉絕妙

洗兒法

一初生兒洗浴不可先斷臍帶候洗了方斷不致水濕傷臍可免臍風臍疔等症浴兒調和湯水須看令熱得宜不可久浴久浴則傷風寒夏不可久浴久浴則傷熱浴時當護兒背免風邪而人不使發熱成癩疾用五根湯洗以免瘡疥之患

五根湯

桃根

柳根

梅根

桑根

槐根

加苦參

白芷同煎辟諸不祥

右每味二兩洗淨切碎用水煮去渣加猪膽汁一椀候水溫洗投金銀銅器則辟諸惡邪之氣

斷臍法

一小兒初生洗訖斷臍不可用刀割以軟絹裹臍或隔單衣咬斷蓋臍不可令長又不可太短只取兒足掌長如長引疳風則成臍風之患短則傷臟內痛面青啼叫臍帶中有穢蟲宜急撥去不然入腹成疾

變蒸論

夫小兒之初生血氣未足陰陽未和臟腑未實骨格未全有變蒸之候變者蒸也蒸者熱也所以變者五臟蒸蒸六腑須要變蒸多則則

節臟腑由是而全胎毒亦因之而散氣血方榮性情有異後未出胎下
輕可也自生之日始每至二十日一變凡人有三百六十五骨除手足指
十五碎骨外正有三百二十骨自生下骨而止下日十骨三十二日爲
一變骨氣始全一變生一臟或一腑十變則臟腑始足每變輕則發熱
微汗其狀似驚重則壯熱脈亂而數或吐或汗或煩啼燥渴輕者五日
解重則八日解凡小兒之病無不由變熱而得也而不熱不驚無他
病候是暗變者多矣此受胎氣壯故也凡變熱須看兒唇白如上唇微
腫有如卧蚕或有珠泡子者是其變熱之候也此則決不可妄投針灸
藥餌若誤之則爲藥引入各經證遂難識而且纏綿不脫反爲藥之所
害也煩或因傷食因傷風因驚嚇等項來雜相值而發令人疑惑亦須
守候二三日俟其病勢其的是食則消食是風則行痰是驚則安神隨
症調治或非變熱時而得傷寒時行溫病則口上無白泡其診皆相似
惟耳及尻通熱此爲他病可作餘治業幼科者不可不詳究耶

小兒初生雜證論方

大小兒初出腹，骨氣未斂，肌肉未成，猶尚是血。血凝則堅，而成肌肉也。又云：如水上之泡，草頭之露。夫初生一臘之內，天地八風之邪，豈能遽害良由在胎之時，母失愛護，或勞動氣血相干，或坐卧飢飽相役，飲酒食肉，冷熱相制，恐怖驚撲，血脉相亂，繼毒于內，損傷胎元，而降生之後，故有胎熱、胎寒、胎肥、胎怯、胎驚、胎黃、諸症生焉。外因浴洗拭口，斷脐灸臍，之不得法，或絆抱驚恐，乳哺寒溫之乖其宜，致令噤口、臍風、鎖肚、不乳等症，病而致此，亦難治療。良可哀憫。小兒雜病諸方，悉陳于後。

胎熱	胎寒	胎肥	胎怯	胎黃	胎驚	鎖肚	不乳	臍風
撮口	噤風	客忤	不尿	夜啼	中惡	天弔	驚口	口瘡
重舌	木舌	弄舌	牙疳	吃泥	丹毒	赤遊	喉痺	乳蛾
眼疾	耳膿	鼻瘡	頭瘡	臍瘡	蟲痛	尾疳	陰腫	疳氣

盤腸 氣痛 脫肛 遺尿 尿濁 便血 下淋 吐血 衄血
小便閉 大便秘 水腫 黃疸 汗症 解顛 鶴節 行遲 諸遲
語遲 齒遲 龜胸 龜背 滯顛 顛陷 顛填 手拳 脚拳
痘瘡 麻疹

胎熱

○一論胎熱因母孕時食熱毒之物過多令兒生下身熱面赤眼閉口中
氣熱焦啼燥渴或大小便不通法當漸次解熱先令乳母服藥兒服乳
即解決不可速効以涼藥攻之必致嘔吐而成大患也慎之慎之
乳方

生地黃 二錢 澤瀉 二錢 半 猪苓 去黑皮 赤茯苓 去皮 天花粉 各一錢
茵陳 甘草 各一錢

右剉散每服三錢水一盞煎七分令乳母捏去宿乳却服藥少頃乳之

胎寒

○一論胎寒。乳母孕時受寒。生下再感外邪。令兒面色青白。四肢厥冷。太便青黑。口冷。腹痛。身起寒慄等症。即宜當歸散服之。

當歸散

當歸炒

黃芪蜜炙

桂心

黃芩

細辛

龍骨細研

赤芍各二錢

右爲末。每服一字。以乳汁調下。日進三服。仍看兒大小加減。

胎肥

○一論胎肥。小兒生下。肥肉厚。遍身血色紅。滿月以後。漸漸羸瘦。目白睛粉紅色。五心煩熱。太便難時。時生涎。當浴體更別。父母肥瘦。肥不可生。瘦瘦不可生。肥。

胎怯

○一論胎怯。小兒面無精光。肌肉薄弱。太便白水。身無血色。時時哽氣。多啼。且無精彩。宜以浴體法主之。

浴體法

天麻末二錢。蝎稍去毒。

朱砂各半錢。白礬。

青黛各二錢。

烏蛇肉三錢。酒浸焙。

麝香一字。

右同研勻。每用三錢水三碗。桃枝下握。并葉五七箇同煎。去滓溫熱浴之。浴時勿浴背。

胎黃

○一論胎黃者。皆因乳母受熱而傳於胎也。兒生下遍體面目皆黃。狀如黃金色。身上壯熱。大便不通。小便如梔子汁。乳食不思。啼哭不止。宜以

地黃湯主之

生地黃

赤芍

川芎

當歸

天花粉

猪苓

澤瀉

赤茯苓

茵陳

甘草各等分

右剉每服五錢水煎食前乳母服并略滴些少與兒口中

胎驚

○一論胎驚者由胎婦調適乖常飲食嗜慾忿怒驚撲母有所觸胎必感之或外挾風邪有傷於胎故子乘母氣生下卽病也其候月內溫壯帶眼握拳噤口咬牙身腰強直涎潮嘔吐搐搦驚啼腮縮頭閉或頰赤或面青眼合其有著繫撮口之類亦此二種之所發也視其眉間氣色紅赤鮮碧者可治若黯青黑者不治虎口指紋曲入裏者可治反出外者不治治宜鮮散風邪利驚化痰順氣青金丸主之慎不可作他藥也

青金丸

人參

天麻煨

白茯苓去皮

白附子炮

牛膽南星

各二錢

甘草炙

一錢 青黛一錢

朱砂

水飛半錢

麝香一字

右爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，用釣藤皂莢子煎湯研化，不拘時服。

鎖肚

○一論鎖肚者，由胎中受熱毒，壅盛結於肛門，太小便閉而不通，腹脹欲絕者，急令婦人以溫水先漱了口，吸吮兒前後心并臍下手足心共七處，每一處凡三五次漱口，吸吮取紅赤爲度，須臾自通，不爾無生，有此症，知此法，可得再生。

不乳

○一論不乳者，謂初出胞胎而不吮乳也。嬰兒初出胎時，其聲未發，急以手拭其口，令惡血淨盡，不得下咽，卽無他病。若拭口不全，惡穢入腹，則

令腹滿氣短不能吮乳或產母受冷過度胎中受寒致令兒腹滿肚直
茯苓丸

赤茯苓去皮川黃連去毛枳殼去穰炙炒各等分

右爲末煉蜜爲丸如梧子大每服一丸乳汁化下

撮口

○一論撮口者由胎氣挾熱風邪入臍流毒心脾之經故令舌強唇青
口啼聲不出者當視其齒齙之上有小泡子如粟米狀急以溫水蘸
熟綿布裹手指輕輕擦破卽開口便安甚者用牛黃三分竹瀝一錢散
調勻滴入口中卽愈

噤風

○一論噤風者眼閉口噤啼聲漸小舌上聚肉如粟米狀吮乳不得口吐

白沫。大小便皆通。自滿月一百二十日見此。名曰犯風。噤可急看。兒上
膊有黠子。先以指甲輕輕刮破。次服定命散。如口噤不開。諸藥不効者。
生南星去皮。臍研為極細末。龍腦少許。和勻。搗離生薑汁。於大牙齦上
擦之。立開。凡臍風撮口。噤風三者。雖異其受病之原則一也。大抵氣
鬱結。壅閉不通。並宜服淡豆豉汁。與吃。取下胎毒。千金云。小兒初生。其
氣高盛。若有微患。卽須下之。若不下。時則成太疾。難為療矣。紫雲丸

定命散

治初生小兒口噤不開

蟬退

十四箇

全蝎

十四箇

右為細末

入輕粉少許。和勻。乳汁調服。

臍風

一論臍風多因斷臍為風濕所乘。或者胎元有熱毒。則見下胎時。其
臍必硬直。定有臍風。必自臍發出青一道。行至肚却生兩道。行步心者
必死。於青筋初發。急用燈心蘸香油。內風於青筋頭。并各行盡處。燻之。

以截住不致致心更以外灸中脘三壯內服萬應九二十粒以

○一治小兒臍風撮口用完全生葱搗汁用直姜蚕三箇研末調塗丹乳頭上令兒吮之或用乳調蚕末灌之兒口即開

一治臍風撮口用田螺搗爛入麝香一分再搗塗臍上立効
經驗五通膏 治小兒臍風撮口

生地黃

生薑

葱白

蘿蔔子

田螺肉各等分

右共搗爛搗臍四圍一指厚抱住候一時許有屁下泄而愈

○一治臍風用蟾蜍一條將尾鬚二根剪斷自然出水滴入臍內少頃即愈其蟲只在多年墻孔內取人家水缸底亦有

一秘方治臍風撮口

姜蚕末三分牛黃六釐水片 麝香各一釐先將姜蚕牛黃搽上次將

片麝用蝦蟇膽調抹之

一小兒犯撮口風荷包風驚口風臍風等項并牙齒邊生白點名爲馬口

作痛啼哭不吮乳卽看口內堅硬之處或牙齦處白點點針挑破出血用如墨調薄荷湯以手指搗過再用其母油髮蘸墨遍口擦之仍用新絹蘸新井水展口卽愈

客忤

○一論客忤者初生兒因別房暑戶外人來氣息忤之下名中人是爲客忤也及家人或乘馬行得馬汗氣息或衣漆穢暴之氣未盥洗易衣便向兒邊皆令忤也小兒衣布帛中不得有頭髮穢中亦謂曰衣穢帶青衣白帶皆令中忤亦能驚兒致病欲防之法從外來所忌之物當將避之勿令兒見慎護三歲之內方無忌也

不尿

○一論小兒初生不尿者有因在胎之時母食糟餼炙等毒之物熱氣流

入胎出竟因飲血是以生下肚腹膨脹腎腫如蠶勝四傍有青黑色及
口撮即不可救也如有青黑色不飲乳者服葱乳湯
葱白切作四散用乳汁半小盞同煎片時分作四次服即服之即飲者

夜啼

○一論小兒夜啼者此是邪熱乘心也宜

花火膏 用燈花三顆以乳汁調抹兒口或抹母乳上令兒吮之

○一治小兒觸犯禁忌而夜啼者宜醋炭薰服蘇合香丸

○一方用艾柴頭一箇長四五寸削平下面朱砂寫云撥火杖撥火杖差
來提神將捉着夜啼鬼打殺不要放急急如律令

○又方治夜啼不止用朱砂書甲寅二字貼床頭即止

○一治小兒夜啼用竹園內無葉之竹名爲仲人杖取三尺放兒膝處勿
使入知即時愈

○一治小兒夜啼不止，心經有熱，有虛冷。

安神散

人參

黃連

姜汁炒各一錢半

甘草五分

右剉竹葉二十片，生薑一

片，水煎服。

○一方治驚啼用亂

○燒灰酒調服

○一論小兒夜啼狀若鬼祟

蟬退七箇半截爲末，初生抄一字薄荷湯入酒少許調下，或者不信，將上半截爲末，依前湯調下，復啼如初，古人立法莫知其妙。

○一治夜啼用朱砂筆寫在小兒臍上

子

勝卯

午

○一治夜啼用尿溲約水洗淨，莫令人知，覆在兒床土即止。

中惡

○一論中惡，天男者，冒犯邪氣也。小兒卒中，惡毒心腹刺痛，悶亂欲死，此症

辟邪膏

治中惡

降真香

白膠香

沉香

虎頭骨

鬼臼

龍膽草

人參

白茯苓

去皮各五錢

右爲細末。入雄黃五錢。麝香一錢。煉蜜爲丸。乳香湯下。

天弔

○一治小兒天弔潮熱

鈎藤散

鈎藤

人參

甘草炙一錢半

犀角

鎊屑各五錢

天麻各二錢半

右剉作四劑。水煎溫服。

鵝口

○一論小兒鵝口。口瘡者。胃中濕熱也。小兒口中百病。鵝口。口瘡。重則不能吮乳。及咽喉腫塞。下切熱毒。

牛黃散

牛黃

冰片

硼砂

辰砂

研各

雄黃

青黛各二分牙硝一分半黃連末八分黃柏末八分

右共入乳鉢內研勻每用少許傳入口內

○一治小兒驚風不能食乳用地龍搗水塗瘡即愈即瘡蟲也

口瘡

○一治口瘡

瀉心湯 用川黃連淨爲細末每服下字蜜水調下

○一論小兒口舌生瘡乃心脾受熱口瘡赤心臍熱口瘡白脾臍冷口瘡

黃脾臍熱宜用

吳茱萸末醋調傳脾心移夜即愈藥性雖熱能引熱下行其功至良

○一論治小兒滿口白爛生瘡口糜

壽世保元

辛集八卷

卷二

白朮 猪苓 澤瀉 木通 生地 赤苓 肉桂 甘草各等分

○一論小兒白口瘡 黃丹巴豆仁同炒焦去宜用丹搽瘡上立已

咽喉并口瘡 我也有妙方 白礬二錢許 硼砂一錢強

咽痛用吹入 口瘡蜜調當 一次若不愈 再用管安康

重舌

○一論重舌者脾經實火也小兒心脾有熱舌下有形如舌而小者名曰

重舌及唇出兩傍生瘡

當歸連翹湯 治重舌

歸尾 連翹 白芷 各三錢 大黃 煨甘草 各一錢 右剉作二劑水煎食後頻

○一方治重舌用蒲黃塗之 ○一方用膽礬研細敷之

○一治小兒重舌木舌乃舌下生舌也

用三棱針於舌下紫脉刺之即愈又宜竹瀝調蒲黃末敷之舌上

○一治小兒絆舌用布針舌下針數下以唐雞屎一搭即愈

○一治小兒絆舌不乳啼哭用布針鰓相消燒紅針下頸挨滑島邊一驗即

木舌

○一論木舌乃舌腫硬不柔和脾經有實火也

瀉黃散 治木舌弄舌

藿香葉七分 山梔一錢 軟石羔五分 防風四分 甘草七分半

右剉下劑水煎不拘時服

○一治木舌 百草霜 芒硝 滑石 爲末酒調傳之

弄舌

○一論小兒舌微露而即收名弄舌屬心脾虧損用補脾散補之舌舒長而收緩名吐舌乃心脾積熱少用前瀉黃散去之燕口舌生瘡作渴飲冷

胃經實熱用瀉黃散作渴畏冷屬胃經虛熱用四君子湯食少作渴或太便不實脾胃虛弱也用吐瀉門七味白朮散若午後甚者脾血虛也四物湯多加參朮茯苓未應用肉傷門補中益氣湯本病未已而弄舌微微露即收得於病後最難瘳出長收緩名舒舌熱在心脾不用熨

補脾散 治弄舌

人參

白朮

去蘖各一錢

白芍

酒炒

白茯苓

各八分

陳皮

川芎

各六分

黃芪

蜜炙

當歸

酒洗

甘草

炙各四分

右剉每劑三錢生薑煎服

牙疳

○一論牙疳者陽明之熱也小兒齒腫流涎腮腫走馬牙疳等症

清胃升麻湯

升麻

川芎

白芍

半夏湯洗各乾葛

防風去蘆

黃連酒炒

生甘草焙五軟石膏煨一錢

白朮七分

白芷三分

右劉水煎熱服能漱即含漱而吐之漱藥不用白朮半夏

○一治小兒走馬牙疳下時腐爛即死用婦人溺桶白垢來煨下錢許入

銅錄三分煨香下分半敷之立効

立効散 治走馬牙疳

青黛

黃柏

枯礬

五倍子各一錢

右爲細末用米泔水先漱口內擦入患處

○一論小兒走馬牙疳牙齦其爛侵蝕骨痛先用甘草湯洗皮令血出至

乏亦理身上肥瘠但見瘡疔用之立効

玉蟾散

蜩皮即蝦蟆不鳴不跳者身兩黃泥裏炙焦二錢生黃連二錢生黃芩

然一錢得香少許石爲細末濕則乾擦乾則香油調抹之

吃泥土

○一論小兒愛吃泥土乃脾胃虛弱所致面色青黃或是不動此皆虛弱
若不急治恐生癰疽

清田里脾湯

軟石膏

黃芩

陳皮

白朮

白茯苓

甘草

胡黃連

使君子

右剉等分水煎瀝服或爲細末放于飲食內令兒服之

黃金餅

治好吃泥土

紫栗土爲末濃煎黃連汁和爲餅服之立愈

丹毒

○一論小兒丹毒赤腫風熱狂燥睡卧不安胸膈煩悶咽喉腫痛九竅不通血妄行遍身丹毒及痘瘡已出未出不能快透或已出熱不解急宜服犀角消毒飲

牛旁子

微炒荊芥穗

防風

黃芩各一錢犀角一錢

甘草各五分

右剉水煎不拘時服如無犀角以升麻代之

泥金膏 治丹毒赤遊風

陰地上蚯蚓糞熟灰硝蚯蚓糞三分之二共下處研細新汲水調調厚敷患處乾則再止

喉痺

○一論小兒喉痺風熱兩傍腫者為雙乳蛾易治下傍腫者為單乳蛾難治乳蛾差小者為喉痺熱結於咽喉且麻且痒腫連於外名經喉風喉痺暴發暴死者名走馬喉風宜後方

難危湯

主方

桔梗二錢

山豆根一錢牛旁子一錢荊芥穗八分玄參八分

升麻三分

防風八分

生甘草一錢竹葉五箇

水煎頻服外用硼砂下味化嚥下除痰消腫

○碧雪

碧雪真青黛

硼砂與硝磺

盆過蒲黃甘草末俱生等分搽咽

喉治咽喉腫痛水漿不下或生瘡重舌水舌

○一治喉蛾乳蛾氣絕者即時返活

單乳蛾用皂豆下粒去殼打碎入綿裹臍內塞鼻在左塞左在右塞右

右若雙乳蛾用二粒塞兩鼻

○一喉蛾乳蛾風口古生瘡用黑牛膽一箇入生白礬末二兩銀朱五錢

入膽內陰乾取出研末每少許吹入喉內神效

眼疾

○論小兒兩眼腫痛上焦火盛也

吹鼻散 暴發赤痛

乳香

沒藥各五分雄黃三分 火焰一兩 黃丹水飛一分

右爲細末每少許吹兩鼻孔

○一論小兒未周患兩眼腫痛

拔毒膏 用黃連爲末水調敷脚心手心自愈如腫痛難開加姜黃牙皂

朴硝爲末同敷太陽穴手心足心加葱搗爛敷之尤妙

○一方熟地黃二兩以新汲水浸透搗爛貼兩脚心布裹住効

○一治小兒雀目不計時月

蒼朮二兩爲末每服一錢不計時候以好羊子肝下筒以竹力子批開

摻藥在內麻繩扎定以粟米泔下太盡煮爲度患人先熏眼溫服

耳疾

○一論小兒耳腫耳痛停耳乃三陽風熱雍遏所致宜升陽散火湯加黃柏知母晚服兼服金花丸

○一論小兒耳熱出汁作痒乃痰也腎火上炎也宜用清腎湯

防風

天花粉

貝母

黃柏 薑水炒 白茯苓

玄參

白芷

蔓荊子

天麻

半夏 湯洗各五

生甘草二分半

生薑二片水煎服

○一治小兒耳後月蝕瘡燒蚯蚓糞合猪脂敷之

○一小兒患膿耳出膿水成瘡以蚯蚓糞末吹耳中

○又方治膿耳

羽澤散

枯雄爲末少許吹入耳中即已

○一方用五倍子燒存性爲末吹入耳亦効

○一方用枳殼雞卵殼炒黃色爲細末香油調灌耳內即時痛止

鼻瘡

○一論小兒鼻瘡熱壅傷脾肺主氣通於鼻風濕之氣乘虛客於皮毛入於血脉故鼻下兩傍瘡濕痒爛是名鼻瘡其瘡不痛汙所流處又成斑

澤瀉散治鼻瘡

澤瀉

鬱金

山梔仁

甘草炙各一錢

右爲細末用甘草煎湯調食後臨卧服

○一治久患鼻瘡膿極者用百草霜研細每服五分冷水調服

頭瘡

○一論小兒頭生肥瘡或多生虱子搔痒成瘡膿水出不止

一掃光

細茶一錢口嚼爛水銀研入茶內牙皂 花椒銛二爲末香油調服

○一小兒頭瘡經年不瘥者

白礬五錢

胡粉一兩

水銀一兩

黃連一兩半黃芩一兩

大黃一兩半苦參一兩半松脂一兩半蛇床子十八硃

右爲細末以臘月猪脂和研水銀不時敷之

○一小兒頭瘡胎毒諸風熱惡瘡痘瘡

黃柏

黃連

白芷

五倍子各等分

右爲細末用井花水調稀稠得所鋪開在碗內覆架兩磚上中爲處灼艾煙薰蒸以墨乾爲度仍取下煎藥再研作末清油調塗如有蟲則用

煎油調塗立効

○一小兒頭生禿瘡用通聖散酒拌除太黃另用酒炒共爲末再以酒拌煆乾每服一錢水調服外以白灰燒紅淬入水中乘熱洗之更以開水

子依龍肝懸龍尾黃連白礬爲末油調敷之

臍瘡

○一論小兒因剪臍外傷於風邪以致臍瘡不乾用
礬龍散

枯礬

龍骨煨各五分 共爲細末每用少許乾敷臍上

○一小兒臍中汁出疔痛用枯礬末乾敷○又方黃柏末敷之○又方礬
鹽煨燒灰存性摻之亦可

虫蝨積

○一論小兒蟲積腹痛凡腹疼口中出清水者蟲積也
追蟲散

使君子二錢檳榔一錢 作二劑水煎食遠服

便君散

使君子 去殼一錢

檳榔 一錢

雄黃 五分

右爲末每服一錢苦練根皮煎湯調下

○一治小兒蟲積腹痛用巴豆下投去殼槌去油以朱砂一粒同研勻用雞子下篩開頭微去白入藥在內攪勻仍將紙糊口用稗圈坐在鍋內水浸熟令兒食之或以茶清送下卽打下所積蟲効極捷

○一治小兒吐衄蟲

蛇蟲出口有三般

日鼻中來大不堪

如或自蟲兼黑色

靈丹縱服病難安

練陳湯

苦練根皮 二錢

陳皮

半夏 姜炒

白茯苓 錢

去皮各一

甘草 五分

右剉下劑生薑煎服

○一女子肚大腹脹蟻積瘦弱用馬慈下名地黃食之打下虫來肚腹止

○一治小兒冬月吐乳，多是胃寒胃虛所致。

鐵氏白朮散

人參

白朮 去蘆

白茯苓 去皮

木香

乾葛

甘草 各二錢 丁香 二粒

每服三錢，水煎服。

尾骨痛

○一論小兒尾骨痛，乃是陰虛痰火所致也。

滋陰化痰湯

當歸 酒炒

川芎

白芍 酒炒

熟地黃

黃柏 酒炒

知母 酒炒

陳皮

半夏 姜炒

白茯苓 去皮

甘草 各等分

右剉少用，官桂爲引，或以前胡、木香爲引，如痛不止，加乳香浸藥。

陰腫疝氣

○一論小兒陰腫疝氣者寒邪所驚也。五倍子燒存性爲末，好酒調服，出

○一治疝氣偏墜腫痛不可忍者，槐子炒爲末，每服一錢，入鹽調下，立止。

○一治小兒疝氣小腹引腰脊，彎曲身不能直，京師傳。

青皮

陳皮

三棱

莪朮炮

木香

檳榔

川練肉

芫花

鹽炒各
五錢 梓桂

牽牛

生取木各
三錢

巴豆肉

不去油一錢

右爲細末，麵糊爲丸，如麻子，大每二九空心一服，午前一服，薑湯下。

○一治小兒陰囊忽腫，或坐臥多時，或風邪，或蟲蟻咬者。

蟬退半兩，水一大碗，煎湯洗腫處，其痛立止。若不消，再煎再洗，內服。

五苓散，燈草煎服，方見中暑。

又方，用葱園內蚯蚓糞，以甘草汁調塗腫處，或薄荷汁調亦可。

盤腸氣

○一論小兒驚風氣逆，即服此藥，額上有汗，是小兒驚風，氣逆所致。其口閉，脚冷，或太便青色，不實，上唇乾者是也。此多因生下洗濕感寒，風冷而致也。急用葱湯淋洗其腹，揉葱熨臍腹間，良久尿且湧，自止。

乳香散

治盤腸氣痛

乳香

沒藥

各等分

共爲細末，以木香煎湯調服。

脫肛

○一論小兒脫肛，皆因久患瀉痢所致。太陽頭自裏門出而不收，是也用葱湯薰洗，令軟，送上，或以五倍子末敷而頻托入，又以五倍子煎湯洗之，亦可。

○又方以蠶頭燒存性爲末，香油調敷。一云以此物燒煙薰之，久久自收。又以陳壁土泡湯先薰，後洗亦効。

提氣散 治小兒脫肛，極効。

遺尿

○一論小兒遺尿朱禁者膀胱冷弱也。

益智仁七箇桑螵蛸七箇爲末酒調服用熟白果七箇送下

故紙散 用破故紙炒焦末每服一錢熱湯調下

○一治小兒遺尿六味丸加破故紙益智仁人參肉桂

○一治小兒睡中遺尿不自覺者

官桂爲末雄雞肝一具等分搗丸如小豆大溫水送下每日進三服

○一治小兒遺尿用枯礬牡蠣煨等分爲末米湯調下

尿濁

○一論小便尿濁澄之如米泔水也。

澄清飲

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

白芍

炒

黃連

姜汁炒

澤瀉

山查

去子各一錢

青皮

四分

甘草

生三分

剉

一劑

水煎

空心服

○

治小兒尿濁如米泔水

江

南

做酒

小麴炒為末

每服五分

調酒下

三服

効

便血

○

論便血者

熱傳心肺也

凡初生嬰兒

七日之內

大小便有血出

此

由胎氣熱盛之所致也

謂母食酒麴炙煖熱毒等物

流入心肺

兒在胎

內受之熱毒

亦傳於心肺

且女子熱入於心

故小便有血

男子熱入於

肺

故大便有血

治法

生地黃取自然汁

入蜜少許

和勻

溫服

男女皆然

肺

故大便有血

治法

生地黃取自然汁

入蜜少許

和勻

溫服

男女皆然

○

方用生蒲黃

油頭髮燒灰

各一錢

為末

生地黄汁

或米飲

乳汁

調同

下淋

○一論小兒下淋。乃膀胱有熱。水道不通。淋瀝不止。或尿如豆汁。或如沙石。或如林如膏。或熱淋。尿血。

五淋散

赤茯苓

去皮

赤芍藥

二分

山梔子

二分

條芩

三分

當歸

各二分

甘草

各五分

一方

加生地

澤瀉

木通

滑石

車前子

各二分

右剉

一劑

煎燈心

一團水煎服。

吐血

○一論小兒吐血衄血下血。宜用

黃金丸

黃芩不拘多少。為末。煉蜜為丸。如雞頭實大。三歲兒每一丸。搥湯化。

○一治小兒吐血不止。

黃連末一錢。淡豆豉二十箇。水一盞。煎六分。去渣。溫服。量兒大小。加減。

○一治吐血衄血。

栢枝散

栢枝 晒乾

藕節 晒乾

各等分爲末。三歲兒服半錢。藕汁和發下。

肥白湯調下。

便閉

○一小兒初生。太小便不通。腹脹欲死。急令人以溫水漱口。淨口。及前兒前後心并臍下手足心共七處。每一處九三五次。漱口。吸吮取乳。若偏度。須臾自通。不爾則無生意。

○一論小兒小便不通者。膀胱火盛也。

神通散

小便閉澀不堪言。尋時溲便湧如泉。

爲用兒茶末一錢。蒲黃煎湯來送下。

○一治小便不通腹脹欲死野地蔞黎子不拘多少焙黃色爲末煎通
○又方用水麻燒灰酒調服
○一論小兒大便不通者感腑有熱也小兒風與熱滯留黃土焦腦腸高
起大便不通

沒藥散

沒藥

大黃

枳殼炒

桔梗銹二木香

甘草各二錢

右剉碎二錢薑三片水煎服

○一治新生小兒二三日不大小便用葱汁入乳各半調勻抹在口中同
乳帶下即通

○一揀麻法治小兒大小便不通

取連根葱白一莖生薑一塊淡豆豉二十粒鹽一小匙同研爛搗作餅
子貼臍中烘熱貼之用絹帛扎定良久氣透自通不通再易餅

二妙散

六七月間尋牛糞中有蜚蠊不拘多少用線穿起陰乾收貯用時取一箇要全者放淨磚上四面以灰火烘乾以刀從腰切斷如大便閉用上半截小便閉用下半截二便俱閉全用爲細末新汲水調服。

腫滿

○一論小兒腫滿土虧水旺也并四肢腫滿陽水陰水皆可服。
加味五皮散

五加皮

地骨皮

生薑皮

大腹皮

茯苓皮各一錢

加薑黃

木瓜各一錢

剉散水煎服

○一方去五加皮加白皮

○一治小兒諸般腫脹

黑牽牛半生半炒取頭細末每服一匙桑白皮煎湯磨木香汁調服

黃疸

○一論小兒黃疸寒熱嘔吐而渴或飲冷水身體面目俱黃小水不利不得安臥不重飲食
茯苓滲濕湯

茯苓

茵陳

山梔

黃連

黃芩

防己

白朮

蒼朮

陳皮

青皮

枳殼

猪苓 各一錢 澤瀉 三分

水煎徐徐溫服○如小便不

通加木通如傷食不思飲食加神曲麥芽砂仁

汗症

○一論小兒盜汗潮熱往來

胡黃連柴胡各等分爲細末煉蜜爲丸如鷄頭子大每丁丸至二九銀器中用酒少許化開更入水五分重湯煮二十沸放溫食後利渣服○一治小兒虛汗或心血液盛亦發爲汗此藥收斂心氣

新羅人參

川當歸各三錢

右細剉用雄猪心丁箇切三片每服二錢猪心丁片井水一盞半煎
前作兩次服

○一治小兒盜汗因食封冷之物過多或熱水淘飯大能損土爲水之所
傷則不能制其津液故成汗自出也

牡蠣二錢黃芪蜜炙生地黃各一兩 剉散水煎服

○一治小兒盜汗用五倍子爲末津液調塗臍中丁宿卽止○又方用何
首烏爲末津液調塗臍內効

解顱

○一論小兒解顱者生下顱門不合也長必多愁少笑目白睛多面色晄
白肢體消瘦皆腎虛也

○一治小兒顱顱開解頭縫不合此乃腎氣不成腎主骨髓而腦髓每腎氣

不盛所以腦髓不足故不能合○丹路治解頤以八物湯有熱加酒炒黃連生黃芩甘草水煎服外用布帛緊束及以白芩末傅之

人參地黃丸

人參二錢

懷熟地黃四錢 嫩鹿茸

山藥

白茯苓

去皮

牡丹皮

山茱萸酒蒸去核各三錢

右爲細末煉蜜爲丸如芡實大用入參煎湯研化食遠服

鶴節

○一論小兒鶴節因血氣不充故肌瘦薄骨節暴露如鶴之膝

當歸地黃丸

懷熟地黃酒蒸八錢

山茱萸酒蒸去核

乾山藥

澤瀉去毛

牡丹皮去梗

白茯苓去皮當歸酒洗各三錢

一方加鹿茸酥炙

牛膝去蘆酒洗各二錢

右爲細末煉蜜丸。每用熱水研化食前服。仍以天南星炮去皮
臍研細末。入米醋調敷。絹帛上烘熱貼之。亦良法也。

行遲

○一論小兒行遲。肝腎虛弱。骨髓不充。不能行步。
加味地黃丸

懷熟地黃八錢

山藥四錢

山茱萸

酒蒸去核四錢

白茯苓

去皮

牡丹皮

澤瀉各三錢

嫩鹿茸

酥炙多錢

懷牛膝

去蘆酒洗三錢

五加皮三錢

右爲細末煉蜜爲丸。黍米大。每服一錢。空心鹽湯送下。

○一論小兒稟受元氣不足。顙額開解。肌肉消瘦。腹大面腫。語遲行遲。手
足如蠲。神色昏慢。牙齒生遲。諸遲。

調元散

乾山藥五錢

人參

白茯苓

去皮

白茯苓

去皮

木各二

白朮去蘆二錢 石菖蒲一錢

白芍藥炒

熟地黃黃

當歸

川芎

黃芪

蜜炙各二錢半

甘草炙一錢半

右剉薑棗煎不拘時服嬰兒乳母同服。

語遲

○一論小兒語遲者氣不足也。

菖蒲丸

石菖蒲

人參

麥門冬去心

川芎

遠志

甘草水炮

當歸

乳香

朱砂另研各一錢

右爲末煉蜜爲丸黍米大每服十丸食遠粳米飲送下。

齒遲

○一論小兒齒遲者腎不足也。

有類散

川芎 乾山藥 當歸 白芍炒 甘草炙各二錢半
右爲細末每服二錢白湯調下食後服此乾藥末擦牙齦即生

龜胸

○一論小兒龜胸者因肺熱脹滿攻於胸膈卽成龜胸也又云綠乳母食
麵熱物五辛轉更胸起高也

龜胸丸

川大黃煨六分 天門冬去心

百合

杏仁去皮尖炒

木通去節

枳殼炙炒

桑白皮蜜炙

甜葶藶隔紙炒

軟石膏各一錢

右爲細末煉蜜爲丸黍豆大每服五丸溫水化下食後服此服仍宜灸
兩肩前各一寸半上脘行三膏譴間六處各灸三壯春身從下後起秋
冬從上後起依法灸之

龜背

○一論小兒龜背者由兒生下風邪客於脊入於骨髓致成龜背也龜背之其尿自出

龜背丸

枳殼麩炒

防風去蘆

獨活

大黃浸

前胡去蘆

當歸

麻黃去節各三錢

右爲末麩糊爲丸如黍米大每服十五六丸看兒大小以米湯下食後服仍灸肺俞穴在三椎下兩傍各一寸半心俞穴在五椎下各一寸半膈俞穴在七椎下兩傍各一寸各灸三壯以小兒中指節爲一寸艾炷以小麥灸灸五壯愈

○一治小兒龜背兒生下客風入脊遂於骨髓即成龜背治以龜背丸

節即平取龜尿法用蓮葉置龜于上尿自出

諸遲

○一論小兒行遲齒遲解頤填五軟鵝膝腎痛齒落暗白多愁凡此皆因稟受腎氣不足當以大味丸加鹿茸補之若因精氣未滿而御安以通多致頭目眩暈作渴吐痰或發熱足熱腰腿酸軟或自汗盜汗二便瀉痛變生諸疾難以名狀余常用大味丸八味二九及補中益氣之劑加減用之無不奏効方見補益

○一小兒五歲不能言咸以爲廢人矣但其形瘦瘠乃肺腎不足遂用六味丸加五味鹿茸及補中益氣湯加五味兩月餘形氣漸健將半載能發十二言至年許始聲音明朗方見補益

滯頤

○一論滯頤乃涎流出而清子頤間也涎者脾之液脾胃虛冷故涎自流不能收約法當溫脾為主宜服

溫脾丸

半夏

姜汁炒

木香

五錢

丁香二錢

白姜

炒

五錢

白朮

去蘆炒

青皮

去穢

陳皮

五錢

右爲細末薑汁打稀糊丸麻子大每二三十九米飲送下

頤陷

○一論頤陷乃臟腑有熱渴飲水將成泄痢又則血氣虛弱不能平六腦骨故頤如坑不得滿平宜用黃狗頭骨炙黃爲末鷄蛋清調敷之卽合

頤填

○一論頤頤者頤門腫起也脾主肌肉乳食不常飢飽無度或熱或寒乘于脾家致使臟腑不調其氣上衝為之填脹頤突而高如物堆塚毛髮短黃自汗是也若寒氣上衝則牽輓熱氣上衝則柔軟寒者溫之熱者涼之劑量輕重兼以調氣小兒肝盛風熱文攻亦然未易噬耳

手拳

○一論手拳不展裏受肝氣怏弱致筋脉攣搐兩手伸展無力宜展

當歸

薏苡仁

秦艽

米仁

棗仁

防風

羌活各等分

右為末煉蜜為丸如鷄頭實大麝香湯化下量兒大小服之

脚拳

○一論脚拳不展所宜腎氣不足榮氣未充脚指拳攣無力不能伸屈宜

川牛膝

洗去蘆酒

山茱萸肉

人參

當歸身酒洗

牡丹皮

懷生地黃

補骨脂

右爲末煉蜜爲丸如茱萸大空心溫湯送下

○一治富翁子八歲不能步履皆因看得太嬌放不著手兒身未得去氣以致肌肉軟脆筋骨薄弱用黃土入于火熨內與穿內服地黃丸加入參鹿茸牛膝虎膠骨服未半料兒能行矣

○一治小兒稟賦腎經虛熱耳內生瘡或肌肉消瘦骨節皆響節亦不味丸加鹿茸牛膝各一兩五味子四兩若顯解不食牙齒不生眼睛不黑腿軟難行最宜此藥

痘瘡

夫痘瘡者乃胎毒之所致也。嬰兒在胎之時感其穢毒之氣藏於臟腑之中發時有近遠之不同耳。若值寒暄不常之候痘疹由是而發。且其初

受感深而爲疳積焉。大抵始發之時有因外感風寒而得者有因內傷飲食而得者有因時氣傳染而得者有因跌撲驚恐而得者。大凡初起未見紅點與傷寒相類發熱煩躁臉赤唇紅身痛頭疼乍寒乍熱噴嚏呵欠喘嗽痰涎等症身熱未明疑似之間急須表散可服敗毒散以微發其汗則胎毒隨汗而解而痘疹亦隨發而出矣。痘苗一見之際則禁寒藥恐發得表虛故也。雖視痘之稀稠稀者輕不須用藥而稠者重宜以九味神功飲以化其毒痘自出至痊愈此如減用之能除諸病毒已解盡又看痘之起脹何如如痘不起脹此元氣虛也宜以保元湯主之而痘必起脹又看痘之貫膿何如如痘不貫膿此氣血虛也宜內托散加入乳好酒此貫膿之巧法也。貫膿已滿又看收靨何如若靨不脫原陷黑陷嘔吐白沫爲表虛宜木香散治之若靨不脫寒戰咬牙牙疼泄瀉爲裏虛宜異功散治之有過服熱藥以致熱毒猖狂血氣壅盛痘爛不靨者宜小柴胡湯猪尾膏餅之收靨已畢又看痘後有無餘毒

若餘毒盛必因過服附子熱毒失解聚而不散以致渾身手足赤腫成
癰毒也宜消毒飲五福化毒丹治之又有毒攻發爲諸病宜隨症而治
之大凡癰瘡七日以前爲裏實不可投溫燥之藥能助毒也八日以後
爲裏虛不可投寒涼之劑能伐生氣也但世俗不分寒熱但見疽出不
快舉手悉用陳氏治虛寒熱藥殊不知疽瘡屬燥熱者多宜丹溪涼
血解毒治之若槩投熱劑豈無死者今不知致病之因又不求立方之
意倉卒之際據症檢方漫爾一試設有不應并其書而廢之不惑之甚
也余觀陳氏其意大率歸重于太陰一經蓋以手太陰屬肺主皮毛足
太陰屬脾主肌肉肺金惡寒而易于外感脾土惡濕而無物不受觀其
用丁香薑桂所以治肺之寒用朮附半夏所以治脾之濕使肺果有寒
脾果有濕而兼有虛也量而與之中病則已何傷之有今徒見瘡之出
遲者身熱者泄利者驚悸者氣急者渴思飲者不問寒熱虛實半投水
香散異功散間有傷中墮手獲効設或誤投禍不旋踵何者古人用藥

製方有綱道有監制有反佐有因用陳氏之方之時必痘瘡而挾寒者其用燥熱補之故其宜也今未挾寒而用偏之方寧不過於熱乎余嘗會諸家之粹求其意而用之實未敢據其成方也若痘瘡虛寒淡白色瘡癰屬虛寒者宜用之若發熱壯盛齊勇紅紫色燥痒此屬熱毒宜涼血自陳氏方盛行後屬虛寒者率得生屬熱毒者悉不救痘是胎毒古人治法只解毒然氣血虛則又送毒氣不出及不能成就故陳氏之法既行而解毒之旨遂隱只顧救其虛寒之瘡而不能治其燥熱之瘡也予思治法陳氏與丹溪寒熱兼用俱不可廢如痘瘡陷頂灰白色血戰悶亂腹脹泄瀉者屬虛寒只用異功等方治之如熱盛紅紫癰痒屬熱毒者急用涼血之藥消毒等散相兼而用之豈有不中其病耶予謂痘疹乃小兒之配疾生死反掌古人論之不一有見於寒者有見於熱者學者不可執一而誤赤子之生何也蓋痘疹乃胎毒所致初生小兒失於拭法口中穢毒者一誤也及長失於未用預解胎毒免痘之方者二

誤也。初起發熱有汗而不汗者三誤也。將出之際有不當汗而汗者四誤也。既出之後有毒盛瀉解毒而不瀉者五誤也。起脹貫臍之時有瀉補虛而不補虛者六誤也。有首尾証平不當下而下者七誤也。有首尾實熱當下而不下者八誤也。有首尾虛寒當溫補而不溫補者九誤也。有過服熱藥致痘瘡後餘毒瀉解毒而不瀉者十誤也。凡此十誤當預慎之務加通變故曰寒者溫之熱者涼之虛者補之實者瀉之又曰化而裁之神而明之若斯治者庶免小兒夭枉之禍耳。

視痘顏色輕重之法

空谷而響應形動而影隨夫痘瘡之發也。內熱和緩達於外者必輕便閉煩燥彰於外者必重有諸中形諸外理勢之自然也。夫顏色異潤澤而嫌昏暗貴光彩而嫌枯澁貴淡紅而嫌黑滯貴圓淨而嫌破碎貴同鋒而嫌平塌貴結實而嫌虛薄貴稀疎而嫌稠密根巢收緊痘分陰陽見點動活更怕臉浮出要參差血宜歸附耳後心喉少於他處為佳。冒拔

兩額額前光潤不泄爲妙一發熱偶出者重瘡夾疹爲半輕半重其外微紅者輕外黑裏赤者微重外赤裏黑太重瘡內黑點如針孔者發極青乾紫陷昏睡汗出煩燥熱渴腹脹喘喘大小便閉者困也善治者觀其形色而辨之輕者獲安重者能取効矣

痘疹辯疑賦

胎毒蓄積發於痘瘡傳染由於外感輕重過於內傷初起太陽壬水克于丙丁後歸陽明血水化爲膿漿勢若然肩變如反掌若救焚兮從新何如焦額如落承兮拯溺不及累裳欲知表裏虛實須明寒熱溫涼証候殊形臟腑易狀肝火激成水泡肺主涕而膿漿心斑紅紫脾疹赤黃經居下不受汚濁爲變黑而可防觀其內症推乎外臟可欠煩悶兮肝木之囚咳嗽喘噴嚏兮肺金之象自帶赤兮心火延於兩脇手足厥冷而昏睡兮脾土困于中央耳尻屬腎溫暖如常二處灼熱痘症乖張先分部位次察炎祥陽明從自落鼻太陽形於頭上心火炎熱則舌乾而

赤肺金結則肺膈先傷手足屬乎脾胃肝膽主脇肋之傍頸項三陽
交會腰背統乎膀胱外症明分用心想像泄者邪盛于下吐者邪甚于
上氣逆而腹脹隱隱毒甚而腰痛惶惶心熱甚而驚悸胃邪實而癲狂
口燥咽乾肺受火邪而液渴便閉尿澀腎因火旺而津亡欲識痼之輕
重當觀熱于形狀毒甚兮心如焚上毒微兮內外清涼寒熱往來神氣
爽定知痘出必禎祥數番漸出兮春回陽谷三澤湧出兮火烈崑岡蚤
蟲蚤斑刻期而歸陰府蛇皮蟬退引白而返泉鄉雖珀紫紅景耀灰印
最宜淡紅滋潤切忌黑陷乾黃色要明潤兮猶恐薄嫩之易破痘貴乾
結兮又愁痒場之難當面煩稀而磊落清安可保胸膈塞而連串吉凶
難量頂要尖圓不宜平陷漿宜飽滿切忌空瘡皮喜老而愁嫩厚要活
而怕光結實高聳始終無虞丹浮皮肉必主刑傷唇面預腫兮八九如
何可過腰痛胃爛兮丁七定主災殃瘡堆口舌毒纏頸項咽瘡喉腫飲
食難甘渴刺膿血毒甚無藥人力難盡天命匪張痘瘡焦落辨別陰陽

人中上下。先驚爲良。足腰先若黑。屬多凶。而少吉。祥。

神斷秘訣

細嫩無分地
皮膚無光亮
痘腫皮不腫
滿面皆稠密
頭身色不潤
初起瘡貼肉
見點如川樣
頭面方見大
十四痂堪落
日中光射斗
五經穴痘上

粘連一片紅
胸前不空閑
眼開口又開
仔細看陰陽
膿綠臭難當
起後肉難通
焦枯黑陷傷
項刻又尖長
依然乾燥膿
手足亂抽搐
斜視腫不分

七朝虛癰塌
一身紅紫泡
陰陽俱無縫
天庭漿不足
此般脾氣絕
寒熱不分別
心腎二經絕
此般形像見
沉沉睡不食
若遇有此疾
總然與辭壽

乾燥定無膿
九日結西天
六日一場空
此兒必有傷
不久命須亡
瘡塌七朝中
此痘火中央
不藥有奇方
延日不能生
不日命須傷
遲日一場空

舌尖上見黑
目白睛紅赤
初見雲中月
膿黃色不活
勝凸四肢浮
仔細看身疔
十四痧該落
見點如川棧
目定神昏熱
舌上浮血點
如神真秘訣

● 預解胎毒免痘門

延生第一方

心經冠肺經
唇紅豆三般
雲中隱隱丹
乾極脚攤紅
睛黃赤鼻頭
咽喉前後心
膿瘡食不進
針苗接一連
喉痰膝下水
喉瘡熱不清
學者要精明

皮紅胭脂樣
黃漿胃先腐
兩朝三日後
牙疳瀉不食
類般顏色異
陰陽并腦後
無神死蛇臭
乾紅主絕水
飲湯并下瀉
皮紅痘不起

半月此兒已
焦裂飲茶終
兒命待兩天
半月命須終
十五命難留
腎舌頂陰生
兒命必身逆
十命九難延
頃刻命難存
心經克肺經

○一論小兒初生臍帶脫落後取置新瓦上用炭火四圍燒至烟將盡放
地土上用瓦蓋之類蓋之存性研爲末預將朱砂透明者爲極細末水
飛過臍帶若有五分重朱砂用二分五釐生地黄當歸身煎濃汁一二
蜆殼調和兩味抹兒口上臍間及乳母乳頭上一日之內晚至盡次
日太便遺下穢污濁垢之物終身永無瘡疹及諸疾生一子得一子上
分妙法也

○一論小兒未出痘疹者每遇交春分秋分時服一丸其痘毒能漸消化
若只服一二次者亦得減少其毒毒能消化必保無虞此方神秘本不
欲輕傳但慈幼之心自不能已願與四方君子共之

神効消毒保嬰丹

纏豆藤

一兩五錢其藤八月間收或九月間收其藤上纏有黑豆三十粒

黑豆三十粒

赤豆七十粒

山查肉一兩新升麻五錢荆芥五錢

防風五錢

生地黃一兩

川獨活五錢甘草五錢當歸酒洗五錢

赤芍五錢

連翹七錢 黃連五錢 桔梗五錢 辰砂水飛一兩 牛旁子一兩

苦絲瓜可瀉熱 隔年經霜者方好

右為極細末和勻。薄砂糖拌九。李核大。每服一丸。濃煎甘草湯化下。其前項藥須預辦精料。遇春分秋分。或正月十五日。七月十五日。修合。務在精誠。忌婦人猫狗。合時向太陽祝藥曰。神仙真藥。體合自然。嬰兒吞服。天地齊年。吾奉太上老君。急急如律令勅。一氣七遍。

全生保安散 曾府秘傳治小兒不出痘疹

麻黃 羌活 防風 升麻 生地黃

黃柏酒浸各川 藁本 乾葛 蒼朮

黃芩酒浸 生苧 柴胡各二分 紅花 細辛

蘇木 白朮 陳皮各一分 甘草 歸身

黃連各三分 連翹 吳茱萸各半分

右判「癘」立春立夏立秋立冬之日。水煎。臨「宿」次早溫服。如一年之

內依時服此四服神効永不出痘。

條穢免痘湯

太尹王太中傳自方上異人

十月經期後取練樹子一升收貯到正月初一日半夜子時父母只令
一人知將練子入鍋內用水煮湯待溫洗兒全身永不出痘。此方也。
鄉隣出痘預服禁方

一凡鄉隣覺有時行痘疹可以預防宜節其飲食謹其起居加減衣服預
其藥餌亦制節謹度順天之道也。

蘇油擦法

用蘇油每夜臨卧時以手中三指蘸油擦兒頭額項背腰兩手腕兩足膝
然發睡即可以便輕此亦暢達流通升脫疑滯之義也。

三豆湯

大黑豆

赤小豆

藟豆

各一盞甘草一兩細切每日用四味瓦甌水煨熟爛連湯帶豆食

之豆鮮腎經之毒制相火也赤小豆鮮心經之毒制君火也豉豆鮮陽明經之毒制胃火也用豆者又以形治以類從也易簡而便里閭食治以便寄雅其爲神巧矣乎。

永不出痘二十五散 賈蘭峰傳

用有雄鷄蛋七枚內取丁枚開丁孔去清黃淨裝入鮮明好朱砂四錢九分其孔以紙糊用雞抱出雞雛將朱砂採日精月華各七日夜收貯聽用母用起頭結絲瓜一個候老成種乾煨燒灰存性爲末每服朱砂五分絲瓜灰五分爲細末蜂蜜水調服服過三次永不出痘疹鄰家出痘就宜服之。

油飲子

若遇痘疹行時左右隣家有出者可預服之用豉香油一斤煎過連日與兒飲盡永不出痘。

看耳後筋紋斷法

九耳後筋紋似水紅色爲上赤紅色次之太紅色宜退火紫黑青色皆不治
又須條均直上耳尖而無分枝者爲上若分枝纏繞者雖淡紅亦凶其
或過髮際者多不可救

經擦照法

用舊書竹紙或燒錢草紙烘乾作擦子如小指大蘸清油于燈上往來薰
炙令紙條無泡不爆啞又飽蘸油又薰熾令油無泡即點擦子將患者
房內燈門閉令黑暗有光處以蔽之有共左額有白色點右額有白色
點中庭有白色點觀兩額宜以擦子在兩耳邊及鼻邊平點觀中庭宜
以擦子在兩眼角平點看其皮中歷歷可指是赤是紫是塊是點是然
明白若是麻疹則浮于皮外肉內無根若是痘瘡根在肉內極深者以
擦子當額及中庭正照則黯而不見然子有灰影即指去今明如此照
之病情在內者可以預見若日間以天日光觀之則不見矣

初起發熱治法

一論發熱之初急宜表治使微汗胎毒及外感不正之氣增寒壯熱頭疼
腰腹痛脹或喘嗽痰涎鼻流清涕或因驚恐跌蹠而發搐搦角弓反張
上宮天串一切內外所感盡從汗散則痘出自然稀少但執甚者其毒
亦盛熱微者其毒亦微然表藥必在紅點未見之前可服

敗毒散

升麻

乾葛

紫蘇

川芎

羌活

防風

荊芥

前胡

薄荷

桔梗

去蘆

枳殼

去穢

牛蒡子

蟬退

山查肉

地骨皮

甘草

右判丁劑生薑丁片水煎臨服加葱白汁五匙熱服○一方無乾葛加
紫草○如熱甚加紫胡黃芩○冬加麻黃○暑月加香薷○瀉加猪苓
澤瀉

一論小兒痘疹發熱者服之不出見苗者服之出極開大者服之

起死回生不可言

神効復生丸

方伯主如水傳

賞歸身

西芎

升麻

乾葛

白芎

人參

黃芪

甘草

辰砂

一兩二紫草茸一兩

右爲末糯米粽爲丸如雞頭子大每服一丸河水煎滾入黃酒少許

○一論痘初發熱一服即輕百發百中

預服西靈丹

紫草茸一兩

山豆根

五錢升麻小者

葛根

蟬退淨者

姜蠶

少去絲

白附子

連翹

去心各

全蝎

去毒十

生甘草五分

雄黃

分一錢

五磨香一錢

蟾酥

一錢

好酒調化

服之

右十二味爲末用蟾酥丸如皂角子大每服一丸紫草湯下

○一論痘瘡初出先用此藥塗面若用之早則痘瘡不生於面用之遲雖

出亦稀少

玉顏膏

黃柏兩 酥皮一葉 豆粉四兩 甘草生四兩 紅花二兩

右爲末香油調成膏從耳前眼唇面上並塗之且三五度。

出痘治法

避穢氣

腋下狐臭氣 房中淫涉氣 行遠勞汗氣 溝糞瀾惡氣

婦人經候氣 諸瘡腥臭氣 硫黃蚊煙氣 吹滅燈燭氣

誤燒頭髮氣 柴烟魚骨氣 葱蒜韭蘆氣 煎炒油煎氣

醉酒暈腥氣 麝香燥穢氣

又禁忌

生人往來 罵罵呼怒 對梳頭 對搖痒 勿掃地 勿對荒言

勿飲食詩藥 勿僧道師巫入房

以上幾氣禁忌諸條謹之則痘可變輕不謹則輕變重矣

○一論外解諸方。凡被房事經水生產之穢所犯者。以太棗燒烟解之。凡被五辛厭者。以生薑燒煙解之。凡被酒厭者。以爲根茵陳蒿燒之。凡被死屍之氣及厲氣所犯者。以太黃蒼朮燒烟解之。

凡被胡臭木羊厭者。燒楓葉解之。

凡遇風雨。燒蒼朮楓葉避之。

凡一切惡氣。通以乳香燒煙。薰之。仲景曰。小兒痘時。宜燒乳香。辟諸惡氣。蓋紫衛遇香則行。遇臭則凝。故也。

世俗煮醋。薰豆謂其能活血。然醋氣收斂。故婦人血崩者。用薰之。痘症欲升發而不欲收斂。故不宜耳。常見用醋薰痘。發時搔破而膿血淋漓。○一論痘疹初出時。宜用此酒。遍噴面床壁及與患者服。役人皆飲。能辟穢毒。又以淨胭脂點兩眼角。防痘入眼。

胡蔓酒

胡蔓三兩。細切。以酒二鍾煎沸。用紙密封。久入氣出。候冷。去渣。從頂

至願鎖微微塗之更噴背脊胸腹及兩脚背遍再用蒲扇壁門戶遍洒之尤妙

○一論痘瘡欲出已出熱尚未解毒氣太盛稠密成片急進此三四服快透消毒外神專治內蘊邪熱咽膈不利痰涎壅嗽眼赤臉腫腮項結核腫毒聚遍身風疹癰毒赤痛等症

消毒飲

牛旁子

微炒四錢荆芥

甘草各一錢防風去蘆半錢

一方加黃芩一錢犀角鎊五分

右剉水煎溫服

○一論痘瘡已出痘毒太盛以此消毒或出不快皆宜服之云痘瘡欲出渾身壯熱不思飲食若服此下劑即肉毒已有一兩顆即解其生若全出即當日頭焦只三服瘡子每用此治壯盛小兒痘出毒盛殊効消虛者宜神功散尤妙

化毒湯

紫草茸五錢

川升麻

甘草各二錢半

右剉每服二錢糯米五十粒同煎服。

○一論瘡出毒氣太盛血紅一片不分地界如蚊蚤種或諸朱血或口瀉七日必前諸症可服解毒神效。

九味神功散

黃芪

人參

白芍

紫草

紅花

生地黃

牛蒡子

各等分前胡

甘草半

右剉水煎溫服渣再煎服。○熱毒者加黃連黃芩各二錢未起毒加太黃○有紫加薤退去蘊足。○若頭粒淡黑紫色者有寒乘之加桂下錢。如太便閉加大黃。

一瘡發湯服神功散不渴或猶渴者用紅花子一兩煎湯服。○紅花亦好加牛蒡子九炒並能散胃中之毒血故也切不忌口。

壽世保元

辛集人卷

大人

能助陽經之火大發者用黃土百沸湯碗蓋泡取出水少加炒桂
飲之立止

一痘出三百內頂陷者非虛也用神功散活血退火

四日以前有寒症其色黑慘係元陽加桂

色白光者寒乘之神功散加桂

腹痛者寒盛也神功散主之

面紅不退地界不分者神功散倍前胡

吐者寒盛乘火炎而宣也神功散主之

泄瀉者火盛而存也神功散加升麻以提之

一身已涼汗不止者血隨氣溢也用當歸五錢黃芪三錢酸棗仁炒一錢

作一劑水煎服立止

一有痘明日耐于腐脹切不可用一陳湯使燥陽明經使孤陽無陰不能

柱化也

一熬用杏仁煎湯磨白附子服即止

一遍身疼痛者以水香木味磨服即止

一藥行作痒此內熱而外爲麻寒所乘用荆芥穗紙裹緊米糊粘住紙頭令不散燈上燒了却于桌上擦去灰快放手指走痒症頭點痒處一下即放退無痒症點之立止

一行藥漿足而發疥認定是黑疥症或黑而硬或有紅絲或爲太紫泡未曾鮮毒者仍以神功散加雄黃黃連黃芩大黃煎服却用點法雄黃二錢研胭脂重浸水金銀調雄黃末點疥頭上立時即紅活亦神法也蓋雄黃能解毒胭脂能活血也

一痘九日十日作瀉先失解毒者宜用

定中湯

真正黃土一太塊碗盛以百沸湯泡即以碗蓋少傾出用如冷候於內外以熱水盪之加入雄黃一錢朱砂五分二味爲末和勻以黃土湯

兩善少加沙糖溫服二服立止。

一論痘癰脹渴者或瀉渴者或足指冷渴者或驚悸渴者或身濕渴者或身熱面皯白色渴者或寒戰渴不止者或氣急咬牙渴者或飲水轉渴不止者。此上九證即非熱也。乃脾胃肌肉虛寒液衰少故也。此所散主之。如不愈更加丁香官桂多煎服之。香攻裏官桂發表其表裏俱實而瘡不致於痒塌喘渴而死矣。

一痘十十二日當靨不靨發熱蒸者宜用

甘露回天湯

沙糖半酒鍾百沸湯調一大碗溫服立時熱退。豆靨萬發萬中真有

回天之力也。

看痘不治法

初出勇壯者不治。○出如傘種者不治。○隨出隨沒者不治。○如蚊蟲咬者不治。○氣血相失者不治。○倒出者不治。○飲水如飯者不治。○

肺氣不逆也

有痰也歌

輕者熱輕病亦除

小大後先出不齊

根寒紅活帶血清

飲食如常多藥宜

重者熱中寒並出

密如蠶絲若肝膽

根白頂紅是紫黑

若逢血治尚堪醫

○起脹治法

保元湯

人參 去蘆二錢

嫩黃芪三錢

甘草一錢

右剉二劑生薑一片水煎溫服○一當起脹而不起用柴山芎藭或

研末二錢酒調服○一血弱不起根底淡薄以保元湯加丁香三錢以

桂丁錢當歸二錢川芎一錢水煎溫服

二日初出圓革成形乾紅少稠黃能犯上其氣血未離以候出氣血來

會也然等尚淺急以保元湯加桂枝治血勻氣之劑如毒若清其毒

之藥治血加營歸身白芍一錢白氣加陳皮五分解熱加芍藥七分牛
麥子七分水一盞煎七分溫服

二三日根葉雖圓而頂暗者血亦難聚為氣虛弱不能領袖其血也以保
元湯加川芎官桂扶陽抑陰豈有不痊者哉

四五日根葉雖起色不充澤生者猶任為氣弱血盛以保元湯加芍藥官
桂糯米助衛制榮斯為調緩之妙也

五六日氣血弱色青紅紫以保元湯加木香當歸川芎助血歸附氣位
以全中氣之道也

六七日氣交下血雖歸附不能成聚為血少寒不能制急投保元湯
加官桂糯米助其成聚而收濟惠之偉功斯為治矣

七八日毒化紫而不消為氣血有凝不能大振以保元湯加官桂糯米
桑陽助藥斯可謂保全生命矣

一痘至此毒主貫腰腹已消雖有他証亦不壞也若無腰灰暗雖無他

症亦死

一痘瘡至八九十日，視痘頂心上有一點如冰珠見出，此痘漏無藥可救，死症也。

八九日漿不冲滿，血附緣紅，氣弱而險也。以保元湯加糯米，以助其氣而駕其血，斯漿成矣。

十一二日氣血冲滿，血甚紫，足濕潤不斂者，內虛也。以保元湯，血亦有力，加白朮茯苓助其收斂而結痂也。

十三四日毒雖盡，鮮漿光結痂之際，或有雜症相仍，以保元湯隨症加減，不可峻用寒涼太熱之劑，恐致肉損之患故也。

十四五六日痂落，潮熱唇紅，口渴不食，以四君子湯加陳皮山查黃連如渴甚，以參苓白朮散如熱不解，以大連翹散去黃芩主之，症去之後多有肉損或餘毒未解，此則尤為難治也。

凡痘瘡發渴者為虛弱，而津液枯竭也。保元湯加麥門冬五味子即止，如

不止以參苓白朮散工二劑即止

凡瘧瘧不起發瘧瘧不厚保元湯加川芎五分下香 四分夏月二分糯米

二百粒煎熱加好酒入乳各半蓋同服

若頭額不起脹加川芎六分爲引○若頭部不起脹加升麻四分爲引○

若胸膈不起脹加桔梗四分爲引○若腰膝不起脹加牛膝四分爲引○

○若兩手不起脹加桂枝二分爲引

○一論瘧瘧胃虛不進飲食或口乾發渴或吐瀉等症

參苓白朮散

人參

白朮

去蘆炒白茯苓 去皮甘草炙

白扁豆炒

蓮肉去心

山藥炒各一錢五分

桔梗八分

薏苡仁八分

砂仁七分

右爲細末每服五六分或一錢紅棗煎湯調下或姜湯亦可

貫職治法

○一論痘瘡血氣虛損或風邪藏毒沖觸使瘡毒內陷伏而不出或出而不勻快此藥活血勻氣調胃補虛內托瘡毒使之盡出易收易靨

內托散

黃芪

人參

當歸各二錢川芎

防風

桔梗

厚朴姜汁炒白芷

甘草各一錢木香

官桂各三分

右方如紅紫乾燥黑陷屬熱毒者去桂加紫草紅花黃芩用此藥調穿山甲炒成珠爲末五分同服

若淡白灰黑陷伏屬虛寒者加丁香救裏官桂枳殼○當歸同服而不貫膿者倍參芪當歸煎熟服入木乳汁好酒同服此實膿之功也○泄瀉加丁香乾薑肉豆蔻

○一論痘瘡已成出齊而難脹或已脹而難靨者由內虛故耳蓋痘既出灰白色及頂平不起或陷伏者氣血大虛也宜此方

歸身湯

嫩鹿茸酥炙當歸身酒洗 每劑五錢好酒煎溫服

○一論痘屬虛寒八九日色白如水泡頂陷根白痒塌寒戰咬牙等症
回陽酒一

鹿茸酥炙 大附子麩包煨去皮臍 嫩黃芪 當歸酒洗

右剉好酒煎溫服

○一論痘出至翳膿收靨之時倒塌陷伏心慌喘急悶亂死在須臾

好揀參丁兩水煎濃汁灌下即甦

○一論灰白黑陷嘔吐白沫為毒虛

木香散十一味

木香磨 前胡 甘草炙

大腹皮 人參五分 陳皮

牛黃善製八分

赤茯苓去皮訶子煨取肉
肉桂各八分丁香雄者五粒

右判一劑生薑三片水一鍾煎八分溫服○嘔吐甚加白豆蔻去殼
○一論寒戰咬牙疳積場泄瀉爲裏虛

異功散十二味

當歸酒洗

肉豆蔻去油

陳皮

白朮

去蘆炒

白茯苓

去皮

大附子

炮煨去

半夏

姜汁炒厚朴姜炒

肉桂各八分

人參五分

小丁香七粒

木香磨八分

右判一劑生薑三片棗一枚水一鍾煎至八分溫服○泄瀉甚加蘇合
○一論此方鮮毒發聖藥也治紅斑黑陷頂不起痘并一切惡症危
者用此立見起死回生之功也

小靈丹

雄黃

朱砂各二錢乳香

沒藥

各一錢五分

大蟾蜍取心肝尾焙乾三錢

麝香三分

右研細末取猪心血雞冠血丸如芩大每服一丸身無大熱生酒化

下熱甚不飲酒者紫草燉心湯下即時紅活而起如服此不効者大無可生之理也

一論瘧疾初出光壯忽然黑陷心中煩燥氣急喘滿狂言妄語如見鬼神急宜治之不然毒氣入臟必死

人牙散

人牙燒存性

爲細末每二箇作一服酒調下立効

又秘方用人牙一箇火煨

朱砂三分

雄黃三分

爲細末先用

甘草爲末熬成膏調入三味再用無灰好酒調稀灌下治惡瘡瘰癧不發危急之甚服之立効

無價散 治症同前

人牙

猫牙

狗牙

犬牙

右等分各將炭火燒留烟在碗蓋蔽存性爲末每五六歲服三四分好熱酒調下辟瘡寒戰泄瀉者前其功散調下若無猫牙用前人牙下味

亦好但不如此方。

○一論痘疹咬牙戰六七日陷而不發。不覺膿陷入黑色。氣欲絕者。神効。有瀉者不宜服。

三仙散 趙黃真江傳

穿山甲半斤。用好漿兒酒一斤。以山甲微火炙乾。再浸再炙。以酒乾爲度。穿山甲一兩。麝香一分。朱砂。

以麻黃水浸過。下錢

右爲細末。每服五七分。或一錢溫酒調下。○一方治前症。單用穿山甲用炭火炒成珠爲末。每服五七分。木香湯調服亦効。

○一論痘疹紫黑乾枯變黑。身如火炙之熱。不瀉者可服犀角散。果益陽傳。

烏犀角 羚羊角

二味磨京水服之。有回生之妙。

○一論痘疹不瀉。黑陷於死。皆可服。

萬金散

人猶猪犬臘皮燒，少許微煎，蜜水調。百者救生無二死。黃金萬錠也，難消。

右將前四物的糞，於臘日早晨日未出時，貯於銀鍋內，用炭火燒令烟盡為度。但是瘡發不快，倒腐黑陷者，及一切惡瘡，每用一字蜜水調服，其効如神。

○一論瘡瘡自出，至收醫時，理不宜下者，用此導之。若既醫之後，有前症者，又當下也。

○一論瘡瘡中有長大紫黑者，為赤毒，把住，瘡不起發，急用簪挑破，以四聖散。

珍珠五粒鐵器上煑 苑豆四十九粒燒 頭髮燒存性不拘多

右為經末用，擦向中脘，調成膏子，將兒在溫煖處，少存忌風寒，穢氣。先用簪尖平撥開，赤口，將藥雜入，疔內，即變紅色，餘瘡皆起，但挑破，出黑血，或挑開，用口吮去黑血，或用綿裹，指拍去黑血，即愈。蓋破，乃而毒。

氣得散也

一女子出痘至脹滿將實膿時多紫黑抓破流血此痘腐結毒太盛用皮硝不拘多少入花椒下搗煎水用靑布蘸搭患處頻頻更換以即起脹如舊

收靨治法

一凡痘十日十二日痘漸收靨自上而下為順自下而上為逆其遍身皆靨雖數顆不靨尚能殺入猶蛇退皮雖一節被傷不能退者即是死也

一十日至十二日當靨不靨其身不壯熱閉亂不寧則喉痛煩渴咬牙開口散加木香當歸以救陰陽表裏若以蜜水西瓜紅柿等為物食之連死

一凡當靨不靨而渴寒戰咬牙抓破此虛寒也宜與功散

一凡過服熱藥以致熱毒猖狂血氣壅盛痘爛不靨者內服小柴胡湯

猪尾膏鮮之外用敗草散付之

○一凡瘡不收膿氣急上痰聲啞目閉無神者死脈微瀰紅黃白無血色者毒氣歸內也恐生餘症

敗草散

一治瘡瘡抓搔成膿血淋漓宜

用葦房多年爛草或蓋牆爛草亦可其草經霜露感天地陰陽之氣并鮮瘡瘡其功不能盡述取草不拘多少晒乾或焙乾爲末乾貼瘡上若週身瘡破膿水不絕乾貼衣裳難以坐卧可用土升攤於席上令兒坐卧其効如神仍服休香散加丁香官桂同煎服

硝膽膏

硝膽膏口不收

患處塗之病自瘳

瘡癰果爛血膿流

宜研猪膽七硝細

猪尾膏

龍腦香

研細末，酒洗，心氣痛，九厘砂，爲末，紫草湯化下。

一治瘰癧，抓破，搗爛。

用蠟孔內入土蜜，新瓦上焙乾，煨灰，布包，爲末，如濕乾，搗如乾，

一、小兒三歲者，發熱，七日瘡出，倒靨，色黑，唇白，水冷，危症也。祈福求神，無所不至，遇逢丁土日，此疾有藥，可起。以少許，俾服之，移時，則紅活如常。不吝寶，求其法，用狗蛇七枚，搗細，和醋酒少許，調服。雖夏月，極多，易得，冬月，藏於耳中，不可不知。此蠅，夏月，狗身上飛，都是也。

一、瘰癧，屬虛寒者，直可延至十數日，後方死。屬毒盛，轉色，都不過七八日，蓋始起，胎毒，自內出外，一二三日方出，毒氣尚在內，出至六日，則常盡，出於表，七八九日成膿，而結痂矣。若毒氣盛，在內，則不見膿，反內入，膿曉故須以六日以前，毒氣該出之時，忌用涼血解毒之藥，以驅之，六日以後，陰氣發矣，故其外最惡，若用涼血解毒之藥，只是氣血不足，不能成膿，成膿，故結痂，延日，久而後死，此瘰癧，輕重之分也。

痘後餘毒

小兒痘疹餘毒輕則肌表津淫癢痒重則肢節壅腫作痛若發熱而大便
閉結者消毒飲察熱而太便秘調和者清熱消毒散太便秘調和而渴者麥
門冬飲腫痛發熱而渴者仙方活命飲大凡根赤而作痒者血虛也四
物湯加牡丹皮色白而作痒者氣虛也四君加當歸芍藥色赤而作痛
者血熱也四物湯加連翹金銀花色白而不嫩痛者血氣虛也托裏散
不成膿或不腐血氣俱虛也八珍湯膿既潰而不斂脾氣虛也六君子
湯按之隱指復起者內有膿也卽刺之勿使內攻膿出兒安不必服藥
如膿稀清或反作痛或倦怠熱渴或作痛等症皆屬氣血虛甚急以參
芪犀水之類補之若虛中見惡症者不可救實中無惡症者多自愈

活命飲 托裏散 方見癰疽

○一論痘後餘毒或先服陷子熱毒未解聚而不散以至頭頂胸背手足
肢節赤腫成癰毒者宜消毒飲或五福化毒丹

清毒散

鼠粘子炒

荆芥穗

甘草

防風各五分 犀角鎔末二分

金銀花三分

右剉水煎服。

○一論瘡後餘毒未解頭面身體多生瘡癩上焦熱難瘡口腫破生瘡牙齦出血口臭咽喉腫痛口渴等症。

五福化毒丹

犀角鎔三錢

桔梗一兩

生地黃

赤茯苓

牛蒡子各五錢

連翹六錢

玄參三錢

青黛二錢

朴硝

粉草各三錢

右為細末煉蜜為丸如雞眼大每服一丸薄荷湯化下兼服糯米粥

○一論瘡後不問瘡毒發於何經初起紅腫時却用黑葉赤豆以酸醋

浸研漿時時以雞翎刷之隨手退去其效如神。

○一論一切癰疽陽症腫痛發熱作渴

清熱消毒散

連翹

山梔

黃連

當歸各五分 川芎

芍藥

生地黃 各六分 金銀花 一錢 甘草 二分

右剉一劑水煎服

○一論瘟疫發熱作渴咽痛

麥門冬飲

麥門冬 洗心黃芩 三分 甘草 五分 人參

玄參 各三分

金銀花 五分

右剉水煎服。○咽痛加桔梗五分

○一論痘後朱音不出

天花粉

桔梗

白茯苓 去皮 訶子肉

石菖蒲

甘草

右爲末水調半匙在碗內。外以水竹七葉薰荆七條縛作一處點火在

碗內熏臨卧時服

○論瘡瘡合藥其藥或白或曲用白蜜塗於瘡上其瘡
易落且無邪氣亦不見移

○一論瘡瘡後身微及肢節生瘡瘡瘡米不乾用出黍或綿裹不拘多
少用白蜜研碎塞入瘡內令滿以炭火燒候白蜜汁乾取出研入麝香
許每用乾貼瘡上若不早治則潰難消

○一瘡瘡入眼成翳用蠅退爲細末辛脂煎湯調化食後服。

○一瘡瘡後眼生翳膜○凡瘡瘡不可食雞鴨卵即時其瘡其瘡如神
不可不戒。

雲丹

虎糞辛花盧花色者佳

蠅退

木通

白蘞藜各二兩

炙甘草一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服八十九食後白湯下日進三服
以愈爲度

○一治眼疾餘新眼生翳障

通明散

當歸

小芎

芍藥

生地黃

防風

乾葛

菊花

蟬退

天花粉

各等分

穀精草倍

右剉散水煎服眼赤腫加黃連梔子翳膜加木賊

秘方

黃丹

輕粉各一錢

右爲末用蠟管吹如左眼患吹入右耳右眼患吹入左耳一日吹三次

兼服通明散或用雄雞楨柳磨水服之效

一治眼疾餘新眼生翳障

○一治眼疾餘新眼生翳障

酒金散

陳皮中

半夏姜製中貝母上

天花粉上

麥門冬去心上

桔梗上

梔子炒

黃芩各等分甘草生下

右剉水煎食遠服

○一論小兒痘後咳嗽不拘遠年近日者有此失治乃貽終身患也。

白砒一錢雄黃

板礬

燕管石

石黃

寒水石火煅各一錢

右研細末用葦豆粉打糊丸葦豆大每服三九臨臥井水送下忌熱物

一夜無妨

補遺

鹽府秘傳沖虛至寶丹

治痘初起氣血兩虛倒場黑陷不起不分地畧或咳或瀉兼治

紫草茸八兩荆穗八兩

當歸四兩

鮮笋一斤

紅花

木通

麻黃

白芷

白芨

牡丹皮

赤芍

懷生地

牛蒡子

甘草各四兩

右共咀片用水二十碗

鍋內煎去五分起來再入水十碗煎至五碗去

渣共煎汁煎滴水成珠加蜂蜜四兩再熬成珠爲度聽用

梅花蕊

半兩

蟾酥三錢

紫河車

一具酒煮成膏听姜蚕炒一兩

金蠅酒洗

穿山甲炒

川黃連

酒炒

杏仁

另研

黃芩

蜂房炒

連翹炒

地膚子炒

大胡麻

已上各一兩

右爲細末前膏一半爲丸如龍眼大每用一丸鮮雞湯下立起分地而

奪命象皮丸

益壽傳

治氣不足空殼無髓下九即有

象皮

用一兩酒炒磨下

大附子五錢重便煮

穩小鷄

用酒煮過皮爛黃色爲度

血蠅五錢

沉香二錢

麝香三分

冰片一錢

馬櫨榔五錢

牛黃五分

黃芪五錢

細辛五錢

麝香一兩

官桂二錢

鹿茸五錢

辰砂三錢

銀錢一分小者無核

木香二錢

白附子二錢仙茅一兩黑豆汁煮

甘草五錢

右爲末白蒲醇打細米糊爲丸如龍眼大每下丸酒化下立起

神仙救苦丹

菴濟傳

治痢初起三五日熱不出又瀉又嘔噤痛腰痛或癰或驚皆可治如
症初出葱白湯下驚風泄瀉咳嗽痰喘如神

白附子五錢山東者佳

大竺黃二錢全蠍二錢

膽星一兩

姜蚕炒一兩肉豆蔻五錢柯子麩包煨去核五錢

麝香一分

麝香五錢 蒲公英花五錢

朱砂一錢

雄黃二錢

川黃連二錢

右爲細末煎膏爲丸如龍眼大金箔爲衣滾水化下

起死回生散

治癰瘡至七八日忽然變黑收入腹內遍身抓破吮喘死在須臾服此

壽世保元

卷之八

二

後新另發出立可回生扶清龍神仙傳

當歸

川芎

白芍

生地黃

升麻

紅花

上陷加白芷

下陷加生薑

遍身黑陷加麻黃象糞微炒如一歲兒用三錢大則用五錢
右到一劑半水半酒煎服從新發出脚下有黑疔至七八日用針挑去
以太乙膏貼之即拔去毒連進二三服

麻疹

古謂肺即疹也疹出如麻成朵痘出如痘成粒皆象其形而名也夫肺毒
一也痘出於五臟臟屬陰陰主血故痘有形而有汁其症寒熱備有也
疹出於六腑腑屬陽陽主氣故疹有形而無漿其形多實熱而無寒也
爲症既異則治法亦殊痘宜內實可用補劑疹忌內實只宜解散惟初
熱發表略相似耳既出之後痘則補氣以生血疹宜清陰以制陽何也

蓋疹熱則陰分受其熬煎而血多虛耗故治以清火滋陰為主而不
可少動其氣所以人參白朮半夏若燥悍之劑宜肩背深忌也世知瘡
證所繫之重而不知疹之殺人尤甚有事多忽而不備良可太息矣

○一論疹發熱之初多似傷風惟疹子則咳嗽噴嚏流涕眼胞腫其
淚汪汪面浮腫雙腮赤惡心乾嘔爲異耳但見此候即是疹子便宜謹
避風寒戒葷腥厚味用藥以表散之使皮膚通暢腠理開而疹毒易出

○一論疹之初起呵欠發熱惡寒咳嗽噴嚏流涕頭眩宜

升麻葛根湯

升麻

乾葛

白芍各一錢

甘草五分

右剉生薑水煎服加紫蘇薄荷以解肌切忌大汗斑不結者亦宜乃疹
疹初起之神方也

○一論疹既出下且而又沒有乃爲風寒所抑麻毒內攻若不治胃爛
而死可用

消毒飲

鼠粘子四錢 荆芥二錢 甘草生一錢 防風去蘆牛錢

右剉水煎服加烏犀角尤妙

○一論麻疹已出而復沒或出不盡心驚哭啼不止十分危惡死在須臾或下利腹痛可用

三仙湯

蘇陵劉孟門傳

黃芩去朽 白芍藥生用 各等分水煎溫服如神

○一論麻疹已出譫語煩燥作渴者可用

白虎解毒湯

石膏

知母

黃連

黃芩

黃柏

梔子

甘草

右剉水煎服

○一論麻疹已出大小便閉可服

防風通聖散方見中風門

○一論麻疹已出譫語小便閉者宜

導赤散 生地黃 木通 甘草 淡竹葉七片 水煎服。

○一論麻疹已出泄瀉不止可服。

四苓散 猪苓 澤瀉 白朮 去蘆 白茯苓 各等分 水煎服。如小便如清

者或小便不通者加車前木通。

○一論麻疹已出寒熱似癰可服。

柴苓湯 柴胡 黃芩 半夏 猪苓 澤瀉 白朮 去蘆

白茯苓 去皮 甘草 右剉薑棗煎服。

○一論麻疹已出太便下血或小便下血吐血衄血或二便閉澀疹稠

密熱渴赤痛。

犀角解毒湯 真犀角 升麻 無名 生地黃五分 牡丹皮 一錢 赤芍 一錢

黃連 枯黃芩 黃柏 梔子 右剉水煎服。

如吐血衄血加炒山梔子通便和服。

○一論麻疹前後有熱潮不退等症並爲血虛血熱可服。

四物湯

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

血虛用熟地黃熱用生

右判水煎服。○發渴加麥門冬犀角汁。○嗽加瓜蒌霜。○有痰加貝母陳皮去白。

○一論麻疹正出之時雖不進飲食者但得麻疹淡紅潤澤真正不爲害也蓋熱毒未解內蘊實熱自不必急退後若不當用四物湯加神麩砂仁一二帖決能食矣如胃氣虛者忌少下地黃。

○一論麻疹既出之時如色紅紫乾燥暗晦乃火虛毒熾宜四物湯用生地黄加紅花酒炒黃芩。

○一論麻疹既出已過三日不能沒者乃內有虛熱宜用四物湯進之如失血之症加犀角汁鮮之。

○一論麻疹退後若有牙根腐爛鼻血橫行並爲失血之病急用四物湯加茵陳木通生犀角之類以利小便使熱下行如肺熱色白者加白芍藥。

不治之症也。

○一論麻退之後。須避風寒。戒水濕。如或不謹。遂致終身之咳。嗽患無有愈也。

○一論麻疹。前後大忌。猪肉、魚、酒、雞子之類。恐惹終身之咳。只宜用老鷄精肉、煮食。少助滋味可也。

○一論孕婦出麻。當以四物湯。中加白朮、全、冬、艾、葉。安胎清熱為主。則胎失無害。且易產矣。如胎氣上冲。忌用芎根、艾葉煎湯。產後橫痃服之。更以四物湯大進之。

○一論疹子。沒後餘熱內攻。循衣摸床。譫言妄語。神昏喪志者。死。如熱輕餘毒未除。必先見諸氣色。雖預防之。始終以升麻葛根湯為主。或消毒飲解。時疫隨症選用。仍忌魚腥葱蒜之物。

黃連解毒湯

黃連

黃芩

黃柏

梔子

水煎溫服。

補遺

干仙湯

序班孫雙泉傳

治痧後餘毒

柴胡

葛根

玄參

黃連

黃芩

梔子

陳皮

茯苓

枳殼

生地黄

右剉生薑煎服。

○

小兒入痧咳嗽。腹脹喘急。煩燥泄瀉。聲啞唇青。黑。買爾峰傳。

黃芩

黃芩

連翹

玄參

知母

桔梗

杏仁

白芍

麻黃

牛蒡子

乾葛

陳皮

厚朴

甘草

右剉水煎服。