

新刊醫林狀元壽世保元

新刊醫林狀元壽世保元已集卷之六

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編著

男

龔廷國

龔安國

仝校

南雍太學生蓋印周文卿光齋堂鐫

頭痛

脉頭痛短滿應須死浮滑風痰必易除寸口緊急或短或浮或弦皆主
夫頭者諸陽所聚之處也諸陰至頸而還惟足厥陰有絡上頭至顙頂其
脉浮緊弦長洪大者屬風熱痰火而致也其脉微弱虛濡者屬氣血兩
虛必丹田竭而髓海空爲難治也甚有真頭痛者脉無神而腦中發勞
痛其心神煩亂爲真頭痛也旦發夕死夕發旦死蓋頭痛暴起者如汗
塞發熱惡寒乃感冒所致也其曰頭痛者有虛有火有痰厥頭痛者有

偏有正蓋左邊宜小柴胡湯加川芎當歸防風羌活其偏於右邊頭痛者補中益氣湯加白芷獨活蔓荊子酒炙其眉棱處痛者二陳湯加酒炒片苓羌活薄荷其腦頂痛者宜入參敗毒散加川芎藁本酒炒黃柏木瓜紅花酒炒大黃。

○一論一切頭痛主方不問左右偏正新久皆效。
清上蠲痛湯

當歸酒洗一錢 小川芎一錢

白芷一錢

細辛三分

羌活一錢

獨活一錢

防風一錢

菊花五分

蔓荊子五分

蒼朮米泔浸一錢

片苓酒炒一錢

麥門冬一錢

甘草生三分

右剉一劑生薑煎服。

一左邊痛者加紅花七分柴胡一錢草龍膽酒洗七分生地黃一錢。

一右邊痛者加黃芪一錢乾葛八分。

一正額上肩校背痛甚者食積痰壅用天麻五分半夏一錢山查一錢

枳實一錢

一當頭頂痛者加藁本一錢大黃一錢酒洗

一風入腦髓而痛者加麥門冬一錢蒼耳子一錢木瓜荆芥各五分

一氣血兩虛常有自汗加黃芪一錢五分人參白芍生地黃各一錢

一論年深日近偏正頭疼又治肝臟久虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭

痛頭眩目暈心忪煩熱百節酸疼腦昏目痛鼻塞聲重項背拘急皮膚

癢痒面上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血風攻注頭目昏痛

並皆治之

追風散

防風去蘆一兩荆芥穗一兩羌活五錢川芎一兩

白芷五錢全蝎去毒尾五錢天麻五錢白僵蠶一兩炒

白附子炮五錢石膏煨一兩天南星炮一兩川烏炮去皮尖一兩

草烏

炮去尖

五錢

地龍

五錢

雄黃

二錢

五分

乳香

二錢

五分

沒藥

二錢

五分

甘草

炙一兩

右爲細末。每服五分。茶湯調食。後臨臥服。清頭目。利咽喉。消風化痰。

○一論痰厥頭痛。其症眼黑頭旋。惡心煩悶。氣短促。上喘無力。以言心神顛倒。目不敢開。如在風雲中。頭苦痛如裂。身重如山。四肢厥冷。不得安臥。此乃胃氣虛損。停痰而致也。

半夏白朮天麻湯

黃柏

酒洗

一分

乾薑

炒二分

澤瀉

白茯苓

去皮

天麻

黃芩

蜜炒

人參

蒼朮

米泔浸

炒

神麴

炒

白朮

去蘆

炒

麥芽

炒

半夏

姜炒

陳皮

各七分

右剉生薑三片。水煎熱服。可下劑而愈。

○一論頭痛偏左者。屬血虛火盛也。

加味四物湯

當歸

川芎

生地黄

黃柏酒炒

知母酒炒

蔓荊子

黃芩酒炒

黃連酒炒

梔子炒

藥本各等分

右剉一劑水煎溫服○風盛加防風荊芥

○一論頭痛偏右者屬痰與氣虛也

黃芪益氣湯

黃芪蜜炒

人參

白朮去蘆

陳皮

半夏姜汁炒

當歸酒洗

川芎

藥本

甘草炙各五升麻

黃柏酒炒

細辛各三分

右剉一劑薑棗煎服

○一論頭左右俱痛者氣血兩虛也

調中益氣湯

黃芪蜜炒

人參

甘草炙

蒼朮米泔浸川芎各六分

升麻

柴胡

陳皮

黃柏

酒炒

蔓荊子

各三分

當歸六分

細辛二分

右剉水煎溫服。

○一論偏正頭風下切頭痛諸風眩暈頭目昏重

都梁丸

香白芷切碎晒乾爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服下九荊芥點膜

茶細嚼下

○一論眉棱骨痛者風熱并痰也

選奇湯

羌活

防風各二錢酒片苓

一錢五分冬月不用或甚苦炒用

半夏

姜汁炒

甘草

一錢夏月生冬月炙

右剉下剉水煎食後服

○一論雷頭風者頭痛而起核塊也頭面疙瘩憎寒發熱拘急狀如傷寒

升麻湯

升麻

蒼朮

米泔浸

薄荷葉各等分

右剉水煎服

○一譚侍御但頭痛卽吐清水不拘冬夏吃薑便止已三年矣余作中氣虛寒用六君子加當歸黃連木香炮薑而瘥

○一論頸項強急筋痛不能回顧者

烏藥順氣散加羌活獨活木瓜

○一治偏正頭痛頭風

羌活

白芷

細辛

川芎

蔓荊子

薄荷

防風

甘草

各等分

右爲細末每服二三茶匙白湯調下

○一人頭痛發熱眩暈喘急痰涎壅盛小便頻數口乾引飲遍舌生刺瘡做如荔枝然下唇里裂面自俱赤煩燥不寐或時喉間如烟火上衝急

飲涼茶少解已至于死脉洪大而無倫且有方捫其身烙手此腎經虛火遊行于外投以十全大補加山茱澤瀉牡丹山藥麥門五味附子一鎔熟睡良久脉症略減三四再以八味丸服之諸症悉退後投冷物

○一治頭風腫痛偏正石拘用艾槌爛鋪布上將快捲成筒次將黃蠟溶化灌入筒內以瀉為度如左邊疼將藥燒烟入右耳右邊疼即安

○一論半邊頭痛祛痛腎

防風

羌活

藜蘆

細辛

菊花各五分

南星

草烏

白芷各錢

右為末用連翹蔥下把洗淨同煎藥搗成膏銅鍋頓熱草烏太小以油帛攤藥貼痛處周圍以生麵糊封之再用乾帕包定其痛即止○一方加菊花獨活各一錢五分草烏一錢麝香一分

鬚髮

醫者所論人鬚髮眉雖皆毛類而所生五臟各異故有老而鬚白眉髮不白者或髮白而鬚眉不白者臟氣有所偏故也大率髮屬於心稟火氣故上生鬚屬於腎稟水氣故下生眉屬於肝故側生男子腎氣上行上爲鬚下爲勢故女子宮入無勢則亦無鬚而眉髮無異於男子則知不屬腎也明矣

婦人無鬚無血氣乎岐伯曰今婦人之生有餘于氣不足于血衝任之脉不榮唇口故鬚不生

宦者其鬚獨去其故何也曰宦者傷其宗筋血泄不復皮膚弱故鬚不生

天宦未嘗被傷其鬚不生其故何也曰天宦稟賦不足宗筋不成故鬚不生天下第一烏鬚方 閩老高中玄傳

五倍子一斤擇整箇者箇箇槌破去蟲土擇和粉如黃豆大者如

赤豆六次者如藁豆大分三樣入新鍋內炒如栗殼色以青濕布包之以脚踏成餅晒乾爲末錫罐盛貯緊實封口勿令泄氣藥用紅銅末半斤淘去皮土見清水令乾入鐵鍋內炒太熱傾入醋醋少半碗拌勻濕透再炒入醋七次研爲末羅過以綿帛另包聽用

白礬

四兩爲末

皂礬

四兩爲末

白芨

四兩切片

研爲細末帛包

右每遇染髮時量鬚髮多少用藥如五倍子九錢銅末一錢八分白礬白芨皂礬各九分再加食鹽九分共入于碗內再研極細入小銅杓內以濃茶淘調如稀糊放木炭火上徐徐熬之不住手攪勻熬成稠糊爲度預先以肥皂水洗淨鬚髮待乾以根子挑藥乘熱塗鬚髮上用油紙兜住外用烏帕包裹至頂解衣護枕而睡至半夜驗藥將乾用手搜去殘藥如乾甚用茶油潤潤去藥至天明洗面略洗鬚髮如面皮上尚有處以指蘸香油塗摩即用軟帛擦去油跡染後仍以香油少許潤之即

明黑可觀先一月染三四次後半月染一次永不露白

野狐倒上樹 尚書劉子元傳

黑鉛四兩 汞二錢

右先將鉛化成汁後入汞凝成其汞剪成錢樣外用鐵絲穿作十二串聽用再用木磁罐一箇入無鹽好醋三碗將鉛錢入罐內懸於醋上醋二指內泡卷指二箇鴨嘴膽礬四錢用磁碟封口蓋之再用黃泥封固夏月日中晒七日冬月糠火煨七日出罐底摘下孔出醋不用搗起礬來掃下藥霜來用脂皮包住收之臨用藥時將髮髮用溫水洗淨就濕再用脂皮包手指拈藥霜黏在鬚髮上自然黑到根神効切忌香肥皂水洗

烏髮方 刺史周如梅傳

官粉一兩二錢 白礬三錢

麝香一分 輕粉三分

白石灰二錢 樟腦二分
百草霜八分

水銀丁先將一錢化開入水銀結成砂子

右爲末用鹹水和熬滾去髮上燒半炷香即洗去

青雲獨步丹 烏鬚黑髮延年益壽

赤白何首烏共三斤用黑豆二升半浸洗淨浸首烏一晝夜去汁水將

赤茯苓半斤用汁乳浸過煮乾白茯苓半斤用乳浸過煮乾

兔絲子半斤酒浸煮搗爛焙乾當歸身酒洗三兩

補骨脂鹽酒炒四兩甘枸杞酒浸焙三兩

懷牛膝甘草水泡四兩懷生地黃酒浸入砂仁三錢同蒸

眞沒藥一兩五錢去砂土

右已鐵器晒乾爲末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸空心酒下午間

薑湯下臨臥薑湯下忌忌白

造酒烏鬚方 本府來推府傳

懷生地黃四兩眞牛薑汁四兩赤白何首烏各一斤新洗淨與麥過燒黃

小紅棗肉三兩

大當歸二兩

麥門冬去心二兩

甘枸杞二兩

胡桃肉三兩

蓮肉三兩

土蜜三兩

右先用酒洗淨地黃將何首烏水去渣入地黃煮俟乾再用薑汁水燉乾爲度便將地黃搗爛以三官斗糯米水十二斤作酒麴藥加常俟酒漿來方以水調勻地黃入酒糟內過三日去糟將前藥切片入絹袋中懸酒罈內箏殼包封毋令出氣放鍋內煮三炷香爲度後以酒罈埋土中三宿去水毒任意飲三五杯

烏鬚秘方用龜尿

研墨塗鬚烏立時

要取龜尿亦有法

猪鬃刺鼻龜卽尿

烏鬚秘方

用馬蝗蟬尋起數條帛包要用時將雞血或猪血將馬蝗入血內令食飽針出血同龜尿同研墨濃塗鬚髮上可烏丁月乃烏鬚第方也

烏鬚神妙方 本府蘇通府傳

五倍子

炒黑爲末

銅末一錢

白芨末八分

食鹽三分

沒石子末三分

白礬三分

黑礬三分

細辛末三分

柯子末三分

右爲細末。熱茶調稀。重湯煮入黑礬。再煮。面上生光。搽鬚上。油唇裏。黑烏鬚狐狸倒上樹。周賓崇傳自蜀中得來。

山茄要極黑者。收約有八九升來。去蒂以夏布包洗。去漿水。將山茄扭自然汁四五碗。入上等好墨四五錢。打碎。黑礬四五錢。一味俱入山茄汁內。貯新瓦罐中。每用將竹片蘸藥汁于鬚髮上。自尾倒上。切莫粘肉上。則洗不去了。

○一論烏鬚生髮良方

蒲公英

摘淨切

血餘洗淨四兩。青鹽四兩。研

右用磁罐

一箇。盛蒲公英

十層。血餘

一層。青鹽

一層。鹽泥

封固。添

桑椹

五白。夏

三。日冬

七日。桑葉

火煨

令烟盡

爲度。候

令取出。碾爲末。每服一

錢侵晨酒調下。

- 一儒者因飲食勞役及惱怒鬚髮脫落余以爲勞傷精血陰火上炎所致用補中益氣加麥門五味及六味地黃丸加五味鬚髮頓生如故。
- 一男子年二十頂髮脫盡用六味地黃丸不數日髮生寸許兩月復舊。
- 一史萬湖云有男女偶合鬚髮脫落無藥調治至數月後復生。

面病

難經曰人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之會也諸陰脉皆至顙項中而還獨諸陽脉皆上至頭而足陽明胃之經起鼻交頤中入齒中俠口環唇倚頰車上耳前過客主人穴其或胃中風熱或風熱乘之令人面腫或面鼻色紫風刺癢疹或面熱面寒隨其經症而治之。

○一論面寒者陽明經虛寒也。

升麻附子湯

升麻

葛根

白芷

黃芪 各七分 大附子 炮七分

人參

草豆蔻 各五分 益智仁 三分 炙甘草 五分

右剉一剉連翹葱白二根水煎溫服。

○一論面熱者陽明經風熱也。

升麻黃連湯

升麻

葛根 各一錢 白芍 七分

川芎 四分

薄荷

荆芥 各三分 蒼朮 八分 半黃連 酒洗 五分 酒芩 六分

犀角 四分半

白芷 二分 甘草 五分

右剉水煎食後服。

○一論面生瘡者上焦火也。

清上防風湯

防風 一錢 荆芥 五分

連翹 八分

山梔 五分

黃連 五分

黃芩 酒炒 七分 薄荷 五分

川芎 七分

白芷 八分

桔梗 八分

枳殼五分 甘草三分

右剉一剉，水煎，入竹瀝同服。

○一論：面唇紫黑，乃陽明經不足也。

升麻白芷湯

升麻

防風

白芷 各一錢 芍藥

蒼朮 各三分

黃芪

人參 各七分 葛根 一錢半 甘草 四分

右剉一剉，薑棗煎服。宜早後午前，取天氣上升於中，使陽達於面也。

○一論：面生粉刺者，肺火也。

清肺飲

連翹

川芎

白芷

黃連

黃芩

荊芥

桑皮

苦參

山梔

貝母

甘草 各等分

右剉，水煎，臨臥服。

○一點痣方

以巴豆七箇石灰等分爲末以鹹水搗在掌內藏獨不於巴豆石灰內候米爛將痣用針撥動以米膏點之絕三日不洗自然脫落

○一起字出青方

礦石灰

紫蓼灰各一錢人參五錢

鹹一錢

加百草灰

辣蓼灰各一兩

右爲末水調寫字上有泥起拂去再上

○一出刺青方

馬肉不拘多少儘令蒼蠅作壤生蛆出晒乾爲末以針撥動青處擦藥其青自出

○一抓破面皮

用生薑自然汁調輕粉搽患處更無痕迹

○一洗面方

每早以漱口水吐在手掌中洗面久久自然光潤粉刺自消

○一治赤紅爛臉

水銀一錢 柏油蠟一錢 共搗塗之

○一治面上瘡鼻酒刺

雄黃一錢 硫黃五分 鉛粉一錢

右共爲末乳汁調塗晚上敷次日溫水洗之如此三上去矣

耳病

脉兩寸脉浮洪上魚爲溢兩尺脉短而微或大而數皆屬陰虛法當補陰
抑陽○左寸洪數心火上炎兩尺脉洪者或數者相火上炎其入必遺
精夢與鬼交兩耳蟬鳴或聾

耳者屬腎而開竅於少陽之部通會於手三陽之間坎離交則聚氣以司
聰而善聽也開於腎而貫於腦內經曰五臟不和則九竅不通其耳鳴

耳痒耳聾者皆屬腎虛水不上頭清氣不升所致也從補益門治之其壯年及小兒耳腫耳痛耳停乃三陽風熱壅遏所致也宜升陽散火湯加黃柏知母晚間兼服金花丸可矣。○黃連解毒大黃

○一論思慮煩心而神散精脫於下則真陰不上泥丸而氣不聚故耳鳴耳重不聽及耳內痒。

安神復元湯

黃芪

蜜炒五分

一錢

人參

一錢

五分

當歸

酒洗五分

一錢

柴胡

一錢

升麻

五分

黃連

酒炒一錢

黃芩

酒炒一錢

黃柏

酒炒一錢

知母

一錢

防風

一錢

蔓荊子

七箇

麥門冬

一錢

扶神

一錢

小章

一錢

酸棗仁

炒一錢五分

甘草

五分

右剉

一劑

圓眼肉三枚

水煎服。

○一論勞傷氣血風聲虛聾耳鳴勞傷者勞火鼓其聽戶也氣

右剉一劑圓眼肉三枚水煎服。

○一論勞傷氣血風聲虛聾耳鳴勞傷者勞火鼓其聽戶也氣

聾者經氣滯塞於聽戶也。風聾者風熱閉其聽戶也。虛聾者氣血虛耗而神不用也。毒聾者膿血瘴礙於聽戶也。久聾者病非一日邪氣痺聚也。凡是聾者勢必耳鳴。故總繫其耳鳴也。

千金補腎丸

當歸酒洗

白芍酒炒

懷熟地黃酒蒸黃芪蜜炒

人參

白茯神

去皮木

山茱萸

酒蒸去核

牡丹皮

澤瀉

兔絲子酒製

蛇床子

肉苁蓉

石斛

乾薑

桂心

大附子

炮去皮膽

巴戟去心

遠志

去心

細辛

甘草各二兩

石菖蒲一兩

防風一兩

五錢羊腎二枚

共二十三味

西園公加山藥二兩殊效

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服十五丸加至三四十丸溫湯下

○一論虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛或憂鬱痞滿咽喉

不利煩燥不寧

通明利氣湯

蒼朮

一錢 鹽水炒

白朮

一錢 去蘖炒

梅芎 八分

陳皮

二錢 鹽水浸

香附

一錢 童便炒

貝母

三錢

生地黃

一錢 姜汁浸

黃連

一錢 半酒浸

黃芩

一錢 半酒浸

黃柏

二錢 炒

梔子仁

炒 二錢

玄參

二錢 酒洗

木香

五分

檳榔

一錢

粉草

炙 四分

右剉二劑生薑水煎入竹瀝同服

○一論陰虛火動而耳聾或鳴者

六味地黃丸

見補益

依本方加黃柏知母石菖蒲遠志去心屢驗

○一治耳鳴主方

黃連

黃芩

梔子

當歸

陳皮

膽星

各一錢 龍膽草

香附

各八分 玄參 七分

青黛

木香

各五分

乾薑

炒 黑 三分

右剉一劑生薑三片煎七分入玄明粉三分痰盛加五分食後服如作
丸子加麝香五分麝香二分爲末神麴糊爲丸每服五十九淡鹽湯送
下如腎虛而鳴者服六味地黃丸

○一論耳主風者耳腫作痛牙關緊急乍寒乍熱飲食不下是也
射干散 苦竹吳紹源傳

升麻

桔梗

射干

昆布

連翹

甘草

右剉水煎熱服汗出立愈并治面腫牙痛咽喉痛神效

○一治耳鳴如流水聲耳痒及風聲不治久成聾

生烏頭二味搗得乘濕削如棗核大塞耳且易夜易不三日愈

○一論塞藥治耳聾殊效

石菖蒲一寸 巴豆一粒去壳全蝎一箇去足尾

右爲末葱涎爲丸如棗核大綿裹塞耳卽通

○一論寒藥專治耳聾或因病因氣及感風邪而聾者若年老而聾者
蚯蚓去土陰乾爲末七分麝香三分用葱截寸許塞藥于內左聾塞
右耳右聾塞左耳左右俱聾兩耳俱塞

○一治耳聾

通靈丹

安息香

分

錢五

桑螵蛸

分

錢五

阿魏

分

錢五

朱砂

分

五分

草麻子仁

七箇

巴豆仁

七箇

獨蒜

七箇

右爲細末入二十仁與蒜同研爲丸如棗核樣每用一九綿裹入耳內覺
微痛卽去

○一論停耳生膿并黃水

紅綿散

枯白礬五分

乾胭脂粉半

麝香

少許

片腦

一分

熟燼甘石五分

右爲末先以棉杖子展乾膿水另將鴉翎管子送藥入耳底○下方用蛙竹粉易變甘亦效。

○一治耳空腫出膿水。

用枯礬爲末以筆管吹耳內日三四次或以綿絮塞耳中。

○一治耳熱耳出膿汁。

甘草炙

升麻

木通

赤芍

桑白皮炒

生地黃

前胡

赤茯苓

蔓荊子

甘菊花各等分

右剉薑棗煎服。

○一治人耳如蠅鳴服四物湯耳鳴甚此元氣虛損之症五更服六味

丸食前服補中益氣湯頓愈此症若血虛而有火用八珍湯加山藥

胡氣虛而有火四君子湯加山藥柴胡若因怒即瞽或鳴實用小柴胡

加芎歸山藥虛用補中益氣加山藥午前甚用四物加白朮茯苓久須

用補中益氣午後甚用地黃丸。

○一論治人因怒耳鳴吐痰作嘔不食寒熱脇痛用小柴胡合四物加山
梔茯苓陳皮而瘥

○一論耳鳴因虛火妄動心神不寧以益氣湯去升麻參芪加半斤茯苓
川芎白芍竹茹黃柏黃連天麻蔓荊子細辛

○一治耳中常鳴生地黃截塞耳數易之以瘥爲度○一法以黃連灰火
中煨之用良

○一治耳鳴肺火盛腎氣虛以四物湯四錢黃柏三錢童便煎空心服

○一寡婦耳內外作痛不時寒熱脉上魚際此血盛之症用小柴胡湯加
生地以抑其血而愈又頃間結核如貫珠寒熱用加味歸脾湯加味逍
遙散調補肝脾而愈

六味丸方見補益補中益氣湯方見內傷八珍湯方見補益四君子湯方
見補益四物湯方見補益小柴胡湯 加味逍遙散 加味歸脾湯
方俱見婦人虛勞

○一專治耳鳴耳聾

獨勝丸

川黃柏去皮，小兩人乳拌勻，曬乾，再月鹽水炒褐色。

右爲細末，水糊爲丸，如梧子大，每服百丸，空心鹽湯送下。

○一治耳內腫痛膿血出

白礬枯末，入麝香少許，吹耳中，日三四度，或綿裹塞耳中，立瘥。

○一治耳聾

細辛爲末，鑄黃蠟爲丸，如鼠屎大，綿裹塞耳中，又宜灸耳前兩中髎。

○一治氣道壅塞，兩耳聾

用甘草，如棗核大，綿裹塞耳中，却以甘草放口內，隨嚥，又宜生葱白

塞耳內，頻換，卽通。

鼻病

脈石手脈浮洪而數爲鼻竅鼻疏左手脈浮緩爲鼻竅鼻塞不通
夫鼻者肺之候時常和則吸引香臭矣若七情內鬱六淫外侵
之過則鼻氣不能宣調清道壅塞卽爲病也爲血爲氣爲痰爲
爲寒塞不通爲濁涕不聞香臭此皆臟腑不調邪氣鬱於鼻而清道壅
塞矣寒則溫之熱則清之塞則通之壅則散之可也

○一論肺熱鼻流濁涕壅塞不通又治鼻不聞香臭
神愈散

細辛白芷與防風
十般等分剉和同

羌活當歸半夏芍
三錢薄荷薑煎服

桔梗茯苓陳皮輩
氣息調勻鼻竅通

○一治腦漏

防風

荆芥

獨活

連翹

蔓本

辛夷

甘草

細辛

牙皂

石菖蒲

右剉水煎服如數服未效可將後藥三味爲末綿裹塞鼻內卽效

○一論鼻流濁涕不止者名曰鼻淵乃風熱在腦傷其腦氣腦氣不固而液自滲泄也。

蒼耳散

白芷一兩

辛夷仁

蒼耳炒各一錢薄荷五錢

右剉水煎服

○一論鼻中流出臭膿水名曰腦漏

辛夷散

辛夷花一錢

黃芪一錢

人參一錢五分當歸一錢

白芍一錢

川芎一錢

白芷一錢

細辛八分

黃芩酒炒一錢甘草六分

右剉一劑燈心三十根水煎食遠服

○一治顏疳或鼻疳

乳香

沒藥各五分

孩兒茶一錢

雞腔脰焙黃色一錢

右爲末搽患處

○一老人鼻中流涎不乾

獨蒜四五箇搗如泥貼脚底心下用帛貼之其涕再不發

○一男子酒齙鼻

雄猪膽每日早以好酒調服二箇不過半月如舊

○一治糟鼻方

用硫黃爲細末甚者加草烏尾爲末以酥油調稀塗患處如覺痛苦用梔子煎湯服之或洗藥處卽愈

○一論鼻赤久不瘥用大黃芒硝檳榔等分爲末水調敷患處三四次洗淨以新銀杏去殼嚼爛敷於鼻上不過五七次復舊

○一治赤鼻

檳榔爲片將茄汁浸晒一二次爲末面上紅壘硫黃以人乳浸滿碗頓入湯鍋煮乾先須用唾濕鼻方味藥上

○一論鼻淵頭眩

清泥丸飲神湯

人參

防風

麥門冬去心當歸頭

枯苓酒炒

小草

黃連

酒炒各一錢蔓荊子八分升麻

生甘草各三分

明天麻

半夏製各七分

右剉水煎食遠服。○腦漏者加蒼葶子二錢黃芪一錢

○一論鼻流涕久而不愈乃成腦漏必因虧損元陽以致外寒內熱甚則有滴下腥臭之惡者也知保養服藥方可

加味防風湯

防風一錢

人參一錢

片苓酒炒一錢白芨一錢

麥門冬

去心生甘草五分

當歸頭一錢

白芍一錢

懷生地

酒洗

黃柏酒炒一錢黃芪一錢

黃連酒炒一錢

知母一錢

百合一錢

右劉水煎食遠溫服

○一論鼻涕長流名鼻淵也

當歸

川芎

白芷

人參

白茯苓

麥門冬

防風

秦朮

荊芥

薄荷

蒼耳子

香附子

蔓荊子

甘草各一兩 天竺黃三錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三四十九米湯下

○一男子面白流涕不聞聲穢三年矣用補中益氣湯加麥門山梔四倍

○一論色慾太過虛損白濁鼻軌出清涕如泉湧者

補中益氣湯方見內傷依本方加黃柏知母白芷細辛藜蘆五味子白芍

辛荑蒼耳葉水煎溫服

○一論肺虛爲四氣所干身內壅塞涕出不已或氣息不通或不聞香氣

川芎

白芷

細辛

藜蘆

防風

辛荑仁

木通

甘草

右剉水煎溫服

○一治鼻中肉贅臭不可近痛不可搖以

白礬末加硃砂少許吹其上頂之化水而消與勝濕湯合瀉白散下劑此厚味擁濕熱蒸於肺門如雨霖之地突生芝蘭也

○一治鼻中肉贅

用藕節有毛處下節燒灰存性爲末吹患處立瘥

○一治血熱入肺名曰酒齋鼻此丸主之

苦參淨末四兩當歸淨末二兩

右和勻酒糊爲丸如梧子大每服七八十丸食後茶下

○一治鼻疳爛通鼻孔予治陳都憲夫人患此得効

鹿角一兩 白礬一兩 俱放在瓦上隔火煨過

人頭髮五錢 在燈火上燒過

右爲末先用花椒湯洗淨搽藥於疳上三四次卽愈如瘡不收口用瓦

松燒灰存性研末乾擦之即收

○一人酒瘡鼻紅赤用此方晚服用六味地黃丸全料加當歸二兩苦參四兩空心服不兩月而愈

金花丸

黃連二兩

枯苓二兩

黃柏二兩

梔子一兩

大黃九次一兩酒蒸桔梗二兩

白粉葛二兩

右爲細末井水丸如梧子大每服七八十丸白溫水下

口舌

脉左寸洪數心熱苦○右寸浮數肺熱口辛○左關弦數而虛膽虛口苦甚洪而實肝熱口酸○右關沉實脾胃有實熱口甘兼洪數者口瘡或爲重舌木舌脉虛者中氣不足口瘡若服涼藥不愈者宜理中湯夫口舌之爲病或爲重舌木舌或爲糜爛生瘡之類經云肝熱則口酸心

熱則口苦，痺熱則口甘。肺熱則口辛，腎熱則口鹹，有口淡者，胃熱也。口臭者，乃腐脂燥腐之氣，凝積於胸膈之間而生熱，衝發於口也。口瘡者，脾氣凝滯加之風熱，而然也。治當以清胃瀉火湯主之。此正治之法也。如服涼藥不已者，乃上焦虛熱，中焦虛寒，下焦陰火，各經傳變所致，當分別而治之。如發熱作渴，飲水口瘡者，上焦虛熱也，補中益氣湯主之。如手足冷，肚腹作痛，木便不實，飲食少思，口瘡者，中焦虛寒也，附子理中湯主之。如晡熱內熱不時而熱作渴，痰唾小便頻數，口瘡者，下焦陰火也。六味地黃丸主之。如食少便滑面黃肢冷，火衰土虛也。八味丸主之。若熱來復去，晝見夜伏，夜見晝伏，不時而動，或無定處，若從脚起，乃無根之火也，亦用八味丸。及十全大補湯加麥門、五味，更以附子末唾津調搽涌泉穴。若藥用涼藥損傷生氣為害匪輕。

○一論心肺蘊熱口瘡咽痛膈悶小便淋瀝不利
清金道子赤散

黃連

黃芩

梔子

木通

澤瀉

生地黃

麥門冬

甘草

右剉生薑三片。水煎。食後頻服。

○一論上焦實熱。心胃二經之火而作。口舌生瘡。腫痛。都并咽喉牙齒耳面腫痛皆効。

清胃瀉火湯

連翹

桔梗

黃連

黃芩

梔子

玄參

升麻

生地黃

薄荷

五分

甘草三分

乾葛

七分

右剉水煎。頻頻溫服。

○一論飲酒過度。舌本強腫。言語不清。此脾虛濕熱。以益氣湯加神麴麥芽乾葛澤瀉。

○一論上焦虛熱發熱。作渴。飲水勞則體倦。此內傷氣血而作。口舌生瘡。

補中益氣湯方見內傷依本方加麥門冬五味子

○一論中焦虛寒手足冷肚腹痛太便不實飲食少思而作口舌生瘡以附子理中湯方見中寒依本方

○一論肺熱內熱不時而熱作渴痰唾小便頻數而作口舌生瘡者此下焦陰火也以

六味地黃丸方見補益依本方

○一論如食少便滑面黃肢冷如作口舌生瘡者此火衰土虛也以八味丸方見補益依本方

○一論若熱來復去晝見夜伏夜見晝伏不時而動或無定處而作口舌生瘡者若從脚起乃無根之火也以

八味托及十全大補湯方見補益依本方加麥門冬五味子

○一論口瘡鼻氣穢爛久而不瘥者用黃柏五錢青黛一錢五分爲末每用一錢於舌上津嚥下

○一論口瘡用黃連川椒等分爲末每少許搽瘡上噙漱良久以凉水漱

○一治口舌生瘡

加味陰陽散

黃連

乾薑

青黛

孩兒茶 各等分

右爲末每用少許搽患處立效○丁方用五倍子爲末搽瘡上愈

○一治口瘡良方 徐杏庄老師傳

生白礬一錢

朱砂二分

右共爲末敷上立愈

○一論口舌生瘡咽喉腫痛咳嗽痰涎清聲潤肺寬膈除熱

上清丸 黃濱江傳

百藥煎四兩

薄荷研沫四兩砂仁二兩

訶子五錢

桔梗五錢

甘松五錢

寒水石二兩

玄明粉五錢

硼砂五錢

片腦一錢

右爲末甘草熬膏丸如梧子大每嚼三五丸茶清下

○一論曰瘡連年不愈者此虛火也

玄門丹

天門冬去心

麥門冬去心

玄參各等分

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸嚥化下

○一人口內如無皮狀或咽喉作痛喜熱飲食此出氣虛寒而外虛熱也
用加減八味丸而愈

○一人舌腫舒出口外舌者心之苗又脾之經絡連舌本故舌下止熱當
責於心脾二經經所謂熱勝則腫也用薑麻子去殼暴炙投出油誘痰
作撚燒烟薰之而愈本草云薑麻子浮腫惡氣取油塗之葉主風腫不
仁搗蒸敷之則其能解風腫內熱也可知矣

○一人胃弱痰涎口舌生瘡彼服滾痰丸愈盛反瀉不止惡食倦怠此胃

氣被傷也。予以香砂六君子湯數劑。少可。再以補中益氣湯加茯苓半夏而愈。夫胃氣不化。飲食不化。亦能爲痰。補中益氣乃治痰之法也。苟虛症而用峻利之劑。鮮不危哉。

○一人脾胃虛。服養胃湯枳朮丸。初有效。而久反虛。口舌生瘡。勞則愈盛。此中氣虛寒。用理中湯。少愈。更以補中益氣湯加半夏茯苓。而安。夫養胃湯香燥之劑也。若飲食停滯。或寒滯中焦。服則燥開。胃氣宿滯消化。最爲近理。使久服。則津液愈燥。胃氣愈虛。況胃氣本虛。而用之。豈不反甚其病哉。亦有房勞過度。稟氣衰敗。或元氣不足。不能上蒸。中州不運。致飲食不進者。以補真丸治之。若丹田之火上蒸脾土。脾土溢和中焦。自治飲食自進。何口瘡之不愈哉。

○一人舌青黑。有芒。乃熱劇也。良由思慮過度。氣所得。病者要將舌來。土壁上貼之。方好。予製此方。卽效。

清心散

赤茯苓去皮一錢

酸棗仁一錢

麥門冬去心一錢

遠志五分

水淘去心

黃連一錢

胡麻仁一錢

枳殼去穢八分

小木通八分

小甘草三分

右剉水煎溫服

○一男子口臭牙齦赤爛腿膝痿軟或用黃柏等藥益甚時或口鹹此腎經虛熱以六味丸悉愈

○一治口瘡喉痛牙疼妙藥 陳上余傳

硼砂一錢

孩兒茶二分

雄黃二分

青黛一厘

玄明粉一厘

胡黃連三厘

冰片一厘

右共研末擦止

○一香茹治口氣甚捷蓋口臭是脾有鬱火溢入肺中失其清和甘美之意而濁氣上干故也

○一補舌唇方 賈蘭峰傳

用鮮蠟燒灰每二錢用乳香沒藥各二分半塗之即生肉如去多唇舌用川烏草烏爲末攤帛一條以涼水調令貼之即不覺痛可用刀取如流血以陳石灰塗之愈後舌硬用白雞冠血點之即軟

○一生舌方

用活蟹一箇炙乾爲末收之如遇此患敷上合口即已

○一治舌上腫硬

用百草霜海鹽等分爲末井花水調敷患處○又宜真蒲黃末頻搽舌上內以黃連一味煎湯服以瀉心火

○一治舌長過寸研木片敷之即收

○一治舌無故血出如泉槐花炒爲末搽之立止

○一治舌忽脹出口外俗云是蜈蚣毒用雄雞冠血一小盞浸之即縮入

○一活吐不收名曰陽強

○一舌縮不能言名曰陰強

○一男子舌常破而無皮狀或咽喉作痛服清咽利膈散愈時子以理中湯治之乃愈

蘭唇

內經云脾氣通於口又云脾之榮在唇蓋燥則乾熱則裂風則癢寒則揭若唇腫起白皮皸裂如繸齒名曰蘭唇有唇腫重出如繸者有本細末大如齒如繸者或因七情動火傷血或因心火傳按脾經或因厚味積熱傷脾太要審本病察兼症補脾氣生脾血則燥自潤火自除風自息腫自消若患者忽略治者不察妄用清熱消毒之藥或用藥線搗去皮反爲翻花敗症矣

○一論肝經怒火風熱傳脾唇腫裂或患唇蘭唇

柴胡清肝散

柴胡

黃芩 炒各一錢 黃連 一錢五分 山梔 七分

當歸一錢五分 川芎六分

生地黃二錢 升麻二錢五分

牡丹皮一錢五分 甘草三分

右剉丁劑水煎食後頓服若脾胃弱去苓連加白朮茯苓

○一論陰虛火動唇燥裂如繭

濟陰地黃丸

熟地黃

自製

山茱萸

酒蒸

乾山藥

遼五味子

麥門冬

去心

當歸身

肉苁蓉

甘枸杞子

甘菊花

巴戟肉各等分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服百丸空心白湯送下

○一論中氣傷損唇口生瘡或齒牙作疼惡寒發熱肢體倦怠食少自汗或頭痛身熱煩燥作渴氣喘脉大而虛或微細軟弱

補中益氣湯

人參

黃芪

蜜水炒

甘草

各一錢

白朮

去蘆

當歸

橘紅各一錢

柴胡

升麻各五分

右剉下剉薑棗煎服。

○一論唇紫燥裂生瘡用嫩槐燒灰爲末以猪油調塗患處立已。

○一論冬月唇乾血出用挺仁搗爛猪油調塗唇上即効。

牙齒

○脈石才關脈洪數或弦而洪腸胃中有風熱齒痛○尺脈洪大而虛腎虛主齒動搖疎豁相火上炎而痛。

夫牙齒有乃骨之芽也腎主之則諸經血脈津液皆潤澤清涼矣蓋血足則涼涼即骨堅固血虛則熱熱則齒浮動人之上唇人中之下牙屬督脈下前齒屬任脈其兩頤上下及齦口皆屬手陽明二經故牙床屢土牙齒猶如木栽土上土涼則根固土熱則焦搖牙即骨也骨不能療其痛者牙齦筋肉也人食梅多者牙即燉麻痺而不能力嚼者非木

酸制土耶。其牙斷肉脫胃火也。牙疎脆者腎之相火也。經曰諸痛痒瘡瘍皆屬心火。緣心火之下陰精承之。若承之者不缺何痛之有。其牙患之名有風牙蟲牙牙疳牙宣。蓋由一火之不齊也。故熱則生風風字有虫。又曰血遇火則沸而出牙宣也。熱兼外邪則腫痛。真陰未成而熱熾者曰疳。乃潰塌之速。凡為治者保腎水者知其本清胃火者知其標疎風邪者知其權。蓋風藥善通經開腠。則是火鬱宜發之義。其修養家常食淡些。則血不凝戒慎厚味甘辛香辣。則不積火。治牙至藥不効時熱之積也。蓋因縱慾而陰虛嗜味以為補而益增其火。其目下嗜慾之節乃為移邊晚景不甚苦於牙也。東陽明火多者易作牙病也。凡用椒姜巴豆葷穢性熱辣者擦而定痛雖快於一時實乃資邪益深矣。戒之戒之。其小兒牙疳牙痛者悉以什嚙以味而不知節厚其衣重其緇而不知識乳兒作疳者母之遺熱也。烘焙純綿夜煖圖於睡寐况與陰未成所以為害甚也。固不可不留心究明於斯矣。○經云腎衰則齒齕。

精固則齒堅

○一論一切牙齒腫痛皆屬胃經火盛多是辛熱厚味及服溫暖之藥過多以致胃熱上下牙痛牽引頭腦面熱其齒喜冷惡熱者加味清胃散

當歸尾

生地黃

牡丹皮

升麻

黃連

加防風

荊芥

軟石膏各等分

右剉水煎服

若牙齦額半邊痛者加防風白芷羌活細辛

若牙齦脫而血出者加扁柏葉黃芩荊芥梔子

若虛損人牙痛者加黃柏知母人參甘草

若滿口浮而痛不能力嚼者加連翹玄參芍藥

小兒牙疳者乳母服加天花粉玄參白芷

醇酒厚味唇齒作痛或齒齦潰爛連頭面頸項作痛者並加犀角連翹

甘草○胃寒齒痛加草豆蔻細辛防風羊脛骨灰去牡丹皮

○一論胃得實熱齒痛或上片痛尤甚者

涼膈飲

連翹

梔子

大黃

酒蒸爲君

芒硝

黃芩

薄荷

知母

升麻

石膏

黃連

甘草各等分

右剉水煎頻服

○一論風牙疼痛

草烏

二錢米泔水浸去皮炒焦

細辛一錢

全蝎稍五錢洗去躁

白殭蠶

五條炒大嘴

冰片一分

右研勻搽患處開口流涎內服清胃散

○一治牙風腫痛

涼牙散

軟石膏一兩

川烏三錢

草烏三錢

花椒三錢

右俱生用爲末，擦牙漱口，吐之立愈。

○一陳省香遇一，道人治牙痛如神。

巴豆

去壳三枚，真川椒七粒。

右先將川椒略焙爲末，次入巴豆同研，極爛入新米飯中，須搗研爲末。

九如黍米大，每用一丸貼痛處。

○一陳恕軒治牙痛不可忍者。

花椒炒

胡椒

白礬半生半枯，食鹽炒。

右各爲末，合和同研，每少許擦痛處，吐涎即止。

○一治風冷齒痛。

白芷

細辛

良薑

萆撥

川椒

香附

蜂房炒

右各等分爲末，擦牙搗鼻。

○一治牙痛方。

黑豆一兩

炒

鹽六錢

花椒五錢

生薑六錢

連翹葱六錢

艾六錢

右白水煎漱口吐去

○一論牙屬腎骨之餘不作痛作痛者乃手足陽明經之火沸血壅牙根齒齦浮起作痛也宜清胃火為主其牙齒疎脆剝下漸覺齒搖牙蛀去乃屬腎之真陰虧欠牙不堅實矣宜服六味地黃丸

滋陰清胃固齒丸

善治牙疼且能固齒

山藥末一兩

牡丹皮末一兩

黃柏酒炒末一兩

黃連酒炒末一兩

升麻末一兩

當歸酒洗末一兩

玄參末一兩

乾葛末一兩

右用知母二兩山查肉二兩煎濃湯去渣淨汁煮葛粉爲糊又用細米飯一盞研爛和葛粉同又所勻調早上八味末爲丸如棗豆大以水吞過朱砂爲衣晒乾每服三十錢食後白湯送下要忌一切厚味辛辣

諸甜等物

一治胃經虛熱齒牙作痛者

補中益氣湯方見內傷依本方加熟地黃牡丹皮白芍藥

一治齒動作渴屬脾胃虛弱陰火熾盛者

補中益氣湯方見內傷依本方加酒炒黃柏知母

一治每勞心則齒縫脹而不能咀嚼此元氣虛弱也

補中益氣湯方見內傷依本方

一論齒浮作痛耳齒黑口乾作渴日晡則劇此脾虛也用益氣湯加

減八味丸而愈

一朱土部午後有熱遇勞遺精其齒即痛此脾腎虛熱先用補中益氣

送六味丸更以十全大補湯而愈

一男子齒浮作痛耳齒黑口乾作渴日晡則劇此脾虛弱也用補中

益氣湯加減八味丸而愈

一男子口臭牙齦赤爛眼眩痰軟或用黃柏等藥益甚時或口減此腎經虛熱余用六味地黃丸悉瘥

一男子每足發熱牙即浮腫此足三陰虛火用加減八味丸而不復作

一論腎氣虛寒牙齒作痛面色黧黃精神憔悴脚膝無力飲食少思或痰氣上升小便頻數齒不堅固或口舌麻悶畏飲冷水以八味丸而安

一治胃中客熱牙疳去血口臭齒齦腫痛腐爛

甘露飲子

枇杷葉

石斛

黃芩

枳殼

天門冬

麥門冬

生地黃

熟地黃

山茵陳

甘草

右剉水煎服

一李小園患滿口牙齒疼痛潰爛動搖飲食不下乃牙疳也諸醫不効忽遇一道人傳方一擦即愈

川椒炒

錢半銅青一錢

硼砂一錢

右三味爲末每少許擦患處流涎立止

○一治牙疳牙根內臭爛黑色有蟲作痛

雞內金即雞脾腔內粗皮曰正五錢

銅青一錢 麝香一分

右爲細末用溫鹽水漱口貼患處

○一治牙疳臭爛久不愈

白礪砂一錢 白礬枯一錢 麝香五分 青黛三分 輕粉二分

雄黃二分 冰片一分

右爲細末候睡去時以竹管吹藥吹在牙疳上或以雞翎掃敷之

○一論牙痛或腫風牙蟲牙牙動牙長痛不可忍 宋知府傳

馬蜂窩 白蒺藜 花椒 艾葉 葱頭

荊芥 細辛 白芷 各等分

右剉散酒煎口含良久吐出即瘥

○一治牙痛蟲蛀不化諸藥無効者

救苦丹

蟾酥 三分 剉細乳汁也 少溶化 磁盞內 雄黃 二分 細辛 二分

冰片 二分

右將酥乳調和細細納在蛀牙孔內或痛牙齦縫中口中涎任流出之內服加味清胃湯

○一方治蟲牙腫痛用雄黃二分麝香少許搽於蟲孔中蟲死痛止

○一治風牙蟲牙作痛

用黃蠟蜂窠一箇以花椒填滿其竅以白鹽一錢封口燒紅入白芷羊脛骨灰各一錢同研爲細末先以清茶漱口淨然後以藥搽之及數痛處如有蟲蛀孔作痛以少許塞孔中立驗

固齒明目烏鬚黑髮良方

牙痛胃火

厚味所起

齒動腎虛

房勞過矣

補腎牙牢

清火痛止

節慾其淡

何疾不愈

經驗良方

擦牙固齒

明目烏鬚

香口潤喉

久而用之

其妙無比

何首烏

黑古件蒸一次半

次四兩

早蓮草

槐角

黑豆煮汁拌蒸四兩

懷生地黃

酒拌砂鍋內蒸一日至

骨碎補

剉去皮毛炒七次一兩五

青蘆

二兩

沒石子

公母成對二兩

右共爲細末每早擦牙滾水嚥下能用於鬚髮未白之光可免染鬚之

勞烏鬚黑髮百歲不白固齒牢牙永世不落真仙方也

牢牙固齒烏鬚黑髮秘方

臨川劉雲素傳

沒石子

四錢

青蘆

二兩

細辛

一兩

熟地黃

二兩

破故紙

炒二兩

地骨皮

二兩

右共爲細末每早擦牙良久滾水嚥下

擦牙烏鬚方

本縣丁侯傳

白茯苓

去皮

細辛

牙皂

生

灰

存

五倍子

炭

右各等分爲細末頻頻擦牙日久鬚自黑

○一擦牙固齒牙宜口臭烏鬚黑髮吏部吳繼疎試効

旱蓮草陰乾切碎半斤

香附米四兩

右二味入砂鍋炒黑存性爲末擦牙

○一固齒烏鬚王斗岳傳

青鹽炒一兩

槐角子

炒一兩

牡丹皮

酒洗一

破故布

酒炒七錢

細辛

酒洗五錢

熟地黃

酒洗二兩

沒石子

三錢

百藥煎

二錢

右共爲末每早擦牙嚥下

○一擦牙防齒患

取青槐枝搥半碎半斤水四碗煎二碗去渣入好鹽丁在釜乾更將

搥炒研細擦牙溫水漱口吐水洗眼日明齒固

修合日期

五月五日

六月六日

眼目

（脉）左寸脉洪數，心火炎上也。關弦而洪，肝火盛也。○右寸關俱弦洪，肝木夾相火之勢而來侮所不勝之金，而剋已所勝之土也。

夫天運拂經，則兩曜薄蝕。人身違和，則兩目眇昏。是眼目之在人，猶日月之麗天，明則其常而昏則其變也。下身之中，惟目最爲貴重者，臟腑之精華萃焉，血脉之宗會繫焉。東垣曰：按陰陽應象論云：諸脉皆屬於目。又曰：目得血而能視。五臟六腑之精氣皆上注於目，而爲之精。精之窠爲眼，骨之精爲瞳子，筋之精爲黑眼，血之精爲目窠之繖絡，氣之精爲白眼，肌肉之精則爲約束。裹瞳筋、骨、血、氣之精而與脉併而爲系，上屬於腦，後出於項，是故瞳子黑眼法於陰，白眼赤目法於陽。故陰陽合德而爲精明也。是以五臟六腑十二經脉三百六十五絡其血氣皆聚受於脾，土上貫於目而爲明，故目者心之使也。心者神之舍也。若精神亂

而不守名然覺非常之怪邪中其精則精散則視岐視一物爲兩也四
事煩擾使食失節勞役過度致脾胃虛弱心火太盛則百脉滯騰血脈
並行經曰天明則日月不明邪害空竅是也董院使曰目之首尾赤喘
屬心其滿眼曰睛屬肺其烏睛圓大屬肝其上下肉胞屬脾而中間黑
瞳一點如漆者腎實主之是隨五臟各有證應然論其所主則瞳子之
關繫重焉何以言之目者肝腎外候也肝取水腎取水水能生木子肝
母腎爲子母而能相離者哉故肝腎之氣充則精彩光明肝腎之氣
乏則眊眊眩暈烏輪赤暈刺痛滑淚此肝熱也膽生清淚枯黃遙睛此
肝虛也瞳人開大淡白偏斜此腎虛也瞳人焦小或帶微黃此腎熱也
又曰白睛帶赤或紅筋者其熱在肺上胞下胞或目唇間如疥點者其
熱在脾又曰眼者輕膜裹水照徹四方遡源反本非天一之水入莫就
爲之主宰乎机而論之則拘急牽緩瞳青胞白癢而清淚不赤不疼是
之謂風眼烏輪突起胞硬腫紅眵淚濕漿裏熱刺痛是之謂熱眼渾而

淚胞腫而眇，上壅，朦朧酸澁微赤，是之謂氣眼。其或風與熱并，則癢而浮赤，風與氣搏，則癢滿昏沉，血熱交聚，故生淫膚粟肉，紅縷偷針之類。氣血不至，故有眇視，胞里雀眼，盲障之形，淡紫而隱紅者，爲虛熱，鮮紅而兼赤者，爲實熱。兩眦呈露生努肉者，此以熱血旺，白睛紅膜如錦者，此氣滯血凝，熱證。瞳仁內湧白睛帶濁色浮而赤也。冷證，瞳人青綠，白睛枯槁，氣沉而濁也。眼熱經久，復爲風冷所乘，則赤爛，眼中不赤，但爲痰飲所注，則作疼，肝氣不順而夾熱，所以羞明，熱氣蓄聚而傷胞，所以胞合劉河間曰：在瞳則爲表，當除風散熱；在臟則爲裏，當養血安神。如暴失明，昏澁，翳膜眇淚斑入眼，此風熱也。一云斑入眼，此肝氣盛而發在標也。宜表散以去之。如昏弱不欲視物，內障見黑花，瞳子散大，皆裏也。血少神勞，腎虛也。宜養血補水，安神以調之。觀諸公所論治法之法，大槩以清心寧肝調血順氣爲先，不可固執水能生木之說而偏補養。蓋腎水惡燥，設遇虛證，亦不過以當歸地黃等藥潤養之，輕則溫補。

之亦可也。况夫肺能發燥，肝亦好潤。古方率用杏仁、乾柿、飴糖、沙蜜、爲佐果，非潤益之意乎？抑且脾者，諸陰之首，目者血脉之宰也。故脾虛則五臟之精氣皆失，所司不能歸明於目矣。心者君火也，主藏神明，宜靜而安。相火化行，其令相火乃胞絡之火，主百脉皆榮於目。既勞役妄動，又因邪氣所併，而復血脉是故諸病生焉。翳目者，雖宜養血安神，又當兼理脾胃，良法也。至於退翳一節，尤關利害。凡翳起於肺，肺家受熱，輕則朦朧重則生翳，有曰真珠翳狀如碎米者，易散。有曰梅花翳狀如梅花者，難消。雖翳自熱生，然治法先退熱，而後退翳者，謂熱極生翳，若先去赤熱，則血爲之凝，而翳不能去。其有赤眼與之涼藥過多，又且滌之以水，不反掌而水凝眼特，下團水耳。水性清澄，尤不可規規於點洗，緣其喜怒失節，嗜慾無度，勞役眼力，泣涕過傷，寒風衝目，目目不避烟火，飲啖諸多，此皆患生於臟腑者也。專事點洗，可乎哉？在乎察受病之因，究標本之理，推明運氣以調之，斟酌藥餌以平之，患者又能靜

坐間居澄神息慮節飲食戒色欲專內視簡外觀愛護目力則無有不
安者矣。

○一論暴發眼腫如桃并赤眼痛澀難開者
祛風清熱散

當歸尾

赤芍

芍藥

生地黄

黃連

黃芩

梔子

連翹

薄荷

防風

荆芥

羌活

桔梗

枳殼

白芷

甘草

右剉一劑燈草七根水煎食後服。○腫痛甚加大黃芒硝。○風熱如蔓
荊子牛旁子。○烏珠痛加天麻川烏生用。○犯眼加蒼朮朱砂。○眼生
翳障加白蒺藜。○眼目被人打傷青腫加大黃。○如杖瘡腫痛未破作
增寒壯熱或打重血氣攻心加大黃梔子。○如打撲傷損肉重瘀血不
散加梔子大黃服之立愈。

○一論治眼暴發赤腫臉高苦痛不可忍者
救苦湯

連翹

桔梗

紅花

細辛 各二分

當歸身

夏月減半

甘草

炙各一錢

蒼朮

米泔浸

龍膽草

各一錢四分

羌活

太陽

升麻

陽明

柴胡

少陽

防風

藁本

黃連 各二錢

生地黄

黃柏

黃芩

知母 各三分

川芎 六分

右剉下剉水煎臨臥服

○一洗眼赤眼暴發腫痛不可忍者

黃連

黃柏 各一錢

生白礬 二分

右剉膠聚一枚煎水半鍾洗之立消

○一洗暴發爛弦風眼

用皂莢不拘多少瓦器盛於二伏內晒之至白色須晒十餘日方好

再入黃連末十分之一。每用少許水和棉蘸洗眼立效。

○一治眼暴發腫痛。

用白礬枯過爲末。每用三錢以生薑去皮取自然汁調如膏。抹帛上令病人閉目。將藥貼眼上。燒煙香盡痛即止。用溫水輕輕洗去神效。

○一外治火眼腫痛。

用青礬炒三錢黃土六錢各爲細末。井花水調作二餅子。如眼大先將水洗淨眼。次用餅貼眼上。後用餅子貼帛上。病人仰睡。用水潤餅如乾再潤。二三時即已。

○一治眼暴發赤腫。痛淚隱澁難開。

用大黃末新汲水調塗兩眉正上頭兩腦。水潤之。須臾腫消痛止。

○一治法如前。

用黃連末五錢薄荷二錢半爲末。用雞清和隔帛塗眼上。良久乾則以水潤之。即效。

○一論凡眼疾暴發新久腫痛不可忍者皆緣心家火起所致也并治一切翳障等疾

光明丸 李中山傳

生地黃

白芷

羌活

獨活

甘草

薄荷

防風

荆芥

木賊

甘菊花

草決明

黃連

黃芩

黃柏

大黃

連翹

桔梗各二錢歸尾

川芎各三錢

石十九味爲末煉蜜爲丸如菉豆大每服三五十九白熟水送下清晨晚上各進一服

○一論暴發眼

瀉火升陽湯

黃芪八分

人參七分

甘草五分

柴胡一錢五分

升麻一錢八分當歸三錢

川芎三錢

生地黃三錢

黃芩二錢

梔子二錢

薄荷二錢

菊花二錢

藜蘆二錢

枳實一錢六分 甘枸杞子二錢 龍膽草二錢

右剉下劑用水一鍾酒一鍾煎至一鍾臨臥服渣再用水三鍾煎至一鍾溫服卽愈如未全愈將第三次渣用水二鍾煎至一鍾溫服忌食腥

○一論內障眼得之脾胃元氣虛弱心火與三焦俱盛飲食失節形體勞役不得休息故上爲此症也

冲和養胃湯

黃芪一錢五分 人參一錢

甘草炙一錢 五當歸酒洗一錢

白朮

去蘆一錢

白芍酒炒六分

白茯苓三分

柴胡七分

升麻一錢

葛根一錢

羌活一錢五分 防風五分

黃連七分

黃芩七分

乾薑一分

五味子二分

右剉下劑水煎稍熱服

○一論肝主目肝受熱而不能視血弱則肝氣無以榮養用氣不榮則有

花也。久視艱澁。太腎赤色。此血不足。肝之失養也。迎風有淚。肝之虛也。黑睛上有翳不散。此亦因勞受風。血氣不能行也。宜服此藥。補肝血。滋膽水。益腎氣。大有殊効。

家傳養肝丸

羚羊角

五錢

研生地黄酒浸

熟地黄酒蒸

肉蓯蓉酒洗

甘枸杞子

防風去蘆

草決明炒

菊花

羌活

當歸酒洗

沙苑蒺藜

一兩

炒五錢

羊子肝

小肝葉黃芩乾爲末

右爲細末

煉蜜爲丸

如梧子大。每服五十丸。加至七十九至百丸。早晚

湯下

午茶下。睡臥酒下。不飲酒。人當歸湯下。即補肝重明丸。亦爲甘草

○一論。素虛虛弱。勤勞。眼目昏暗。

當歸

酒洗

一錢

白芍

酒炒

一錢

川芎

一錢

生地黃

二錢

人參

五分

白朮

法蘆

一錢

黃柏

入乳

浸炒

知母

入乳

浸炒

密蒙花 五分

兗蔚子 一錢

龍膽草 酒洗 四分

黃芩 酒炒 七分

右剉一劑水煎服。

○一論病目用涼藥過多以致隱澁難開。

防風 七分

黃芪 一錢

甘草 炙 五分

蔓荊子 三分

當歸 五分

白芷 三分

升麻 七分

柴胡 五分

右剉一劑水煎服。

○一論日晡兩目紫澁不能瞻視此元氣下陷也。

補中益氣湯方見內傷依本方倍參芪。

○一論腎水枯竭神光不足眼目昏暗此壯水之主以制陽光。

壯水明目丸

熟地黃

一兩二錢

山藥

一兩二錢

澤瀉 八錢

山茱萸

酒蒸 取肉 一兩二錢

白茯苓

去皮 一兩二錢

當歸

酒洗 一兩二錢

川芎 三錢

生地黃

五錢

牡丹皮

八錢

蔓荊子

一兩

甘菊花 五錢

黃連

五錢

柴胡三錢

五味子五錢

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五十丸酒送下。

○一論遠年近日爛眩風眼翳障青盲腫痛百病。

點眼仙方 臨川馬休所傳

麝仁

三錢淨去皮將竹葉擦煨

去油方入藥用筆筒捲將藥鋪於上

珍珠

二錢五厘生用綿布包打碎

琥珀二分生用布包打碎研爛

熊膽一分五厘生研

牛黃一分生用

麝香半分生研

片腦一分五厘生研

蜂蜜三錢五分生用溫化攪去渣

右先秤眼藥罐次如蜜秤後入藥攪已上八味和勻點眼。

○一論暴發風熱時行火眼神效

紫金錠 陳省齋秘傳方

川黃連四兩剉粗末將井花水十鍾浸二三日入鍋煎至三鍾去渣

再熬至半鍾下水膠一錢二分溶化調後藥爲錠

銅線五錢

輕粉二錢

官粉三兩

右共爲細末以黃連汁調爲錠陰乾用時以井水磨加熊膽五分冰片二分九釐

一論兩目翳障爛弦風熱眇眼色眼皆治
光明散

蘆甘石上好的用四兩

珍珠四錢

右二味用竹帛包定將銀新紫泥罐作餅包石珠在內爲丸外用熊膽一錢硼砂二錢火硝三錢研末爲衣再用紫泥罐包裹曬乾用炭火煅煉以七根線系於煅煉四炷香用草紙包之紙裏包爲妙又煉根半香以好醋淨之又煉根半香歇火聽用前煉過末藥一錢加熊膽一分火硝一分爲極細末點眼其効如神

一論遠年近日內障青盲雲翳堆睛火眼暴發迎風冷淚怕日羞明肝

腎虛邪等疾點之亦愈能治七十二種眼疾能醫二十年目不通明者
惟有瞳人反背而驚散者不治

仙傳珊瑚紫金膏 薛共述秘傳

白蘆甘石

南方出此名羊脂蘆甘石重一兩七錢五分用灰火銷銀砂鍋內煨

黃丹

商者名國乃漆木飛過三次脂乾細研一兩

海螵蛸

即烏賊魚骨刮者皮中微火炙過細研二錢

乳香

光明者入砂鍋微火煨出烟細研二錢

沒藥

光明者入砂鍋內微火炒去烟細研二錢

白礬砂

明者者二錢細研

麝香揀淨去皮細研五分

青鹽

去泥土細研五分

片腦細研三分

右將前七味各研細研足令一處入乳鉢內再研極細無聲後入麝香
二味再研極勻將蜂蜜用絹袋濾過熬蜜滴水成珠夏老冬嫩春秋酌
老嫩之間用蜜調藥令稀稠得所磁器內封固不可泄氣貼服神效

○一人兩目作痛服降火祛風之藥兩目如針刺熱倦殊甚余用十全大補湯數劑諸症悉退服補中益氣湯兼六味丸而愈復因勞役年後目滿體倦服十全大補而痊

○一人年二十素嗜酒色兩目赤痛或作或止兩尺洪大按之微動余謂少年得此病自當失明整早索途而行不辨天日果肯服重劑余以六味丸料加麥門五味二劑頓明

○一人目赤不明服祛風散熱藥反畏明重聽脈大而虛此因勞心過度飲食失節以補中益氣加扶神散填山藥石菖五味類愈又勞役復眩用十全大補兼以前藥漸愈再用補中益氣湯加前藥而痊

○一儒者日晡兩目昏花不能瞻視此元氣下陷用補中益氣倍加參芪救劑全愈

○一論眼病之後微有上熱白睛紅多眵淚每痒痛而難視此皆寒太過而真氣不能通九竅也故服自昏花不明以益氣湯大參才康如

防風白芷蔓刺子

○一論內障眼得之元氣脾胃虛弱心火與三焦俱盛飲食失節形體勞役不得體息故上爲此症也以益氣湯加白芍茯苓葛根羌活防風黃連黃芩乾薑五味去陳皮

○一論諸般翳障睛努肉內障青盲等症

益府秘傳撥雲龍光散

麤仁

五兩去粗殼取仁用溫水浸去麤皮膜尖心用上好白竹屑包

白朱砂

即好白細砂用溫水浸去麤皮膜尖心用上好白竹屑包

好珍珠

今九分將珍珠雞一隻以鐵入雞肚內過一夜殺雞取珍珠

真熊膽

三分以砂五盛放火上烘去水用二分五厘

硃砂

三四分將硃砂一兩以火煮乾爲末用二分

硃砂二錢五分牛黃二分五厘琥珀五分

水片一分

當門子一分 白丁香一分 海螵蛸水煮過六七次二分

不能_知人_子口內吐_也錢虫_即用_根椿_破開_{河水}洗_剖今_時陰

右精製一處細研任膏點眼。盲者便明。古今天下第一仙方。不可妄傳。匪人秘之秘之。

一治氣血虛損眼目昏暗。此壯水以制陽光。有快服寒藥之過。黑睛全不通路。以十全大補湯加沉香大附子白豆蔻。

東垣謂其能遠視不能近視。火盛而水虧也。法當補腎。六味地黃丸主之。目能近視而不能遠視。有水而無火也。法當補心。定志丸加茯苓主之。又曰不能近視。視晨服地黃丸不能遠視。臥服定志丸。是皆道手足少陰經也是以知不能近視者腎水虧火盛也不能遠視者心血不足也。定志丸。

定志丸

遠志_{去心} 石菖蒲各二兩 人參一兩

白茯苓神三兩

加白茯苓二兩

右爲未煉蜜爲丸朱砂爲衣每服二十丸茶湯下
六味地黃丸方見補益

喉痺

附聲啞 疰腮

脈兩寸脈浮洪而盛者喉痺也。脈微而伏者死。

內經曰：一陰一陽結謂之喉痺。一陰者手少陰君火。心主之脈氣也。一陽者手少陽相火。三焦之脈氣也。一脈並絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹腫脹甚則痺痺甚則不通而死矣。入推原上經准足太陽則下項其餘皆湊于喉嚨然內經獨言一陰一陽經爲喉痺蓋君相二火獨勝則熱正絡故痛者速也。余謂一言可了者火也。故十二經中言盛乾薑痛喉腫頰腫舌本強皆君火爲之也。惟咽喉急速相火所爲也。夫君火者猶人火也。相火者猶龍火也。人火焚木其勢緩龍火焚木其勢速。內經之言喉痺則與咽舌其兩間耳。然其病同於火故不分也。後之

醫者各詳其狀，強立八名，曰單乳蛾、雙乳蛾、子舌脹、木舌、假通、喉閉、定馬、喉閉、氣上行，故轉於喉之兩傍，近外腫作，以其形似足，謂乳蛾。一爲單，一爲雙，其此乳蛾，差小者名喉閉，熱於舌下，復生以小舌子，名曰子舌脹，熱結於舌中，舌爲之腫，名曰木舌脹。木者強而不柔，和也。熱結於咽喉，腫連於外，且麻且痒，腫而大者，名曰纏喉風，惡痺暴發，發於此者，名曰走馬喉風，此八種之名，雖詳若不歸之火，則相去遠矣。其微者，可以鹹麥之而大者，以辛散之。今之醫者，皆有其藥也。如薄荷、射干、鹽、白礬、升、硝、銅、綠之類也。至於走馬喉腫，何特此乎？其生死，死之則耳，其最不誤入者，無如砭針出血，血出則病已。易曰：血去陽出，良以此乎？昔余治一婦人，木舌脹，其舌滿口，諸醫不愈，令以銼針小而銳者，從之，五七度，腫減。三日方平，計出血幾至盈斗。又治一男子，纏喉風腫，表裏皆作，藥不能下。余以涼藥灌於鼻中，下十餘行，外以拔毒散傅之，陽起石燒碎，與伏龍肝等分，細末之，以新水掃百遍。子日熱始退，腫

始消。又當治下貴婦嗟痺，蓋龍火也。雖用涼劑，而不可使冷服，婦龍火宜以火逐之。人火者，烹飪之火是也。乃使曝於烈日之中，登於高堂之上。令待如湯火爐坐，藥銚于上，使藥常極熱，不至太沸，通口時時咽之。百餘次，然火自散。此法以熱行寒，不爲熱而打格故也。太抵治痰痺用針出血，最爲上策。但人畏針，委曲求之，瞬息受命。凡用針而有針創者，宜搗生姜塊調以熟白湯，時時咽之，則創口易合。銅人中亦有灸法，然痛微者可用。病速者，恐遲則殺人，故治嗟痺之人，與救火同，不容少待。內經火鬱發之，發謂發汗。喉咽中竟能有汗，故出血者，乃發汗之下端也。後之君子，毋執小方而曰吾藥不動，臆服又妙於出血者，幸遇小疾而獲効，不幸遇大病而死矣。毋遺後悔可也。

○一切嗟痺危急，死在須臾，牙關緊閉。

病人太指外邊指甲下，根不問男左女右，只用布針針之，令血出即効。如太段危急，兩手太指俱針之，其効尤捷。

○一論治不刺急慢喉痺咽喉腫塞不通。

龍腦破毒散

盆硝 研細四錢

白殭蠶 炒去青黛八分

甘草 生八分

蒲黃 五分

馬勃 三分

片腦 一分

麝香 一分

右各爲細末秤足同研極勻磁盒收貯如有病症每用藥一錢以新汲水少半盞調勻細細噴嚥如是喉痺即破出血便愈如不是喉痺自藥消散若是諸般舌服用藥半錢以新煎藥擦在舌上下嚥津唾如是小兒一錢作四五服亦如前法用並不計時候。

馬勃一名馬左蘭也虛軟如絮紫強之紫灰出狀如狗肺生濕地園中久腐處主惡瘡馬亦傳諸瘡良以爲搽抹以永調呬治喉痺咽喉痛。

○一論咽喉腫痛痰涎壅盛初起或壯盛人上焦有實熱者可服清咽抑火湯。

連翹 一錢五分 片苓 一錢

梔子 一錢

薄荷 七分

防風一錢

桔梗二錢

黃連一錢

黃柏五分

知母一錢

玄參一錢

牛蒡子一錢

大黃一錢

杜硝一錢

甘草五分

右剉一劑水煎頻頻熱服○聞生過楊梅瘡初加防風山奇糧二兩

○一論犀火上升喉痛并喉內生瘡喉閉熱毒最能降火滋陰

滋陰降火湯

當歸一錢

川芎一錢

白芍一錢二分懷熟地黃一錢二分

川黃柏一錢蜜水炒知母生一錢

天花粉一錢

白桔梗去蘆二錢

甘草生三錢加玄參一錢

右剉水煎入竹瀝一盞溫服

○一論喉痺腫痛聲嘶不出飲食不下陰虛相火上炎咳嗽痰喘潮熱虛

勞等症內服此藥外以神仙通隘散吹之甚愈

滋陰清火湯

懷熟地黃一錢

山茱萸

酒蒸去核一錢

白茯苓

去皮一錢

山藥

一錢

牡丹皮一錢

澤瀉一錢

桔梗二錢

去心一錢

玄參一錢

一錢

黃柏

鹽水炒一錢

知母一錢

天門冬

去心一錢

麥門冬

去心一錢

甘草一錢

右剉一劑水煎服外用硼砂一味噙化嚥下降痰消毒如神

○一論咽喉腫痛屬素虛弱者或服涼藥過多而作瀉者皆宜服

清上養中湯

小甘草

桔梗各二錢

玄參

白朮

去蘆

當歸

黃芩各一錢

陳皮

去白

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

麥門冬

去心

連翹各八分

人參

防風

金銀花各五分

右剉水煎食遠類服有痰加貝母

○一論喉痺腫痛不能言語或吐或瀉或不食或四肢冷痺但可進粥無

不愈者此從治之法也

通關散

炙甘草

一錢五

人參

白朮

去蘆

白茯苓

去皮

桔梗

二錢

防風

七分

荊芥

薄荷

各五分

藳蘆

炒

或加大附子

炮各五分

右剉水煎頻頻與服

○一論喉痺雙單乳蛾風腫吐熱不下死在須臾治一切喉痺之總司也

山豆根爲末用龍膽和爲丸用雞脰皮陰乾研末爲衣丸如菉豆大每用下九放香上徐徐嚥下立愈

○一治喉風等症

起死回生散

蜈蚣

三錢

煅存

膽礬

一錢

全蝎

三錢

煅存

僵蚕

去絲嘴

炒一錢

蟬退

性

一錢

煅存

蟾酥

穿山甲

三錢

煅存

乳香

五分

川烏笑一錢

右爲末每服一錢五分或二錢小兒每服一分或六分薑用葱頭搗爛和藥酒送下出汗爲度如口不開灌服忌雞豬羊油麵七日

○一論單蛾雙蛾風喉喉痺腫痛水漿不入死在須臾賓崇周端家試驗
膽礬一錢五分硼砂一錢八分雞內金假過一錢枯白礬二錢
百草霜三錢以衆末黑爲止

右各爲細末用絹羅過用中指盛藥擦上患處父喚令痰去後用薄荷湯漱口如甚將鵝翎削尖刺破用藥按上或用鵝毛蘸醋帶藥刷上滿口刷攪引痰出盡則愈○一方加熊膽五分更効

○一論喉風腫痛幾死雙橋周端家屢驗

茶子

霜梅

醋

右三味研爛去渣將藥汁蘸掃咽喉即時吐痰而愈
○一論喉痺腫痛湯水不下死在須臾用此一吹卽活

牛黃二分

硼砂一錢

雄黃三分

右爲細末，每用一分五厘，吹入喉內。

○一論喉癰腫痛，車左源傳效。

鬱金一錢

雄黃五分

巴豆肉

去壳，四箇二箇半，用二箇，用猪油包好，上燒熟，在喉內。

右爲末，三味攪勻，每用一分二厘，入竹筒內吹患處，小兒用六厘。

○一治喉閉風閉難治者。

猪牙皂角一條，用蜜調和水煎，如急立服，緩則露一宿，尤妙。如倘日緊者，擊開，灌之，須將危者即甦。

○一治喉風危急。

用大黃爲末，竹筒盛之，安青魚膽七箇入末，待乾，研末，聽用。遇患喉癰，吹入鼻中，或喉中，立効。

○一論時氣纏喉，風漸入喉，塞水穀不下，牙關緊急，不省人事，神應散。

雄黃

枯礬

藥蘆生用

牙皂炙黃

右各等分爲細末。每用豆大一粒吹入鼻內。吐痰神效。

○一論喉痺乳蛾咽喉腫痛。湯水不入。死在須臾。

巴豆去壳搗爲末。入細辛末少許。全研勻。捲在指內。中間斷斷如左患塞。右鼻右患塞。左鼻孔中。雙腫左右相替塞之。咽喉立開神效。

○一論喉痺腫痛。水漿不入。死在須臾。扶瀉劉皇涯傳。

先以皂角細辛爲末。擦牙。次用陳鹽松葉。燒灰。霜梅肉。生艾葉。搗爛。全扎於快頭上。蘸喉數次。吐痰盡。即食百沸湯。後用米粥調服。

○一治咽喉腫痛。

百藥煎

硼砂

甘草

生白礬各等分

右四味爲細末。每服一錢。食後米飲調。細細呷嚥。

○一論喉風腫痛。

皂角爲末。醋調塗。外頸上乾。則易。其乳蛾即破而愈。

○一論喉風腫痛不可忍者

霜梅五七箇去核白礬二兩研爛用好醋一碗入藥同煮以礬化為度待溫用快乳綿繳齒上下至喉先繳牙外自外而繳至舌下舌下又繳至舌上繳至喉其痰自湧出痰帶絲者即愈無絲者絲斷不洽

○二論喉痺壅塞不通者

用紅藍花搗繳取汁一小鍾服之以為爲度如冬月無濕花可及乾者濃絞取汁如前服效

○一論咽喉腫痛

吹喉散 周印池傳

牙硝一兩五錢 硼砂五錢

雄黃二錢

冰片二分

殭蠶二錢

右共爲細末每用少許吹喉立效

○一治咽喉腫痛水吞不下

用青蘗白礬硃砂各等分爲末吹患處有痰吐出而愈

○一論咽喉腫痛水漿不入死在須臾

真蟾酥爲末用林頭點入對嘴上即時消散其效速如風

○一論久嗽喉痛

小太平丸

人參二分

五味子三分

天門冬

去心二錢

麥門冬

去心二錢

玄參八分

微墨三分

右爲細末煉蜜爲丸噙化下○痰盛加貝母

○一論勞役過傷忽咽喉腫閉不省人事喘促痰湧汗出如水肢體痿軟脉浮大而數此飲食勞役無根虛火上炎也

補中益氣湯方見內傷依本方加肉桂瑣匙

○一論咽喉腫痛口舌生瘡勞則愈甚此肺肺氣虛勝眊有熱也

補中益氣湯方見內傷依本方加玄參酒炒黃柏知母稍愈去知柏加山

藥山菜羹

○一論咽喉痛服涼藥過多或過勞痛愈甚此中氣虛熱也補中益氣湯方見內傷依本方加炒蒼連

○一論積熱上攻痰涎壅盛喉痺瘡疔腫痛難禁上宮清化丸 內閣秘傳

黃連 去毛

桔梗 去蘆 各六分 山豆根

粉草 各四錢

薄荷葉 一錢

白礪砂 六分

右爲細末煉蜜爲丸如芡實大時常噙化

○一論喉痛有痰聲啞

薄荷 二兩

細茶 一兩

白礪砂 七錢

烏梅肉 二十一箇

貝母 一錢

冰片 三分

孩兒茶 五錢

右爲細末煉蜜爲丸如皂角子大每噙化下

○一論聲啞

甘草

烏梅

桔梗

烏藥

右剉水煎溫服

○一治_{出聲音方}

訶子

_{兩炮去核一}

木香一兩

甘草五錢

右剉水煎入生地黃汁一合再煎_{沸放溫分六服}食後日進半料

○一論聲嘶失音

鐵笛丸

當歸酒洗一兩 懷生地黃一兩 懷熟地黃一兩 天門冬_{去心}炒五

麥門冬

_{去心}炒五錢

黃柏蜜炒一兩 知母五錢

人參三錢

白茯苓

_{去皮}一兩

訶子五錢

阿膠炒五錢

烏梅肉十五箇

人乳一磅

牛乳一磅

甜梨汁一磅

右爲細末煉蜜爲丸如黃豆大每服八九十九訶子湯下羅蘆湯亦可

○一治失音

用梨花新瓦上炒熟懷之隨處細嚼工十粒久久自愈

○一治失音

用生白礬煉蜜爲丸服効

○一治聲啞失音不出

用蜜入猪板油切爛入蜜內重湯煮熟食之

○一論瘰癧腫痛

防風 荆芥

羌活

連翹

牛蒡子

甘草各等分

右剉水煎服外用赤小豆末醋調敷患毒氣入喉諸瘡○一方用右臣不拘多少炒七次地下窖七次醋調塗腫處立愈

○一論治疥癩疣瘡腫痛及吹乳

南薄荷三錢

斑猫去翅足炒三分

右爲末每服一分燒酒調下立消服藥後小便頻數服益元散一服

○一治瘰癧中牛肉以繩裹快頭蘸酒上日六七度易

○一人患喉閉以防風通聖散治之腫不能嚥此症須針之乃可奈牙關已閉遂刺少商穴出血口卽開更以膽礬吹患處吐痰一二碗許仍投前藥乃愈嘗見患此疾者畏針不刺多斃少商穴在手大指內側去爪甲角如韭葉許

○一人喉閉腫痛寒熱脉洪數此少陰心火少陽相火二經爲病其症最惡惟刺患處出血爲上因彼畏針先以涼膈散服之藥從鼻出急乃願刺則牙關已緊不可針遂刺少商二穴以手勒去黑血口卽開仍刺喉間治以前藥及前吹喉散吹之頓愈又以人參敗毒散加芩連玄參牛旁子四劑而平經曰火鬱發之謂發汗出血乃發汗之一端也河間云治喉之火與取火同不容少怠嘗見喉閉不食血喉風不去痰以致不救者多矣每治咽喉腫痛或生瘡毒以荊防敗毒散加芩連重者用防風通聖散

○一男子口舌常破如無皮狀或咽喉作痛服諸涼藥愈甚予以理中湯

劑乃愈。

○一人脚發熱則咽喉作痛，內熱口乾痰涎上壅，此腎經虧損，火不歸經，用補中益氣加麥門五味及加藏八味丸而痊。

○一人患喉痛，日晡益甚，此血氣虛而有熱，用八珍湯而愈。後每入房發熱，頭痛用補中益氣湯加麥門五味及六味丸常服，後不復作。

○一丹溪先生云：咽喉痛屬血虛，用四物加竹瀝，陰虛火上炎者必用玄參氣虛加入參竹瀝。又云：咽喉腫痛有陰虛陽氣飛越痰結在上者，脉必浮大重取必盛，去死爲近，宜參一味濃煎細飲之。如作實症治之，禍如反掌。此發前人所未發，救無窮之天柱。

○一人因怒氣大叫，將下腮脫落，任撻不上。衆視措手，予以烏梅餅餅塞於兩腮，坐牙盡頭，控處張口，流涎須臾，隨手擦上。

補遺

○一治喉痛如生毒物，并車蛾雙蛾喉嚨並治。

巴豆半夏各等分。將此二味用上好醋放小罐子裏煎熟。取巴豆半夏一起研末。用麻布包。做數粒如豆子大。以前醋浸之。取一粒含在喉痛處。至熱又換別粒含之。直至吐瀉而後已。既以稀粥補之。而食忌冷水猪油。

○一利膈生津止渴。消食常用之藥也。

烏梅一兩

蘇州薄荷葉四兩

右為細末。白糖霜四兩。蜜九如茶實大。每用下九噙化。

○一治喉風咽痛。重乳蛾。姜節風傳。

烏梅去核。和空搗在蜈蚣身上陰乾。取燒灰存性為末。點患處立已。

○一治咽喉腫痛生瘡。聲嘶危急之甚。反治虛勞聲嘶喉痛。

神仙通隘散 賈蘭峰秘方。

白礪砂二錢

孩兒茶一錢

蒲黃六分

青黛一錢

牙硝六分

枯礬六分

片腦二分

黃連末五分

白滑石一錢

寒水石一錢

黃柏末五分

右爲末吹喉中立効。

○一治喉中熱毒腫痛喉閉乳蛾等症。

清上丸

熊膽一分

雄黃五分

礞砂一錢

薄荷葉五錢

青鹽五分

膽礬少許

右爲末煉化白沙糖爲丸如芡實大卧時吞壓二丸自化入喉神効。

○一治聲音不出。

真蘇子二兩

訶子三箇

杏仁三十箇

百藥煎二兩

右爲末每服二三錢熱酒調下。

○一要欲好聲音。

用杏仁一升熬去皮尖酥一兩蜜少許爲丸如梧子大空心米湯

送下十五丸。

○一治癰疽

皂角一枚去皮子蘿蔔三個切作片水煎服之不過三服能語聲出

結核

結核者火因痰注而不散鬱結堅硬如果中核也或在頸脇或在手足或在頭顱或在臂在腋如腫毒不紅不痛不作膿不必潰發但令熱氣散則核自消大法宜二陳湯加竹瀝多服爲効

梅核氣者窒碍於咽喉之間略之不出嚥之不下如梅核之狀者是也然因喜怒太過積熱蘊陰而成膈痰鬱結致有斯疾耳治宜導痰開鬱清熱順氣加陳皮半夏川芎香附山梔黃芩枳殼蘇子之類是也如老痰凝結不開以鹹能軟堅之藥海石是也

○一論咽喉結核成塊如核梅者腫硬疼痛四腋下俱有及頸項腫硬不能轉頭

消解散

南星泡

半夏姜炒

陳皮

枳實

桔梗

前胡

柴胡

黃連

連翹

赤芍

防風

獨活

白附子

白芥子

蔓荊子

莪朮

木通

蘇子

甘草

右剉生薑燈草煎服。

○一論不問男婦遍身疥瘡成塊如移不紅不痛皆痰流注而成結核也
醉翁仙酒 方上異人傳

白頭翁一斤去葉用根分作四服每下服四兩用酒煎一日三次服之。二百服盡而已。

○一秘方 治症同前効不可言。

草麻子一斤去殼用肉入放公猪肚內酒煮肚爛爲度取出草麻子晒乾爲末用前爛猪肚拊下下爲丸酒送下。一日服三次。

一論婦人遍身痰核，不紅，不腫，不疼，內消之劑。

陳皮

半夏

白茯苓

當歸

川芎

白芍

枳實

黃連

香附

桔梗

連翹

防己

羌活

龍膽草

柴胡

甘草

右剉生薑三片，水煎服。

○一論結核，渾身手足俱有核，如胡兜者，并治胸中胃脘，至咽喉，皆痰核也。線痰痛者，此風痰氣熱所致也。

開結造瘻湯

陳皮一錢

半夏七分

枳殼一錢

枳實七分

桔梗五分

前胡八分

黃芩一錢

香附童便浸三分

荆芥七分

羌活七分

木香五分

檳榔八分

僵蚕二分

射干七分

威靈仙七分

甘草七分

右劉下劑生薑三片煎服。

○一論痰核氣核疔腮疔瘡及吹乳等症。

內消散 朱賓洞得効。

南薄荷葉三錢

斑猫去翅足炒三分

右爲末每服三分燒酒調下立消服藥後小便頻數服益元散以爲維子清丸如菰豆大每服下丸茶下加至五丸却每日減下丸減至二丸後每日服五丸治癰癰名內消丸。

○一論瘰癧方 庠生分右伯傳

歸尾一兩

赤芍稍一兩

五連翹一兩

藥本七錢五分

細辛八錢

羌活一兩

獨活一兩

防風一兩五錢

荆芥八錢

薄荷一兩

桂枝一兩

赤芍一兩

小川芎六錢

白芷稍一兩

甘草節六錢

右爲末每服三錢食後酒調服。

天花粉三兩

昆布

酒洗八錢 貝母一兩

姜盞 炒一兩五錢

全蝎

酒洗五箇

黃連

炒五錢

土木鱉

去壳十知母一兩

川山甲

土炒一兩

陳皮一兩

青皮炒一兩

歸尾七錢

黃芩

酒炒一兩

連翹

去心一兩

紅花五錢

海藻

酒洗一兩五錢

施子

一兩五錢

蒲公英

二錢

夏枯草

一錢五分

右將前十七味君臣藥分作十劑其蒲公英夏枯草每劑各照數白

水煎臨服時加濃酒一杯同服

○一治癰核金星膏 蘇九寧傳

金星鳳尾草

一兩五錢

實竹葉一兩

葱白三十根

側柏葉

二兩五錢

右用香油一斤浸藥一白用火熬着藥焦黃爲度用細布袋濾去渣仍入鍋熬熟油一斤淨入上好鉛粉三兩用竹攪勻文武火熬看起烟黑色再入鉛粉四兩着四五十下鍋仍用竹攪勻滴水成珠連鍋

放在地上再攪去火毒。

○一治瘰癧核氣核。陳出雲傳

黃芩一錢三分 枳實一錢

連翹一錢 海帶七分

白芥子八分 甘草三分

右剉水煎食後服。

○一治瘰癧核。

用拍子葫丁斤晒乾爲細末每兩末二兩又將天門冬連翹各用
一兩爲末入小布口袋內將白米酒二小瓶煖熱當至二日食後服
服下碗半月內即消。

○一治瘰癧核頸天。戴雷門傳

牛蒡子五分 枳實五分

桔梗八分 黃芩八分

殭蚕五分

連翹八分

防風八分

貝母一錢

蘇子一錢

香附七分

貝母一錢

桔梗七分

海藻洗一錢

金銀花一錢

枯礬一錢

夏枯草八分

右剉一劑。白水煎食後服。

○一治瘰癧。心泉姓傳。

用黃泥作竈。入生白礬四兩。鹿角蛇一條。在竈內陰乾。火煨化為末。每服一分。溫酒調服。立消。

○一治項後側少陽經中疣瘡。不變肉色。不問大小。及日月深淺。或有赤硬腫痛。

生山藥一排去皮

草麻子二箇去壳

右二味研勻。攤帛上貼之。如神。

○一治梅枝氣

加減四七湯

蘇梗

陳皮

厚朴

南星

半夏

茯苓

枳實

青皮

砂仁

益智仁

白芷

神曲炒

檳榔

右生薑煎服。

癭瘤

夫癭瘤者，多因氣血所傷而作斯疾也。太抵人之氣血循環無滯，癭瘤之患如調攝失宜，血凝結皮肉之中，忽然腫起，狀如梅子。久則滋長，癭有五種：曰石、肉、筋、血、氣是也。癭有六種：曰骨、脂、膿、血、石、肉是也。治法癭有二：者，切不可針破。針破則膿潰漏，則殺久。惟脂癭可破，去脂粉，卽爲異。不可輕易爲，余將癭瘤之分于後，醫者宜審辨之，則不悞也。

治癭湯

海藻洗

龍膽草

海蛤粉各二兩通草

昆布燒存性

枯白礬

松蘿各一兩

半夏二兩五錢

麥麴一兩五錢

白芷一兩

壽世保元

已集未卷

七十一

右爲末。每服五錢。酒煎。煎甘草蝦魚猪肉五辛諸藥等物。又要吞蠟丸。
○一論治癰瘤瘰癧。便毒惡瘡。久漏不愈者。
經驗蠟丸

白礬生四兩爲末。黃蠟二兩。溶化。衆手丸。如梧桐子大。每服三十丸。
空心清湯下。

○一論內府秘傳方 治瘰癧

海藻熱水洗淨 昆布洗淨

海帶

海螵蛸

海粉飛過

海螺醋

甘草少許

右如項下搖動者。用長螺頸不搖者。用圓螺。各等分。爲末。煉蜜爲丸。每夜臨臥口中噙化一丸。功效不可言也。

○一論瘰癧神方 兼扶鼠妳痔及瘻肉

用羌花根洗淨。帶濕。不可犯鐵器。須於木石器中搗取汁。用線一條。浸半日。或一宿。以線穿瘰癧。循則落。如未落。再換線。不過三次自落。

後用龍骨、訶子、赤石脂、各等分，為末，敷瘡口，即合。如無根，用元花泡
水浸，雞子乳奶痔，依法用之，無不効。

○一論洗瘡秘方

用桑指草、名金鳳花，一科煎水頻洗。夏用鮮，秋冬春用乾的煎水洗。

○一治癰驗方

沉香

乳香

丁香

木香

藿香 各一錢五

右用臘月，母猪眼子七箇，同藥醇好酒蒸，三炷香露，下但連藥酒乾為
末，煉蜜為丸，如白果大，臨臥嚼化服，一料効。

○一治頭下卒結，欲成癰者

海藻一斤，洗去鹽酒，浸飲之，加昆布等分，為末，煉蜜為丸，如杏核大，
含口中，稍稍嚥下。

○一治癰消塊

神効開結散

沉香

木香各二錢 橘紅 四兩

珍珠

猪壓子肉

四十九秋月解搖者生項

加東二大

4

右爲末每服一錢臨臥酒調徐徐嚥下患小三五服大者下刺愈忌酸鹹油膩滯氣之物須用除自於靜至修合上

肺癰

脉寸口脉數而實者肺癰也其脉短而濇者自瘥浮大者難治

夫肺癰者由寒熱之氣內舍於肺其氣結聚之所成也蓋因調理失宜勞傷與米風寒得以乘之寒生熱風亦生熱蘊積不散遂成肺癰咳而膿漏右脇隱痛二腳腫滿咽乾口燥煩悶多渴時出黃唾腥臭狀如糯米粥者難治有膿而嘔者不可治嘔膿盡而止則自愈若吐黃色膿臭或帶粉紅色者卽肺痿也太抵脉細而沉裏虛而變症矣。

肺腫血腥臭不可聞者肺癰也

黃芪蜜水炒防風

金銀花

忍冬藤

金匱草

牛膝

桔梗各等分

右用鴨一隻，縱死，開破入前七味藥，手鴨肚內用好酒煮，酒盡爲度，去鴨藥渣，晒乾爲末，酒調服，後服消腫湯。

淨服湯

此湯吃鴨後宜服

甘草四兩，剉作太帖，用水煎，頓服，如納不得吐，出之服後，化痰止咳丸。

白礬一兩，枯百草霜一兩

右二味爲末，滴水爲丸，每服三五十九，人參五味子各三錢，煎湯送下，作二日服。

○一論治肺虛

用白鴨一隻，去內臟，用蔥以仁杏仁各二兩入鴨腹中，脩上，煮藥只用鴨肉吃，大能補肺。

○一論肺癰吐膿腥臭

用菹豆以病人口嚼不覺豆之氣味是肺癰也。

○一論肺癰

以薏苡仁略炒爲末糯米飲調服入粥煮吃亦可或水煎服常下膿血而安。

鐸肺丹

凡治肺癰必以此藥間而服之以護膈膜不致潰透心肺故切當即茶蠟丸用蜜水送下方見癰疽

肺痿

肺寸口脈數而虛者肺痿也。

肺痿之候久咳不已汗出過度重亡津液便如爛瓜下如黍肺痿使然而不渴渴者自愈欲飲者欲瘥此由肺多唾涎沫而無津者肺痿也。

一論肺痿咳嗽其証辟辟燥咳胸中隱隱而痛肺弱無方
意以仁散

當歸

白芍

黃芪

人參

五味子

麥門冬

黃芩

桑白皮

百部

黃連仁

右劉生藥煎服

心滿

○一論胸前有孔常出血水者謂心滿也。

鹿子丸

嫩鹿茸

去毛併炙微黃

大附子

炮去皮屑

鹽花各等分

右爲末聚肉爲丸每服三十丸空心好酒送下

○一論腸下生漏瘡如牛眼之狀服水不愈

用鹽少許安白牛乳內然後煎甘草湯以鹽湯上即瘡類小瘡

牛耳不瘡難取其垢其諸漏瘡外用蒜切片放瘡上煎水服之數次灸即愈。

○一論漏瘡血水出不止。

蛇皮

燒灰三錢

五倍子

龍骨各五錢

川續斷五錢

麝香

少許

右為細末用津唾調厚患處立止。