

新編醫學正傳

醫學正傳卷之三目錄

○痢門十七

論 脉法

丹溪方法

凡四十二條

芍藥湯

黃芩芍藥湯

黃連湯

芍藥黃連湯

大黃湯

香連丸 益元散

神効參香散

丹溪活套

祖傳和中飲

經驗三根飲

經驗二防飲

禁口廁法

已試醫驗一條

○嘔吐門十八

論

脈法

丹溪方法

凡十一條

藿香安胃散

和中桔梗湯

木香散

荆黃湯

換榔散

清鎮丸

白朮湯

金花丸

紫沉丸

小半夏湯

姜汁半夏湯

藿香平胃散

胃苓湯

黃連六一湯

丁香安胃湯

丁附治中湯

加味二陳湯

丁香安胃湯

茯苓半夏湯

丹溪活套

已試醫驗一條

○噎膈門十九論

脈法

丹溪方法九十一條

瓜萎實丸

寬中進食丸

人參利膈丸

丹溪活套

祖傳潤腸膏

大力奪命丸

又經驗方

已試醫驗二條

○飽逆門二十論

脈法

丹溪方法九六條

陳皮竹茹湯

橘皮半夏生姜湯

六君子湯

丹溪活法

經驗炙飽逆法

○吞酸門二十一論

脈法

丹溪方法九七條

藿香安胃散

加減二陳湯

三因麵米丸

祖傳治吞酸方

○嘈雜變門二十二論

脈法

丹溪方法九八條

三聖丸

木蓮丸

軟石膏丸

麵米丸

○痞滿門二十三論

脈法

丹溪方法九二條

厚朴溫中湯 木香順氣湯 痘挾瘀血方法 七氣湯

大消痞丸 失咷丸 消痞湯 黃連消痞丸

黃芩利膈丸 丹溪活套 已試醫驗一條

○腫脹門二十四 論 脉法 丹溪方法九八條

禹餘糧丸 紮矩三和湯 紫蘇子湯 木香順氣湯

中滿分消丸 廣葉瀆堅湯 半夏厚朴湯 破滯氣湯

草荳蔻湯 草薢木香散 白朮木香散 草薢膏

二氣散 牵牛丸 三花神祐丸 雞屎體飲

丹溪活套 祖傳雞屎體 又經驗方 經驗桃奴丸

自己試驗二條

○積聚門二十五 論 脉法 丹溪方法九六條

三聖膏 琥珀膏 阿魏丸 大中丸 小溫中丸

婦人腹中有塊訟

一方治婦人血塊

又治婦人血塊如盤

塊在皮裏膜外方

倒倉法已上皆丹溪法

廣木瀆堅湯

半夏厚朴湯

三因散聚湯

大七氣湯

千金硝石丸

局方妙香丸

導氣枳壳丸

木香三稜丸

草荳蔻丸

肥氣丸

伏梁丸

息奔丸

奔豚丸

○虛損門

二十六

論

脉法

丹溪方法一條

老人調養方

四君子湯

四物湯

八物湯

六君子湯

十全大補湯

大補陰丸

補陰丸

加味虎潛丸

滋陰大補丸

補腎丸

補天丸

六味地黃丸

人參固本丸

人參膏

補中益氣湯

益胃升陽湯

濟生芪附湯

參附湯

濟生茯苓湯

補氣湯 千金延壽丹 祖傳心虛手振方 班龍丸

桂枝加龍骨牡蛎湯

已試醫驗二條

○勞極門

三十七

論 脉法

丹溪方法 丸四條

蓮心散

青蒿飲

白蟬塹方法

鬼哭飲子

天靈蓋散

射香散

取虫神仙方

神授散

禁方無比丸

又取勞虫方

紫河車丹

虛勞紫胡散

治勞鱗甲散

貫衆丸

治勞嗽輕骨散

治嗽哈吟散

古今治驗五蒸湯

丹溪活套

灸勞瘵崔氏四花穴法

新編醫學正傳卷之三

花溪恒德老人虞搏天民編集

痢十七

姪孫虞守愚惟明校正

論

內經曰瀉而便膿血知氣行而血止也

愚按經文瀉字下必與一瀉字瀉即屎也

瀉而便血膿者言病因也蓋血因氣滯而大小二便俱不利耳氣行而血止者言治法也故河間闡明其說折謂

和氣則後重自除而用木香換榔枳壳等藥以和之即此意也

河間曰行血則便膿自愈和氣則後重自除又曰後重則宜下腹痛則宜和身重則除溫脉弦則去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以熱藥溫之風邪外束宜汗之驚瘧為痢宜溫之又曰在表者發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表熱者內躁之小便澀者分利之又曰盛者

和之去者送之過者止之兵法云避其來銳擊其惰歸此之謂也夫古方以瀉痢滾同論治朱紫混淆殊不知瀉屬脾而痢屬腎也丹溪曰先水瀉而後膿血者此脾傳腎賊邪難愈先膿血而後水瀉者此腎傳脾微邪易愈是皆先哲之格言以為後學之繩墨醫者其可不詳究乎

脉法

脉經云腸澼下膿血脉沉小流連者生洪大數身熱者死又曰腸澼筋挛脉小細安靜者生浮大而緊者死

方法

丹溪方法九  
二十四條

丹溪曰痢赤屬血自小腸來白屬氣自大腸來

○原病式曰痢為濕熱甚於腸胃怫鬱而成其病皆熱証也俗以痢白為寒誤也如熱生瘡癧而出白膿可以白為寒乎

陰陽水火一高則一下一盛則一衰若以白為寒赤為熱則兼赤白者乃寒熱俱甚於腸胃之間而為病乎况下迫窘痛小便赤澁而痢白者必多有之為熱明矣世有用辛熱藥而愈者蓋辛甘發散熱主出行故病微者則鬱結開通氣和而愈若病甚者鬱結不開其病轉加而死故治痢者必用寒以勝熱苦以燥濕微加辛熱佐之以為發散開通之用如此固無不效者

○仲景治痢可下者悉用承氣等湯加減下之大黃之寒其性善走佐以厚朴之溫善行滯氣緩以甘草之甘飲以湯液灌滌腸胃滋潤輕快積行即止局方用砒丹巴礪類聚成丸其氣充累其体重滯積氣已行而毒氣未消循累賊手持兵刃使之徘徊瞻顧於堂奧之間縱有愈病之功而腸

胃清純之氣寧無損傷之患乎可溫者乃用姜附溫之局方剝用熱藥為主澁藥為佐用之於下利清白者猶可其裏急後重經所謂下迫者皆屬火熱所為加以澁熱之劑非殺而何

○初得一二日間元氣未虛必推瀉之此通因通用之法用大承氣湯或調胃承氣湯下後看氣血調理氣用參术血用四物五日後不可下此亦大槩言之氣血虛者雖一二日亦不可下實者十余日後亦有下之而安者

○腹痛以白芍藥甘草為君當歸白朮為佐惡寒者加桂惡熱者加黃柏

○腹痛因肺金之氣鬱在大腸之間以苦梗發之後用痢藥一云實則可下虛則以苦梗發之

○初下痢腹痛者用溫藥姜桂之屬切不可驟用參术縱氣虛胃虛皆不可用

○後重者積與氣墜下之故兼升薦消尤當和氣木香枳榔丸保和丸之類

○身熱挾外感者不惡寒用小柴胡去人參發熱惡寒身首俱痛此為表証宜微汗和解又蒼朮川芎陳皮芍藥甘草生姜煎服恩每以上二方併而治前之挾外感者亦多獲奇效也

○發熱不止者屬陰虛用寒涼藥必兼溫藥升藥

○大孔痛肛門也因熱流於下也术香枳榔本連加炒乾姜仲景法治孔痛一曰溫之一曰清之若久病身冷自汗脉沉小宜溫之寒病身熱脉洪大宜清之

○下血者宜涼血活血當歸黃芩桃仁之類或用朴硝有風邪

下陷宜升提之蓋風傷肝肝主血故也有濕傷血宜行濕清熱

○湿熱下痢小便澁少煩渴能食脉洪大而緩腹痛後重桂芩甘露飲送下保和丸二三十粒

○湿多熱少脾胃不和食少腹痛後重夜多利下胃苓湯送下

保和丸二三十粒

○氣虛面色痿黃或枯白色人疲倦痢穎併痛後重不食肺細弱或微汗時出黃芪建中湯送下保和丸二三十粒

○湿熱為痢不渴者建中湯加蒼朮茯苓下保和丸

○脾胃不和食少腹脹痛後重脉弦緊平胃散加芍藥官桂葛

根白朮茯苓下保和丸

○下痢血氣大虛腹痛頻併後重不食或產後得此証用四君

子湯加當歸陳皮下保和丸二三十粒

○下痢白積者用芍藥湯加白术陳皮甘草滑石桃仁

○下痢赤積身熱一元散加木通炒芍藥炒陳皮白术煎湯送

下保和丸加黃參丸

○久下前已數日不能起床不食疲弱之甚者用人參半錢

白术

一錢

黃芪

半錢

當歸

七分

芍藥

一錢

炙甘草

三分

木香

三分宿砂

五分

御米殼

醋炒三分

地榆

五分

陳皮

一錢

升麻

三分

白荳蔻

三分

仁

澤鴻

五分

右細切作一服水

一盞半煎至一盞去

粗溫服

○如下墜異常積中有紫黑血而又痛甚者此為死血証用桃仁細研及活石行之

○血痢久不愈者屬陰虛四物為主

○下痢如荳汁者濕也蓋脾胃為水穀之海無物不受常兼四藏故有如五色之相染當先通利此迎而奪之之義如虛宜審之

○古方用厚朴專為行凝滯之氣滯氣稍行則去之枳殼雖少緩亦不宜久服只以陳皮和藥可也

○古多用粟殼治嗽與痢但要先出病根乃收功後藥也  
○如力倦氣少惡食此為挾虛証宜用白朮當歸身尾甚者加入參陳皮補之虛回而痢自止

○如久痢體虛氣弱滑泄不止亦當以遊藥止之訶子肉荳蔻白朮半夏牡蛎之類擇而用之然須以陳皮為佐恐太滻亦能作疼又甚者須灸天樞氣海取穴法見前

○如痢已減十之七八穢積已盡糟粕未實用炒芍藥炒白朮

炙甘草陳皮枳參煎湯下固腸丸二三十粒此丸性燥澁  
有去濕實腸之功若帶氣未尽除者不可遽用

○如痢後糟粕未實或食粥稍多或飢甚方食腹中作疼以白  
术陳皮二味煎湯和之自安

○如氣行血和積少但虛坐努積此爲無血証倍用歸身尾芍  
藥生地黃而以桃仁泥佐之陳皮和之血生自安

○如痢後脚弱漸細小用蒼朮二兩白芍藥龜板各二兩半黃  
柏五兩滑糊丸以四物湯加陳皮甘草煎湯送下

○禁口痢胃口熱甚故也用黃連人參煎湯終日呷之如吐則  
再強飲但得一呷下咽便好又用田螺搗盦臍中以引下  
其熱胃中熱結當開以降之人不知此多用溫藥甘味以  
大濟火以滯益滯也亦有誤服熱毒之藥犯胃者當推明

而祛其毒用糞蛆焙乾為末清米飲調下一錢七甚效

○多有時疫作痢傳染相似宜推明運氣之勝復以治之

○小兒痢疾用黃連黃芩大黃甘草煎服赤痢加桃仁紅花白

痢加滑石末同煎

○一小兒八歲下痢純血作食積治蒼朮白朮黃芩白芍藥滑石茯苓甘草陳皮神曲煎湯下保和丸

○凡下痢純血者如塵腐色者如屋漏水者大孔開如竹筒者唇如珠紅者俱死。如魚腦脢者身熱脉大者俱半死半生經所謂身涼脉細者生身熱脉大者死是亦大槩言之耳不可一途而論也

○一方治熱痢血痢用大黃黃連黃芩黃柏枳殼白芍藥川歸滑石甘草桃仁白朮等分神曲糊丸如梧桐子大每服五

六十九白湯下

○青六丸治血痢神効

○溫六丸治痢及水瀉皆効已上二方並見泄瀉門

○固腸丸治濕熱下痢大便下血去腸胃陳積之後用此以燥  
下濕而實大腸

擣根白皮 不拘多少細切畧炒

右一味研為細末米糊為丸如梧桐子大每服三五十丸  
陳米飲送下或用炒芍藥炒白朮炙甘草陳皮茯苓煎湯

下

○芍藥湯行血則便腹自愈和氣則後重自除此藥是也

白芍藥二錢當歸尾 黃連 黃芩各一錢

大黃七分 甘草 桂榔 木香

桂心各五分

右細切作一服水一盞半煎一盞空心服○如初病後重窘迫甚者倍大黃加芒硝一錢○如痞滿氣不宣通枳實一錢○如藏毒下血加黃柏一錢

○黃芩芍藥湯治瀉痢腹痛或後重身熱久而不愈脉洪數者及膿血稠粘者

黃芩 芍藥各二錢 甘草一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服腹痛甚加桂三分稍熱服之

○黃連湯治大便後下血腹中不痛謂之濕毒下血

黃連 當歸各二錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○芍藥黃連湯治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下血

芍藥

川歸

黃連

各一錢半

大黃

三分

桂心

一分半

甘草

三分

右細切作一服水一大盞煎七分溫服

○大黃湯治痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度脉沉實人不甚困倦者或初得腹痛甚者窘迫不安者

大黃

一兩

右細切作一服用好酒二大盞浸半日煎至一盞半去粗分作二服頓飲之如痢未止再進後服後以芍藥湯和之又再服黃芩芍藥湯以徹其邪此乃瀉滌邪熱之劑用酒煎者蓋欲其上至頂頭外撤皮毛也

○香連丸治下痢膿血赤白相雜裏急後重

黃連

二十兩用吳茱萸十兩  
谷以酒拌熱同炒去茱萸

木香

四兩  
錢不見

右為細末酸調麪糊為丸如梧桐子大每服三十九清

米飲送下○一方加石連肉半斤治噤口痢尤佳

○益元散謂此為治痢之聖藥也其功不能盡述

桂府膩白滑石

六兩

粉甘草

一兩炙

右二味共為極細末每服三錢白水調無時

○神効三杳散治痢疾日久癰積已少腹中不痛或微痛不後重窘迫但滑瀉不止乃收功之後藥也

粟殼

大麥殼帶鬚炙  
一兩二錢

陳皮

一兩三錢

肉荳蔻

錢裹煨四錢

茯苓

去皮  
一兩

白扁豆

炒各四錢

木香

人參各一錢

右為細末每服一錢七清米飲調下食遠

○丹溪活套云痢疾乃外感兼內傷之候也須分表裡治之在

表者必惡寒發熱身首俱痛宜以小柴胡湯去人參棗  
子加蒼朮川芎陳皮生芍藥微汗以散之在裡者必後  
重窘迫腹痛下積早宜以大小承氣河間酒煎大黃湯  
之類下之餘邪未盡更以芍藥湯杳連丸之類以徹其  
邪穢積已盡而更衣未息者此大腸不行收令故也宜  
以固腸丸參香散之類以止澼之禁口者湏詳証按法  
調治切不可輕用粟殼肉豆蔻诃子之類以試之殺人  
於反掌之間也但亢痢証不問輕重若邪氣正盛而以  
粟殼之類止遏之雖不死亦成休息痢二三年不能愈  
也又不可輕用巴豆牽牛等熱毒之藥攻之蓋病因熱  
毒又得熱毒之劑以火濟火不死何待

○祖傳經驗秘方和中飲治痢疾不分赤白久延服之無有不

效 實者但發熱禁口不食者不可服

陳皮 白朮 茯苓 茯藥各一錢

草菓仁 七分 甘草三分 陳蒼米二錢 砂糖三錢

粟殼 酢炙一錢 半烏梅一箇

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水二盞煎至一盞去粗溫服

○經驗三根飲治休息痢年久不愈者其効如神

五倍木根 蒼耳草根 臭櫟木根 刮取白皮

各等分細切每服七錢重加生姜三片大棗一枚大黑豆三十六粒糯米四十九粒水二盞煎至一盞去粗溫服

○經驗二防飲治痢後不謹感冒寒濕或涉水濕霜以致兩足痛痺始力剗虎咬之狀膝腹腫大不能行動名鶴膝風此

藥神効

人參

白术

黃芪各一錢

甘草炙半錢

川歸

川芎

芍藥

熟地黃各一錢

防風

防已

羌活

牛膝各七分

杜仲

姜汁拌炒草薢各一錢

附子

童子采浸三日去皮鹽七分一錢

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水二盞煎至一盞去粗空心濕服溫

○仁齊云下痢噤口不食者雖曰脾虛蓋亦熱氣閉膈心竅間所致也俗用木香則失之溫用山藥則失之閉惟真料參苓白术散加石菖蒲末以道地梗米飲多年陳倉米在溫調下或人參茯苓石蓮子肉入些少菖蒲為末與之胃次一開自然思食其參本白术散本方或有宿砂或小入木香見內傷門

一子年將五十夏秋間得痢疾月餘服藥而少愈繢積已  
但盡糟粕不食晝夜五六次入廁兼脫肛不安又半月諸  
藥不効予記祖傳一方用池塘中鱉一箇如法修事多用  
生姜米精作羹入沙糖一小塊不用鹽醬熟煮吃一二碗  
三日不登廁大腸自此實矣肛門亦收而不脫夫此証蓋  
因脾土受虛致肺與大腸俱失化源之所滋養是故大腸  
不行收令也此母能令子虛耳蟄乃介蟲屬金而有土性  
溫能補肺脾又況肺惡寒先得奉連等寒涼之味已多今  
用生姜之辛以補肺金用沙糖之甘以補脾土肺氣既實  
其大腸亦隨而實故得以行收令也故其功效如是之驗

焉

論 嘘吐十八

內經曰諸嘔吐酸暴注下迫皆屬於火東垣曰夫嘔吐噦三者俱屬於胃胃者樞司也以其氣血多少爲異耳嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲血病也噦者少陽也少陽多氣少血故有聲無物氣病也河間曰胃膈熱甚則爲嘔火氣炎上之象也吐証有三氣積寒也皆從三集論之上焦在胃口上通於天氣主納而不出中焦在中脘上通天氣下通地氣主傷熱水穀下焦在臍下下通地氣主出而不納是故上焦吐者皆從於氣氣者天之陽也其脉浮而洪其証食已即吐渴欲飲水大便燥結氣上衝竅而發痛其治當降氣和中中焦

吐者皆從於積有陰有陽食與氣相假爲積而病其脉浮而長其証或先痛而後吐或先吐而後痛治法當以毒藥去其積候榔木香行其氣下焦吐者皆從於寒地道也其脉沉而遲其証朝食暮吐暮食朝吐小便清利大便秘而不通治法當以毒藥通其秘塞溫其寒氣大便漸通復以中焦藥和之不令大便秘結而自愈也外有傷寒陽明實熱太甚而吐逆者有內傷飲食填塞太陰以致胃氣不得宣通而吐者有胃熱而吐者有胃寒而吐者有久病氣虛胃氣衰甚聞較氣則嘔噦者有脾濕太甚不能運化精微致清痰留飲鬱滯上中二焦時時惡心吐清水者宜各以類推而治之不可執一見也

脉法

脉經曰脈而脉弱小便復利身有微熱厥者難治

趺陽脈浮者胃氣虛寒氣在上噯氣在下二氣相爭但出而不入其人即嘔而不得食恐怖即死寬緩即瘥

脉陽緊陰數其人食已則吐陽浮而數亦爲吐

寸口脉緊而芤緊則爲寒芤則爲虛虛寒相搏脉爲陰結而遲人則噎閏上脉數其人則吐 脉弦者虛也胃氣無餘

朝食暮吐暮食朝吐變爲反胃寒在於上醫反下之令脉反弦故名曰虛

寸口脉微而數微則無氣無氣則榮虛榮虛則血不足血不足則胸中冷故吐

方法

丹溪方法九十一條

丹溪曰胃中有熱膈上有痰二陳湯加炒梔子姜炒黃連生

姜煎服

○凡嘔吐者切不可下逆之故也

○有久病吐者胃氣虛不納穀也生姜人參黃芪白朮香附治之凡痞滿短氣而嘔宜補中氣止可用調中益氣湯

○肝火出胃逆上嘔吐抑青丸方見火門

○夏月嘔吐不止五苓散加姜汁入湯調服

○吐蛔而嘔用黑錫炒成灰枳榔未米飲調服

○惡心吐清水者有熱有痰有虛皆用生姜隨証佐藥治之

○胃中有熱者二陳湯加姜汁制炒黃連黃芩挾虛者加人參白朮又云胃虛弱嘔者二陳湯加砂仁霍香白朮

○痰飲爲患或因多食生冷脾胃不和以致嘔吐惡心或頭眩或胃脘懊憹不快或發寒熱二陳湯加丁香烏梅生姜煎服心下痞而痛者加草豆蔻仁

○ 痰熱惡心嘔吐氣盛者道痰湯加宿砂姜炒黃連竹茹

○ 霍香安胃散治胃氣虛弱不能飲食時時嘔吐惡心者

藿香

八分

陳皮

各一錢

丁香

半錢

右細切作一服水一盞煎至七分溫服

○ 和中桔梗湯治上焦氣熱上衝食已暴吐脈浮而洪宜先和

中桔梗

一錢半

半夏麴

二錢

陳皮

去白

一錢枳實

炒黃色

一錢

白茯苓

一錢半

白术

一錢半

厚朴

姜汁

拌炒

一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗取清汁調木散加

二錢空腹服三服後氣漸下吐漸止然後去木香散加

芍藥二錢黃芩一錢牛煎服病愈則已如大便燥結食

不盡下以大承氣湯去芒硝微下之再服前藥補之如

大便復結又依前微下之

○木香散

木香 桂榔

各等分爲細末前藥調之服

○荆黃湯治暴吐上焦熱氣所衝肺浮而洪者

荆芥穗五錢人參二錢半甘草一錢大黃一錢半

右細切作一服水二盞煎至一盞去粗調梅榔散二錢空

腹服

○梅榔散

梅榔三錢木香一錢半輕粉少許

右爲細末用前藥調服爲丸亦可用水浸蒸餅丸如小豆  
大每服二十丸食後服

○青鎮丸治上焦吐頭痛發熱有汗脉弦

柴胡

二兩去芦

黃芩

七錢半

甘草

五錢半

半夏

五錢

青代人參

二錢半

人參

五錢

右爲細末姜汁浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸生  
姜湯送下食後服

○白木湯治胃中虛損又有痰而吐者

半夏麯

五錢

白朮

二錢

換榔

二錢半

木香

一錢

甘草

一錢

茯苓

二錢

右爲細末每服二錢生姜湯調下食前服

○金花丸治吐食脉弦者肝乘於脾而吐乃由脾胃之虛宜治

風安脾

半夏

煑泡七

甌

二錢

雄黃

一錢半

右爲細末姜汁和蒸餅爲丸如梧桐子大小兒丸如黍米

大生姜湯送下從少至多漸加服之以吐爲度無羈絆於

脾故飲食自下

○紫沉丸治中焦吐食由食積與寒氣相假故吐而痛宜服此

藥

半夏麵

二錢烏梅肉

二錢代赭石

三錢杏仁

去皮尖另研一錢

砂仁

三錢

丁香

二錢

沉香

一錢

旃榔

二錢

木香

一錢

陳皮

五錢

白荳仁

半錢

白朮

一錢

巴荳霜

另研半錢

右爲細末入巴荳霜和勻醋麪糊爲丸如黍米大每服五十丸食後生姜湯下吐愈則止小兒另丸如芝麻大治小兒食積吐食亦大妙

○小半夏湯治陽明傷寒不納穀而嘔吐不已者

半夏湯 七文一兩 生姜二兩

右細切水三盞煎至一盞去粗分作二服服之

○生姜汁半夏湯治胃中似喘不喘似嘔不嘔徹心  
憒憒然無柰者

半夏湯 七文一兩

右細切水一盞半生姜自然汁半盞同煎至一盞溫服仲  
景曰嘔多雖有陽明証慎不可下孫思邈曰嘔家多服生  
姜乃嘔家之聖藥也氣逆者以辛散之故以生姜為主治  
之

○藿香平胃散治內傷飲食填塞太陰嘔吐不已

藿香一錢 厚朴一錢 姜制一錢 荘朮一錢 半陳皮一錢

甘草根三錢 研 神曲半錢炒

右細切作一服加生姜五片大棗一枚水一盞半煎至二  
盞去粗溫服

○胃苓湯治証同前

平胃散加五苓散加姜棗水煎服之

○黃連六一湯治因多食煎燙燒餅熱麪之類以致胃脘當心  
而痛或嘔吐不已漸成反胃

黃連六錢甘草炙一錢

右細切作一服水一大盞煎至七分去粗溫服

○丁附治中湯治胃傷寒冷之物致心腹疼痛而嘔噦不止

人參五分曰木一錢乾姜一錢甘草三分炙

陳皮 青皮 丁香各一錢 附子二錢

右細切作一服加生姜五片大棗一枚水一盞半煎至二

盡去粗溫服

○加味二陳湯治胃中有伏火膈上有稠痰時常胃口作痛及  
惡心吐清水不快

陳皮一錢半

半夏一錢半

茯苓一錢半

甘草炙三分

桔子炒一錢

黃連姜汁拌炒

川芎一錢半

白术一錢

乾姜炒半錢

蒼朮一錢

香附一錢

牡荆子炒另研一

挾虛者加入參一錢

右細切作一服水二盞加生姜三片煎至一盞稍熱服如  
胃口痛甚入生姜自然汁一合和勻服

○丁香安胃湯治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香半錢

吳茱萸一錢

草豆蔻一錢

黃芩二錢

人參一錢

炙甘草半錢

柴胡半錢

升麻

當歸身

陳皮 銘半 黃柏二分 蒼朮一錢

右細切作一服水一大盞煎至七分食前溫服

○茯苓半夏湯治脾胃虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於

脾胃之間當先實其脾土

白术一錢 茯苓一錢 半夏一錢 炒麴一錢

橘紅七分 天麻七分 麥蘖麪炒黃色一錢二分

右細切作一服水一盞半加生姜五片煎至一盞熱服

○丹溪活套云胃中有熱膈中有痰令人時常嘔吐清水作噯氣吞酸等証用二陳湯加姜炒黃連梔子蒼朮川芎香附砂仁神曲山楂少加木香以行滯氣加姜水煎服

○久病虛者加入參白术○胃寒者加益智草豆蔻乾姜桂心之類去黃連梔子又甚者加丁香附子○如脇痛或

脾痛右閟脈弦嘔吐不已此本來土之分也本方加入參白术升麻柴胡青皮芍藥川芎砂仁神曲之類○如時常吐清水或口干不喜食冷涎自下而湧上者此脾熱所致也本方加白术芍藥升麻土炒參連旋子神曲麥芽乾生姜或丸或煎皆可○如時常惡心吐清水心胃作痛得食則暫止飢則甚者此胃中有虫也本方加苦練根史均子煎服即愈或用黑錫灰梅榔末等分米飲調下

在城黃氏婦特年三十產後因食傷致胃虛不納穀四十餘日矣聞穀氣則恶心而嘔聞藥氣亦嘔求予治予曰藥不能入口又將何法以治之乎懇求不已遂制一方用人參白术茯苓各一錢甘草二分陳皮藿香砂仁各伍分炒神曲一錢十年以上陳倉米一合順流水二大盞煎佛泡

伏龍肝研細搗渾放澄清取一盞加姜棗同煎前藥至七分稍冷服此藥遂納而不吐別以陳倉米煎湯時時與之日進前藥二三服漸能吃粥而安後以此法治十數人皆

驗

噎膈十九

論

內經曰三陽結謂之膈子和云三陽者大小腸膀胱也結謂熱結也小腸熱結則血脉燥大腸熱結則不能圊膀胱熱結則津液涸三陽既結則前後閉塞下既不通必反而上行所以噎食不下縱下而復出也此陽火不下降而上行也故經又曰少陽所至爲嘔湧溢食不下此理明矣又先哲論膈噎反謂大率以血夜乾槁其或因候空塞食不能下其槁在吸

門或食下則胃脘當心而痛須臾吐出食出痛止其槁在  
責門此皆上焦之膈噎也其或食物可下良久復出其槁  
在幽門此中焦之膈噎也其或朝食暮吐暮食朝吐其槁  
在蘭門大小腸之間此下焦之膈噎也雖然亦有斯須輕  
病而爲醫所誤者丹溪論之詳矣謂夫氣之初病其端甚  
微或因此少飲食不謹或外冒風雨內傷七情或食味過  
厚偏助陽氣積成膈熱或資稟充實表密無汁或性急易  
怒相火上炎以致津液不行清濁相干惟氣之爲病或痞  
或痛或不思食或噫腐吞酸或嘈雜痞悶醫者不求其本  
便認爲寒遽以辛香燥熱之劑投之時暫得快以爲神方  
厚味仍前不節七情反覆相侵舊病被劫暫開濁液易於  
攢聚或半月或一月前証復作如此延蔓自氣成積自積

成痰此爲痰爲飲爲吞酸之由也良工未遇謬藥又行痰  
挾瘀血遂成窠囊此爲痞爲痛爲嘔吐膈噎反胃之次第  
也整者尤謂虛而積寒非尋常草木可療竟以烏附助佐  
丹劑專意服餌積而久也血液俱耗胃脘乾槁其槁在上  
近咽之下水飲可行食物難入間或可入食亦不多名之  
曰噎其槁在下與胃爲近食雖可下難盡入胃良久復出  
名之曰膈亦曰反胃大便祕小若羊屎然名雖不同病出  
一体又曰噎病生於血乾血陰也陰主靜內外兩靜則藏  
府之火不起而金水二藏有養陰血自生腸胃津液傳化  
合宜何噎之有醫者當知此意不可妄以燥熱之劑以火  
濟火則何以異刺人而殺之也慎之慎之

脉經曰寸緊尺澁其人膏滿不能食而吐吐止者爲下之故不能食誤言未止者此爲反胃故尺爲微澁也

寸口脉緊而芤緊則爲寒芤則爲虛虛寒相搏脉爲陰結而遲其人則噎關上脉數其人則吐脉弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐變於胃反寒在於上鑿反下之令脉

反弦故名曰虛

趺陽脉浮而澁浮則虛澁則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐食朝吐宿穀不化名曰胃反脉緊而澁其病難治脉滑而小血不足脉大而弱氣不足

方法

丹溪方法  
九十一條

丹溪曰大率屬血虛氣虛有痰

戴氏曰氣虛者脉必緩而無力血虛者脉必數而無力  
脉者寸關脉必緩或伏而大有氣滯結者寸關沉而濡

○張維峯曰嘵當是神恩間病惟內觀以自養可安此言深中  
病情

○尿如羊屎者不治大陽無血也年高者不治年五十餘則不可治矣

戴氏曰氣血俱虛者則口中有氣出沫但見沫大出者必死不治

○治法用童便韭汁竹瀝姜汁牛羊乳一本有氣虛入四君子  
駁屎

湯血虛入四物湯切不可用香炒藥宜薄滋味

○一法用黃連三錢姜汁炒山查肉二錢保和丸二錢同爲末糊

丸麻子大胭脂胚子爲衣人參湯入竹瀝下五十九丸

○一方用馬鮑兒即野田瓜燒存性陳米湯調服北方多有本書馬利兒誤也

○一云馬鮑兒燒存性一錢好棗肉四枚平胃散二錢溫酒調

服食即可下然後隨病源調理

○一方用吳茱萸黃連貝母瓜蒌子牛轉草丸服

○一方用韭汁二兩牛乳一盞生姜半兩搗汁和勻頓服効  
○有氣結者用開導之劑有陰火上炎者作陰虛治有積血者  
當消息去之韭汁能下膈止瘀血

○古方用人參以補肺御米以詳毒竹瀝以清痰乾姜以養血  
粟米以實胃薑以潤燥姜以去穢有治寒者必為當時有  
實因於寒者用之也挾寒者間或有之今人悉因痰氣久  
誤於醫傳變而成其無寒也明矣

○瓜萎實丸治膈噎脅痛喘急妨悶

瓜萎實去壳別研枳殼麩炒半夏湯炮桔梗炒各一兩

右爲細末姜汁米糊爲丸如梧桐子大每服五十九生姜

湯送下

○寬中進食丸滋形氣喜飲食方見內傷門

垣東

局方

經效

○人參利膈丸治膈噎宵中不利大便結燥痰嗽喘滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香

枳榔

各七錢半

人參

當歸

藿香

耳草

枳實

一錢

大黃

酒濕蒸熟

厚朴

姜製一兩

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服五十丸溫水下  
○丹溪活套云凡膈噎反胃悉用二陳湯加姜汁竹瀝童便逃  
汁之類爲主治○如宵中覺有熱悶本方加土炒黃連黃  
芩瓜萎仁桔梗之類○如血虛瘦弱之人本方合四物湯  
少加杏仁泥紅花童便逃汁之類仍不可缺○如飲酒人  
本方加砂糖驥屎入內服○如朝食暮吐暮食朝吐或食  
下須臾即吐者此胃可容受而脾不能傳送也或大小腸

驗

秘結不通食返而上奔也本方加酒蒸大黃桃仁之類以潤之脾不磨者本方多加麥蘖麴神曲之類以助化之○如氣虛肥白人膈噎者本方合四君子湯亦加竹瀝姜汁爲要藥也○有因七情鬱結成氣噎者本方加香附撫芎木香桔梗括萎仁砂仁之類○凡膈噎大便燥結用大黃乃急則治其標之劑也仍用四物湯加童便韭汁多飲牛羊乳爲上策也但不可以人乳代之蓋人乳內有飲食烹飪之火及七情之火存於中故不可代服也

○祖傳經秘方潤腸膏治膈噎大便燥結飲食良久復出及朝食暮吐暮食朝吐者其功甚捷

新取威靈仙

四五兩  
五月開花者

生姜

四五兩  
搗汁

真麻油

二兩

白砂蜜

四五兩

內煎沸掠出上沫

右四味同入銀石器內攪勻慢火煎候如錫時時以筋挑食之一料未愈尋服一料決効

○經驗大力奪命丸治膈噎不下食及翻胃等証

杵頭糠

牛轉草

各半斤

糯米一斤

右爲細末取黃母牛口中涎沫爲丸如龍眼大入鍋中慢火煮熟食之加沙糖二三兩入內丸尤佳

○一方治膈膈久不納穀者噎

隔年炊飯乾不拘多少

右一味以急流順水煎者糜爛取濃汁時時與之待能食後以調脾進食生血順氣之藥調治而安

○稻溪金匱九里年五十三夏秋間得噎証胃脘痛食不下或食下良久復出大便燥結人黑瘦殊甚求予治診其脉右

手閨前弦滑而洪閨後畧沉小左三部俱沉弦尺帶芤予  
曰此中氣不足木乘侮土上焦濕熱鬱結成痰下焦血少  
故大便燥結陰火上衝吸門故食不下用四物以生血用  
四君子以補氣用二陳以祛痰三合劑加姜炒黃連炒  
枳實括萎仁少加砂仁又間服閏腸丸或服丹溪墜痰丸  
半年服前藥百餘貼病全安

○梅林駱氏婦予妻嬪也年四十九身材畧瘦小勤於女工得  
膈噫証半年矣飲食絕不進而大便結燥不行者十數日  
小腹隱隱然疼痛求予治診之六脉皆沉伏予以生桃仁  
七箇令細嚼杵生韭汁一盞送下片時許病者云膏中畧  
見寬舒以四物湯六錢加括萎仁一錢桃仁泥半錢酒蒸  
大黃一錢酒紅花一分煎成正藥一盞取新溫羊乳汁一

盞令而服之半日後下宿糞若干明日腹中痛止漸可進稀粥而少安後以四物湯出入加減合羊乳汁服五六十貼而安

十二餽逆

謂書餽與逆通氣上逆作聲之名也古方皆以餽爲欬逆諸皆又多誤以欬聲爲欬逆孫真人又誤

以喘爲欬逆亦有書餌於立切爲吃逆者皆誤也

論

內經曰諸逆衝上皆屬於火丹溪曰餽病氣逆也以其氣自臍下直衝上出於口之名也東垣謂火與元氣不兩立又謂火為元氣之賊古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之未審孰為降火孰為補虛人之陰氣依胃爲養胃土損傷則木來侮之矣謂之吐敗木賊也陰爲火所乘不得內相木挾相火之勢故其氣直衝

清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病者見此似爲危証依正法而治之者尚不能保其一二而况誤醫者乎然亦有因實而爲餽者不可不審或因飲食太過填塞膏中而氣不得升降者或有痰閉於上火起於下而氣不得伸越者有爲傷寒熱病陽明內實過期而失下清氣不得升濁氣不得降以致氣不宣通而發餽者凡若此者皆實証也醫者宜專心致意察審虛實而調治之不可妄爲處治以夭人之天年也幸甚

脉法

脉浮而緩者易治弦急而按之不鼓者難治

脉結或促或微皆可治 脉代者危

右關脉弦者木乘土位難治

方法

丹溪方法

此六條

丹溪曰大率有痰有氣虛有虛火上衝視有餘不足治之

○痰與食在上者吐之人參芦稀涎散之類

○不足者補之人參白朮煎湯下大補丸

○痰用陳皮半夏氣虛用人參白朮陰火用黃連黃柏滑石或  
吐或補隨証施治

○飴逆自利滑石甘草黃柏芍藥人參白朮陳皮加竹瀝服

○痢疾發餽用人參白朮煎湯調益元散頻服自止

○陳皮竹茹湯治傷寒餘熱未解氣虛發餹

甘草炙一錢人參二錢陳皮去白三錢青竹茹四錢

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎服

○橘皮半夏生姜湯治氣虛有痰發餹

陳皮

半夏

乾生姜

人參

通草  
各一

右細切作

一服水一盞半煎至一盞去粗溫服

○六君子湯治痰挾氣虛發餽

陳皮

一錢半

夏一錢半

茯苓一錢半

甘草半錢

半錢

人參

一錢半

白朮一錢半

右細切作

一服加大棗二枚生姜三片新汲水煎服

○丹溪活套云凡傷寒發餽有四証不可不辨有中氣不足脉

重微氣不相續而發餹者

宜用補中益氣湯加生脉散黃

柏以降虛火或少加附子服之立愈有陽明內實失下而

發餹者宜大承氣湯下之而愈有渴而飲水大過成水結

實而又發餹者宜小陷育陽或用小青龍湯去麻黃加附

子治水寒相搏發餹大妙有傳經傷寒熱証醫者誤用姜

桂等熱藥助起火邪痰火相搏而爲咳逆者宜用黃連解毒白虎湯及竹瀝之類治之

○祖傳經驗灸咳逆法

乳根二穴直乳下一寸六分婦人在乳房下起肉處陷中灸七壯即止其効如神

又氣海一穴直脐下一寸半灸三七壯立止

東陽李氏子病傷寒陽明內實醫與補藥治而成發而十日後召予診其脉長而實大與大承氣湯大下之熱退而愈亦止

盤松周氏子得傷寒証七日無退而銳連声不絕本家傍徨召予診其脉六脉皆沉細無力人倦甚以補中益氣湯作大劑加炮附子一錢一日三貼煎與炙乳根氣海三處當日既止脉亦充而平安

內經曰諸嘔吐酸皆屬於熱惟李東垣獨以爲寒誠一偏之見此河間原病式曰酸者肝木之味也由火盛制金不能平木則肝木自甚故爲酸也如飲食熱則易於酸矣是以肝熱則口酸也或言爲寒者但謂傷生冷硬物而喜噫醋吞酸故俗醫主於溫和脾胃豈知人之傷於寒也則爲病熱蓋寒傷皮毛則腠理閉密陽氣怫鬱而爲熱証故傷寒熱在表而以麻黃湯熱藥發散使腠理開通汗泄熱退而愈也凡內傷冷物者或但陰勝陽而爲病寒或寒熱相搏怫鬱而爲病熱亦有內傷冷物而反病熱得汗泄熱退身涼而病愈也或微而止爲中酸俗謂之醋心法宜溫藥散之亦猶傷寒解表之義若久喜酸不已則不宜溫宜以寒藥治之後以涼藥調之結散熱去則氣和矣所以中酸不宜食粘滑油膩者謂能令氣

卷之三  
七言  
驚不通暢如食物在器覆蓋熱而自酸宜食栎食華蔬能令氣之通利也曰寒曰熱於斯明矣學者詳之

脉法

脉弦而滑  兩寸或浮而弦或浮而滑或沉而遲或緊而洪或洪而數或沉而遲有寒飲洪數者痰熱在膈間時吐酸水欲成胃反也

方法

丹溪方法  
凡七條

○茱連丸

吳茱萸去梗湯泡浸半日陳皮去白黃芩陳幹土炒各五錢

黃連土炒一兩 蒼朮米泔浸七錢半

右爲細末神龜糊丸如棗荳大每服二三十丸津潤下  
方茱連二味隨時令寒熱迭爲佐使寒月倍茱萸  
熱月依本方

蒼朮茯苓爲補助湯浸蒸餅爲小丸吞之

○治酸必用茱萸順其性而折之

○食欒有疼二陳湯加南星黃芩之類

○加味平胃散治吞酸因食欒所致

生料平胃散加炒神曲炒麥芽姜棗同煎

○酸味宜節厚味必蔬食自養則病易安

○吐清水用蒼朮

陳歸土

茯苓滑石

炒

白朮陳皮煎服

○參朮丸上可治本酸下可治自利又云治濕而氣滯者濕熱

其者用之爲鄉導

六一散一料吳茱萸

一兩制右爲飯丸服

○藿香安胃散治脾胃虛弱飲食入胃嘔吐作酸不待腐熟

藿香

丁香

人參各半

二錢

陳皮五錢

右爲細末每服二錢加生姜水煎溫服

○加減二陳湯治痰飲爲患嘔吐頭眩心悸或因食生冷硬物

脾胃不和時吐酸水

丁香半錢半夏

陳皮各二錢半

茯苓一錢半

甘草七分半

右細切作一服加生姜三片水煎服

○三因麯木丸治中脫宿食留飲酸摵心痛吐清水

神曲

炒三兩

蒼朮米泔浸少半兩

砂仁一兩

陳皮去白一兩

甘草一兩

右爲細末生姜汁別煮神曲糊爲丸如梧桐子大每服十

十九姜湯送下

○祖傳經驗治吞酸方

用黃連吳茱萸各一兩右以黃連細切同茱萸以井花水

浸七日去連根茱萸焙乾每日清晨以米湯下四十九粒

嘈雜嘔氣二十二

論

內經曰胃爲水穀之海無物不受若夫濕廻魚腥水菓生冷以及烹飪調和粘滑難化等物恣食無節朝傷朝損而成清痰稠飲滯于中宮故謂嘈雜嘔氣吞酸痞滿甚則爲翻胃膈噎即此之由也夫嘈雜之爲証也似飢不飢似痛不痛而有懊憹不自寧之况者是也其証或兼嘔氣或兼痞滿或兼惡心漸至胃脘作痛痰火之爲患也治法以南星半夏橘紅木芍藥之類以健脾行濕壯其本元又當忌口節慾無有不安者也

暮

脉法

右寸閔脉緊而滑  兩寸弦滑膏中有留飲

寸脉橫者腸上有橫積也○右閔弦急甚者木乘土位欲作

胃反難治

方法

丹溪方  
凡八條

丹溪曰此爲食鬱有熱炒梔子姜炒黃連乃必用之藥也

○肥人宜二陳湯少加撫芎蒼朮白朮梔子

○若濕痰氣滯不喜食用三補丸加蒼朮倍香附

○三聖丸治嘈雜神効

白朮四兩  
黃連五錢  
橘紅一兩

右爲細末神麴糊丸如葵莖大每服五十丸津澑下或姜

湯下

○木連丸治嘈雜

白术

四两

黄连

四钱半

右爲細末神麃糊丸如黍米大津潤下

○軟石膏丸治嘔氣嘈雜

南星

炮製

半夏

湯泡

軟石膏

四两

香附

童便浸透

梔子炒

右各等分爲細末粥丸如梧桐子大每服五十丸姜湯下

○燮术丸治中脘有飲則嘈宿食則酸

方是吞酸門

○大抵嘈雜是痰因火動令人心嘈似飢非飢有積有熱也

宜用山梔子黃連姜汁爲君南星半夏陳皮爲臣熟多加  
青代若食薺有熟梔子與姜炒黃連不可無

痞滿

二十三

內經曰脩化之紀其痞名又曰太陰所至爲積飲痞膈夫痞滿之証東垣論之詳矣謂太陰濕土主壅塞乃土來心下爲痞滿也傷寒下之太早亦爲痞滿乃寒傷榮血而然心主邪入於本故爲心下痞仲景以瀉心湯用黃連瀉心下之土邪功效甚速非止傷寒爲然至於酒積雜病下之太過亦作痞滿蓋下多則亡陰也亡陰者謂脾胃水穀之陰亡也故胃中之氣因虛而下陷于心之分野故心下痞宜升胃氣以血藥治之若全用利氣之藥導之則痞尤甚痞甚而復下氣愈不降必變爲中滿鼓脹皆非其治也又有虛實之異如實痞大便秘者厚朴枳實主之虛痞大便利者芍藥陳皮主之如飲食所傷而爲痞滿者宜消導其胃中窒塞之氣上逆冗冗

欲吐者則宜吐之所謂在上者因而越之是也學者宜詳究焉

脉法

脉經曰痞脉浮堅而下之緊反入裏因作痞

脉濡弱弱反在閑濡反在頭微反在上澁反在下微則陽氣不足澁則無血陽氣反微中風汗出而燥煩澁則無血厥而且寒陽微不可下下則心下痞堅

右閑脉多弦弦而遲者必心下堅

於肺木杜脾土鬱結泛閑

方法

丹溪方法此二條

丹溪曰痞滿與脹滿不同脹滿內脹而外亦形痞則內竟痞悶而外無脹急之刑也蓋由陰伏陽畜氣血不運而成位腹心下之中脹滿痞塞皆土邪之所爲耳有因誤下裏氣虛

邪乘虛而入於心之分野有因食痰積不能施行而作痞者有濕熱太甚土來心下而爲痞者

○用黃連黃芩枳實之苦以泄之厚朴生姜半夏之辛以散之  
人參白朮之甘溫以補之茯苓澤瀉之鹹淡以滲之大槩與濕同治使上下分消可也

○厚朴溫中湯治脾胃虛弱心腹脹滿疼痛時發時止

厚朴

姜汁片

陳皮

去白各一錢

茯苓

草豆蔻

甘草

木香

各半錢

乾生姜

一錢右細切水煎服

○木香順氣湯治腹脹心腹滿悶

木香

益智

陳皮

蒼朮

草豆蔻

各半錢

厚朴

姜製青皮各四錢

茯苓

澤瀉

半夏

各六分

乾生姜

茱萸

各三分

當歸

人參

各五分

升麻

柴胡各一錢

右細切作一服水一盞半煎至一盞溫服

○痞有痰挾血成窠囊者用桃仁紅花香附大黃之類治之

○七氣湯治七情所傷憂思鬱結府藏氣不和平心腹疼痛

半夏

茯苓

各二錢

厚朴

姜制半錢半

紫蘇葉

一錢

○大消痞丸治一切心下痞及年久不愈者

乾生姜

神曲炒

甘草

炙各二錢

朱苓

貳錢半

澤鴻

厚朴

姜汁拌炒各參錢

砂仁

各參錢

半夏

湯泡七次去皮臍

陳皮

去白

人參

錢各四錢

枳實

五錢去穰炒

黃連

陳皮土炒

黃芩

如連制各二錢

姜黃

白朮各一兩

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸至百

九空心白湯下

東垣

食

乾生姜

一錢  
甘草  
炙

麥蘖麪  
炒

白茯苓

白术

各二錢

半夏  
麵

人參各三錢

厚朴  
姜制四錢

枳實

炒黃  
黃連各五錢

右爲細末蒸餅丸如梧桐子大每服七八十九白湯下

○消痞湯

一名木香  
化滌湯

治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞

滿不思飲食

川歸

枳實

炒各四分

陳皮

生姜

木香各六分

柴胡

七分

甘草  
炙

草蔻  
蔻

各一錢  
麪包煨

半夏  
半

一錢  
紅花一分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞溫服

○黃連消痞丸治心下痞滿壅滯不散煩熱喘促不安

澤瀉各一錢乾生姜二錢甘草炙

茯苓

白朮各三錢陳皮五錢

朱苓去黑皮五錢

枳實炒黃色七錢

半夏湯泡七錢黃連一兩

黃芩二兩炒

右爲細末蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯下

○黃芩利膈丸除胃中熱利膈上痰

生黃芩

炒黃芩各一兩半夏

黃連各五錢

澤瀉三錢

枳殼炒去穰

陳皮去白各三錢

白朮二錢白朮一錢今加蘿蔔子五錢炒

小皂角一錢

右爲細末湯漫蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸白湯  
下忌酒濕麪魚腥

○丹溪活套云凡心下痞滿須用枳實黃連○如肥人心下痞  
內有濕飲宜蒼朮半夏硝砂茯苓滑石之類○如瘦人心  
下痞乃轉熱在上焦宜枳實黃連以導之葛根升麻以發  
之○如人飲食後因胃風寒飲食不消而作痞滿宜吳茱  
萸硝砂藿香草蔻蔻之類溫以化之○如脾氣虛弱轉運  
不調飲食不化而作痞者宜白朮山楂神曲麥芽之類以  
消之○又曰痞滿之証不一有傷寒下早而作痞者枳殼  
桔梗湯卜陷腎陽之類○有因飲食填塞胃中而作痞者  
保和丸東垣枳實導滯丸木香化滯湯之類○傷寒下多  
則亡陰而痞者四物湯加參芩白朮升麻柴胡少佐以陳

除

皮枳殼之類鹽之○或大病後元氣未復而胃滿氣滯者  
補中益氣湯陳皮枳朮丸香枳朮丸之類○夫痞滿之  
証不可執一全在活法詳脉証虛實而調之可也

山頭沈三十一年三十餘身材壯盛夏秋間因官差丈量  
田地辛苦至冬間得痞滿証兩脇氣攻胃中飽悶不能卧  
欲成脹滿証歷數醫者皆與鍼氣耗散之藥皆不効十一  
月初旬召予診治兩手閔前皆浮洪而弦滿兩閔後脉皆  
沉伏予曰此膈上有稠痰脾土之氣敦阜肝木鬱而不伸  
當用吐法木鬱達之之理也柰何值冬月降沉之令未可  
行此法且先與豁痰疎肝氣瀉脾胃敦阜之氣用平胃散  
加半夏茯苓青皮川芎草龍胆香附砂仁柴胡黃連瓜萎  
子等藥病退之十有三四待次年二月初旬爲行倒倉法

平安

腫脹二十四

論

內經曰諸濕腫滿皆屬於脾又曰諸腹脹大皆屬於熱夫脾虛不能制水水漬妄行故通身面目手足皆浮而腫名曰水腫或腹大如鼓而面目四肢不腫者名曰脹滿又名鼓脹皆脾土濕熱爲病腫輕而脹重也丹溪曰心肺陽也君上腎肝陰也居下脾居中亦陰也屬土經曰飲食入胃游溢精氣上升於脾脾氣散精上歸於肺通調水道下輸膀胱水精四布五經並行是脾具坤靜之德而有乾健之運故能使心肺之降腎肝之陰升而成天地交之泰是爲平人令也七情內傷六淫外侵飲食不節房勞致虛脾土之陰受傷轉輸之官失

居

陽

職胃雖受穀不能運化故陽自升陰自降而於天地不交之  
隧否清濁相混遂道壅塞濕鬱爲熱熱又生濕濕熱相生遂成  
脹滿經曰鼓脹是也以其外雖堅滿中空無物有似於鼓膠  
固難治又名蠱者若更侵蝕有蠱之義理宜補脾又須養肺  
以制木使脾無賊邪之憲滋腎以制火使肺得清化之令卻  
益味以防助邪斷妄想以保母氣遠音樂戒暴怒無有不安  
醫者不察急於獲効病者苦於脹滿喜行利藥以求通快殊  
不知寬得一日二日復脹愈甚真氣已傷去死不遠矣俗謂  
氣無補法者以其痞滿壅塞似難於補不思正氣虛而不能  
運行邪滯着而出所以爲病經曰壯者氣行則愈怯者著  
而成病氣虛不補邪何由退病何由安且此病之起固非一  
年狼深帶固欲取速効自求禍耳。王道者可與語此其或

受病之淺脾胃尚壯積滯不固者惟可畧與鍊導而不可峻  
與利藥也

愚按先生此論詳明殆盡誠千古不易之定義也及視東垣脈滿論又以藏寒生滿病立說引脉經胃中寒則張滿之語以爲之証愚恐南北風土寒熱不同難以一途而論雖然愚嘗按丹溪法活人多矣是以東垣之論不與附合故不敢採其言以爲後人之惑也

### 脉法

鍼經曰其脉大堅以濶者張也

脉經曰閔上脉壅則內張

遲而滑者張

脉盛而緊者張

虛而緊濶者張

或弦而遲或浮而數皆張也

丹溪曰水腫脉多沉伏病陽水兼陽証脉必沉數○病陰水兼陰証脉必沉遲○煩滿小便亦澁大便秘結此爲陽水

不煩滿大便溏小便少而不赤澁此爲陰水

脉沉而滑爲風水

脉浮而遲弦而緊皆爲腫也

生

水病腹大如鼓脉實者虛者死洪大者生微細者死

腹脹便血脉大特絕剝脉小疾者死

中惡腹大四肢滿脉大而緩者生浮而緊者死

緊而柴衡俱絕面浮腫者死

唇腫齒焦者死

卒唇腫而苔黑者死

掌腫無紋者死

臍腫凸出者死

缺盆平者死

陰囊莖俱腫者死

脉絕口張足腫者死

足趺腫膝如斗者死

方法

丹溪方法

丹溪曰古方惟禹餘粮丸制肝補脾殊爲切當然亦須隨時

隨証加減一友人得脹疾自制此藥服之予曰溫熱藥多且煅煉之火尚存宜自加減彼不聽服之一月口鼻出血骨立而死

○朝寬暮急血虛暮寬朝急氣虛朝暮急氣血俱虛

○治腫脹大法宜補中行濕利小便以人參白朮爲君蒼朮陳皮茯苓爲臣黃芩麥門冬爲使以制肝木少加厚朴以消腹脹氣不運加木香木通氣下陷加升麻柴胡提之血虛加補血藥參威加利灰藥隨証加減用之無不効者

○盧氏醫鏡以水腫隸於腎肝脾而不及肺又肺金盛而生水水溢妄行豈理也哉夫肺上受病肺爲之子固不能自盛而生水然肺金氣清而能生水則滋長腎陰奉行降令爲生化之源何病腫之有今爲腫之水乃屬濁之氣滲透經

亦絡流注谿谷灌入繚道血赤因之而化水欲藉脾土以制  
之道腎氣以利之殊不知脾病則金氣衰木寡於畏而來  
侮土脾欲不病不可得矣治法宜清心經之火補養脾土  
全運化之職肺氣下降滲道開通其精之之清者復固而  
爲氣爲血爲津液敗濁者在上爲汗在下而爲溺以漸而  
分消矣

○腰已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便此仲景之法  
○東垣曰宜以辛散之以苦瀉之以淡滲利之使上下分消其  
濕正所謂開鬼門瀉淨府開鬼門者謂發汗也瀉淨府者  
利小便也

○產後浮腫必大補氣血少佐以蒼朮茯苓使水自降大劑白  
素木補脾壅滿者用半夏陳皮香附紫之有熱當清肺金麥  
藍

門冬黃芩之屬

○熱水腫用山梔子仁炒爲末米飲調下三五錢若胃脘熱病  
在上者連葛用

○禹餘糧丸治中滿氣脹喘滿及水氣脹

蛇含石

三兩

針砂

五兩

禹餘糧

三兩同針砂炒

已上三味爲主其次量入更實入下項藥

木香

牛膝

蓬莪术

白蒺藜

桂心

川芎

茴香

白芷仁

三棱

羌活

茯苓

乾姜

青皮

陳皮

附子

炮

當歸

各五錢

右爲末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸空心溫

酒下

○絜矩三和湯

陳皮

去白分

柴蘇

甘草

炙各七分

厚朴

姜、製

枳榔

白朮各一錢

海金沙

四分

木通

二分

右細切作一服加生姜三片水煎服

○濟生紫蘇湯專治憂憲過度致傷肺脾心腹脹滿喘促治腸

鳴氣走瀉有聲大小便不利脉虛而累滿

紫蘇子

一錢研

白朮

二錢

人參一錢

大腹皮

酒洗淨

草茱仁

半夏

厚朴

木香

陳皮

枳殼

麸炒黃色

甘草

炙各五分

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水煎溫服

○木香順氣湯治濁氣在上則生脹脹

木香三分

厚朴

四分

青皮

陳皮

益智

茯苓

澤瀉

乾生姜

半夏各一錢分

吳茱萸

湯泡二分

川歸五分

升麻

柴胡各一分

草豆蔻

三分

蒼术五分

白术

一錢

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服

○中滿分消丸治中滿鼓脹氣脹水脹熱服

黃芩

大者細切酒拌  
二次七錢半  
小者五錢

黃連

枳實

翹炒黃色

半夏

水泡七錢去皮  
各二錢半

姜黃

白术

人參

各二錢半

甘草

炙各一錢

朱苓去黑皮  
各一錢

乾生姜

白茯苓

砂仁各二錢半

厚朴

姜制五錢

知母

去毛酒炒

澤瀉

陳皮去白各三錢

右爲細末蒸餅糬丸如梧桐子大每服百丸焙熟白湯飲  
淡姜湯下

○廣藥潰堅湯治中滿腹脹內有積塊堅硬如石令人坐卧不寧二便澁滯上氣喘促或通身虛腫

厚朴

姜制

黃芩

黃連

益智

草豆蔻

當歸

各五分

半夏

七分

薦菜

升麻

紅花

吳茱萸

各二分

生甘草

柴胡

澤鴻

神曲炒

青皮

陳皮

各三分

湯加乾葛

四分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎七分溫服食後忌酒醋濕過二服之後中滿減半止有積塊未消再服後藥○半夏厚朴湯

紅花

蘇木

各半分

木香

青皮

各二分

吳茱萸

乾生姜

黃連

各一分

肉桂

蒼朮

白茯苓

澤鴻

柴胡

各一分

陳皮

生黃芩

草豆蔻

生甘草

各三分

京三棱

當歸梢

朱苓

升麻

各四分

神曲炒六分

厚朴

姜制八分

半夏

湯泡錢

桃仁

七箇去皮尖研如泥

昆布

如渴加乾姜

三分

右細切作一服水三盞煎至一盞稍熱服服此藥二貼之後前証又減一半却於前藥中減服之加

○破滯氣湯一呂木香化滯散破滯氣心腹滿悶治

甘草

炙一分

白檀香

藿香

陳皮

大腹子

白荳蔻

白茯苓

桔梗

砂仁

人參

青皮

枳榔

木香

姜黃

白朮

各四分

右細切作一服水一盞半煎至一盞去粗溫服不拘時候

○草荳蔻湯治腹中虛脹

澤瀉

一分木香三分神曲四分半夏泡

枳實

炒草荳蔻

黃芪

秦夏不用益智

甘草

各五分青皮

陳皮

各五分陸

茯苓

當帰各七分

右細切作一服加生姜三片水二大盞煎至一盞溫服冬月加黃芪五七分春夏止服正藥食遠

○草荳蔻散治濕熱內外甚水腫腹脹小便赤澁大便滑泄此藥下水濕消腫脹止瀉利小便之藥聖也

草荳蔻

茯苓

去皮

朱苓

去皮

白朮

各二錢半

木香

半錢

澤瀉

木通

甘草

各五錢

辣桂

二錢半

白滑石

三兩

右爲細末每服三錢白湯調下食前服

○白术木香散治喘嗽壅滿欲變成水病者不能卧不敢多食  
小便閉而不通者

白术

木猪苓

去皮

甘草

澤鴻

木通

赤茯苓

各五分

木香

旋榔

各三分

陳皮

去白二錢

官桂

滑石

二錢

○右細切作一服加生姜三片水一盞半煎至一盞溫服  
二氣散治水氣蠱脹滿悶

白丑

黑丑

各二錢

右爲細末外用大麥麪四兩同一處拌勻做燒餅臨卧用  
茶清一盞下降氣爲驗

○牽牛丸治一切濕熱腫滿等証

黑丑

黃芩

大黃

桃仁

滑石

各等分

右爲細末酒煮麪糊爲丸如梧桐子大每服五丸至七丸  
生姜湯下食後服看虛實加減丸數

○三花神祐丸治中滿腹脹喘嗽淋悶一切水濕腫滿濕熱腸  
垢陳積變生諸疾久病不已黃瘦困倦氣血壅滯不得宣  
通或風熱燥癥肢體麻痺走注疼痛風痰涎嗽頭目眩運  
癆疾不已癰瘕積聚堅滿痞悶酒積食積一切瘀飲嘔逆  
及婦人經病不快帶下淋瀝無問赤白併男婦傷寒濕熱  
腹滿實痛久新瘦弱俗不能辨兼瀉新舊腰痛併一切下  
痢及小兒驚脾積熱乳癖腹滿並宜服之

甘遂

大戟

芫花

醋拌濕炒各五錢

黑丑

二兩取頭  
末一兩淨

大黃

一兩

輕粉

一錢另包不研

右爲細末同輕粉拌勻滴水爲丸如小豆大勿服五丸每服五丸溫水下日三服加至快利爲度利後却又常服病去乃止設病愈後惟老弱久病虛人勿服平人常服保養宣通氣血消進飲食病痞悶極甚者便多服則頓攻不開轉加痛悶宜初服二丸每服加二丸至快利爲度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱大小增減丸數三四歲者三四丸依前法服

河間

○宣明雞屎醴飲

詞出素問  
腹中論

治鼓脹旦食則不能暮食痞滿壅

塞難當

大黃

桃仁

去皮

乾雞屎

右各等分爲細末每服二錢水一盞生姜三片煎湯調下食遠臨卧服

○丹溪活套云凡腹脹須用姜制厚朴肥人腹脹必用利濕蒼  
术茯苓滑石海金沙之類○色白人腹脹必是氣虛用人  
參白术白茯苓之類○瘦人腹脹是熱必用黃連黃芩梔  
子厚朴之類○如因有故蓄血而腹脹者用桃仁紅花甚  
者用抵當湯丸之類○如因食積而腹脹者保和丸加木  
香梔榔阿魏之類○有熱鬱而脹者木香梔榔丸之類下  
之○有寒積鬱結而脹者局方丁香脾積丸東垣三棱消  
積丸之類○如因外寒鬱內熱而腹脹者用藿香官桂升  
麻葛根之類○如因多怒鬱氣而脹者宜用蒼朮梔弓香  
附青皮芍藥柴胡及龍鬚丸之類○凡腹脹初得是氣脹  
宜行氣疎導之劑木香梔榔枳殼青皮陳皮厚朴之類○  
久則成水脹宜行濕利水之劑

○祖傳經驗雞屎醴治鼓脹氣脹水脹等証

羯雞屎

一升

右一味研細炒焦色地上出火毒再研極細百沸湯三升  
淋汁每服一大盞調木香枳榔末各一錢日三服空腹服  
以平爲期

○文經驗方治腫脹或通身水腫或腹大堅滿

三棱

莪术

各用  
醋炒

陳皮

去白  
青皮

砂仁

羌活

防已

澤鴻

連翹

枳榔

各三錢

甘遂

二錢  
半

木香

乾漆

炒烟盡各一錢

白丑

黑丑  
各二錢  
頭末九錢

大黃

八錢  
双頭連三錢

右研爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服三錢重空心溫  
酒送下以利爲度病退即止藥忌甘草菘菜鹽醬  
酒送下以利爲度病退即止藥忌甘草菘菜鹽醬

○又經驗桃奴丸治婦人或室女月經不通漸成脹滿及男子

墜馬跌撲損傷以致瘀血停積成血蠱病皆能治之

桃奴

桃對上乾朽樹也十二月收用

假鼠糞

丙頭尖者是雄鼠糞也

玄胡索

肉桂

香附子

五靈脂

砂仁

桃仁

去皮尖各等分

右爲末每服三錢溫酒調下

○予族八一兄素能飲酒年五十得腫脹病通身水腫腹脹尤甚小便澀而不利大便滑泄召予治予曰若戒酒色鹽醬此病可保無危不然去生漸遠兄曰自今日戒起予以丹溪之法而以參术為君加利水道制肝木清肺金等藥十貼而小水長大便實腫退而安又半月有二從弟平日同飲酒者曰天民弟素不飲酒山中之鹿耳我與兄水中之

魚也鹿可無水魚亦可無水乎三人遂痛飲沉醉而止次日病作甚於前後來求治予曰不可爲矣挨過一月而逝○梅林妻姪孫駱智二得腫脹証亦令戒前四事用前法服藥四五十貼而愈頗安五年一日嘗曰人不吃鹽腎與姪何異遂開鹽十數日後舊病大作再來求治不許又告欲行倒倉法予曰脾虛之甚此法不可行於今日也踰月膨脹而死予用丹溪之法治腫脹愈者多矣不能盡述特書此二人不守禁忌者以爲後人病此者之戒云

積聚

二十五

論

內經曰積聚留飲痞膈中滿濕積霍亂吐下癥瘕堅硬腹滿皆大陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也難經曰積者陰氣也

聚者陽氣也故陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五藏所生聚者六腑所成也夫所謂積者陰氣也其始後有常處其病不離其部上下有所終始左右有所窮處謂聚者陽氣也其始終無根本其病或隱或見上下無所留止痛發無所定位是故肝之積名曰肥氣在右脇下如覆杯有頭足久不愈令人發欬逆咳瘡連歲不已心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心脾之積名曰痞氣在胃脘右側覆大如盤久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不爲飢膚肺之積名曰息奔在右脇下大如覆杯久不愈令人洒淅寒熱喘咳發肺壅腎之積名奔豚在小腹上至心下若豚狀或下或上無時久不愈令人喘逆骨痿少氣東垣曰鍼經云其成積者蓋厥氣生足慾足慾生

氣

經寒、腔寒則血脉凝澁。故寒上入腸胃所以腹脹。脹則腸外之汁沫迫聚而不得散。日以成積矣。或盛食多飲則脉傷。若起居不節用力過度則陽絡脉傷。陽絡脉傷則血外溢。血外溢則虧血。陰絡脉傷則血內溢。血內溢則便血。腸胃之絡脉傷則血溢於腸外。腸外有寒汁沫與血相搏則氣聚而成積矣。或外中於寒。內傷於憂怒則氣上逆。氣逆則六腑不通。溫氣不行。凝血蘊聚不散。津液凝澁滲着不去而成積矣。又曰生於陰者蓋憂思傷心重寒傷肺。忿怒傷肝。醉以入房。汗出當風則傷脾。用力過度入浴則傷腎。此內外三部之所生病也。故難經中說五積各有其名。如肝積曰肥。氣在左脇下如杯而脰左有動氣。按之牢若痛者是無是非也。餘積皆然。治者當察其所痛以知其應有餘不足可補則補可瀉則瀉。

母逆天時詳藏府之高下如寒者熱之結者散之客者除之  
留者行之堅者削之按之摩之誠以輕之苦以瀉之全其真  
氣而補益之隨其所利而行之節飲食慎起居和其中外可  
使必已不然徒以大毒之劑攻之積不能除反傷正氣終難  
復也可不慎與

耗<sup>1</sup>

脉法

脉經曰脉來細而附骨者積也在寸口積在膏中微出寸口  
積在喉中在關上積在臍傍上關上積在心下微下關積  
腹 在小腸尺微積在氣衝脉出在右積在右脉出在左積在  
左脉兩出積在中央各以其部處之也

脉來小沉而實者脾胃中有積聚不下食食則吐

肺積脉浮而毛按之辟易 心積脉沉而芤上下無常處

肝積脉弦而細

腎積脉沉而急

脉沉重而中散者因寒食成積

脉左轉而沉重者氣癥積在胃中

脉右轉出不至寸口者內有肉癥也

方法

丹溪方法  
凡六條

丹溪曰塊乃有形之物氣不能成形痰與食積死血也在中爲痰飲在右爲食積在左爲死血大法鹹以軟之堅以削之行氣開痰爲主

○治積塊方用海石三棱莪术香附已上俱用醋煮桃仁紅花五靈脂之類爲丸石釀白术湯下

○黃蜀葵根煎湯入人參白术青皮陳皮甘草稍牛膝煎成膏入細研桃仁玄明粉各少許熱飲之二服當見塊下病重

者補接之後加減再行。

○石釀去痰積食積洗滌垢膩有功

○瓦壘子能消血塊次消痰

瓦壘子即瓦壘也。靈尚書移萬葉南改耕名瓦壘子以其壳上有棘刺如瓦屋故名之耳。出嶺表異錄。

○積塊不可專用下藥徒損其氣病亦不去當消導使之鎔化

其死血塊去湏大補

○三聖膏貼積塊

用未化石灰半斤為末瓦上炒微紅提出候熱稍減入大黃末一兩炒熟仍提出入桂心末五錢畧炒以米醋熬成膏摩搘烘熱貼之

○曉珀膏 用大黃朴硝各一兩爲末以大蒜搗膏貼之

○阿魏九治肉積成塊

阿魏

山楂

各壹兩

連翹

五錢

黃連

六錢半

右以下三味為細末以阿魏用米醋煮糊為丸如梧桐子大每服五十九脾胃虛者以白朮三錢陳皮茯苓各一錢煎湯送下○一方加半夏一兩以皂角同煮透而乾用石薦三錢○

又一方以醋煮神麪糊為丸無連翹○又一方既兼諸方

而又有瓜萎貝母南星風化硝胡黃連萊菔子麥蘖麪姜汁浸蒸餅為丸治諸般積聚用者更宜詳之

○大溫中丸○小溫中丸俱以食積成痞塊面色淒黃肌膚虛腫飲食無味等証二方俱見黃疸門

○凡婦人腹中有塊多屬死血

○一方治婦人死血食積痰飲成塊在兩脇動作雷鳴嘈雜眩

運身熱時作時止

治

黃連一兩半

半以吳茱萸半兩同炒去茱萸

茱萸子半沙

半以益智牛兩同炒去益智

莪朶醋煮

麥麯去皮大半五錢

香附童便浸

山楂各一兩

右爲細末蒸餅為丸如梧桐子大

服五十丸姜湯下

○一方治婦人血塊如盤有孕難服峻藥

香附四兩醋煮

桃仁一兩去皮尖海石二兩醋煮

白朮一兩

右爲細末神麴糊丸服

○凡宿塊在皮裏膜外須用補氣藥及香附開之兼二陳湯先  
須斷厚味為要

○倒倉法用肥嫩黃牡牛肉二三十斤切成小片去筋膜長流  
水煮糜爛以布濾去渣滓取淨汁再入鍋中慢火熬至粥

均色則成劑矣令病者預先斷慾食淡前一日不食晚飯  
設密室一間明亮而不通風處行之置微桶及木瓦盆貯  
吐下之物一磁瓶盛所出之濁令病者入室以汁飲一杯  
少時又飲一杯積數十杯寒月則重湯溫而飲之任其吐  
利病在上者欲其吐多病在下者欲其利多病在中者及  
在上復在下者欲其吐利俱多全在活法而為之緩急多  
寡也視所出之物必盡病根乃止吐利後必渴甚不得與  
湯以所出之濁飲之名輪迴酒非惟可以止渴抑且可以  
瀉滯餘垢行後倦睡竟飢先與稠米飲次與淡稀粥三日  
後方可與小菜羹次與厚粥乾餃調養半月或一月自  
覺精神漸發形體輕健沉疴悉能痊矣其後須忌牛羊肉數  
年夫牛坤土也黃土之色也以順為性而効法乎乾以為

功者牡之用也肉者胃之樂也熟而液無形之物也橫臥

入肉絡由腸胃而滲透肌膚毛竅爪甲無不入也積聚久

則形質成依附腸胃廻薄曲折處以為極泊之窠臼阻礙

氣血津液薰蒸燔灼成病自非刮膚剖骨之神妙可以銖

兩丸散覶犯其藩牆戶牖平肉液之散溢腸胃受之其厚

皆倍於前有似乎腫其廻薄曲折處肉液充滿流行有如

洪水泛漲其浮槎陳朽皆推逐蕩漾順流而不可停留任

表者因吐而汗其清道者自吐而湧濁道者自泄而去凡

屢滯碍一洗而盡牛肉全重厚和順之性益然渙然潤澤

枯槁補益虛損寧無精神渙發之樂乎正似武王克商散

財奚棄以賑殷人之仰望也其方得於西域之至入凡人

於中年後行一二次亦郤疾養壽之一助也

夫倒倉法全藉自飲輪迴酒十數杯以怯遠，餘后迎援調勻新布榮衛使肺氣宣暢生意敷暢有脫胎換骨之功也。多鍊其穢以致中經而功虧一簣若非明物理通造化者其肯視為羹醤良味乎此段乃丹溪真人書簡所論也

愚按內經謂脾胃者倉廩之官五未出焉大腸者傳道之官變化出焉小腸者受盛之官化物出焉今詳此法名爲倒倉謂傾倒倉廩之陳腐也其論中反覆叮嚀之意無非只爲腸胃中痰積膠固及化生諸般奇形之至誠怒咽難療愚嘗妄試明驗惟脾胃與大小腸有食積痰飲而爲腹痛吞聲食蘿黃肝痞滿惡心嗳氣嘈雜吞酸等証行之無不應手獲効其餘一應氣血虛損與夫天胃膈噫鼓脹癆癰大風真病已成及肥白氣虛之

人或一切証候脉虛軟無力者切不可輕試以自招咎  
衍丹溪有謂咯血吐紅久病嘯用此法而愈者蓋必其  
真其人胃中痰火太盛而真氣壯實未虧亦在丹溪之高見  
觀乎用之則可今人效顰而妄以似是而非者行之是  
乃徒取謗於他人而反謗以丹溪之法不堪信也慎之

慎之

○廣木瀆堅湯治有積塊堅硬如石形大如盤令人坐卧不安  
中滿腹脹方見脹門

○半夏厚朴湯治証同前方見脹門

○三因散聚湯治九氣積聚狀如癰癧隨其上下發作有時心氣  
腹疼痛攻刺腰脇小腹脹大小便不利

半夏 桔梗 川芎各四分陳皮

氣

杏仁

去皮另研

桂心

各一錢另研

茯苓

一錢另研

附子

泡

川芎

各五分另研

枳殼

炒厚朴另研

吳茱萸

易包一錢另研

大黃

酒拌湯半錢另研

大黃

大便利即去之

右細切作

一服加生姜三片水二盞煎至一盞溫服

○千金硝石止可磨塊不令人困須量虛實用之

硝石

六兩另研

大黃

八兩另研

甘草

各三兩另研

右爲細末以三年陳米醋三升置磁器中以竹片作準每入一升作一刻先入大黃不住手攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一刻微火熬使可丸如雞子黃大每服一丸白湯化下或丸如梧桐子大每服三五十丸服後下如雞肝或如米泔赤黑色等物乃効下後忌風冷宜軟粥將息

○局方妙香丸年陳積方見火門

○導氣枳殼丸治氣結不散心胃痞滿氣上攻分氣逐風功

莫盡述

枳殼去穰炒

木通炒

青皮

陳皮去白

桑白皮炒

萊菔子炒

白丑炒

黑丑炒

莪朶煨

茴香炒

京三棱炮

右各等分為細末姜汁調麪糊爲丸如梧桐子大每服三十丸煎橘皮湯下

○木香三稜丸治一切氣悶脅痛滿榮滿不和口吐酸水嘔逆惡心飲食不化脇肋疼痛無問久新並皆治之

青木香

破故芷

茴香

黑丑

甘遂

芫花

大戟

京三棱

蓬莪术

川練子

葫蘆巴

巴戟 巴上各一兩

巴豆 不去油二分陳倉米三分與巴豆一錢同炒黑

砂仁 一兩半

右細功用好米醋二升除砂仁木香外餘藥入醋中浸一宿入鍋內煮醋盡乾爲度同木香砂仁爲細末醋煮麪糊爲丸如棗大每服五丸或七丸食後服者鹿實大小加減丸數隨湯水任下

○東垣草豆蔻丸治酒積或傷寒冷之物胃脘痛咽膈不通

草豆蔻 茯累煨白朮各一兩 大麥蘖

神曲各炒

黃芩

半夏 各半兩

枳實炒二兩

陳皮

青皮

乾生姜各二錢炒鹽半兩

右爲極細末湯浸蒸餅爲丸如棗大每服一百丸熱水

下

愚按此方乃飲酒過度恣食寒涼之物有痃癖積飲在  
膏肓間作痛者之所宜也

○肥氣丸治肝之積名曰肥氣在左脇下如覆杯有頭足久不  
愈令人發欬逆連痃癰連歲不已

厚朴

姜製伍錢黃連七錢

柴胡一兩

川椒

四錢

巴豆霜五分

乾姜

泡五分

川烏

泡二分

皂角

去皮弦炙一錢半

白茯苓

一錢半

廣木

泡二錢半

人參

泡二錢半甘草炙三錢

昆布

酒洗貳錢半

右件除茯苓皂角巴豆霜另研末外諸藥共爲極細末和

勺煉蜜爲丸如梧桐子大初服二丸日加一丸二日加二丸漸漸加至大便微溏再從二丸起加服之周而復始積減大半勿服

○伏梁丸治心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心

黃連

半兩

厚朴

姜制

人參各伍錢

黃芩

三錢

桂枝

一錢

乾姜泡

葛蒲

巴豆霜

各伍分

紅荳蔻

二分

川烏頭泡

五分

茯神

丹參

炒各一錢

右件除巴豆霜外爲細末另研包巴豆霜旋入末和勺煉蜜丸如梧桐子大服如上法淡黃連湯下

○痞氣丸治脾之積名曰痞氣在胃脘覆大如盤久不愈令人

四肢不收發黃疸飲食不為肌膚

厚朴姜制四錢

黃連八錢

茱萸三錢

黃芩二錢

白茯苓

人參

澤瀉各一錢

川烏炮五分

川椒五分

茵陳酒炒

乾姜泡

砂仁各壹錢半

白术二分

巴豆霜四分

桂皮四分

右件除巴豆霜另研茯苓另末旋入外為細末和勻煉蜜丸如梧桐子大服如上法淡甘草湯下

○息奔丸治肺之積名曰息奔在右脇下大如覆杯久不愈令人渴漸寒熱喘咳發肺壅

厚朴姜制八錢

黃連炒一兩三錢

乾姜泡

白茯苓

川椒炒

紫苑各一錢

川烏泡

桔梗去芦

白荳蔻

陳皮去白

京三棱炮

天門冬

人參二錢 青皮五分

巴豆霜四分

右件除茯苓巴豆霜各另研旋入外爲細末和勻煉蜜丸如梧桐子大服如上法淡姜湯送下已上四方秋冬加厚朴減黃連四分之一

○奔豚丸治腎之積名曰奔豚發於小腹上至心下若豚狀或上或下無時久不愈令人喘逆骨痿少氣及治男子內結七疝女人瘕聚帶下

厚朴姜制七分

黃連五錢

白茯苓

澤瀉

菖蒲

各二錢

川烏泡

各七分

丁香各五分

善練

酒煮三錢

玄胡索

一錢半

全蝎

附子

獨活各一錢

桂

肉桂一分

巴豆霜

五分

右件除巴豆霜茯苓各另研爲末旋入外爲細末和勻煉蜜丸如梧桐子大淡鹽湯下服如上法

腎

論

虛損二十六

內經曰飲食飽甚汗出於胃驚而奪精汗出於心特皇遠行  
汗出於胃疾走恐懼汗出於肝搖休勞苦汗出於脾又曰久  
視傷血久卧傷氣久坐傷肉久立傷骨久行傷筋若夫七情  
五心之火飛越男女聲色之慾過滛是皆虛損之所由也機  
要曰虛損之疾寒熱因虛而感也感寒則損陽陽虛則陰盛  
損自上而下一損損于肺皮聚而毛落二損損于心血脈虛  
少不能榮于藏府婦人則月水不通三損損于胃飲食不為  
肌膚治宜以辛甘淡過於胃則不可治矣感熱則損陰虛則  
陽盛損自下而上一損損于腎骨痿不能起于床二損損于  
肝筋緩不能自收持三損損于脾飲食不能消魁治宜以

治

苦酸鹹過於脾則不可治矣又曰心肺損而色弊腎肝損而形瘦難經曰治損之法損其肺者益其氣損其心者補其榮血損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者緩其中損其腎者益其精是皆虛損病因治法之大要也學者詳之

脉法

脉經曰脉來軟者為虛 緩者為虛 微者為虛

弱者為虛 弦者為中虛 脉來細而微者血氣俱虛  
脉小者血氣俱少

要畧曰脉芤者為血虛 脉沉小遲者脫氣

又曰血虛脉大如葱管 又曰脉大而乳者脫血

方法

丹溪曰天為陽而運於地之外地為陰而居乎中天之大氣

舉之曰實也屬陽而運於月之外月缺也屬陰稟日之光以為明人受天地之氣以生天之陽氣為氣地之陰氣為血故陽常有餘而陰常不足氣常有餘而血常不足也又曰經曰精不足者補之以味味陰也補精以陰求其本也然味乃如穀菽菜出於天賦自然冲和之味故有食人補陰之功非醯醬烹飪調和偏厚之味出於人為者也經曰陰之所生本在五味非天賦之味乎曰陰之五宮傷在五味非人為之味乎善揮生者不可謂味以補精而遂恣於口腹以自速其禍也又曰形不足者溫之以氣溫養也溫存以養使氣自克氣克則形完矣曰補曰溫各有其旨局方悉以溫熱藥佐輔名曰溫補豈理也哉又曰人年老或虛損精血俱耗陰不足以配陽孤陽幾於飛越天生胃氣尚爾畱連又藉水穀之陰故

繁

羈而定耳局方用溫劑劫虛蓋脾得溫而食進故亦暫可夫質有厚薄病有淺深設或失手何以收效吾寧稍遲計出萬全溫劑補虛決不敢用

○丹溪治老人虛損但糞小水短少即是病進宜以人參白朮  
為君牛膝芍藥為臣陳皮茯苓為佐春加川芎夏加黃芩  
麥門冬秋冬加當歸身倍生姜一日或一貼或二貼小水  
之長若舊乃止此老人養生之捷法也此丹溪養母之方也

○四君子湯治氣虛

人參

一錢半

白朮

茯苓

各二錢

甘草

一錢

右細切作一服水煎如自汗或小水利者去茯苓加黃  
芪二錢無汗小水不利者只依本方

○四物湯治血虛

川歸二錢

川芎

芍藥各一錢半

熟地黃二錢

右細切作一眼水煎服春倍川芎夏倍芍藥秋倍地黃

冬倍當歸

○八物湯治氣血兩虛

四君子合四物湯共為一劑如上法加減煎服

六君子湯治氣虛痰方見經選門

○局方十全大補治氣血俱虛而挾寒暑

人參

黃芪

甘草

白芍藥

當歸

白朮

白芍藥

肉桂

熟地黃

芍藥各等分

右細切每服一兩重加生姜三片大棗一枚水二大盞  
煎至一盞溫服加減法宜詳前論

○大補陰丸降陰火補腎水

黃柏

鹽酒拌新瓦上炒褐色

知母去皮酒拌濕炒各四

兩

熟地黃

酒

酒洗懷裏者佳酒洗

龜板

酥炙黃各六兩

右細末猪脊骨髓和煉蜜為丸如梧桐子大每服五丸空心姜鹽湯下

○補陰丸

一名虎潛丸

黃柏

半斤如前制知母去皮酒

熟地黃各三兩

制炒

龜板

酥炙四兩

白芍藥

酒

熟地黃各三兩

兩

虎胫骨

一兩

瑣陽

酥炙

當歸各一兩半

兩半

右為細末酒煮羯羊肉為丸鹽湯下冬加乾姜半兩

○加味虎潛丸

人參

黃芪

芍藥

酒

黃柏

鹽酒炒

當歸

酒洗山藥各一兩

瑣陽酥炙枸杞子

虎胫骨

醤灸

龜板

酥灸

兔綠子

鹽酒

浸三宿

細研糊于

破故紙

炒

杜仲

姜汁拌炒絲斷

五味子

各七錢半

牛膝

去芦酒洗二兩

熟地黃

四兩

右爲細末煉蜜和猪脊骨髓為丸如梧桐子大每服五六十九溫酒或姜鹽湯下

○滋陰大補丸

川牛膝

去芦山藥各一兩半

杜仲

姜汁拌炒絲斷

巴戟

去心

山茱萸

去核肉從容

酒浸洗新瓦上焙干

五味子

白茯苓

去皮

茴香

炒

遠智

去心并草同煮各一兩

石菖蒲

枸杞子

各五錢熟地黃二兩

右爲細末紅棗肉和煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九淡鹽湯或溫酒空心下與上虎潛丸相間服之佳所

謂補陰和陽生血益精潤肌膚強筋骨性味清而不寒  
溫而不熱非達造化之精微者未足以議於斯也

漢丹

○補腎丸

黃柏

龜板

各二兩 杜仲

各依前制牛膝

陳皮

各二兩

乾姜

五錢 冬加

五味子

右為細末姜汁糊或酒糊為丸服溫酒或白湯空心下

紫河車

一具即產孩胞衣也古方不分男女世傳男用女胎女用男胎者候以初胎者為勝似為有理  
若不可得但求肥盛無病婦人者俱可用初取  
得長流水洗淨去筋膜以箋籠盛之外以紙糊  
使不泄氣焙乾要用時以米醋浸一宿焙乾用

右以前補腎丸藥為末同河車再研極細酒糊為丸或  
新取紫河車蒸熟同前藥末搗爛為丸亦可

○虛勞者當以骨蒸藥佐之一云氣虛加補氣藥血虛  
加補血藥

○一方用側柏葉烏藥葉俱以酒浸九蒸九曝亦同紫  
河車為丸名補腎丸

○六味地黃丸治腎經虛損久新憔悴盜汗發熱五藏齊損瘦  
弱虛煩骨蒸痿弱下血咯血等証

乾山藥

山茱萸

去核各四兩

澤瀉

去毛

牡丹皮

白茯苓

各三兩

熟地黃

八兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸白湯下

○人參固本丸

天門冬去心

麥門冬去心

生地黃各二兩

人參去芦一

熟地黃二兩

右各焙乾同磨為末勿犯鐵器煉蜜為丸或只以天門冬熟地黃二味量酒浸搗膏同三味末杵千餘下丸如梧桐子大每服五七十九丸空心姜鹽湯下忌蘿蔔

○人參膏

人參一味不拘多少去芦細切量水於銀石器內慢火煎如稠鴆磁器盛貯每服一二匙白湯點服

○補中益氣湯治飲食失節勞役所傷暴傷元氣惡寒發熱証似傷寒者方見內傷門

○益胃升陽湯血脫益氣古聖人之法也先補胃氣以助生發之氣故曰陽生陰長諸卦藥為之先務舉世皆以為補殊不知其能生血從陽而引陰也故先理胃氣蓋人之身穀為寶也

柴胡

升麻各二分

炙甘草

當歸身

酒洗

陳皮

各五分

人參

久嗽不炒

神曲各七分

黃芪

一錢

白术

一錢半

生黃芩

二分

右細切作一服水二盞煎至一盞溫服○如腹中痛每

服加白芍藥五分中桂二分如渴或口燥加葛根三分

○芪附湯治陽虛氣弱虛汗大出不止肢體倦怠

川附子

炮

黃芪

蜜炙各二錢

右細切作一服加生姜三片大棗二枚水一盞半前空

一盞溫服

○參附湯治真陽虛乏上氣喘急自汗盜汗短氣頭旋眼花

人參

半兩

川附子

炮去皮精一兩

右細切分作三服加姜水煎溫服

○ 茯神湯治六脉虛轎咳則心痛喉中介介或腫或痛

茯神

人參

遠志

通草

麥門冬

黃芪

桔梗各六分

甘草

五味子各三分

右切作壹服加生姜一片水煎服

○ 补氣湯治氣虛脉浮而軟怔忡無時

黃芪

二分人參

甘草

各一錢麥門冬去心

桔梗

去芦各七分

右細切作一服加生姜三片水二盞煎至一盞溫服

○ 千金延壽丹治諸虛百損怯弱欲成癆瘵及大病後虛損不復凡人於中年後常服可以卻疾延年

五味子

菟絲子

煮爛另研川牛膝

杜仲

姜汁拌沙絲斷

川歸

山藥

天門冬

麥門冬

生地黃

熟地黃

各一

肉蓯蓉二兩人參

白茯苓

大茴香

菖蒲九節者

澤瀉

各一

鹿茸

巴戟去心

各五錢

遠志

覆盆子

各五錢

柏子仁

各五錢

右共磨為細末勿犯鐵器蒸鴉凍密為丸如梧桐子大  
每服一百丸空心溫酒或姜鹽湯下○如大便溏小便  
不利加車前子二兩○如精滑或夢遺加赤石脂山茱  
萸肉各五錢忌蘿蔔菜

○班龍丸治真陰虛損及老人虛人常服延年益壽

鹿角膠

炒成珠子鹿角霜

菟絲子

酒浸研細

柏子仁

取仁洗淨熟地黃各半斤

白茯苓

補骨脂各四兩

右磨為細末酒煮米糊為丸或以鹿角膠入好酒洋化

為丸如梧桐子大每服五十丸空心姜盃湯下昔蜀中  
有一老人貨此藥於市自云壽三百八十歲矣每歌曰  
星闕不禁滄海竭九轉金丹都謾說惟有龍班頂上珠  
能補玉堂閨下血當時有學其道者傳得此方彼老人  
化為白鶴飛去不知其所終

京師

○桂枝加龍骨牡蠣湯治六脉芤動微緊男子失精女人夢交  
及盜汗自汗等証

桂枝 白芍藥各三錢甘草炙二錢龍骨

牡蠣 各三錢

右細切加姜棗水煎 息恐上証不可用姜

○祖傳經驗秘方治心虛手振

川歸身一兩半川芎一兩汾甘草半兩生地黃一兩半

遠志去心二兩半

酸棗仁

柏子仁各三兩人參壹兩

辰砂

研五錢另

金鉑二十片

射香一錢

琥珀三錢

茯神

七錢五錢

膽南星半夏

五錢半夏五錢

石菖蒲六錢

右為極細末蒸餅為丸如棗大辰砂為衣每服七八十九津唾嚥下或姜湯送下

○本邑在城金匱元國子生也年五十余年身畧瘦十年前得內傷挾外感証一醫用發表疎利之劑十數日後熱雖退而虛末復胷中痞滿氣促眩運召予治以補中益氣湯間與東垣消痞丸陳皮枳木丸等藥調理而安但病根未尽除而住藥故眩運或時而舉不甚重來兌至此年因往杭城跋涉辛苦又兼色慾之過還家眩運大作歷數醫皆與防風羌活荆芥南星半夏蒼朮等去風散濕消痰之劑病愈

重一日十數次厥去片時復甦凡動或轉側即厥不知人事舉家惶惶叫哭召予治診其六脉皆浮洪而濡予曉之曰此氣血大虛証幸脉不數而身無大熱不死但恐病愈後而有數年不能下榻行動病者曰只要有命臥亦甘心與大補氣血之藥倍人參黃芪或加附子引經合大劑一日三貼又煎人參膏及作紫河車丸補陰丸之類間服如此調理二月余服煎藥二百餘貼丸藥三五料用人參五六斤其証漸不厥飲食如故但未能行動耳次年聞黃布政汝言往京師道經蘭溪以舟載去彼俟候求診王公曰此証陰虛風痰上壅因誤服參芪多故病久不愈立方以天麻菊花荆芥川芎等清上之藥亦未見效住藥後越六年方得起而步履如初儒元不思昔日病劇而藉參芪

等藥之功遂以王公之語歸咎於予用寒以誤意彼時若  
非峻補何以得一儒元見王公耶嗚呼此誠得患忘簽得  
免忘帶也可勝嘆哉

○東陽邑庠鄒掌教先生一証發大汗戰慄振掉片時許發  
燥熱身如火燒又片時許出大汗如雨身體若冰冷而就  
發寒戰如前寒後又熱熱後又汗三病繼作而晝夜不息  
庠生盧明夫與作瘧証治不効召予診其右手陽脉數而  
浮洪無力陰脉畧沉小而亦虛左三部比右差小而亦浮  
軟予曰此陽虛証也用補中益氣湯倍參芪減升柴一半  
加炙浸生附子一錢半炒黃柏三分乾姜薄桂各五分大  
棗一枚同煎服一服而病去三分二服而減半四服寒熱  
止而身尚有微汗減去桂附乾姜一半服二貼全愈

勞極二十七

論

宜

內經曰陰虛生內熱又曰陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷又曰有所勞倦形氣衰少穀氣不盛上焦不行下脫不通而胃氣熱熱氣薰胸中故內熱是故欲養陰而延生者心神而恬靜而毋躁擾飲食宜適中而無過傷風寒暑濕之謹避行立坐卧之有常何勞怯之有哉今也嘗發無節起居不時七情大慾之火時動乎中飲食勞倦之過屢傷乎體漸而至于真水枯竭陰火上炎而發蒸之燥熱或寒熱進退似瘡非瘡古方名曰蒸病或二十四種或三十六種名雖不同証亦少異大抵不過咳嗽發熱咯血吐痰白濁白滯遺精盜汗或心神恍惚夢與鬼交婦人則月閉不通日漸

羸漸成勞極之候夫病此者始多矣。究姑息日久直至發熱不休形體瘦甚真言已脫然後求醫治療雖食而復生其能救其萬一良可嘆哉雖然一人未足憐也况其持奉親客之人或同氣連枝之屬薰陶日久受其惡氣多遭傳染名曰傳屍又曰喪屍曰飛屍曰遁屍曰瘡口屍注曰鬼注蓋表其傳注酷虐而神妙莫能以測之名也雖然未有不由氣体虛弱勞傷心腎而得之者初起於一人不謹而後傳注數百人甚而至於城族成門者誠有之矣然此病最為可惡其熱毒鬱積之久則生異物惡入食人藏府精華變生諸般奇狀誠可驚駭是以勞傷于肝膽者則為毛蟲如刺蝟瓦蛆之屬食人筋膜勞傷于心與小腸者則為羽虫如灯蛾蠅蠅禽鳥之形食人血脉勞傷于脾胃者則為倮虫如嬰孩蚯蚓之

類食人肌肉勞傷于肺與大腸者則為介蟲如蟲蟻蟹之  
狀食人膚骨勞傷于腎與膀胱者則為鱗蟲如魚龍蛟蛇之  
形食人骨骼或挾相火之勢亦如羽蟲之體者鴟枭之類為  
狀一一不可勝紀凡人有此証便宜早治緩則不及事矣  
治之之法一則殺其虫以絕其根本一則補其虛以復其真  
元分經用藥各有條理務如庖丁解牛動中肯綮無有不安  
者也若待病勢已劇元氣已脫雖依古法取虫滋補患者不  
無一生但亦可絕後人之傳注耳學者詳之

脉法

脉經曰男子平人脉大為劳極虛亦為劳

男子勞之為病其脉浮大手足煩春夏劇秋冬瘥陰寒精自  
出足痿軟不能行少陰虛滿

人年五六十其病脉大者臂挾背行痛苦腸鳴馬刀挾腹  
者皆為勞之得

男子平人脉虛弱微細者喜盜汗出也

男子面色薄白主渴及亡血卒喘心悸其脉浮者裏虛也

男子脉虛沉弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時時目  
瞑比人喜如小腹滿此為勞使之然

男子脉微弱而虛為無子精氣清冷也

夫失精家小腹強急陰頭寒目眶痛一云目微紅脣落脈極虛芤遲

為消殺亡血失精

脉得諸芤動微緊男子失精女人夢鬼交通

脉沉小遲者名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則  
泄泄食不消化

脉弦而大弦則爲城大則爲芤緩則爲寒芤則爲虛虛寒相

搏此名爲革婦人則半產漏下男子則七血失精

方法

丹溪方法丸四錢

丹溪曰此陰虛之極瘦與血病多有虫者其傳死一証不可

云無大法四物湯加童便竹瀝姜汁

○身瘦屬火因火燒燬也肉脫甚者難治

○氣血虛其發熱成勞者補天丸加骨蒸藥佐之

骨蒸藥如母黃柏地骨皮麥門冬秦艽青蒿鱉甲石膏竹葉烏梅之類

○傳疑芳寒熱交攻久嗽咯血日益羸瘦先以三拗湯次以連

心散

○二十四味蓮心散

川歸

黃芪

甘草

鱉甲

醋炙黃前胡

柴胡

獨活

羌活

防風

防已

茯苓

半夏

黃芩

陳皮

官桂

芍藥

麻黃

不去根莖  
另研

杏仁

另研

蓮肉

生味  
蓮花內  
子

南星

川芎

枳殼

面裹  
半錢

芫花

醋炒  
黑色

一撮

右細切作一服加生姜三片大棗一枚水二盞煎至一盞去粗溫服須待吐有異物完花漸減少蓋芫花反甘草所以殺虫炒之所以斷熱去寒妙處在此

○青蒿飲手治勞瘵

青蒿一斗五升

童便

三斗

右以文武火熬約童便減去二斗去蒿再熬至一升入猪膽汁七箇或加辰砂辰榔末三五錢再熬數沸甘草末收之每服抄一匙清湯點服極妙

○白鑣塵一味大殺瘵虫可入丸藥散中用  
○秘傳取傅宛勞虫鬼哭飲子

天靈蓋

醋炙黃色鱉甲

柴胡

去苦名半錢

木香

一錢二分半

阿魏

一錢

桃仁

二十枚去皮另研

鼓心

滿黃熟

青蒿

半錢

阿魏

一錢

安息香

一錢

貫眾

半錢

甘草

一錢生用

右十一味細切杵為麩末先以童子小便二升隔夜晨  
露星月至四更時煎至八分去粗分作三服每服調後  
散子一貼五更初溫服即穩卧至三點時又進一服至  
日出時查腰中欬利如未利又進一服已利勿服

散子方用梅榔

二錢半辰砂

一錢半牛

射香

一錢另研

赤脚蜈蚣

以竹筒盛姜汁浸信乾

一條

烏雞糞

二錢半先將糞於五月前以火麻子炒之然後

用

右以五味研為細末和勻分為三貼各入前煎藥內服  
凡合上藥宜於六甲建日或除日合之服前藥必利下  
惡物併虫以盆盛之急用火燒殺之或油煎殺之其病  
人所穿衣服及薦褥尽易燒之食葱粥將息以復元氣  
服藥後或夢人哭泣相別是其驗也如取下虫視其色  
青赤黃者可愈黑色者難療也雖虫老病不可療亦能  
絕後人之傳注耳合此藥時不可容孝子婦人雞犬見  
之及不可令患者知之與聞其氣息虫聞氣變化難取

也

○治勞瘵取虫經驗天靈蓋散

天靈蓋

指大用白

檀香

煎湯洗

枳榔

五箇烏

指大用白

末

阿魏

二錢

細研

射香

三分另細研

辰砂

一錢另研

甘遂連珠者二錢為末安息香三分銅刀切細研

右七味各研極細和勻每服三錢後湯調下

薤白二七莖青蒿二握甘草五寸許葱白二七莖

桃枝

柳枝

桑枝

酸石榴枝

各七寸

梅枝

七寸已上五枝俱取向東南者

右九味用童子小便四升於銀石器內以文武火煎至一升去粗分作三盞調前藥末服五更初服一盞服後如覈欲吐以白梅肉噙止之五更尽覈藏府鳴須轉下虫及惡物黃水若一服未下如人行五七里又進一服至天明又進一眼口渴不止用龍骨黃連等分為末熟水調下五錢或吃白粥補之此藥男病女煎女病男煎不可令患者知及不許孝子僧人雖大見之

○射香散治男子婦人骨蒸發熱五勞七傷等証

天靈蓋

二錢半

柴胡

一兩

犀角屑

半兩

甘草

三寸

東引桃枝

另研一錢

東引柳枝

另研一錢

東引榴枝

另研一錢

青蒿

各一握

阿魏

另研一錢

薤白

各七寸

葱白

二錢半

射香

右細切杵為塵末用童便二升半浸藥一宿明日早煎至一升半去粗分作三服每服入柏榔細末三錢溫服五更初進一服約人行五七里再進一服若惡心兀兀

欲吐嚼白梅止之三服後瀉出惡物蟲或身如蟻行不可名狀後用葱粥止之忌風一月及忌食油膩濕麪鹹酸併牛羊雞猪犬肉魚腥年遠重病不過二服全安脩合此藥時男病女煎女病男煎忌貓大雞鶯鳴駒馬僧尼孕婦孝子見之凡取虫後須以後大補茯神散之

青桑枝

柳枝

梅枝

桃枝

石榴枝

各七莖與長七寸皆取東引者

青蒿一握

葱白七莖

阿魏一錢另研

安息香一錢去石另研

少許另研

右除阿魏安息香一味外餘藥用童小便一升半煮去

一半去粗將藥汁阿魏安息香細研再煎十數沸分作

一服調

辰砂末 桔梗末 各五分

射香少許另研

右三味亦分作二服入前湯五更初進一服三點時又

進一服至巳午晚必取下蟲其嘴紅者可治青黑者不

治但可絕後人之傳注耳取蟲後進軟粥溫和將息忌食生冷毒物仍服帝丸子法凢合此藥不可令患者先知氣味亦不得令猫犬孕婦孝子僧尼等不祥人見之

神授散此方得之於河南郡王府濟世既久功不可述也

川椒

二斤擇去閉口者與梗畧炒出干

右一味為細末每服二錢空心米湯送下或用酒米糊  
為丸如梧桐子大每服二三十丸漸加至八十九丸空  
心酒下或米湯下丸人得傳尸勞病氣血未甚虛損元  
氣未尽脉絕者不須多方服食但能早用此藥無有不  
愈者真濟世之寶也

愚嘗治一婦人用花麻

一分苦練根

一分丸服尾虫足從大便泄出

○治勞極禁方無比丸

一名紫河車丸

○其餘勞怯之症平反

南延勞瘵二月可愈

其餘勞怯之症平反

南延勞瘵二月可愈

紫河車

一具初生者佳或無病壯年婦人者亦可一說

米糊浸一宿焙乾用

草龍胆

甘草

炙各

鱉甲

附

灸半兩

桔梗

胡黃連

大黃

酒拌蒸熟

苦參

一本

黃柏

一本黃藥子誤

知母去毛具母去心

秋石

另研不必用煎陳者但用紅梅

中白長流水洗淨各二錢半

犀角屑

蓬莪术

硝石各一錢半

辰砂另研敗鼓皮

心

一本草謂誠心通天能透飛

右共為細末煉蜜為丸如梧桐子大辰砂為衣每服二十丸加至三十九溫酒送下腸熱食前膈熱食後服

○秘傳取勞虫禁方

琢木禽

夏

右用硃砂四兩精猪肉四两將肉切作片子

其硃砂杵如棗豆大塊二味拌

勿

餌禽一晝夜食肉不

為度以鹽泥固濟其禽在內剛火煅一夜來日不見太

陽取出不得打破埋入地中二尺許一晝夜取出去鹽

泥銀石器內研為細末以無灰酒入射香少許作一服

調下置患者在帳中四下緊閉用鐵鉗等候其虫必從

口鼻中出即以鉗鉗入沸油中煎殺之如虫出之

進局方嘉禾散一服軟弱將息

紫河車丹治飛屍鬼注虛勞羸瘦帶嗽痰氣等証其法取首  
生男子胞衣以皂角水洗淨次放銅跳子內以米醋擦洗  
控乾做一小箋籠子盛之圍以紙密糊之不令泄氣以烈

火焙乾加入後藥

人參半兩白木一兩木香白茯苓各半兩

茯神

川歸

熟地黃各一

乳香

四錢另研

沒藥

四錢另研

硃砂

二錢另研

射香

二分

右爲細末和勻酒糊爲丸如梧桐子大每服五十九前  
人參湯送下日三服空腹服之煉蜜爲丸服亦可

○治虛勞柴胡散

柴胡

人參

茯苓

桔梗

芍藥

川歸 酒浸青皮 去白

麥門冬 各二分

甘草一分

右細切作一服杵細水一盞前七分溫服

續

C 治虛勞

鱉甲 醋煮散

大者一箇 柴胡 去芦

川歸 甘草

桔梗

芍藥

人參各一兩

射香五分

杏仁去皮炒研

胡黃連 各二錢

官桂半兩

桂皮去

地骨皮

宣黃連 各二錢半

真酥 三兩

木香半兩

桂皮半兩

白沙蜜 三兩

右為細末用青蒿一斤童便五升熬青蒿汁約二升滌去粗入酥蜜再熬成膏候冷入藥末搜和為丸如梧桐子大每服十五丸溫酒送下米飲亦可日進三服如秋冬時更入桑柳心七箇與前柴胡散同煮煎服之

○去三屍九虫貫衆丸

貫衆

五分殺伏尸虫

白蘿蔔

三分殺尸虫  
乾漆三分殺白

夏枯草

三分殺肺虫

狼芽子

四分殺胃虫

僵蚕

四分殺蟲

白蘿蔔

三分殺蟲

乾漆三分殺白

雷丸

六分殺赤虫

雄黃

三分殺尸虫

右件培乾炒令黃色研爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大新汲水下五丸三服後漸加至十丸服之二十日百病皆愈三屍丸虫盡滅更無傳注之患耳

○治勞嗽輕骨散

烏梅

蘇炙

龍胆草

桔梗

胡黃連

秦艽

具母

知母

鱉甲

蘇炙

人參

青蒿酒煮

阿膠炒成

甘草

桑白皮

杏仁去皮

右件各等分晒乾爲末用好京墨一塊以井花水磨調前

右件各等分晒乾爲末用好京墨一塊以井花水磨調前

藥末作餅子如大指頭大透風處陰乾二七日每用一餅  
以水花水磨化又用淡藥五分磨成一盞更加黃柏末二  
錢同煎數沸傾入盞內頻頻打轉於五更時輕輕起服服  
後就睡仰卧甚者不過三服

○治勞嗽蛤蚧散

白茯苓

一兩去皮細切入鉗  
內漫火燥

桑白皮

二兩以真蘇炙黃色知母二兩

知母

二兩去毛用酥醋炙令

杏仁

六兩去皮尖及核仁者炒乾用蜜炙令黃色

甘草

三兩酥醋炙三五次  
紫黃色

貝母

二兩用酥醋炙令黃色

蛤蚧

雌雄一對入酥醋內浸透慢火乾再用酥醋別炙七

人參

一兩用酥醋炙三五次令黃色不得焦

乳酥

真者四十兩切作骰子大塊入鐵內溶成汁入極酸  
上好米醋半斤和勻用制前藥醋不宜太多則勝不

善用

右爲末每服二錢水一盞煎至七分和杞眼忌油膩生  
冷毒物如久患軟者初服此藥必聞軟加甚須勤服久  
則可安須自保養爲妙

○治勞熱蛤蚧飲子

蛤蚧一對洗淨酒醋浸灸黃色黃芩半兩麻黃不去根

胡黃連

酒洗

秦艽去芦甘草生

生地黃

酒浸洗去芦

熟地黃

酒洗

青蒿

人參

柴胡

去芦

知母去毛酒

貝母

杏仁去皮尖及双仁者炒另研

已上各五錢

鱉甲一兩酒

桔梗

草龍胆

木香

各二錢半

右爲細末每服貳錢加烏梅姜棗煎服

附蒸病

古今錄驗五蒸湯

人參

知母

黃芩

各一錢

竹葉

七片

生地黃

乾葛

各一錢半

茯苓

一錢

甘草

炙半錢

石膏

二錢半

梗米

一合

右細切先以水三盞煎小麥二合至二盞去麥煎藥至一盞溫服隨証加減于後

實熟加黃芩

黃連

黃柏

大黃

虛熱加烏梅

秦艽

柴胡

蛤蚧

青蒿

牡丹皮

鱉甲

○味蒸鼻乾加

烏梅

天門冬

麥門冬

紫苑

茶大腸

右鼻孔乾痛

加大黃

芒硝

皮蒸舌白唾血

加石膏

桑白皮

霍然昏昧嘔吐

加牡丹皮

氣蒸鼻孔喘促遍身氣熱

加人參

黃芩

梔子

心蒸舌乾加黃連

生地黃

木通

小腸蒸

下脣集

加赤茯苓

生地黃

芒硝

血蒸

髮集

加生地黃

當歸

桂心

童便

脉蒸

唾白浪語脉絡

加當歸

生地黃

○脾蒸

脣集

加白芍藥

木瓜

苦參

胃蒸

古下

加石膏

粳米

大黃

芒硝

乾葛

肉蒸

食無味而嘔煩燥不安

加白芍藥

○肝蒸

黑色

加川芎

當歸

前胡

膽蒸

褐色

加川芎

括萎

筋蒸

甲焦

加川歸

川芎

三焦蒸乍熱乍寒加石膏

竹葉

○腎蒸兩耳焦加生地黃

石膏

知母

寒水石

膀胱蒸右耳焦加澤瀉

茯苓

滑石

腦蒸頭暈熱悶加生地黃

防風

羌活

髓蒸肺滿骨中熱加生地黃

當歸

天門冬

骨蒸齒黑腰痛足逆變蟲食藏加鱉甲

地骨皮

牡丹皮

當歸

生地黃

齧蒸肢細肢腫府藏俱熱加石膏

黃柏

胞蒸小便赤黃加澤瀉

茯苓

生地黃 活石

沉香

○丹溪活套云勞極之証五藏必歸重於一經假如足脰痠疼

腰背拘急遺精白濁面色黧黑耳輪焦枯脈沉細數知其

邪在腎也宜以四物湯加知母黃柏五味子麥門冬天門  
冬澤瀉杜仲肉桂之類煎入童便韭汁竹瀝服○其或心  
神驚惕怔忡無時盜汗自汗心煩熱悶口舌生瘡咯血面  
赤脉洪而數知其邪在心也宜以前方去杜仲澤瀉肉桂  
加茯神胡黃連蓮心遠志菖蒲朱砂之類○其或嗽咳喘  
促衄血歟血皮膚枯燥鼻塞声沉時吐痰沫脉微虛而濶  
數知其邪在肺也宜以四物湯加沙參麥門冬五味子知  
母貝母桔梗桑白皮地骨皮欵冬花紫遠馬兜鈴百合百  
部之類煎入童便竹瀝姜韭汁服○其或脇痛目赤面青  
頰赤多怒虛陽不欽憂與鬼交甚則卯縮筋急脉弦而數  
知其邪在肝也宜以四物湯加竹茹草龍膽柴胡黃芩青  
皮竹葉之類○其或面色萎黃唇脣焦燥飲食無味腹痛

腸鳴瀉利四肢倦急脉虛濡而數知其邪在脾也宜以四君子湯加酒炒白芍藥連肉薑以乾山藥猪苓澤瀉白朮荳之類○丸骨蒸勞熱元氣未脫者灸崔氏四花六穴無有不安者也

○灸崔氏四花穴法

先二穴令患人平身正立取一細繩端之勿令長繡於男左女右腳底貼肉堅踏之其繩前頭與大拇指端齊後頭循當脚根中心向後引繩從脚腨肚貼肉直上至曲脅中大橫紋截斷橫紋即委中穴又令患人解髮分兩邊令見頭縫自顙門平分至上正經頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨引繩向下至繩尽头當脊骨中以墨點記之是灸處不墨點又取一繩子令患人合

口將繩子按於口上兩頭至吻却釣起繩子中心至鼻在  
根下如△此便齊兩吻截斷將此繩展今直於前量脊骨  
上墨點處橫量取平勿令高下

其量口尾子先守謂當中以墨記之却展開繩子橫量却以中指墨點記處按於脊骨中先點處即是穴也

兩頭以白圈記之 以上是第一次點二穴

次二穴令患人平身正坐稍縮臂膊取一繩繞項向前双垂頭  
與馬尾齊謂前歧骨謂盡處也双頭齊截斷却翻双繩頭向後以繩  
子中心按於喉嚨結骨上其繩兩頭双垂循脊骨以墨點  
記之是墨點不又取一繩子令患人合口橫量齊兩吻截斷  
還於脊骨上墨點橫量如法繩子兩頭以白圈記之

白圈是次

以上是第二次點二穴通前共四穴同時灸各三七  
壯累灸至一百餘壯候灸瘡將瘻又依後法灸二穴

又次二穴以第二次量口吻繩子於第二次双繩頭尽處墨點  
上當脊骨直上下墜點其繩子中心放在墨點上於上下  
繩頭盡處以白圈記之白圈是灸處也

以上是第三次點二穴也通前共六穴也擇取離日  
及火日灸之一應盈勞發熱尪羸等証灸之立愈真  
濟世之妙法也

四花六穴人形圖式



白圈是穴黑點不是穴

新刊醫學正傳卷之三

續