

活

人

書

活人書卷第十八

大半夏湯

六十四

治膈間有寒痰

半夏

湯洗如法
薄切焙乾

茯苓

生薑

各一分

石爲麈末每遇膈間有寒痰只作一服水兩盞半煎至一盞濾去滓臨睡溫呷如有熱痰加炙甘草一分如脾胃不和去甘草入陳橘皮一分同煎

越婢湯

六十五

治風濕痺脚弱

石膏

四兩

白朮

二兩

附子

一兩炮

甘草

一兩炙

麻黃

三兩去節
湯泡焙乾

右剉如麻豆大每服抄四錢匕水一盞半生薑三片棗子一枚煮至八分去滓溫服

脾約圓

六十一

治老人津液少大便澁及脚氣有風大

便結燥

大黃

二兩酒浸焙乾

枳實

麩炒去穢

厚朴

刮去皮薑汁炙

芍藥

以上各半兩

麻子人

一兩半微炒別研

杏仁

去皮尖麩炒黃三分別研

右爲細末煉密和杵千下圓如梧桐子大每服二

十圓溫水下不拘時候未知加五圓十圓至五十

圓止下利服糜粥將理

與正方九十二同分兩各別

一本麻子作一鈔

別作新自
仁者

黑神圓

天十七

治溫疫時氣有食積者

巴豆

新好者一兩輕抽去殼以急流水兩碗浸一宿然後更煮三五十沸候冷漉出去心

膜以帛子拭去水然後研如膏用厚紙十數層裹以重物壓去油用

五靈脂

二分黑色者為上

大戟

半兩生用去皮裏面如粉白者為妙

荆三稜

半兩生用

杏仁

半兩炒過後研入藥再研

豆豉

二兩瀝是新軟者為妙不得令燥乾與巴豆膏同研細

右三味為極細末方入巴豆豉研細後入杏仁

更研令細別入飛羅麩半匙以井花水調如糊漸

次拌藥搜和得所入白中搗三二千下圓如菟豆

大煎乾入堯合內頻熬或微火焙亦得如遇傷寒
有食積者脉沉結身體不熱即下之量患人藏府
虛實加減圓數服用煎薑棗湯吞下取微利爲度
不可大過澹泄身熱下之則爲痞氣結胃若病在
上可吐者同生薑乾嚼三五圓

神功圓

六十八

治三焦氣壅心腹痞悶六腑風熱大便

不通津液內枯大腸乾澀裏急後重或下鮮血痰唾
稠粘風氣下流腰疼脚重臍下脹痛弱赤如金色

大黃

三兩

人參

半兩

麻子

人

五兩

阿子皮

二兩

另研取

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服二十圓温

水下日三服以通利爲度產後大便秘米飲下十圓

五柔圓

六十九

治老人虛人脚氣亡津液虛秘大便結

調補三焦

大黃

四兩

前胡

一兩

半夏

洗七遍

茯苓

酒浸

芍藥

茯苓

去皮

細辛

當歸

葶藶

炒各半兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大温水下二十圓

以通利爲度

瀉面
同
目手
腫大便

大三脘散

七十

治三焦氣逆胃膈虛痞兩脇氣痛手

面浮腫大便秘澀兼治脚氣

獨活

一兩

白朮

三分

甘草

三分

乾木瓜

一兩切
焙乾秤

紫蘇

一兩

沉香

一兩

木香

三分

大腹皮

一兩
炙黃

陳橘皮

三分

川芎

三分

檳榔

三分
暴煨熱

右十一味同一處杵爲粗散每劑秤一分水二盞

同煎至一盞去滓分二服帶溫服取便利爲効如

能臨晚常進半劑依法煎服即府藏調和風氣人

多秘滯數宜服之未通利者依法煎服此藥極不

虛人氣血不損元神經絡多矣脚氣心腹氣悶大便秘滯者最良

檳榔散

七十二

治脚腫

橘葉

一大握

沙木

一握

小便

半盞

酒

半盞同已

上藥煎

右煎數沸調檳榔末二錢食前服

薏苡人酒法

七十二

治脚痺

薏苡人

牛膝

各二兩

海桐皮

一兩

五加皮

一兩

獨活

一兩

防風

一兩

杜仲

薑汁炙一兩

白朮

半兩

枳殼

炒一兩

生乾地黄

二兩半

右剉爲麤末以生絹袋盛之內無灰酒五升春秋
冬浸二七日夏月盛熱分作數劑逐旋浸酒每日
空心溫服一盞或半盞日三四次常令酒氣醱醱
不絕久服覺皮膚下如數百條蟲行卽風濕氣也

木瓜散

七十三

治脚氣

大腹皮

一枚

蘇

一分

乾木瓜

一分

甘草

一分

木香

一分

羌活

一分

右剉爲麤散分作三服每服水一盞半煎至八分
去滓通口服之

葱豉湯

七十四

治傷寒一二日頭項腰背痛惡寒脈浮

而緊無汗

葱白

十五

豉

二大

乾葛

八分

麻黃

四分

去節

右剉如麻豆大以水二升先煮麻黃六七沸掠去白沫內乾葛煎數十餘沸下豉次下葱煎取八合去滓分溫兩服如人行五六里路以再服服訖良久煮葱豉粥熱喫即以衣覆出汗爲度

連鬚葱白湯

七十五

治傷寒已發汗或未發汗頭疼如

破

生薑

連鬚葱白

寸切
半升

右以水二升煮取一升去滓分作二三服服此湯
不差者與葛根葱白湯

葛根葱白湯

在十六

治頭疼不止

葛根

芍藥

知母

各半
兩

葱白

一把

川芎

一兩

生薑

一兩

右剉如麻豆大以水三升煎取一升半去滓熱分
二服

雄鼠屎湯

七十七

治勞復

梔子

十四枚 擘

枳殼

二枚 炙

雄鼠屎

十四枚 兩頭 炙者

右爲麤末每服四錢水一盞半入葱白二寸香豉三十粒同煎至一盞去滓分二服勿令病人知鼠屎

黃芩芍藥湯

五十八

治鼻衄

黃芩

三分

芍藥

甘草

炙各半兩

右剉碎每服三錢水一盞煎至六分去滓溫服

酒蒸黃連圓

七十九

治暑毒伏深累取不差無藥可治

伏暑發渴者

黃連

四兩以無灰好酒浸而
上約一寸以重湯熬乾

右搗羅爲細末，麩糊爲圓，如梧桐子大，熟水下三
五十圓，胃膈涼不渴爲驗。

茅花湯

八十一

治鼻衄不止

茅花

一大把無花
以根代之

右以水三盞煎濃汁一盞，徐徐服之，卽差。

枳實理中圓

八十一

治傷寒結胃欲絕，心膈高，起手不

得近。

茯苓

人參

白朮

乾薑

炮

甘草

炙各二兩

枳實

十六片
麩炒

右搗羅爲細末煉蜜爲圓如雞子黃大每服一圓
熱湯化下連進二三服胃中豁然渴者加栝樓根
二兩下利者加牡蠣二兩煨之

小半夏加茯苓湯

八十二

治諸嘔噦心下堅痞膈間有

水痰眩悸

半夏

五兩易浸
洗七遍

赤茯苓

三兩
去皮

右剉如麻豆大每服半兩水三盞煎至一盞去滓
秤生薑四錢取自然汁投藥中更煎一二沸熱服

不拘時候

桔梗枳殼湯

八十三

治傷寒痞氣胃滿欲絕

桔梗

枳殼

麸炒去穢
各一兩

右剉如麻豆大以水二盞煎至一盞去滓分二服

赤茯苓湯

八十四

治傷寒嘔噦心下滿胃膈間宿有停

水頭眩心悸

芎藭

半兩或作
二錢半

人參

一兩去
蘆頭

赤茯苓

一兩或
作五錢

半夏

半兩湯浸洗
七遍去滑

白朮

半兩

陳橘皮

一兩湯浸
去白穢焙

右判如麻豆大每服四錢水二盞生薑五片煎至
一盞去滓溫服不拘時候

香薷散

八十五

治陰陽不順清濁相干氣射中焦名爲

霍亂此皆由飽食豚膾復啖乳酪海陸百品無所不
養多飲寒漿或眠卧冷蓆風冷之氣傷於脾胃諸食
結而不消陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升
陰陽交錯變成吐利不已百脉昏亂榮衛俱虛冷搏
於筋則轉筋痛宜服此藥

香薷穗

一兩

厚朴

去皮二兩

黃連

二兩

已上二味以生薑

四兩同炒令紫色用

右搗爲麤末每服三錢水一盞酒半盞同煎至七分去滓用新汲水頻頻浸換令極冷頓服之藥冷則効速也仍煎時不得犯鐵器慢火煎之兼治非時吐利霍亂腹中攪痛大渴躁煩四肢逆冷冷汗自出兩脚轉筋疼痛不可忍者須入餅封口下井中沉令極冷頓服之乃有神効

犀角地黃湯六十六治傷寒及溫病應發汗而不發汗

內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑色此方主消化瘀血兼治瘡疹出得太勝以此解之

芍藥 三分

生地黃

半斤 去心 一兩

犀角

一兩 爲屑 如無 以升麻代之

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取七分有熱者加黃芩二兩如狂者亦加之其人脉大來遲腹不滿自言滿者爲無熱更不用黃芩

黃連解毒湯

八十七

治時疾三日已汗解或因飲酒後

劇苦煩悶乾嘔口燥呻吟錯語不得卧

黃連

三分

黃蘗

半兩

梔子

四枚

黃芩

一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取一

蓋去滓溫服未知再服進粥以此漸差外臺云凡

大熱盛煩嘔呻吟錯語不得眠者傳此方諸人用

之有效此直解毒熱除酷熱不必飲酒劇者

酸棗人湯八十八治傷寒吐下後心煩乏氣晝夜不眠

酸棗四升取人炒甘草一兩炙知母二兩茯苓三兩

川芎三兩乾薑三兩麥門冬一升去心

右爲籠末每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服

梔子烏梅湯八十九治傷寒後虛煩不得眠心中懊憹

梔子半兩黃芩半兩柴胡一兩甘草半兩炙

合後赤

生薑棗
一升夜令
川芎作二
升棗棗
升四升餘
升四升
升六兩

烏梅肉

十四枚
微炒用

右剉如麻豆大每四錢水一盞半生薑三片竹葉
十四片豉五十粒煎至七分去滓溫服

橘皮乾薑湯

九十一
治噎

橘皮

通草

乾薑炮

桂心

各二兩

人參

一兩

甘草

炙二兩

右剉如麻豆大每服四錢水一盞煎至六分去滓

溫服日三服

羌活附子散

九十二

治欬逆

羌活

附子炮

茴香

微炒各半兩

木香

乾薑

炮各一棗許大

右剉為細末每服二錢水一盞盞一捻同煎一二

十沸帶熱服一服即止

半夏生薑湯

九十二

治噦欲死

即金匱小半夏湯

生薑

二兩切

半夏

洗七次一兩一分

右剉如麻豆大水二盞煎取八分去滓分溫二服

黑膏

九十三

治溫毒發斑

好豆豉

一升

生地黃

半斤切

右二味以猪膏二斤合煮之前令三分減一絞去滓用雄黃麝香如大豆內中攪和分三服盡服之毒便從皮中出則愈忌蕪荑

葛根橘皮湯

九十四

治冬温未即病至春被積寒所折

不得發至夏得熱其寒解冬温始發肌中斑爛癰瘡如錦紋而欬心悶但嘔吐清汁服此湯即靜

葛根

橘皮

杏仁

去皮

知母

黃芩

麻黃

去節

甘草

炙各

半兩

右判如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煎至

八分去滓溫服

玄參升麻湯

九十五

治傷寒發汗吐下後毒氣不散表

虛裏實熱發於外故身斑斑如錦紋甚則煩躁讖語
煎治喉閉腫痛

玄參

升麻

甘草

炙各
半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半煎至七
分去滓溫服

大青四物湯

九十六

治傷寒熱病十日已上發汗及吐

利後熱不除身上班出

一名阿膠大青湯

卷二十八
知母
湯方
吳

大青

四兩

豉

八合

阿膠

一兩

甘草

二兩

炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取

盞去滓旋入膠再煎令烊溫服

知母桂心湯

後十七

治傷寒後不差朝夕有熱如瘧狀

麻黃

一兩

甘草

一兩

知母

二兩

炒或

芍藥

一兩

炙

黃芩

一兩

桂心

二兩

或

作一兩

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞半生薑四

片煎取七分去滓溫服日三服溫覆令微汗愈若

心煩不眠其人欲飲水當稍稍與之令胃中和則

愈

三黃圓

丸十八

治吐血黃疸

黃連

三兩

大黃

一兩

黃芩

二兩

右搗羅爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服十五

圓白湯吞下

桔梗半夏湯

丸九

治傷寒冷熱不和心腹痞滿時發

痰痛順陰陽消痞滿

桔梗

微炒

半夏

生薑汁製

陳橘皮

各一兩

枳實

半兩麩炒赤色

右剉如麻豆大每服抄伍錢七水一盞半生薑三片同煎半分去滓溫服

三黃熟艾湯一百治傷寒四五日而大下熱利時作

白通湯諸藥多不得止宜服此湯除熱止利

黃芩

黃連

黃蘗

各三分

熟艾

半雞子大

右剉如麻豆大每服五錢七水一盞半煎取七分去滓溫服

薤白湯一百一傷寒下利如爛肉汁赤滯下伏氣腹痛

諸熱毒皆主之

豆豉

半升
綿裹

薤白 一把

梔子

七枚大
者掌破

右剉以水二升半先煎梔子十沸下薤白煎至二升下豉煎取一升二合去滓每服一盞

赤石脂圓

一百二

傷寒下利

黃連

當歸

各二兩

赤石脂

乾薑

炮各一兩

右爲細末煉蜜爲圓如梧桐子大每服三十圓米飲吞下日進三服

地榆散

一百三

治傷寒熱毒不解日晚即壯熱腹痛便

痢濃血

地榆一兩

犀角屑一兩

黃連一兩去

茜根一兩

梔子人半兩黃芩一兩

右搗爲籠末每服抄四錢七水一盞入薤白五寸

煎至六分去滓不計時候溫服

黃連阿膠湯二百四

治傷寒熱毒入胃下利膿血

梔子人半兩

黃蘗一兩黃連二兩去阿膠一兩

右搗碎每服抄五錢七水二盞煎至一盞去滓入

阿膠再煎膠烱不計時溫服

桃人湯二百五

治蟲安力切蟲食病

槐子

碎一兩

艾

一兩

大棗

十五枚
去核

桃人

一兩去皮
尖雙仁煨

右以水二大盞半煎一盞半去滓分三服

黃連犀角湯

二百六

治傷寒及諸病之後內有瘡出下

部者

黃連

半兩

烏梅

七箇

木香

一分

犀角

一兩如無以
升麻代之

右剉碎以水二大盞半煎至一盞半去滓分三服

雄黃銳散

二百七

治下部馬鬚瘡

雄黃

研

苦參

青箱子

黃連

各二分

桃人

去皮尖
研一分

右為散以生艾搗汁和如棗子核大綿裹內下部
扁竹汁更佳冬間無艾只用散綿裹內下部亦得
百合知母湯 三百八 治百合病發汗後者

百合 七枚

知母 三兩切

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以
泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎知母
取一升去滓後合和煎取一升五合分溫再服

滑石代赭湯 三百九 治百合病下之後者

百合 七枚

滑石 三兩碎

代赭 如彈丸大一枚研碎綿裹

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以
 泉水二升煎取一升去滓別以泉水二升煎滑石
 代赭取一升去滓後合和重煎取一升五合分溫
 再服

雞子湯 二百十 治百合病吐之後者

百合 七枚 雞子黃 一枚

右先以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以
 泉水二升煎取一升去滓內雞子黃攪令勻煎五
 分溫服

百合洗方百七治百合病一月不解變成渴者

百合一升

右以水一斗漬一宿溫暖以洗身洗已食煮餅勿以鹽豉也

百合地黄湯百七治百合病不經吐下發汗病形如

初者

百合七枚

生地黄汁一升

右以水洗百合漬一宿當白沫出去其水更以泉水二升煎取一升去滓內地黃汁煎取一升五合

分溫再服大便當如漆中病勿更服

括樓牡蠣散

百十三

治百合病渴不差者

括樓根

牡蠣

熬等分

右搗羅爲細末飲服方寸七日三服

滑石散

百十四

治百合病變成寒熱者

一作發寒熱

百合

一兩

滑石

三兩

右件羅爲散飲服方寸七日三服當微利者止服

之熱即除

治中湯

百十五

治脾胃傷冷物胃膈不快腹痛氣不和

人參

乾薑

炮

陳橘皮

湯洗去穢

白朮

甘草

炙

青橘皮

去穢

右各等分爲細末每服三錢水一盞煎數沸熱服
尋常入鹽點服

陽旦湯

百病

治中風傷寒脈浮發熱往來汗出惡風

項強鼻鳴乾嘔

桂枝

芍藥

已上各三兩

甘草

炙

黃芩

各二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢水一盞半棗子一
枚生薑三片煎至一盞去滓取八分清汁溫服〇

自汗者去桂枝加附子一枚炮。渴者去桂枝加
栝樓根三兩。利者去芍藥桂枝加乾薑三兩。
心下悸者去芍藥加茯苓四兩。虛勞裏急者正
陽且湯主之煎時入膠飴爲佳。若脈浮緊發熱
無汗者不可與也。

白虎加蒼朮湯 百十七 治濕溫多汗

知母 六兩 甘草 炙二兩 石膏 一斤 蒼朮 三兩

粳米 三兩 按白虎湯竹葉石膏湯皆用粳米此方非合用粳米

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎八分

去滓取六分清汁溫服

七味葱白湯

百十八

許仁則治傷寒或因起動勞後或

因喫食稍多皆成此候若復甚者一如傷寒若初有此證宜服此湯

乾葛

切三兩

麥門冬

去心三兩

葱白連鬚

切半升

新豉

半合綿裹

生薑

切一合

乾地黄

三兩

澆水

四升以杓揚之千遍名曰澆水

右七味用澆水煎之三分減二去滓分二服漸漸

覆蓋取汗

增損四順湯

百十九

治少陰下利手足冷無熱候者

甘草

二兩炙

人參

二兩

龍骨

二兩

黃連

乾薑

各一兩

附子

一枚炮去皮臍

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分日三服

不差復作○下利腹痛加當歸二兩○嘔者加橘

皮二兩

化斑湯

百十

治斑毒

人參

半兩

石膏

半兩

萎蕤

知母

甘草

各一分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入糯米
一合煎八分取米熟爲度去滓溫服

官局桔梗湯 百廿 治乾嘔

桔梗 半夏 陳橘皮 已上各一兩 枳實 炒半兩

右剉如麻豆大每服抄三錢七水一盞半生薑五
片煎至七分去滓溫服

麻黃加木湯 百廿三 治中濕

甘草 半兩炙 桂枝 一兩去皮 蒼朮 半兩 麻黃 一兩半去節湯泡

杏仁 三十五箇去皮尖

右劉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取八

分去滓溫服

竹皮大圓

百三

治虛煩

石膏

三分

桂一分

生竹茹

二分

甘草

二分

白薇

一分

右爲細末棗肉圓彈子大米飲服一圓日三夜一

○有熱者倍白薇○煩喘者加枳實一分

古今錄驗橘皮湯

百十四

療春冬傷寒秋夏冷濕欬嗽

喉中鳴聲上氣不得下頭痛方

陳橘皮

紫苑

麻黃

去節湯泡

當歸

桂枝

杏仁

去皮

甘草

炙

黃芩

各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服

黃連橘皮湯

百十五

溫毒發斑

黃連

四兩去毛

陳橘皮

去白

杏仁

去皮

枳實

炙

麻黃

去節湯泡

葛根

各二兩

厚朴

姜汁炙

甘草

各一兩炙

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至八分去渣溫服下利當先止

麥門冬湯

百法

治勞復能起死人或勞氣欲絕者

麥門冬

一兩
去心

甘草

二兩
炙

右剉如麻豆大先用水二盞入粳米半合煎令米熟去米留水約得水一盞半入煎藥五錢七棗子二枚去核新竹葉十五片同煎取一盞去滓大溫服不能服者綿滴口中

活人書卷第十八

活人書卷第十九

此一卷論婦人傷寒古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血血室不畜則二氣和諧血室凝結水火相刑傷寒氣口緊盛即宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不可下當發其汗以收其血室榮衛得和津液自通浹然汗出而解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譏語如見鬼狀此爲熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣者言不可下也小柴胡湯主

之若行湯遲則熱入胃令津燥中焦上焦不榮
成血結胃狀須當針期門也五行相剋以生相
扶以出平居之日水常養於木水木相生則榮
養血室血室不畜脾無蘊積脾無蘊積則剛燥
不生剛燥既生若犯胃氣則晝夜譫語喜忘小
腹滿小便利屬抵當湯證也傷寒胃實譫語宜
下之婦人熱入血
室譫語不
可下耳雖然婦人傷寒與男子治法不同男
子先調氣婦人先調血此大略之詞耳夏之脈
緊無汗名傷寒脈緩有汗爲中風熱病脈洪大

正宗
八議公議
血之語

中暑脈細弱其證一也假如中暈用白虎胃實
用承氣豈必調血而後行湯液耶仲景傷寒論
所以不分男女良亦以此學者皆可隨病於男
子藥證中以意選用也

若妊婦傷寒藥性瀉涼慎不可行桂枝半夏桃
人等藥小柴胡去半夏名黃龍湯蓋爲妊婦而
去也大極產前先安胎產後先補血次服傷寒
藥若病稍退則止藥不可盡劑此爲大法黃帝
問婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無

殞也大積大聚其可犯也衰其大半而止過者死

○婦人傷寒藥方

男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景所撰而王叔和爲之序以法考之間有可取疑非古方也特假聖人之名以信其說於天下耳今取金匱玉函治婦人傷寒與俗方中可採者列爲一卷雖不足以盡婦人傷寒之詳並可於百問中參用也

小柴胡湯 治婦人傷寒發熱經水適來晝日明了
暮則譫語如見鬼狀者此爲熱入血室無犯胃氣及
上二焦

又治婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適
斷此爲熱入血室其血必結致使如瘕狀者

方在十卷正

方二
十九

刺期門穴 治婦人傷寒發熱惡寒經水適來得之
七八日熱除脈遲身涼和胃脇下滿如結胃狀譫語
者此爲熱入血室也當刺期門隨其實而取之

鍼法
在葉

利作法

瀉心三黃湯 三 婦人傷寒六七日胃中有燥屎大便
難煩躁譏語目赤毒氣閉塞不得流通

蜀大黃

鼠尾黃芩

雞爪黃連

各等分

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半煎至八分去
滓溫服取微利如目赤睛疼宜加白茯苓嫩竹葉
瀉肝氣之餘

桂枝紅花湯 四

婦人傷寒發熱惡寒四肢拘急口燥

舌乾經脈凝滯不時往來

本正不

於本桂枝
芍藥其甘
作一兩

桂心

芍藥

甘草

各三兩

紅花

二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四片棗子二枚煎至七分去滓溫服良久再服汗出而解

黃芩芍藥湯

五

婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思飲食

黃芩

白芍藥

白朮

乾地黃

各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半煎至七分去滓溫服寒加生薑同煎

柴胡當歸湯

六

婦人傷寒喘急煩躁或戰而作寒陰

陽俱虛不可下

柴胡

三兩

白朮

二兩

人參

甘草

炙

當歸

赤芍藥

各一兩

五味子

木通

各半兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四

片棗子二枚煎至七分去滓溫服

乾地黃湯

任

婦人傷寒差後猶有餘熱不去謂之遺

熱

大黃

黃連

黃芩

各一兩

柴胡

去蘆

甘草

炙

白芍藥

各一兩半

乾地黃

一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半煮至

七分去滓溫服取微溏利汗出解

燒裨散

臣

婦人傷寒未平復因交合裏急腰膝連腹

內痛名曰陰陽易證也

男子裨襠燒灰

右一味以水和服方寸匕男子病用婦人裨襠燒

灰小便利陰頭腫即愈

青竹茹湯

臣

婦人病未平復因有所動致熱氣上衝

胃手足拘急搐搦如中風狀

連步
八得
後未滿

一百日不
可與人交
合為陰勞
之病病必
拘急手足
拳舉背死
丈夫病差
傷婦人名
陽勞急疾
之可差滿
以百日不
可操也宜
服此藥
菟蘆地生
右剉如麻
豆大每服
五錢匕
二錢煎

括樓根

無黃者
二兩

青竹茹

刮半斤
去竹者佳

右以水二升半煎取一升二合去滓溫分作二三

服

當歸白朮湯

世

婦人病未平復因有所動小腹急痛

腰膝疼四肢不任舉動無力熱發者

白朮

一分

當歸

一兩

桂枝

去皮

甘草

炙

芍藥

半兩

附子

生去皮
破半片

人參

各一分

黃耆

各一分

生薑

半兩

右剉如麻豆大以水三升煮取一升半去滓通口

七分主
得解手
汗
溫
汗
得
解
手
汗
溫
汗

服一盞食頃再服一盞溫覆發汗便差

○妊婦傷寒藥方

妊婦傷寒仲景無治法用藥宜有禁忌不可與
尋常人一槩治之也

加減四物湯十一 妊婦產前腹痛及治月事或多或少
少或前或後胎氣不安產後血塊不散或去血過多
或惡露不下

當歸

切焙

川芎

熟乾地黄

白芍藥

各一兩

右搗爲麤末每服四錢水一盞半煎至八分取六

分清汁帶熱服日二三服以知爲度若妊婦下血
卽入艾五七葉阿膠末一錢七同煎服如前法○
疾勢甚大散藥不知以四味各半兩細剉以水四
盞煎至二盞半去滓分四服熱喫食前服一日之
中令盡以知爲度平常產乳服至三蠟止如虛弱
血臟不調至一月止○因虛致熱熱與血搏口乾
渴欲飲水加栝樓一兩麥門冬三分○腹中刺痛
惡物不下加當歸赤芍藥各一分○血崩加地黃
蒲黃各一兩○因熱生風加川芎一分柴胡半兩

○身熱脉躁頭昏項強加柴胡黃芩各半兩○秘
泄者加大黃半兩桃人一分炒○滑瀉加官桂附
子各一分○發寒熱加乾薑牡丹皮芍藥各一分
○嘔者加白朮人參各半兩○腹脹加厚朴枳實
各一分○虛煩不得眠加竹葉人參各一分○躁
大渴者加知母石膏各半兩○水停心下微吐逆
者加猪苓茯苓防己各一分○虛寒狀顛傷寒加
人參柴胡防風各三分

阿膠散

十二

妊婦傷寒安胎次治其病

阿膠煨

桑寄生

白木吳者佳

人參

白茯苓

各等分
瓦上煨

右爲麤末每服抄五錢匕水一盞半煮八分去滓

溫服或爲細末糯米飲調服二錢匕日二服

白朮散

十三 妊婦傷寒安胎

白朮

黃芩

各等分新瓦上
並同煨合香

右鶴爲麤末每服抄三錢匕水一盞生薑三片棗

子一枚擘破同煎至七分去滓溫服但覺頭疼發

熱便可服三兩服即差若四肢厥冷陰證見者未

可服也

葱白湯

十四

妊婦傷寒憎寒發熱當發其汗無妊亦

可用

葱白

十莖

生薑

三兩

右以水三升煮取一升分作二服取汗爲度

蘇木芍藥湯

十五

妊婦傷寒或中時行洒淅作寒振

慄而悸或噦者

赤芍藥

廣陳皮

黃芩

黃連

甘草

炙

蘇木

各一兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半煎至八分去滓溫服衣蓋有汗出差若胎不安兼服阿膠散

黃龍湯

十六

妊婦寒熱頭疼黑黑不欲飲食脇下痛

嘔逆痰氣及差後傷風熱入胞宮寒熱如瘧并經水適來適斷病後勞復餘熱不解

柴胡

一兩

黃芩

人參

甘草

炙各一分半

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水二盞煮取一盞去滓溫服

柴胡石膏湯〔十七〕 姪婦傷暑頭痛惡寒身熱躁悶四

肢疼痛背項拘急唇口乾燥

柴胡四兩

甘草二兩

石膏八兩

右剉如麻豆大每服抄三錢七以水一盞生薑五片煎至六分去滓溫服不計時候若氣虛體冷加

人參四兩

枳實散〔十八〕

姪婦傷寒四日至六日已來加心疼腹

脹上氣渴不止食飲不多腰疼體重

枳實

一兩 麩炒 微黃

麥門冬

半兩 去心

陳橘皮

三分 湯浸 去白 麩炒

新麥冬作 一兩

別心疼腹 脹作心腹 脹則

右剉如麻豆大每服抄三錢七水一盞入生薑半分葱白七寸煎至六分去滓溫服

旋覆花湯

十九

姪婦傷寒頭目旋痛壯熱心躁

旋覆花

兩半

白朮

三分

前胡

一兩去蘆頭

赤芍藥

兩半

黃芩

三分

麻黃

三分去節根

人參

三分

石膏

一兩

甘草

半兩炙

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生薑半分煎取六分去滓溫服

麥門冬湯

三十

姪婦傷寒壯熱嘔逆頭痛不思飲食

胎氣不安並宜服。

別前胡作
半兩

人參 一兩
石膏 二兩
前胡 三分
黃芩 三分

葛根 半兩
麥門冬 半兩
去心

別本作竹
葉

右劉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半生薑四
片棗子二枚淡竹茹一分煮取八分去滓溫服

梔子大青湯 方十二
妊婦發斑變為黑色及尿血

別本青杏
各半兩

大青
杏人 去皮
黃芩 各一分
升麻 兩半

梔子人 各二兩

右劉如麻豆大每服抄五錢七以水一盞半細切

別目
和

葱白三寸煎取一盞去滓溫服

蘆根湯 三十二 千金治妊娠熱病頭痛壯熱心煩嘔吐

不下食

知母 四兩 青竹茹 三兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半入生蘆
根一握粳米一撮煎至一盞去滓溫服盡更作差
止

塗臍法 二十三 治妊娠遭時疾身大熱塗之令子不落

召伏龍
肝散

竈中心黃土

右用水調塗臍下乾復易塗差乃止一方酒和塗方五寸又淋清和塗之並佳

葱白豉湯

三十四

治妊娠熱病

葱白

二兩半

豉

半升

右以水三升煮取一升分作二服取汗爲度

葱白一物湯

三十五

治妊娠熱病主安胎若胎已死者

服之須臾胎出

葱白

二把

右以水一升煮令熟服之取汗食令盡

葛根壹物湯

三十六

治妊婦熱病煩悶

葛根汁

每服一小盞如人行五里再一服如無生者用乾葛

右咬咀煎濃汁服

梔子五物散

三十七

廣濟療妊娠傷寒頭痛壯熱

梔子

前胡

知母

各二兩

黃芩

一兩

白石膏

四兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎至一

盞去滓溫服

題本前胡
六分石膏
十二分知
母四分梔
子四分大
青四分黃
生五分竹
茹三分薑
白二分

前胡七物湯

三十八

治妊娠傷寒頭痛肢節煩疼壯熱

前胡

知母

梔子人

各二兩

石膏

四兩

大青

黃芩

各一兩半

甜竹茹

三分

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半葱白三

莖煎至一盞去滓溫服

升麻六物湯

二十九

救急療妊娠七月傷寒壯熱赤斑

變黑溺血

升麻

梔子人

各二兩

大青

杏仁

去皮

黃芩

各一兩半

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一小盞半入葱
白三莖煎至一盞去滓溫服

○產後藥方

陽旦湯

三十

治婦人產後傷風十數日不解頭微痛

惡寒時時有熱心下堅乾嘔汗出

方在十八卷
一百一十六

治瘧法

三十一

婦人產後血虛多汗喜中風身體強直

口噤背反張作瘧治之

法在第六
卷中

一方用荆芥穗

不以多少微炒爲細末好酒調五錢七服之不過再
服

神功圓 三十三 治婦人產後亡津液大便多秘或譫語

煩躁不可用湯液宜神功圓用青木香湯吞下 方在十八

卷六十八

桂心牡蠣湯 三十三 婦人產後頭疼身體發熱煎治腹

內拘急疼痛

桂心 三兩 黃芩 二兩 白芍藥 乾地黃

牡蠣 煨各五兩

右剉如麻豆大每服抄五錢匕以水一盞半煎至

一盞去滓溫服

蜀漆湯

三十四

婦人產後寒熱往來心胃煩滿骨節疼

痛及頭疼壯熱日晡加甚又如瘧狀

黃耆

五兩

生地黃

一斤

蜀漆葉

一兩

桂心

甘草

炙

黃芩

各一兩

知母

芍藥

各二兩

右剉如麻豆大每服抄五錢七水一盞半煎取一盞去滓溫服

增損柴胡湯

三十五

婦人產後虛羸發熱飲食少腹脹

或往來寒熱等疾

柴胡

三錢

人參

白芍藥

半夏

湯泡

甘草

炙

陳橘皮

川芎

各三分

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一大盞生薑三

片棗子一枚煎至七分去滓食後溫服日三

竹葉防風湯

三十六

婦人產後傷風發熱面赤喘而頭

痛

竹葉

半把

防風

人參

桂枝

去皮

桔梗

甘草

炙各半兩

葛根

一兩半

右剉如麻豆大每服四錢水一盞半生薑三片棗

子一枚煎至八分去滓溫服衣蓋汗出差○頸項

強加附子炮去皮臍一錢同煎○嘔者加半夏一錢

三物黃芩湯

三十七

婦人草薺中傷風四肢苦煩熱頭

疼與小柴胡湯頭不疼但煩與此藥

黃芩

半兩

苦參

一兩

乾生地黃

二兩

右判如麻豆大每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服

小柴胡湯

三十八

婦人產後亡血汗多故令鬱冒其脈

微弱不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而

厥厥而必冒胃家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽
上出故但頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽
氣獨盛故當汗出陰陽乃復所以便堅者噤不能食
也方在第十二卷二十九

乾薑柴胡湯

三十九

婦人傷寒經脈方來初斷寒熱如

瘡狂言見鬼

柴胡

四兩去蘆

桂枝

一兩半

枳實根

二兩

牡蠣

一兩熬

乾薑

一兩炮

甘草

炙一兩

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至七分去

津溫服初服微煩再服汗出而愈

海蛤散

十四

婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫近

法當刺期門仲景無藥方此方疑非仲景然其言頗有理姑存焉

海蛤

滑石

甘草

炙各一兩

芒硝

半兩

右搗羅爲散每服二錢鷄子清調下小腸通利則胃膈血散臆中血聚則小腸壅小腸既壅臆中血不流行宜用此方若小便利血數行更宜桂枝加紅花二兩發其汗則愈

活人書卷第二十

此一卷論小兒傷寒小兒大人治法一般但小
分劑藥性差涼耳尋常風壅發熱鼻涕痰嗽煩
渴惺惺散主之咽喉不利痰實咳嗽鼠粘子湯
主之頭額身體溫熱大便黃赤腹中有熱四順
散連翹飲三黃圓主之頭額身體溫熱大便白
而酸臭者胃中有食積雙圓主之小兒無異疾
惟飲食過度不能自節心腹脹滿身熱頭痛此
雙圓悉治之小兒身體潮熱頭目碎痛心神煩

躁小便赤大便秘此熱劇也洗心散調胃承氣湯主之頭疼發熱而佷人惡寒者此傷寒證也升麻湯主之無汗者麻黃黃芩湯有汗者升麻黃芩湯皆要藥也小兒尋常不可過服涼藥胃冷虫動其證與驚相類醫人不能辨往往服進驚藥如腦麝之類逐痰發吐胃虛而成慢驚者多矣小兒須有熱證方可踈轉仍慎用圓子藥利之當以大黃川芎等吹咀作湯液以蕩滌蘊熱蓋圓子巴豆乃攻食積耳

洗心散 治遍身壯熱頭目碎痛背膊拘急大熱衝
上口苦唇焦夜卧舌乾咽喉腫痛涕唾稠粘痰壅
食不進心神躁熱眼澁睛疼傷寒鼻塞四肢沉重語
聲不出百 節疼痛大小便不利熨豆瘡時行瘟疫
狂語多渴及小兒天吊風夜驚啼並宜服之

當歸

四兩 炒

芍藥

四兩 生用

甘草

四兩 炙

荆芥

四兩

白朮

一兩 炙

麻黃

四兩 去節 炙

大黃

四兩 以米泔水浸一炊 間漉出令乾慢炒取熟

右爲末每服二錢水一盞半生薑一片薄荷二葉

煎至八分放溫和滓服了仰臥仍去枕少時如五臟壅實煎四五錢七若夏溽轉則熱服

惺惺散_三治小兒風熱及傷寒時氣或瘡疹發熱

桔梗

細辛

人參

白朮

甘草

炙

瓜樓根

茯苓

川芎

各等分

右搗羅爲末每服二錢用水一盞生薑二片薄荷二葉同煎七分服三歲已下作四五服五歲已上分二服凡小兒發熱不問傷風傷寒風熱先與此散數服往往輒愈

四順散_巨 解大人小兒腸熱退壅盛涼心經

大黃_熬

甘草_炙

當歸_{酒洗}

芍藥_{各等分}

右爲細末每服二錢水一盞薄荷三葉煎七分溫服小兒量歲數與之

麻黃黃芩湯_四 治小兒傷寒無汗頭疼發熱惡寒

麻黃

_{去節}

黃芩

赤芍藥

_{各半}

甘草_炙

桂枝

<sub>去皮各半兩
或作一分</sub>

右搗羅爲細末每服一錢或二錢暖水調下日進三服煎治天行熱氣生豌豆瘡不快煩躁昏憤或

出時身尚疼熱

升麻黃芩湯

五

治小兒傷風有汗頭疼發熱惡寒

升麻

葛根

黃芩

芍藥

各三錢

甘草

一錢半炙

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至六分去滓

溫服瀉者不可服若時行瘡豆出不快煩躁不眠

者加水香一錢半

甘露飲子

六

治傷寒壯熱口渴及胃中客熱口臭不

思飲食或饑煩不欲食齒齲腫疼膿血不住口舌咽

中有瘡赤眼目臉重不欲開瘡疹已發未發並宜服之

天門冬

麥門冬

並去心培

甘草

炙

熟乾地黃

枳殼

麩炒去穢

枇杷葉

去毛

黃芩

生乾地黃

石斛

去苗

山茵陳

右各等分咬咀每服三錢水一盞煎至六分去滓

溫服食後臨卧

雙圓

七

治小兒身熱頭痛飲食不消胃腹脹滿或心

腹疼痛大小便不利或下重數起未差可再服小兒

蒸候哺食減少氣息不快夜啼不眠是腹內不調並宜服此圓下之

甘遂

半兩

硃砂

二錢別研

麩核

取人四兩半別研

牡蠣

二兩蒸

甘草

一兩一分半炙

麥門冬

去心二兩半

巴豆

六十枚去皮心膜研新布絞去油日中蒸之白如霜

右麥門冬甘草甘遂牡蠣四味爲極細末入巴豆硃砂麩核人合和一處搗二千杵更入少蜜搗和極熟旋圓半歲小兒服如荏子大一雙一歲小兒服如半麻子大分爲一雙二歲小兒服麻子大一枚

分一雙三四歲者服麻子大二圓五六歲者服麻子微大二圓七八歲者如小豆大二圓十歲者微大於小豆二圓常以鷄鳴時服如至日出時不下者投熱粥飲數合即下藥圓皆雙出也下利甚者濃煎冷粥飲之便止

石膏麻桂湯

治小兒傷寒未發熱欬嗽頭面熱

甘草

半兩炙

石膏

半兩

麻黃

一兩去節湯泡

芍藥

半兩

桂心

一分

黃芩

一兩

杏仁

十枚去皮尖

右咬咀每服二錢水一中盞生薑二片煎半盞去

滓服兒若甚小以意增減之

連翹飲〔九〕治小兒一切熱

連翹

防風

甘草

山梔子

各等分

右爲末每服二錢水一盞半煎七分去滓溫服

麥門冬湯〔十〕治嬰兒未滿百日傷寒鼻衄身熱嘔逆

麥門冬

三分
去心

石膏

寒水石

甘草

各半
兩炙

桂

三錢
半

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓

溫服

十物升麻湯 臣 治小兒傷寒變熱毒病身熱面赤口燥心腹堅急大小便不利或口瘡或因壯熱四肢掣掣仍作癩疾時發時醒醒後身熱如火者

升麻

白薇

麻黃

去根節

萎蕤

柴胡

甘草

各半兩炙

黃芩

一兩

朴消

大黃

釣藤

各一分

右剉如麻豆大每服三錢水盞半煎至七分去滓

下消再煎化溫服

六物黃芩湯

十二

治嬰兒腹大短氣熱有進退食不

安穀爲之不化

黃芩

大青

甘草

炙

麥門冬

去心

石膏

各半

桂三錢

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎七分去滓温

服

五物人參飲

十三

廣濟療小兒天行壯熱欬嗽心腹

脹滿

人參

甘草

各半

麥門冬

一兩

生地黃

一兩半如無只用
生乾地黃半兩

去心

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎
至七分去滓溫服

八物麥門冬飲

十四

治小兒天行壯熱欬嗽心煩

麥門冬

三兩
去心

甘草

炙

人參

各一兩

紫苑

升麻

各二兩

貝母

一分

右剉如麻豆大每服三錢水一盞入茅根半握煎
至七分去滓再入竹瀝少許重煎合和服

棗葉飲

十五

療小兒天行壯熱五日以後熱不歇者

棗葉

半握

豉

一合

麻黃

半兩
去根節

葱白

切一合

活人書 卷二十一
右件四味用童子小便二盞煎至一盞去滓分作
二服

○小兒瘡疹藥方

此一卷論小兒瘡疹與傷寒相類頭痛身熱足
冷脈數疑似之間只與升麻湯緣升麻湯解肌
兼治瘡子已發未發皆可服但不可踈轉此爲
大戒傷寒身熱固不可下瘡疹發熱在表尤不
可轉世人不學乃云初覺以藥利之宜其毒也
誤矣又云瘡痘已出不可踈轉出得已定或膿

血大盛却用疎利亦非也大抵瘡疹首尾皆不
可下小兒身熱耳冷尻冷咳嗽輒用利藥卽毒
氣入裏殺人也但與化毒湯紫草木通湯鼠粘
子湯出得大盛卽用犀角地黃湯解之若瘡痘
出不快煩躁不得眠者水解散麻黃黃芩湯升
麻黃芩湯活血散主之瘡黑倒靨猪尾膏無比
散龍腦膏子無不驗也若熱毒攻咽喉痛者如
聖湯瘡痘入眼決明散撥雲散蜜蒙花散通聖
散與蛤粉散主之治瘡疹之法無出此矣

升麻湯

十六

治傷寒中風頭痛增寒壯熱肢體疼痛

發熱畏寒鼻乾不得卧并治大人小兒瘡疹已發未發皆可服兼治寒暄不時人多疾疫乍暖脫著衣巾及暴熱之次忽變陰寒身體疼痛頭重如石者

方在第十

六卷

第一

犀角地黃湯

十七

治傷寒及溫病應發汗而不發汗

內有瘀血者及鼻衄吐血不盡內有餘瘀血面黃大便黑者此方主消化瘀血兼治瘡疹出得太盛以此

方解之

方在第十八卷入十六

麻黃黃芩湯

十八

治小兒天行熱氣生豌豆瘡出不

快益煩躁身重昏憤或瘡出身尙疼熱者

方在本卷第四

升麻黃芩湯

十九

治小兒時行瘡痘出不快煩躁不

眠加木香一錢半

方在本卷第五

化毒湯

二十

治小兒痘瘡已出未出並可服之

紫草

嫩而肥大者佳

升麻

甘草

炙各半兩

右剉如麻豆大作一服以水二盞糯米一撮煎至

一盞去滓量大小溫服

紫草木通湯

三十一

治小兒痘瘡

紫草

去蘆

木通

人參

茯苓

去皮

糯米

各寺

甘草

半之

右剉如麻豆大每服抄四錢七水一盞半煎至一

盞去滓澄清温温分服

鼠粘子湯

三十一

治痘癍欲出未得透皮膚熱氣攻咽

喉眼赤心煩躁者

鼠粘子

四兩

甘草

一兩

防風

半兩

荆芥穗

二兩

右爲細末每服二錢沸湯點服食後臨卧日進三

服大利咽膈化痰涎止咳嗽若春冬間常服免生

別防風
兩半

瘡癰老幼皆宜服

水解散

二十三

治天行頭痛壯熱一二日兼治胞瘡未

出煩躁或出尚身體發熱

大黃

黃芩

桂心

甘草

炙

芍藥

各一兩

麻黃

四兩去節湯炮焙研

右搗羅爲末患者以生熟湯浴訖以暖水調下二

錢相次二服得汗利便差強實人服二方寸匕此

調風實之人三伏中亦宜用之若去大黃卽春夏

通用

活血散

三十四

治瘡子或出不快

白芍藥末

一錢

右用酒調如欲止痛只用溫熱水調下

豬尾膏

三十五

治瘡子倒靨

小豬兒尾尖刺血一兩點入生腦子少許

右同研用新水調下立効

無比散

三十六

治瘡癬惡候不快及黑瘡子應一切惡

候

牛黃

一分

麝香

一分

龍腦

一分

膩粉

一分

研細

硃砂

一兩先研如粉

石同研細小兒一字大人半錢水銀少許同小豬
猪尾上血三兩滴新汲水少許同調服先寧穩得
睡然後取轉下如爛魚腸蒲桃穗之類涎臭惡物
便安小兒用妳汁滴尤妙

龍腦膏子

三十七

治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心

煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜早
治不爾毒入藏必死

梅花龍腦

一錢生者

右細研旋滴猪心血和圓如鷄頭子大每服一圓
心煩狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用溫
酒化下少時心神便定得卧瘡疹發透依常將息
取安也

如聖湯

三十八

小兒瘡癩毒攻咽喉腫痛

桔梗

一兩

甘草

生一兩

牛旁子

炒一兩

麥門冬

去心半兩

右爲細末每服二錢沸湯煎細細呷服入竹葉煎
調尤妙

決明散

三十九

治癩豆瘡入眼

決明子

一分

括樓根

半

赤芍藥

一分

甘草

一分

炙

右搗羅爲末每服半錢蜜水調下日進三服

撥雲散

三十一

治癩痘瘡入眼及生翳膜

桑螵蛸

真者一兩炙
今焦細研

右爲極細末入麝香少許令勻每服二錢生米泔

水調下臨服臥之

蜜蒙花散

三十二

治癩痘瘡並諸毒氣入眼

青箱子

決明子

車前子

各半

蜜蒙花

半錢

右爲細末用羊肝一片破開作三片摻藥令勻却

合定作一片以濕紙七重裹煇灰火中煨熟空心食之

通聖散

三十三

治癩痘瘡入眼及生翳

菉豆皮

穀晴草

去根各一兩

白菊花

二兩如銀黃甘菊花代之然不如白菊花

右搗羅爲末每服一大錢乾柿一箇生粟米泔水一盞共一處煎候米泔盡只將乾柿去核喫之不拘時候一日可喫三箇日淺者五七日可効遠者半月即愈

蛤粉散

三十三

治小兒瘡子入眼

殺睛草

蛤粉

各等分

右爲末每服一錢七猪肝二兩許批開摻藥卷了
青竹葉裹麻縷纏定水一碗煮令熟入收口甌瓶
內熏眼候溫取食日作不過十日便退

活人書卷第二十終