

癸巳新刊御藥院方

癸巳新刊御藥院方卷第二

較勘無差

治傷寒門

桂苓丸 治冒暑大渴飲水過多伏冷心腹脹滿見  
食欲嘔頭眩小便赤少大便滑瀉

桂

赤茯苓

五皮各兩

右二味爲細末煉蜜爲丸每兩作一十丸每服一  
丸細嚼白湯送下冷水化服亦得

敗毒散 治傷寒時氣頭痛項強壯熱惡寒身體煩  
痛及寒壅咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔噦寒熱並

皆治之

人參

洗去頭

茯苓

皮剗去

甘草

燒

前胡

去苗洗辨

芍藥

皮剗去

羌活

去苗

獨活

去苗洗辨

桔梗

去苗

柴胡

去苗

枳殼

炒去穰辨

桔梗

去苗

柴胡

去苗

右爲細末每服二分水一盞入生薑薄荷各少許同煎至七分去滓溫服不拘時候

小柴胡湯 治傷寒溫熱病身熱惡風頸項強急胸滿脹痛嘔噦煩溫寒熱往來身面皆黃小便不利大便秘硬或過經來解或潮熱不除及差後勞復

發熱頭痛婦人傷風頭痛煩熱經血適斷寒熱如  
癆發作有時及產後傷風頭痛煩熱此藥並皆治  
之

柴胡去蘆頭

半夏

湯洗乾研二兩

甘草

炙各

半錠

黃芩

人參頭去蘆

甘草三兩

右五味同爲粗末每服三大錢以水一盞半入生  
薑五片棗一个擘破同煎至七分濾去滓稍熱  
服不計時候小兒分作二服更量大小加減

五積散 調中順氣除風冷化痰飲治脾宿冷腹脹  
痛胸膈停痰嘔噦惡心或外感風寒內傷生冷

心腹痞悶頭目暗痛肩背拘急肢體怠惰寒熱往來飲食不進及婦人血氣不調心腹撮痛經候不調或閉不通並宜服之

蒼术

洗淨去皮二十四兩

桔梗

去蘆頭十一兩

枳殼

去穰炒熟

陳橘皮

去白去皮

麻黃

去根節各六兩

芍藥

白芷

當歸

去頭洗

甘草

剉

桂皮

去粗

半夏

湯洗七次

茯苓

去皮

川芎

去頭各三兩

厚朴

去皮

乾薑

去皮四兩

有除桂枳殼二味另爲粗末外一十三味同爲粗

末慢火炒令色轉搘冷次入桂枳殼末令勻每

服三分水一盞半人生薑三片煎至一中盞去  
滓稍熱服如冷氣奔衝心膈肺腹脹滿刺痛反  
胃嘔吐泄利清穀及痃癖癥瘕膀胱小腸氣痛  
卽入煨生薑三片鹽少許同煎如傷寒時疫頭  
痛體疼惡風發熱項背強痛入葱白三寸豉七  
粒同煎若偏覺惡寒或身不甚熱肢體拘急或  
手足厥冷卽入炒茱萸七粒鹽少許同煎如寒  
熱不調咳嗽喘滿入棗煎服婦人難產入醋  
合同煎服之並不拘時候

升麻葛根湯 治大人小兒時氣溫疫頭痛發熱肢

體煩疼及瘡癰已發未發疑貳之間並宜服之

升麻

葛根

甘草

芍藥

各十兩

右同爲粗末每服三錢用水一盞半煎取一中盞去滓稍熱服不計時候日進二三服以病氣去身清涼爲度小兒量力服之

金沸草散 治風化痰除頭目昏痛頸項強急、往來寒熱肢體煩疼胸膈滿悶痰涎不利咳嗽喘滿涕唾稠黏及治時行寒疫壯熱惡風

荆芥穗

四兩

旋覆花

去梗

前胡

去蘆

麻黃

去根節各二兩

甘草炙

赤芍藥

半夏

洗七次用生薑各一兩

生薑

右件同爲粗末每服二錢水一盞半入生薑三片

棗一个同煎至八分去滓溫服不拘時候有寒

邪則汗出如風盛則解利

木附湯 治風濕相搏身體疼痛不能轉側不嘔  
渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味

附子

炮去皮鹽綿切一兩半

白术

四兩

甘草

二兩

右搗白术甘草爲粗末入附子令勻每服二錢水

一盞半入生薑五片棗一个擘破同煎至一盞去滓溫服食前此藥暖肌補中助陽氣止自汗防已黃耆湯 治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩疼時自汗出灑淅惡風不欲去衣及治風水客搏腳膝浮腫上輕下重不能屈伸

防已

四兩

黃耆

五兩

甘草

二兩

白朮

三兩

右同爲粗末每服三錢水一盞半入生薑三片棗一个同煎至一盞去滓稍熱服不計時候服訖

蓋覆溫臥汗出差

水葫蘆丸 生津液止煩渴利咽喉

人參

乾葛

紫蘇葉

各二錢

烏梅肉

木瓜

甘草

炙各一錢

右爲細末煉蜜和丸每兩作三十九丸用一丸綿裹噙化嚥津不計時候或新水化服水得

梅蘇丸 止渴生津液

烏梅肉

白梅肉

乾木瓜

紫蘇葉

各半錢

甘草

半兩

白楂

二錢

麝香

研一錢

右爲末入麝香勻入乳糖淨入兩蜜一兩同煉和

爲劑每兩作二十九每服一丸細嚼嚥津不拘時候或新水化服亦得

沉香飲子 治飲冷過多短氣喘促心胸妨悶全可思食

沉香

半兩

紫蘇葉

二兩

白茯苓

去皮一兩

人參

一兩  
蘆頭去

右四味㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓

時時服

神解丸 治內外所傷骨節疼痛壯熱憎寒頭疼身

體拘急

朱砂

研

硇砂

研

黃蠟

各等分

右鎔蠟和成劑旋丸如菜豆大每服一丸冷水送  
下如人行一二里地以熱葱醋粥投汗出解

六一散 治身熱嘔吐泄瀉腸澼下痢赤白治癰閉  
淋痛利小便偏主腸胃中積聚寒熱益精氣通九  
竅六府津液去留結消畜水止渴利中除煩熱心  
躁治腹脹痛補益五臟大養脾腎之氣理內傷陰  
痿安魂定魄定氣藏傷咳嗽療飲食不下肌肉疼  
健忘止煩滿短氣藏傷咳嗽療飲食不下肌肉疼  
痛治口瘡牙齒疳蝕明耳目壯筋骨通血脈和氣

米只生  
血消水穀保真元解百藥酒食邪毒耐勞役飢渴  
寒熱辟中外諸邪所傷久服強志輕身駐顏延壽  
及解中暑傷寒疫癘飢飽勞損憂愁思慮恚怒驚  
恐傳染并汗後遺熱勞復諸疾并解兩感傷寒能  
令偏身結滯宣通氣和而愈及婦人下乳催生并  
產後損液血衰陰虛熱甚一切熱證並宜服之兼  
不患妨發吹乳或已覺吹乳乳癆頓服卽愈乃神  
驗之仙藥也桂有孕婦人不得服恐滑胎也

滑石

六兩膩好者

甘草

一兩微炒

右爲極細末每服三錢蜜少許溫水調下或無害

亦得無時日三服或欲冷飲者新水調下亦得  
解利發汗煎葱白豆豉湯調下四錢併三四服  
以効爲度此藥是寒涼解散熱鬱設病甚不解  
多服無害但有益耳

生薑附子湯 治痰冷澼氣胸滿短氣嘔沫頭痛飲  
食不消化亦主平風

附子

炮製去皮  
臍細切

每服三錢水二大盞入生薑一十片煎至一盞去  
滓溫服空心食前

四君子湯 治煩熱躁渴

白茯苓去皮

人參去蘆頭

甘草微炙

白术各等分

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓放溫服

不計時候

白术散 治諸病煩渴津液內耗不問陰陽服之止

渴生津液

白术

人參去蘆頭

茯苓去皮

甘草炙

薑香葉

木香各一兩

乾葛二兩

右爲粗末每服三錢水一大盞煎至七分去滓溫

服不計時候

福壽二味散

乾薑生用

石決明

各等分

右爲細末每用藥一錢用男兒津唾於左手心內

調稀稠得所不犯婦人手

桂漿

生蜜三斤

熟水四升

赤茯苓

去皮爲末三兩

大麥蘖末半斤

細麴末半斤

桂

去皮爲末三兩

杏仁湯浸去皮一百

研如泥

右用前項藥蜜杏泥并水一處攪勻了和水共量

得三大紅盞入於磁罐子內或磁瓶內以油子  
封口上用數重紙蓋泥固濟入冰窖內三日方  
熟綿濾去滓水浸飲之

化水丹 消化水飲

牡蠣燒二兩

甘草炒二兩

蛤粉六兩

川烏頭

皮薄得淨一兩九錢炮去  
四隻秤重一兩四錢六分

右爲細末醋浸餅爲丸如梧桐子大每服十五

丸不拘時候溫水下

屠蘇 大辟瘟疫氣令人不染溫病及治傷寒

大黃

小椒子去

桂皮去粗

桔梗各一兩半

白朮一兩八錢

虎杖一錢

川烏頭

生去皮六錢

右件七味修製畢剉細一處和勻用絳袋子內盛於十二月晦日日中懸井中沉至泥正月朔日平明取出袋子放在酒中同煎數沸面向東戶飲之屠蘇之飲先從小飲至大自意飲之一人飲一家無病一家飲一里無病飲屠蘇三日後其滓還置井中能仍歲飲可世無病當家內外片中皆悉注大藥辟瘟疫氣

自是後每遇大汗出後表證已解心胸大煩渴

欲飲水及吐或下後七八日邪毒不解熱結在裏表裏俱熱時時惡風大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者宜服之又治夏月中暑毒汗出惡寒身熱

而渴

石膏五斤二十

知母一百兩十五

甘草七兩五

右爲末每服三錢水一盞半人糯米三十餘粒煎至一盞濾去滓溫服小兒量力少少與之或加人參少許同煎亦得食後服此藥立夏後立秋前可服春時及立秋後并亡血虛家並不可服  
桂苓甘露散 治飲水不消嘔吐瀉利流濕潤燥宜

通氣液水腫腹脹泄瀉不能止者兼治霍亂吐瀉

下利赤白止煩渴解暑毒大有奇効兼利小水

白茯苓

去皮

白术

去皮

寒水石

另研細二兩

甘草

炙一兩

澤瀉

各一兩

滑石

別研二兩

桂

去粗叉半兩

右件爲細末或煎或水調三二錢任意或入蜜少許亦得

荔枝膏

烏梅

八兩

桂

一十兩

乳糖

二十六兩

生薑

五兩取汁

麝香

半錢

熟蜜

四十兩

右用水一斗五升熬至一半濾去滓下乳糖再熬候糖鎔化開入薑汁再熬濾去滓俟少時入麝香用如常法服

牛黃七寶丹 治傷寒時疫熱毒暑病心胸痞塞或發黃發斑狂躁迷悶及久經取轉不較蘊毒滯積潮熱

牛黃

研

龍膽

研

麝香

別研各半錢

朱砂

研二錢半

白麵

半兩

寒水石

燒通赤二兩半

輕粉

研半兩

右件同研勻滴水和作二十丸每服一丸澄清水

化下小兒化半丸不拘時候

桂沉漿

紫蘇葉

烏梅肉各一兩

沉香三錢

乳糖六兩

右件四味用水三碗熬至二碗濾去滓入桂漿一升半合和作漿飲之滲濕逐飲順氣止渴

桂芥白朮丸 消痰逆止欬嗽散瘀滿壅塞開堅結痛悶進飲食調和臟腑無問寒濕熱嘔吐瀉痢皆能開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而無并解酒毒兼療肺痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服

名醫門  
卷之二  
之利止爲度後以隨證調之

乾生薑

棟桂各一

茯苓皮去

半夏各一

白术

澤瀉

紅皮湯浸片去

根各半兩

右爲細末麵糊爲丸小豆大每服二三十丸生薑湯下日進三服病在膈上食後在下食前在中卽不計時候或一法更加黃連半兩黃蘖二兩水丸取効愈妙

桂苓甘露散 消飲止渴去煩生津通利小便

桂皮

粗

茯苓皮去

去

白术各半

半

甘草

四兩

澤瀉

兩

寒水石

石膏

各一兩

滑石

二兩

右件爲極細末欲冷飲者新水調下不拘時候或  
只以沸湯亦得

燈皮丸 調中順氣生津止渴

沉香

白朮

各半兩

木瓜

乾者去皮

烏梅肉

各一兩

橙皮

去白焙五錢

白茯苓

去皮二錢

糖霜

各二兩

乾生薑

二錢半

右件搗羅爲細末用甘草膏子和成劑每兩作二十  
五丸欲作渴水用水化開寒熱溫涼任意飲

之欲噙化亦得

小柴胡加桂湯 治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡

八兩

人參

甘草

炙

半夏

洗七次切

黃芩

桂

去粗皮三兩

右剉如麻豆每服抄五錢匕水一盞半生薑七片  
棗二箇煎至八分去滓取六分清汁溫服日三  
夜二若渴者去半夏加人參桔梗根同煎服之  
交解飲子 治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻

草豆蔻

各二個白麵裹煨赤色去麵各

生用一个

厚朴方二寸

炙熟一半用生薑汁涂一半生用

甘草大者熟一寸半生用

生薑

二塊如棗各一塊紙裹煨熟一塊生用濕

右件生熟各破剉碎同勻每服分一半用水一椀煎至一大盞去滓溫服空心

七棗散 治脾寒瘡疾

川烏頭大者一箇

炮良久移一處再炮凡七次炮去皮膚

右爲細末都作一服用大棗七箇生薑十片葱白七寸水一椀同煎至一大盞疾發前先食棗次溫服只一服差雖然烏頭性熱以七處炮熟散其

熱性服之必効

柴胡桔樓根湯

治瘧疾往來寒熱煩渴引飲

柴胡

去苗三分

黃芩

去黑心

人參

去蘆

甘草

炙剗各三分

桔樓根

剗兩

右五味搗篩爲麅末每服五錢水一盞半生薑五片棗二枚同煎至一盞去滓不計時候細細服七珍散 治瘧後及傷寒中暑後宜服此調胃養氣進食此方溫平不熱服之十日外飲食倍常

人參

去蘆頭

白朮

黃耆

山芋

白茯苓

去皮去黑心

粟米

炒

甘草

炙半兩

上

右搗羅爲細末每服二錢水一盞生薑二片棗一个同煎至七分去滓食前溫服

草果飲子 治寒熱往來煩渴頭痛或但寒但熱方

草果子仁四枚

人參去頭半錢

半夏一錢頭中樣者沸

大棗十三枚

湯浸洗七次

甘草炙半錢

大棗三枚

烏梅三枚去核

生薑三兩一塊

右件㕮咀用水一大碗同煎至一盞去滓五更時

溫服

瓜蒂散 治太陽經頭痛寒熱方

瓜蒂十枚

川山甲鱗一片瓦上焰焦

右爲細末每用一劄耳許右鼻內噙大有神功  
治瘡方如合時具冠帶向神堂前旋看呪曰  
弟子不爲自身爲五姓瘡病

白僵蠶

一個直者切作七段用綿裹定撲爲丸用朱砂爲衣

右只作一服日未出面向東用左手插寅文用桃  
柳枝煎湯送下

香蘇散 治四時瘟疫傷寒

香附子

四兩慢火炒去毛拜二兩不一兩

陳橘皮去白

甘草一兩

香蘇葉

四兩

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服

不抱時候日進三服

竹葉石膏湯 傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐

淡竹葉

半把  
重六錢

石膏

四兩  
杵碎

人參

甘草

各半  
州

麥門冬

一兩  
半

半夏

二分  
半洗

右剉如麻豆大每服抄五錢匕水一盞半入粳米百餘粒煮取八分米熟湯成去滓溫服

五苓散 治傷寒溫熱病表裏未解頭痛發熱口燥咽乾煩渴飲水或水入卽吐或小便不利及汗出表解煩渴不止者宜服之又治霍亂吐利躁渴引飲

澤瀉剉二兩

豬苓去皮一十五兩

桂去粗皮一十兩

茯苓去皮二十五兩

白术去蘿頭十五兩

右爲細末每服二錢熱湯調服不計時候服訖多飲熱湯有汗出卽愈又治療熱在裏身發黃疸濃煎茵陳湯調下食前服之疽病發渴及中暑引飲亦可用水調服

大順散 治暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分清濁相干陰陽氣逆霍亂嘔吐臘膈不調

甘草剉長一寸許三十分

乾薑

杏仁去皮尖

桂去粗皮四斤

右先將甘草用白沙炒及八分黃熟次入乾薑同  
炒令薑裂次入杏仁又同炒候杏仁不作聲爲  
度用篩隔淨後入桂一處搗羅爲散每服二錢  
水一中盞煎至七分去滓溫服如煩躁卽冷服  
不計時候以沸湯點服亦得

香薷丸 治大人小兒傷暑伏熱躁渴脅悶頭目昏  
眩晌膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體倦怠不思  
飲食或發霍亂叶利轉筋並宜服之

香薷土

紫蘇土葉並用

乾木爪各兩

丁香

白茯神木

藿香葉土去梗

甘草炙

剉

檀香

燒已上各半兩

右爲細末煉蜜和丸每兩作三十九每服一丸至二丸細嚼溫湯下或新汲水化下亦得小兒服半丸不計時候

薑木湯 溫和中外退除寒濕治陽虛裏寒外挾風冷頭痛惡風戰慄多汗風濕相搏身體疼痛腰背強直轉側不能又療食寒飲冷內傷脾胃嘔逆吐痰不思飲食

川薑

炮

白术

炒

茯苓

各一兩

附子炮去皮附

甘草炙

各半兩

右爲麌末每服三錢水一盞半煎至八分去滓溫

熱服不計時候

豬苓湯 治姦浮煩渴不利小便不分

豬苓

澤瀉

滑石

赤茯苓

阿膠各等分

右爲麌末每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫  
服不拘時

丹砂丸 治痃寒溫瘧更作證候悉皆治之

丹砂

研一

常山

搗末三分

右件二味研勻煉蜜爲丸如梧桐子大先一日一

更時服三丸溫米飲送下更作日平且時服三  
丸溫米飲送下

茯苓桂枝白朮甘草湯 治心下逆滿氣上衝胸時

發煩渴

白茯苓去皮四兩

甘草炮

白朮各二兩

官桂三兩

去粗皮

右咬咀每服五分水一大盞煎至七錢去滓溫服

不拘時候

增損白朮散 生津止渴順氣下痰

白朮

葛根

茯苓去皮

藿香葉

人參

木香

各一  
兩

陳皮二  
兩

乾生薑一  
錢

右爲麩末每服五錢水一大盞半煎至七分去滓溫服不計時候或涼服亦得

百解丸 解内外傷頭痛壯熱增寒腹脹喘癇

辰砂

研半  
兩

硝砂

研一  
分

巴豆

去皮心膜一  
錢

黃蠟

半  
兩

右除黃蠟外同研令勻人前黃蠟溶開和成劑丸如菜豆大每服二丸新水送下後少時用熱粥投之汗出立愈

御藥院方卷第二

癸巳新刊御藥院方卷第三

較勘無差

治一切氣門上

平胃散 治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺  
痛口苦無味胸滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色  
萎黃肌體瘦弱怠墮嗜臥體重節痛常多自利或  
發霍亂及五噎八痞膈氣反胃並宜服之

厚朴

去蠟皮薑汁炒

蒼术

去粗皮米汁浸一宿五斤

陳皮

去白三斤二兩

甘草

剉炒二兩

人參

茯苓

各二兩

右爲細末每服二錢以水一盞入生薑二片草薑  
一个同煎至七分去薑棗稍熱服空心食前入  
鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣煖胃化宿食  
消痰飲辟風寒冷溫四時非節之氣或以棗肉  
爲丸小豆大每服五十丸溫生薑湯送下空心  
食前服

恩食丸 生津大進飲食

烏梅肉

大麥蘖

神麴

碎炒各一兩

乾木瓜

桂皮

茯苓

去皮一兩

人參各

釐頭半兩

乾生薑

二錢

甘草

炙三錢

右爲細末煉蜜和丸每兩作一十九每服一丸細  
嚼白湯下不以時候日進三服或作小丸如桐  
子大每服一丸亦可

木香三稜丸 治胸膈痞悶心腹脹滿脇肋疼痛寬  
中順氣化痰消食

木香

一兩

三稜

炮二兩

蓬莪术

炮二兩

大麥蘖

炒四兩

神麴

炒二兩

白术

四兩

陳皮

去白二兩

乾薑

炮二兩

黑牽牛

微炒六兩

一方用牽牛頭末

取六兩

右爲細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服三

卷之二  
五十丸食后生薑湯下

助氣丸 治諸膈氣三焦痞塞升降陰陽蠲去寒濕  
胸膈滿悶背膂引痛心腹膨脹諸虛動氣久而不  
散蘊結成積痃癖氣塊飲食不下嘔吐痰逆噫氣  
吞酸氣短煩悶並皆治之常服去停飲和脾胃進  
飲食寬中順氣消積滯

京三稜

炮

蓬莪术

炮各二斤

白朮

青皮

去白

一兩

陳皮

去白各十五兩

檳榔

枳殼

去穰炒

木香

各十兩

右件八味同爲末水煮麵糊爲丸如梧桐子大每

服五十丸溫熱水下不拘時候

玄胡丸 解化傷滯內消飲食治吐利腹脹心腹刺  
痛癥瘕結氣蟲煩不安調順三焦安和脾胃

玄胡

當歸

青皮白

雄黃

飛

蓬莪朮紙

檳榔

木香

各四兩

荆三稜六兩

右爲細末入雄黃勻水麵糊爲丸如梧桐子大每  
服三十丸生薑湯下不拘時候

木瓜湯 調氣利膈消痰止嗽治胸膈煩悶口乾多  
渴治脚氣

木瓜一斤去皮子切作片

鹽白好

甘草

生薑四兩切作片

右一處拌勻磁盒器內淹一宿焙乾搗羅爲細末  
每服一分沸湯點服不拘時候

思食調中丸 治脾胃久弱三焦不調胸膈痞悶肢  
體倦怠嘔逆惡心飲食進退氣道不勻

神麌炒

麥蘖炒

半夏麌

陳皮去白

烏藥各一兩

檳榔

人參各三分

木香

沉香各半兩

白朮半兩

右爲細末密調白麵糊爲丸如梧桐子大每服三

十九食前溫米飲下

治中湯 治脾胃傷冷物胸膈不快腹病氣不和

青皮法

陳皮法

甘草炙

人參去蘆頭

白朮

乾薑炮各等分

右爲麩末每服三分水一盞同煎至七分去滓溫  
服食前

沉香降氣丸 治胸膈痞悶氣不升降飲食減少肢  
體急墮嘔噦惡心臍腹疼痛常服利脾胃進飲食  
利胸膈

沉香

一兩半

香附子

五兩毛

蓬莪葛

炒

木香

各二兩

甘草

七兩

豆粉

輕炒九兩

薑黃

洗淨焙八兩半

右爲細末水浸蒸餅爲丸如櫻桃大却以本末爲衣每服三二丸至五丸細嚼生薑湯下溫水亦可不以時候

三脘痞氣丸 治三焦痞滯氣不升降水飲停積不得流行脇下虛滿或時刺痛並宜服之

木香

白豆蔻

去皮

青皮

去皮

陳皮

去皮

荆三稜

炮各一兩

大腹子

三分

半夏湯洗七次二兩

縮砂仁

檳榔

沉香各半

右爲細末水麵糊和丸如梧桐子大每服三十九  
漸加至五六十九陳皮湯下食後

丁香和胃丸 治脾胃不和中脘氣痞胸膈停痰嘔  
吐惡心脇肋刺痛飲食無味肢體倦怠常服溫中  
和胃止嘔進食

丁香

木香

沉香各半

藿香葉

白茯苓去皮

白豆蔻人

陳皮去皮

白术

人參各一兩

半夏薑製三兩

右件同爲細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每  
服三十丸至五十丸煎生薑湯下不拘時候

養胃進食丸 治脾胃虛弱心腹脹滿面色萎黃肌  
肉消瘦怠墮嗜臥全不思食常服滋養脾胃進美  
飲食消痰導氣去風寒暑濕冷邪氣

人參去蘆頭

一兩

甘草剝各一兩

白术

白茯苓去皮各二兩

各

厚朴三兩去粗皮生薑製炒各一兩

陳皮去白兩半

一

神麴炒半兩

大麥蘖炒黃兩半

一

蒼朮皮五兩去粗皮泡浸

右爲細末水麵糊和丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸食前用溫生薑湯下或粥湯下亦得  
調胃散 療陰陽氣不和三焦痞格五勞七傷山嵐  
瘴氣八般瘧疾四時傷寒頭目肢節疼痛心腹脹  
滿嘔吐惡心痰涎咳嗽手足虛腫五種膈氣噎塞  
寒熱水瀉諸病婦人胎前產後蓐勞脾胃不和飲  
食減少並皆主之

藿香

甘草

陳皮

半夏麪

每一兩用生  
薑三兩半

厚朴

每一兩用薑  
拌製

右五味各二兩同爲細末每服二分水一盞入生

薑二片同煎至七分和滓溫服不拘時候

白豆蔻散 治脾胃氣弱不進飲食

白豆蔻人

厚朴薑製

白术

沉香

陳皮去白

甘草炙各等分

右爲細末每服二錢水一盞入鹽少許同煎至七

分和滓熱服食前

杜翰林枳實丸 疗導老人及虛家風氣痰實腹肋

有妨諸飲癖積

枳實炒

桂

赤茯苓

人參

檳榔各

兩

白朮半

兩

黑牽牛八

兩

右爲細末稀麵糊爲丸如梧桐子大每服食後以  
橘皮湯下十五丸至二十九丸漸加如要不動時

臨臥熟水下五丸至十九丸別一方加木香半兩

逍遙丸 治膈實氣痞痰實喘促

半夏

湯洗七次  
焙三兩

枳實

麸炒

檳榔

赤茯苓

去皮各一兩

右爲細末生薑汁糊爲丸如豌豆大每服二三十  
丸食後溫生薑湯下

通膈丸 治胸中氣痞不通水飲停滯

檳榔

兩

枳實

四兩  
炒

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸至

五十九生薑湯下溫水亦得食後

赤茯苓丸

治痰飲氣痞

赤茯苓皮

檳榔

枳實

麸炒去核

白朮

半夏麴

各等分

右爲細末生薑汁麵糊爲丸如梧桐子大每服五十九溫生薑湯下或風眩頭痛則荆芥湯下食

後

杏橘湯 療一切氣不快之病服藥不下者

白朮

枳實

生用

香附子

大者去鬚

陳皮去白各四兩

甘草炙三兩

右爲細末每服二錢入鹽少許沸湯點或用生薑棗煎尤妙如傷風用葱白一寸生薑五片棗一枚水一盞煎至七分溫服不拘時候

陳橘皮湯 治胸痺速心氣閉喉中塞不通

陳橘皮去白法

桂去皮各二錢半

赤茯苓去黑皮各半兩

甘草炙一兩

枳殼去穰炒

桔梗實去皮各半兩

桔梗實去皮各半兩

右爲麩末每服五錢匕水二盞煎取一盞去滓空心溫熱服日午臨臥各一服

調胃丸 治陰陽氣不和三焦痞隔五勞七傷山嵐

毒氣八般瘡疾心腹脹滿嘔吐惡心痰涎咳嗽手足虛腫五種膈氣噎塞寒熱水滯諸病脾胃不和飲食減少並皆治之

藿香

陳皮去白

甘草炙

半夏麪

厚朴二兩  
薑製各

右爲細末生薑麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸食前生薑湯下

木香調中丸 治因飲食不調腸胃致傷心腹疼痛兩脇脹悶臟腑泄瀉米谷不化腹中雷鳴不思飲食或下腹血或便赤水並宜服之

木香

青皮法

陳皮法

檳榔

內豆蔻

麵裹煨熟去殼

京三稜

炮

調子皮

草豆蔻人

各一兩

右件爲細末水麵糊和丸如梧桐子大每服六十

丸食前熱米飲送下

枳實理中丸 治中脘痞滯氣不宜通積寒停飲食

入不化

人參

乾薑

炮

枳實

炒熟

白朮

甘草

炙

白茯苓

去皮各一兩

右爲細末煉蜜和丸每兩分作四丸每服一丸水

一盞同煎至八分去滓蒸服不計時候

來復丹 破癥開結分正陰陽治中滿不受攻擊下

虛不任峻補並宜服

硫黃細研甘草水酒令潤

消石細研用厚朴水酒令潤

右二味相和拌令勻同淹少時於文武火上炒令

二味氣氣相結取出

五靈脂

玄精石

青皮去白

陳皮去白各

右爲細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服三

十丸食前生薑湯下

理氣丸 治胸中噎塞氣滯不通酒食所傷常服消

導滯氣

枳殼

炒去殼少

蓬莪朮

各半兩

半夏

洗七次

薑黃

甘松

去土二錢各

陳皮

去白法

大麥蘖

炒各半錢半

右爲細末水麵糊和丸如梧桐子大每服五十九

煎陳皮湯下食後

沉香餅子 治食飲停積胸膈痞滿腹脹疼痛嘔吐

不止

京三稜

蓬莪朮

青皮

陳皮

紅豆

調子

棗

縮砂人

半夏

芫花

醋炒

乾薑

檳榔

薑黃

巴豆和皮

益智

去皮爲粗末慢火炒令褐色

桂去皮

木香

藿香葉

沉香

硇砂

另研細已上各等分

右件一十九味同爲細末打白麵糊和丸如小豆大捏作餅子每服七餅子至十餅子更量虛實加減溫生薑湯下食後服

木香順氣丸 治停飲遲化中氣不和

京三稜

炮

石三稜

鷄爪三稜

檳榔

木香

陳橘皮

半夏

生薑  
製

人參

去蘆頭

白茯苓

蘿蔔子

微炒已上各一兩

白豆蔻人

縮砂人

各半兩

黑牽牛

微炒頭末五兩

右件爲細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服四十九加至五十九食後溫生薑湯下

順氣寬中丸 治陰陽不和三焦痞膈氣行滯滯中滿不快咽噎悶恚氣奔急肢體煩倦可欲飲食常服宣通氣血

枳實

炒

檳榔

京三稜

炮

蓬莪术

煨

大麥蘖

炒

人參

薑

桑白皮

去粗皮剉各一兩

甘草

錢七

右件同爲細末每服二分入鹽末少許生薑二片

沸湯點服不拘時候

小沉香丸 和中順氣嗜食消痰又治飲酒後乾嘔

痰涎氣噎痞悶宜服之

沉香

六錢

香附子

去毛炮兩八錢

一

甘草

炙一兩

四錢

舶上丁香皮

二兩四錢

縮砂仁

四錢

芥智人

微炒一兩二錢

甘松

去土六錢

蓬莪术

錢

右爲細末湯浸餌餅爲丸如梧桐子大每服三十丸至四十九食後溫生薑湯下或嚼破更妙分氣丸 治胸膈氣痞癆實不化宜服之

木香

青皮去白

陳皮去白

白豆蔻人

縮砂仁

京三稜炮

蓬莪术炮

華澄茄

蘿蔔子

枳實

炒各一兩

黑牽牛

炒二兩

右件一一味爲細末麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸生薑湯送下食後

神保丸 治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消並皆治之

木香

胡椒半錢

巴豆十個去皮

心膜研

乾蠍一枚

右件四味爲末湯浸餌餅丸如麻子大硃砂爲衣  
用二錢每服三丸心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛  
柿蒂煨薑煎湯下血痛炒蕷醤湯下腎氣脇下  
痛茴香酒下大便不通蜜湯調橘榔下氣噎木  
香湯下宿食不消茶酒漿飲任下

和中益氣丸 治脾胃不和氣不升降嘔吐減食口

苦吞酸胸滿短氣肢體怠墮面色萎黃中焦虛痞  
不任攻擊藏氣久寒不受峻補又療心胸福福如  
滿五飲停滯不散常服和中益氣進美飲食或人  
便不通尤宜服之

木香

丁香各半兩

肉豆蔻

茴香

微炒

京三稜

炮

桂皮

白豆蔻人

人參

去蘿頭各一兩

縮砂人

二兩

青皮去白

陳皮

去白各四兩

右爲細末白麵糊和丸如梧桐子大每服六十丸  
至七十九食後溫生薑湯送下

小橘皮丸 調中順氣寬膈進食治心腹痞悶腹脹滿飲食遲化嘔噦惡心口苦無味肢體煩倦傳導不調或秘或泄

橘皮去白

木香

縮砂人

檳榔各二兩

青皮去白四兩

半夏六兩

洗七次

右爲細末生薑汁麵糊和丸如梧桐子大每服六七十丸食後溫生薑湯送下

導滯丸 治心腹痞滿脇肋刺痛嘔吐痰水不思飲食常服和中順氣消穀嗜食逐飲滲濕

黑牽牛

微炒取頭末四兩

檳榔半

青皮去白  
二兩

木香半錢  
一兩

胡椒半錢  
半兩

三棱半兩  
一兩

丁香皮一兩  
半兩

右爲細末入牽牛頭末令勻薄麵糊爲丸如小豆

大每服三十丸至五十九食後生薑湯下

三和丸 治三焦不和氣不升降心胸痞悶脇肋疼

痛因傷冷物傳化失常

枳實炒

檳榔

半夏

湯洗各二兩

木香

青皮去白

陳皮

去皮各二兩

赤茯苓皮去白  
各一兩半

丁香皮

蓬莪术

炒各三兩

白术各一兩半

京三棱四兩

蓬莪术

炒各三兩

白豆蔻人

沉香

桂皮去粗

藿香各一兩

黑牽牛

一斤微炒搗細頭末取半斤

右爲細末酒麴糊爲丸如梧桐子大每服三十九至五十九食後生薑湯下

調中丸 治脾胃不和內挾濕燠煩燥發渴不思飲食頭目昏眩小便不清胸膈悶痞脇肋腹脹

赤茯苓

皮去

白术

陳皮去穰

桔梗

豬苓

皮去

澤瀉

黃芩

大黃

桂去粗皮

枳殼

去膜

葛根

木通各一兩

半夏

湯洗一兩

滑石

各一兩

黑牽牛

生用六兩

右爲細末水煮薄麵糊爲丸如梧桐子大每服三十丸不拘時候溫水送下

枳殼丸 治中焦氣滯胸膈痞悶食欲遲化四肢困

倦嘔噦惡心常服升降滯氣消食化宿祛痰逐飲  
進美飲食每服五十丸溫生薑湯送下食後

京三稜

炮

蓬莪茂

炮各二兩二錢

白术

青皮

去白法

陳皮

去白法

白茯苓

去皮各一兩半

檳榔

木香

枳殼

麸炒去皮

半夏

湯洗七次一兩

黑牽牛

炒三兩

右件爲細末水麴糊爲丸如梧桐子大

橘皮枳殼湯 治胸膈氣痞短氣噎悶不得升降

枳殼麸炒去穰

半夏不製各二兩

陳皮不去白三兩

人參一兩

右各剉碎每藥一兩用泉水一升生薑片子十餘片同煎至八分一盞去滓稍溫服如大便滯入白蜜少許食後大劑如上喘用東流河水更妙此是半夏湯古語右四味用泉水五大升入白沙蜜四兩調勻用杓揚藥水二百四十過煮取一大升去滓分作三服一日當服盡食後服之

氣寶丸

治一切滯氣腹中積聚心胸痞滿脹悶喘

急及風邪久滯痰涎咳嗽酒食有傷脾胃滯氣膀胱寒氣攻注體背腰脊痛重不可俛仰大行順一

切滯氣爲氣藥之寶因名氣寶

船上茴香

拣淨銀石器內用紙隔炒香二兩

陳皮

湯去白焰一兩

大檳榔

一兩研羅爲末一分四味同

黑牽牛

四兩拣淨

用吳茱萸二兩慢火同炒茱萸焦只取牽牛子一向拌取未二兩

右件藥末同共拌勻煉蜜和劑爲丸如梧桐子大每服十九至十五丸米飲或木香湯下有痰卽用檳榔末半分水半盞煎數沸放溫下藥欲微

疎利加至三十九至四十丸看虛實稍空腹服之

法製生薑散 治飲酒過多或生冷停滯嘔逆惡心

不欲飲食

生薑

十兩切作片用青鹽捲過再白麵拌泡焙乾用之

桂皮

去粗皮

青皮

去

陳皮

去

半夏

生薑製

白术

各一兩

丁香

木香

草澄茄

各二兩半

繩砂人

白豆蔻人

白茯苓

各一兩半

甘草

炙

葛根

各半兩

右件爲細末每服一二分不拘時候溫酒調下

丁皮丸 行滯氣利响膈進飲食

丁香皮

陳橘皮去白

京三棱

切燙

檳榔

各一兩

青木香

一分

麝香

二別研兩

蓬莪藶

半兩

右件搗羅爲麩末微炒再搗爲細末水煮麵糊和丸如菜豆大每服七丸至十九不計時候溫生薑湯送下胸膈滿悶用橘皮湯嚼破十九下丸或加至六十九至八十九如胸中滿悶用橘皮湯嚼破二十九下五十丸不計時候

荆蓬煎丸 破瘀辦消癥塊及冷熱積聚胃膈疾悶

通利三焦升降陰陽順一切氣消化宿穀

荆三稜

二兩剝酒浸冬三日夏一日

蓬莪藾

二兩剝酒浸冬三日夏一日

日二味用去皮巴豆二十片同於銀石器內上文武火炒令乾黃色爲度揀去巴豆不用

木香

枳殼

楚炒去穰

青皮

湯浸去白

川茴香

微炒

檳榔

剝巴上一兩

右件藥七味修製畢搗羅爲細末水煮麵糊和丸如豌豆大每服三十丸溫生薑湯下食後商欽丸治胸膈痞滯氣不宣暢破瘀逐飲

商欽丸

麸炒去皮去核二兩

大皂角

去皮子研炙黃色二兩

青皮

白法

半夏

洗七返

檳榔

木香

各半兩

右件搗羅爲細末生薑汁作薄麯糊和丸如豌豆大每服四五十丸食後溫生薑湯送下

逐氣丸 治脾胃停飲攻注腹脇痞滯疼痛或停痰

飲留瀆胸膈痞悶不快或欬或喘并水氣流注四

肢浮腫及大腹滿

沉香

二錢

破故紙

微多

檳榔

各半兩

郁李仁

五十枚

黑牽牛

四兩一半生一半熟用

大皂角

一十錠

水浸捷授盡濾去渣慢火熬成膏

似是膏也

熬如稀鴨膏相

右將前五味爲細末用皂角膏和丸如梧桐子大  
每服十五丸至二十九生薑湯下食後如欲濟  
利臨時觀虛實加減服之若治腫滿及腹脹用  
葱白湯送下

木香塌氣丸 治胸膈氣痞痰實不化

木香

青皮

陳皮

白豆蔻人

縮砂人

荆三稜

炮

蓬莪朮

炮

草澄茄

蘿蔔子

枳實

炒熟各一兩

威靈仙

去土三兩

右爲細末水麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸

食後生薑湯送下

沉香散 治氣滯不通利飲食不得息者

沉香 木通

白牽牛

青皮桂枝各一兩

枳殼

炒去殼一兩

右爲麩末每服五錢水一盞半入生薑五片同煎至七分去滓稍熱服食後

七氣湯 治虛冷上氣及寒氣熱氣怒氣恚氣喜氣憂氣愁氣內結積聚堅牢如杯心腹絞痛不能飲食時發時止此藥主之

半夏

湯洗七次切作片子焙乾五兩

人參

去蘆頭一兩

桂去皮

甘草炙

右爲麁末入半夏令勻每服三錢以水一大盞入生薑三片煎至七分去滓稍熱服食前

木香三稜九 治脾胃氣弱則所食之物不能腐熟  
又與新穀相兼宿滯腹內噫氣生熟腹脹肺悶膈  
肚刺痛此藥寬利胸膈消化宿食

木香

桂去粗皮

青皮去

陳皮

去白各半兩

京三稜

燒

荳根各三分

大麥蘖

炒

檳榔各一兩

右爲細末麵糊和丸如梧桐子大每服三五十九

食後生薑湯下

鵝舌香丸 治傷冷腹脹痞悶疼痛嘔逆痰水

黑牽牛

炒取頭  
末四兩

京三稜

炮一兩半

丁皮

檳榔

木香

各一兩

青皮

二兩

胡椒

半兩

右爲細末水煮麵糊爲丸如梧桐子大每服三十丸食後生薑湯下

小分氣丸 消滯氣利胸膈止心疼化酒食治毒腹

脇脹滿

荆三稜

醋浸一宿切  
作片焙乾用

牽牛

微

大戟各三兩  
細剉炒

甘遂各二兩  
碎炒黃色

芫花以醋炒  
一兩

右同杵爲末以醋煮麵糊爲丸如葵豆大每服十丸煎陳橘皮湯下不嚼破如大瘕腹脹膨滿氣滯如惡行動漸加丸數日進三服以微利爲度  
感應丸 治久積滯氣胸膈痞悶噫氣吞酸嘔逆惡心脇肋脹滿心腹痞痛水穀不消便利曠血痃癖氣塊發作有時內傷脾胃停飲不散飲食無味並皆治之

木香頭

去蘆

擗丁香各一兩半

肉豆蔻二十

乾薑一兩  
炮製

巴豆七十個去皮膜心

研細出盡油如粉

百草霜細研

杏人十個去尖

揀肥者去雙仁一百四

湯洗一宿去

宿去

一百四

蠟皮研極  
如膏

右七味除巴豆粉百草霜杏人三味外四味搗爲  
末與前三味同拌研令細用好蠟匱和光將蠟  
六兩溶化作汁以一重綿濾去滓更以好酒一  
升於銀石器內煮蠟溶滾數沸傾出候冷其蠟  
自浮於上取蠟稱用丸春夏修合用清油一兩  
於銚內熬令沫散香熟次下酒煮蠟四兩同化  
作汁就鍋內乘熟拌和如前項藥末秋冬合清

油一兩半同煎煮熬作汁和匾藥末以劑分作  
小鉗子以油單子裹之每服旋丸如葵豆大五  
七丸食後溫水下量臟腑虛實加減服之每兩  
作五錠

蓬莪朮丹 治久患癬痕積聚心腹疰悶飲食減少  
四肢困倦欲成勞瘵

蓬莪朮

京三棱

木香

白芍藥

鱉甲

各半兩

白术

人參

各一兩

當歸

二錢半

石斛同爲細末用浸餌餅爲丸如豌豆大每服三

十九食後溫粥飲下常服調和榮衛美進飲食

消積聚長肌肉

降氣橫榔丸 調順三焦升降陰陽美進飲食潤腸去燥

橫榔

二兩

杏人

一兩湯浸去皮尖核炒熟

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五十丸食後溫生薑湯送下

集香丸 消積磨塊去痰療癆治一切積滯不拘老弱虛損者得皆服餌

附子 二个各重五錢半以上者須得正坐好者炮裂去皮臍剜

依瓦兒

硝砂半兩水化開

木香七錢

草撥一兩

破故紙炒一兩

右將飛過硝砂末分在附子裏內却用剝出附子

末蓋口用和成白麵裹約半指厚慢火內燒勻

黃色去麵爲末却將元裹附子麵再爲細末醋

調糊爲丸如菜豆大每服十五丸至二十丸食

後生薑湯下

木香三稜丸 治宿食不消心腹痞悶噫氣吞酸破

癰癧消積塊順氣進食

木香半兩

丁香一分

京三稜酒浸一宿

蓬莪茂

隔夜一宿

枳殼

去穰

青皮

剉白

川棟子

剉

茴香

各一兩

巴豆

二十個去皮炒黃色不用巴豆

朱砂

半兩

右件八味同爲細末醋煮麵糊爲丸如菜豆大朱砂爲衣每服十五丸至二十九生薑湯下食後木香分氣丸 善治脾胃不和心腹脹滿兩脇脹脹胸膈注悶痰嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之大有效

木香

檳榔

青皮

馬交去白

陳皮

湯浸去皮

薑黃

玄胡

名醫別錄  
卷之三  
荆三稜

濕紙裹炮爲度捷碎

蓬莪茂

炮製

乾生薑

當歸

白朮

赤茯苓

去皮

肉豆蔻

已上各等分

右件一十三味爲細末白麵糊爲丸如小豆大每服三四十丸食後生薑湯送下日進三服忌馬齒生茄子秋冬加丁香爲妙

酒癥丸 善療男子婦人一切酒食所傷日久成積心腹脹滿不思飲食四肢無力時發寒熱涎瘻咳嗽兩脇刺痛及肚裏疼每服兩丸食後細嚼燒生薑溫酒送下傷食後溫水下心氣痛醋湯下若取

轉使物隱破兩丸臨臥冷水送下量虛實加減丸  
數常服食後一丸用茶酒任下有孕婦人不可服

寒食麵

斤半

神麴

三兩

雄黃

二錢

巴豆

五

十個

心膜不去皮

右同爲細末滴水爲丸如梧桐大寄乾用蜜棗同  
藥丸一處炒令棗焦爲度每服二三丸茶酒任  
下不拘時候

楂榔枳殼丸 寬中利膈行滯氣消飲食治胸膈噎  
塞腹脹滿心下痞痛大小便不利及一切氣滯  
不勻

檳榔

木香

丁香皮

厚朴

青皮

陳皮

當歸

玄胡

枳殼

荆三稜

蓬莪茂

雷丸

蘿蔔子

炒一兩

牽牛

二兩

杞子

上各半兩

右爲細末，醋麵糊和丸，如梧桐子大。每服五六十丸，食後生薑湯下。

人參湯

治諸氣咽塞憂結不散

人參

赤茯苓

去黑皮

白术

桂枝

去粗皮

京三稜

炮炙

甘草

炙

枳殼去殼  
炒

調梨勒皮炒

陳橘皮湯浸去  
白皮焙

檳榔剉各一兩

木香

草豆蔻去皮各半兩

右十二味麌搗篩每服五錢水一盞煎至七分

去滓溫服食後

通膈散 治胸中氣痞不通水飲停滯

檳榔二兩

枳實炒  
四兩

右爲細末每服二錢食後濃煎生薑湯調下

寬膈丸 療氣不升降胸膈痞結

木香

京三稜炒

青橘皮去白各半兩

各

半夏二兩  
洗七次 大腹子二錢  
半

右爲細末生薑汁麵糊爲丸如梧桐子大每服七十丸食後生薑湯下

法製陳皮 消食化氣寬胸利膈每服不以多少細嚼咽津無時

陳皮半斤  
兩切作條子去膜淨四

茴香二兩

青鹽四兩

甘草二兩

乾生薑半兩

烏梅肉半兩

白朮二錢

右件除陳皮外並爲細末用水一大碗藥末三兩同陳皮一處慢火煮後陳皮極軟控乾少時別

用乾薑末拌勻焙乾

育氣湯 通流百脈 謂暢脾元 補中脘 益氣海思進  
飲食大益臟虛 疼痛祛陰寒 止腸鳴

白术

丁香

人參

木香

白茯苓

藿香

縮砂人

肉豆蔻

草澄茄

甘草炙各半兩

乾山藥一兩

陳皮白

青皮去白各一分

右爲細末每服一二錢木瓜湯點服空心鹽湯點亦得

溫中降氣丸

治脾胃不和不思飲食心腹滿悶腹

脇刺痛嘔吐痰水噴醋吞酸飲食遲化或逆氣上  
衝或中滿虛痞胸膈不利常服消痞快氣進美飲

食

京三稜

煅

蓬莪藺

青皮

白

陳皮

去

乾薑

炮

良薑

剉

吳茱萸

湯

木香

已上各  
一兩

右爲細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服六七  
十丸食後生薑湯送下

寬中丸 治氣不升降痰涎鬱塞飲食不化

檳榔 麵裹  
燒熟

木香 二兩

半夏 二兩半  
薑裹

陳橘皮

青橘皮 各半

京三稜 半錢

牽牛

四兩微炒  
頭末二兩取

右件爲細末水煮麵糊爲丸如梧桐子大每服五  
十九丸食後生薑湯下

調中丸 剥判清濁升降水土流濕潤燥消飲除痰

赤茯苓

白术

桔梗

剉碎

澤瀉

陳皮

去白

乾葛

各一兩

滑石

枳殼

去穰

半夏

湯洗七次

各一兩半

豬苓

皮去

黃芩

木通

分量

黑牽牛

一兩

乾生薑

三錢

右爲細末白麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸  
生薑湯送下食後服

均氣散 治三焦滯氣不宣通

木香

桔梗

炒

廣茂

木通

各半兩

枳殼

炒去穰

青皮

去白各一錢半

京三棱

炮

甘草

炙各一兩

石爲細末每服三錢水一盞生薑三片同煎至七

分去滓食前溫服

十全丸 治心腹痞悶脇肋脹滿食少多傷

檳榔

枳殼

去穰炒

青皮

陳皮

去白

京三稜

茂地

縮砂人

各二兩炒

丁香

一兩

木香

一兩

香附子

炒四兩

右爲細末麵糊和丸如梧桐子大每服五十丸溫  
粥飲送下空心食前服

無礙丸 治脾胃受濕橫流四肢手足皆腫

連皮大腹子

一兩

京三稜

二兩溫火炮熟剉裹

蓬莪茂

二兩炮剉

檳榔

半兩

木香

一兩

右爲細末炒麥蘖麵糊和丸如梧桐子大每服五

十九溫生薑湯下食後

蔻效聖餅子 治積痰停飲留滯不散胃中噎悶胸  
肋刺痛噫醋吞酸不嗜飲食及宿有沉積攻衝膈  
脘痞悶並宜服之

安息香

研

南乳香

研

丁香

木香

川薑

炮

石三棱

剉各半兩

高良薑

荆三稜

剉

蓬莪茂

炮剉

粉霜

研各一兩

乾漆

一兩并碎

硇砂

牛兩并碎

右件藥一十二味除研藥外搗羅爲細末和勻用

石腦油溫就和丸如葵豆大捻作餅子每服五

餅至七鮮食後溫熱水送下

沉香人腹皮散 治脚氣腫滿沉重疼痛筋脈不利  
此證皆由濕氣鬱滯經絡所致服之宣通經絡使  
上下無礙血氣和平腿腳輕利爲效

連皮大腹子三兩

沉香剉

檳榔剉

桑白皮炒微

烏藥剉

荆芥穗

陳皮洗去穰  
焙乾秤

茴香炒

白茯苓去皮

木通剉

紫蘇子炒微

紫蘇葉

甘草炒各一兩

乾木瓜二兩半

枳殼越橘大穰

桔梗秤一兩半

右件十五味爲麩末每服五錢水一盞生薑五

片蘿蔔五大片同煎至七分去滓溫服食前日進二服十日之後一日進一服病愈卽止如無蘿蔔用蘿蔔子一分微炒搗碎同煎代之如覺大便乾燥卽服加減神功丸

木香 檳榔丸 疏導三焦寬利胸膈破瘀逐飲快氣消食通潤大腸

木香

檳榔

枳殼

炒

杏仁

去皮尖熟炒

青皮

去白各

半夏

炮

皂角

去皮炙

郁李仁

去皮二兩各备

右爲細末別用皂角四兩用漿水一椀搓揉熬膏

更入熟蜜少許和丸如梧桐子大每服五十九  
食後溫生薑湯下

木香枳實丸 治濕飲停積胸膈痞悶消痰快氣宿

食遲化

木香

枳實炒

乾生

薑各一兩

白术

澤瀉

縮砂人

檳榔

青皮去

赤茯苓去皮

半夏

湯洗七次各三兩

右爲細末水煮糊爲丸梧桐子大每服七八十

丸溫生薑湯下

鐵甕申先生交感丹

俞居易侍郎傳世人巾年精

耗神農常言百事心灰蓋緣心血少而火不能下降於腎腎氣慾而水不能上升至心中焦陽絕榮衛不和所苦者上則心多驚悸中則寒痞飲食減少下則虛冷遺泄甚至於陰痿不興藏氣滑泄愚醫徒知峻補下田非獨失真不能生水滋心而建僞立見衰悴夭折之由當自此始悲夫所以處此方廣濟迷惑然不可忽此藥品志心服之半年屏去一切暖藥又不可恃此而馳嗜慾然後力習秘固泝流之術其神效不可殫述質之天地切勿妄

傳居易之祖通奉遺訓云予年五十一歲過鐵甕先生授此秘術酷志行持服食一年大補平日所服暖藥一切屏盡而飲食嗜好不減壯歲此藥之力大矣今年八十五享天然之壽瞑目無憾獨此藥傳之理當普示羣生同登道果藥後有渴與牙藥同用之

茯神

四兩

香附子

一斤去毛用新水浸一夕炒令黃色

右爲末煉蜜和丸如彈子大每服侵晨一丸以後

降氣湯嚼下

降氣湯

茯神

二兩

香附子

半斤炒  
浸如前

甘草

一兩  
炙黃

右爲細末每服一分沸湯點服下

牙藥

香附子

五兩

右以生薑三兩研和滓汁浸香附子三錢炒焦黑  
有性爲末以青鹽二錢拌勻揩牙

順氣丸 治風濕毒氣攻疰腿膝或腫或疼降氣消

食

木香

青皮

桂榔各一

黑牽牛

三妙取頭末半兩

郁李仁

湯浸去皮別研半兩

麻子人

一兩半去皮別研

右六味除麻子人郁李人外爲細末入麻子人郁  
李人末同研勻細練蜜和丸如梧桐子大每服  
三十九丸加至五十丸溫麻人湯下或用生薑湯  
下亦得

和中丸 治脾胃怯弱陰陽不和三焦氣滯心腹痞  
悶嘔逆痰甚頭目不清困倦少力飲食減少肌體  
瘦瘁肢節煩疼常服和中順氣升降陰陽消痰止  
嘔長肌退困美進飲食

藿香葉

人參

陳皮各一

丁香

半兩

木香

半兩

白术

二兩

白茯苓

去皮半兩

半夏生

二兩  
湯洗  
薑汁浸

巴豆

二錢半  
炒焦與皮同  
不用

巴豆

同

右件爲細末水煮麵糊和丸如梧桐子大每服五

十九煎生薑湯下食前

大草澄茄丸 和脾胃美進飲食治腹胸虛滿消積

滯化痰飲

草澄茄

一兩

青皮

白

陳皮

白

廣茂

一兩

川丁皮

厚朴

去粗皮  
製各二兩

赤茯苓

去皮四兩

麥蘖

三兩  
炒

半夏

湯洗七  
次二兩

右爲細末生薑汁麵糊爲丸如梧桐子大每服六  
七十九不拘時候溫生薑湯下

御藥院方卷第三