

臨證指南醫案

臨證指南醫案目

卷二

欬嗽

吐血

失音

肺痿

[illegible]

臨證指南醫案卷二

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲同較

姪旦王堂

咳嗽

某^五三寒傷衛陽咳嗽。

川桂枝

五分

杏仁

三錢

苡仁

三錢

炙草

四分

生薑

一錢

大棗

二枚

某^三九勞傷陽氣形寒咳嗽 桂枝湯加杏仁

臨證指南醫案

卷二

咳嗽

一

某^四寒熱咳嗽當以辛溫治之。桂枝湯去芍加杏仁

某^五形寒咳嗽頭痛口渴。桂枝湯去芍加杏仁花粉

某咳嗽寒熱

杏仁 三錢 嫩蘇梗 一錢 桔梗 一錢 桑皮 一錢

象貝母 一錢 生甘草 三錢

王^三脈沉細形寒咳

桂枝 一錢 杏仁 三錢 苡仁 三錢 炙草 五分

生薑 一錢 大棗 二枚

吳^四咳嗽聲音漸窒診脈右寸獨堅此寒熱客氣包裹肺

俞臂則熱先以麻杏石甘湯

又葦莖湯

徐^四七瘧屬外邪。瘧止聲音不揚。必是留邪干於肺系。故咳
嗽不已。納食起居如常。中下無病。但以搜逐上焦。勿令
邪結。可望病已。

麻黃

杏仁

生甘草

射干

薤仁

某^二八風邪阻於肺衛。咳嗽面浮。當辛散之。

麻黃

先煎去沫五分

杏仁 三錢

生甘草 三分

生石膏 三錢

某^三十三

風襲肺衛。咳嗽鼻塞。當以辛涼解散。

杏仁

嫩蘇梗

桑皮

象貝

桔梗

薤仁

某女風熱上痺痰多咳嗽

杏仁

嫩蘇梗

橘紅

桑葉

白沙參

通草

夏五風鬱咳不止

薄荷

前胡

杏仁

桔梗

橘紅

桑皮

連翹

枳殼

風邪阻
數

方煩勞衛疎風邪上受痰氣交阻清竅失和鼻塞音低

咳嗽甚皆是肺病辛以散邪佐微苦以降氣爲治

杏仁

蘇梗

辛荑

牛蒡子

苡仁

橘紅

桔梗

枳殼

風濕

項二 風濕脉虛嗽

桑葉

薄荷

杏仁

象貝

大沙參

連翹

沈

脉右搏數。風濕嗆咳。

桑葉

杏仁

象貝

苡仁

瓜蒌皮

白沙參

某女

風濕發熱咳。

薄荷

連翹

杏仁

桑皮

地骨皮

木通

黃芩

炒查

某

十歲

頭脹咳嗽。此風濕上侵所致。

連翹錢

牛

薄荷七分

杏仁一錢

牛

桔梗一錢

生甘草三分

分

象貝一錢

某二風溫上受咳嗽失音咽痛

杏仁

薄荷

連翹

桔梗

生甘草

射干

風溫化燥

邱

向來陽氣不充得溫補每每奏效近因勞煩令陽氣

弛張致風溫過肺衛以擾心營欲咳心中先痒痰中偶

帶血點不必過投沉降清散以辛甘涼理上燥清絡熱

蔬食安閒旬日可安

冬桑葉

玉竹

大沙參

甜杏仁

生甘草

苡仁

糯米湯煎

宋二脉右浮數風溫干肺化燥喉間痒咳不爽用辛甘涼

潤劑

桑葉

玉竹

大沙參

甜杏仁

生甘草

糯米湯煎

某積勞更受風溫咽乾熱咳形脉不充與甘緩柔方

桑葉

一錢

玉竹

五錢

南沙參

一錢

生甘草

五分

甜水梨皮

二兩

文風邪鬱蒸化燥發熱後咳嗽口乾喉痒先進清肺

杏仁

花粉

蘇子

象貝

山梔

橘紅

薛三風熱咳。經月不止。

活水蘆根 桑葉

大沙參 生苡仁

地骨皮 象貝 滑石 橘紅

風溫化
燥傷胃
陰

某風溫客邪化熱。劫燥胃津。喉間燥癢。嗆咳。用清養胃

陰。是土旺生金意。金匱麥門冬湯

陸三陰虛體質。風溫咳嗽。苦辛開泄。肺氣加病。今舌咽乾

燥。思得涼飲。藥劫胃津。無以上供。先以甘涼。令其胃喜。

倣經義。虛則補其母

桑葉

玉竹

生甘草

麥冬

元米
炒

白沙參

蔗漿

某 外受風溫鬱遏內因肝膽陽升莫制斯皆肺失清肅
咳痰不解經月來猶覺氣壅不降進食頗少大便不爽
津液久已乏上供腑中之氣亦不宜暢議養胃陰以杜
陽逆不得泛泛治咳

麥冬

沙參

玉竹

生白芍

扁豆

茯苓

某 溫邪外襲咳嗽頭脹當清上焦

杏仁

桑皮

桔梗

象貝

通草

蘆根

某二咳嗽痰黃咽喉不利此溫邪上侵肺氣不清故耳

桑葉

川貝母

白沙參

杏仁

羌鈴

鮮枇杷葉

某二陰虧挾受溫邪咳嗽頭脹當以輕藥

桑葉

杏仁

川貝

白沙參

生甘草

甜水梨皮

某脉細數咳嗽痰黃咽痛當清溫邪

桑葉

杏仁

川貝

苡仁

羌鈴

鮮蘆根

又照前方加白沙參冬瓜子

某四脉右弦大咳嗽痰多黃此屬溫邪上伏之故

桑葉

杏仁

白沙參

南花粉

羌活

甜水梨肉

王六脉小數能食乾咳暮甚冬藏失納水虧溫伏防其失血用復脉法復脉湯去參薑桂

張七冬溫邪咳嗽是水虧熱氣內侵交驚蟄節嗽減用六味加阿膠麥冬秋石金水同治是瀉陽益陰方法爲調體治病兼方近旬日前咳嗽復作納食不甘詢知夜坐勞形當暮春地氣主升夜坐達旦身中陽氣亦有升無降最有失血之虞况體質肥柔氣易泄越當暫停誦讀數日可愈

陰虛感
溫邪

桑葉

甜杏仁

大沙參

生甘草

玉竹

青蔗漿

楊二

四形瘦色蒼體質偏熱而五液不充冬月溫煖真氣少

藏其少陰腎臟先已習習風生乃陽動之化不以育陰
驅熱以却溫氣泛泛乎辛散爲暴感風寒之治過辛泄
肺肺氣散斯咳不已苦味沉降胃口戕而腎關傷致食
減氣怯行動數武氣欲喘急封藏納固之司漸失內損
顯然非見病攻病矣靜養百日猶冀其安

麥冬

米拌炒

甜沙參

生甘草

南棗肉

沖入青蔗漿一杯

氣分熱

王五氣分熱熾頭脹痰嗽

連翹

石膏

杏仁

鬱金

薄荷

山梔

又照前方去山梔加蔓皮桔梗

范四脉左弱右寸獨搏久咳音嘶寐則成噎阻咽平昔嗜

飲胃熱遺肺酒客忌甜微苦微辛之屬能開上痺

山梔

香淡豉

杏仁

括蔓皮

鬱金

石膏

林氏宿病營衛兩虛茲當燥氣上犯暴涼外侮氣餒衛怯

肺先受邪脉浮數咳喘欲嘔上熱下冷宜先清化上氣

臨證指南醫案

卷二

咳嗽

七

有取微辛微苦之屬。

桑葉

杏仁

蘇梗

山梔

象貝

苡仁

糯米湯煎

王十歲嗽緩潮熱。程年陰虧氣熱所致。

地骨皮

錢三

青蒿

錢一

知母

錢一

生甘草

錢三

南沙參

錢一

川斛

錢三

某嗽已百日。脉右數大。從夏季伏暑內鬱。治在氣分。

桑葉

生甘草

石膏

苡仁

杏仁

蘇梗

史四濕鬱溫邪。總是阻遏肺氣。嘔咳脫痞。卽病形篇中諸

嘔喘滿皆屬於肺。不明口鼻受侵阻氣之理。清中疎導。乃過病所伐其無病之地矣。

鮮枇杷葉 杏仁

象貝

黑山梔

堯鈴

馬勃

又輕浮苦辛治肺。咳喘頗減。咽痛紅腫。皆邪窒既久。壅而成毒。壅乾不喜飲。舌色淡不紅。仍清氣分。佐以解毒。

雞子白

麥冬

大沙參

金銀花

萊豆皮

蔗漿

陸秋暑燥氣上受。先干於肺。令人咳熱。此爲清邪中上。當以辛涼清潤。不可表汗。以傷津液。

青竹葉

連翹

花粉

杏仁

象貝

六一散

又脉右大。瘧熱無寒。暑鬱在肺。當清氣熱。佐以宣通。營衛。桂枝白虎湯加麥冬。

又熱止。脉右數。咳不已。

知母

生甘草

麥冬

沙參

炒川貝

竹葉

汪女暑熱入肺爲咳。

花粉

六一散

杏仁

橘紅

大沙參

黑山梔皮

暑風

某九咳嗽。頭脹口渴。此暑風襲於肺衛。

杏仁 三錢

香薷 五分

桔梗 一錢

桑皮 一錢

飛滑石 三錢

絲瓜葉 三錢

倪三兩寸脈皆大。冷熱上受。咳嗽無痰。是爲清邪中止。從

暑風法。

竹葉

薑皮

橘紅

滑石

杏仁

沙參

潘氏久咳不已。則三焦受之。是病不獨在肺矣。況乎咳甚

嘔吐涎沫。喉癢咽痛。致咳之由。必衝脈之傷。犯胃擾肺。

氣蒸薰灼。淒淒燥癢。咳不能忍。近日晝暖夜涼。秋暑風

潮熱瘧泄。客氣加臨。營衛不和。經阻有諸。但食薑氣味
過辛致病。辛則泄肺氣。助肝之用。醫者知此理否耶。未
診脉右弦數。微寒熱。渴飲。擬從溫治。上焦氣分。以表暑
風之邪。用桂枝白虎湯。

王三

歲暑風入肺。煽熱咳嗽。防驚。

益元散

黃芩

竹葉

花粉

苡仁

地骨皮

張二
五形瘦脉數。驟涼暮熱。肺失和爲咳。小暑後得之。亦由
時令暑濕之氣。輕則治上。大忌發散。

大竹葉

飛滑石

杏仁

花粉

桑葉

生甘草

某咳嗽喉痛，湯瀉。

西瓜翠衣

三錢杏仁

六一散

桔梗

一錢

通草

一錢

桑葉

一錢

川貝

一錢

連翹

一錢

曹水穀不運，濕聚氣阻，先見喘咳，必延蔓腫脹，治在氣分。

杏仁

厚朴

苡仁

廣皮白

蘇梗

白通草

陸

二濕必化熱，薰蒸爲嗽，氣隧未清，納穀不旺，必薄味靜

養壯盛不致延損。

飛滑石

南花粉

象貝

苡仁

萊豆皮

通草

某渴飲咳甚大便不爽

石膏

花粉

通草

紫苑

木防已

杏仁

苡仁

濕痰阻氣

某雨濕寒熱汗出痰多咳嗽大小便不爽胸脘不飢臍

左室塞

杏仁

萊菔子

白芥子

蘇子

鬱金

萆皮

通草

橘紅

朱中虛少通濕痰多阻氣分咳嗽舌白

火濕熱

炒牛夏 茯苓 桂枝木 炙草 苡仁

馮 脉右弦大而緩形瘦目黃久嗽聲嘶而濁水穀氣蘊之濕再加時序之濕熱壅阻氣分咳不能已久成老年痰火咳嗽無性命之憂有終年之累

蘆根 馬勃 苡仁 浙茯苓

川斛 通草

陳 秋燥痰嗽氣促

桑葉 玉竹 沙參 嘉定花粉

苡仁 甘草 蔗漿

又 用清燥法

桑葉

玉竹

沙參

苡仁

甘草

石膏

杏仁

施脉沉弦爲飲。近加秋燥。上咳氣逆。中焦似痞。姑以辛

泄涼劑。暫解上燥。

括蕁皮

鬱金

香豉

杏仁

苡仁

橘紅

北沙參

山梔

胡六脉右勁。因疥瘡煩以熱湯沐浴。衛疎易傷。冷熱皮毛

內應乎肺。咳嗽氣塞痰多。久則食不甘。便燥結。胃津日

耗。不司供肺。况秋天降燥氣上加。漸至老年痰火之

象。此清氣熱以潤燥。理勢宜然。倘畏虛日投滯補益。

枯燥矣。

霜桑葉 甜杏仁 麥冬 玉竹 白沙參

天花粉 甘蔗漿 甜梨汁 熬膏

某四脈弦，胸膈痺痛，咳嗽頭脹。此燥氣上侵，肺氣不宜使然，當用輕藥以清上焦。

枇杷葉 桑葉 川貝 杏仁

冬瓜子 桔梗

某九十舌白咳嗽，耳脹口乾。此燥熱上鬱，肺氣不宜使然。當用辛涼，宜薄滋味。

鮮荷葉 連翹殼 大杏仁 白沙參

飛滑石

錢二

冬桑葉

錢一

某二邪燥肺陰咳嗽咽痛。補甚。

玉竹

南沙參

冬桑葉

川斛

玄參

青蘞漿

某二鼻淵三載。藥投辛散。如水投石。未能却除。辛辣炙燂耳。近復咳嗽音嘶。燥氣上逼肺衛使然。

杏仁

連翹

象貝

白沙參

桑皮

玃鈴

僧三脉右寸獨大。氣分咳。有一月。

桑葉

杏仁

玉竹

苡仁

沙參

茯苓

糯米湯煎

某脉右大。寤咳寐安。病在氣分。

桑葉

川貝

知母

地骨皮

梨汁

蔗漿

熬膏

朱女

肝陰虛。燥氣上薄。咳嗽夜熱。

桑葉

白沙參

杏仁

橘紅

花粉

地骨皮

糯米湯煎

陸女

燥風外侵。肺衛不宣。咳嗽痰多。不時身熱。當用輕藥。

以清上焦。

桑葉

杏仁

花粉

大沙參

川貝

菴豆皮

戎咽阻咳。兩月來聲音漸低。按脉右堅。是冷熱傷肺。

生雞子白

桑葉

玉竹

沙參

麥冬

甜杏仁

吳七歲

燥氣上逼咳嗽。以甘寒治氣分之燥。

大沙參

桑葉

玉竹

生甘草

甜梨皮

某十

燥熱內伏。發熱咳嗽口渴。

桑葉

杏仁

白沙參

連翹

國圖滑石

鮮蘆根

費

久瘧傷陰。久季溫舒。陽不潛藏。春木升舉。陽更泄越。

入暮寒熱。晨汗始解。而頭痛口渴咳嗽。陰液損傷。陽愈熾。冬春溫邪。最忌發散。謂非暴感。汗則重劫陰傷。迫成虛勞一途。況有汗不痊。豈是表病。診得色消肉燥。脈獨氣口空搏。與脈左大。屬外感有別。更有見咳不已。膠爲肺熱。徒取清寒消痰降氣之屬。必致胃損變重。嘗考聖訓。仲景云。凡元氣已傷。而病不愈者。當與甘藥。則知理陽氣。當推建中。顧陰液。須投復脈。乃邪少虛多之治法。但幼科未讀其書。焉得心究是理。然乎否乎。

炙甘草

鮮生地

麥冬

火麻仁

阿膠

生白芍

青蘗漿

又由陰傷及胃。痿黃食少。餐法當補養胃陰。虛則補母之治也。見咳治肺。生氣日僊矣。金匱麥門冬湯

某五脫痺咳嗽

鮮枇杷葉

三錢

以噤杏仁

三錢

桔梗

一錢

川貝

二錢

冬瓜子

三錢

蜜炙橘紅

一錢

周二秋燥從天而降。腎液無以上承。咳嗽吸不肯通。大便三四日一更衣。脉見細小。議治在臟陰。

牛乳

紫衣胡柿

生白蜜

薑汁

吳久嗽因勞乏致傷。絡血易瘀。長夜熱灼。議養胃陰。

北沙參

黃芪皮

炒麥冬

生甘草

炒粳米

南棗

某

喉痺咳嗽。脉右大而長。

生扁豆

麥冬

北沙參

川斛

青蔗漿

毛

上年夏秋病傷。冬季不得復元。是春令地氣陽升。寒

熱咳嗽。乃陰弱體質。不耐升泄所致。徒謂風傷。是不知陰陽之義。

北參

炒麥冬

炙甘草

白粳米

南棗

某

二病後咳喘。當清養肺胃之陰。

生扁豆

麥冬

玉竹

炒黃川貝

川斛

白粳米湯煎

徐仁形寒畏風。食減久嗽。是衛外二氣已怯。內應乎胃。陽脉不用。用藥莫偏治寒熱。以甘藥調。宗仲景麥門冬湯法。

張七八夏嗽緩。神倦食減。渴飲。此溫邪延久。津液受傷。夏令暴發泄氣。胃汁暗虧。筋骨不束。兩足痠痛。法以甘緩益胃中之陰。做金匱麥門冬湯製膏。

參鬚

二兩

北沙參

一兩

生甘草

錢五

生扁豆

二兩

麥冬

二兩

南棗

二兩

熬膏

湯二脉左堅數促。冬溫咳嗽。是水虧熱升。治不中穀。胃陰受傷。穢濁氣味。直上咽喉。卽清肺翼緩其嗽。亦致氣泄。

而嗽仍未罷。先議甘涼益胃陰以制龍相。胃陰自立可商填下。

生扁豆

米炒麥冬

北沙參

生甘草

冬桑葉

青蘘漿

錢氏 脉右數。咳兩月。咽中乾。鼻氣熱。早暮甚。此右降不及。胃津虛。厥陽來擾。金匱麥門冬湯去半夏加北沙參。某^十咳早甚。屬胃虛。

生扁豆

炒麥冬

大沙參

苡仁

橘紅

陳 秋冬形體日損。咳嗽吐痰。診脉兩寸促數。大便通而不爽。此有年煩勞動陽。不得天地收藏之令。日就其消。

乃虛症也。因少納胃衰。未可重進滋膩。議用甘味養胃。
陰一法。金匱麥門冬湯。

錢 久咳三年。痰多食少。身動必息。鳴如喘。診脉左搏數。
右小數。自覺內火燔燎。乃五液內耗。陽少制伏。非實火。
也。常以瓊玉膏滋水益氣。暫用湯藥。總以勿損胃爲止。
治嗽肺藥。諒無益於體病。

北沙參 白扁豆 炒麥冬 茯神

川石斛 花粉

肺火犯 范氏 兩寸脉大咳甚。脘悶頭脹。耳鼻竅閉。此少陽鬱熱上。
逆。犯肺。肺燥喉癢。先擬解木火之鬱。

胃火傷

羚羊角

連翹

梔皮

薄荷梗

苦丁茶

杏仁

薤皮

菊花葉

陸 婦

脉小久咳背寒骨熱知飢不食厭惡食物氣味此憂

思悵鬱皆屬內損。閱方藥都以清寒治肺不應。議益土泄木法。

炙甘草

茯神

冬桑葉

炒丹皮

炒白芍

南棗

尤氏 寡居煩勞脉右搏左澹氣燥在上血液暗虧由思鬱致五志煩煎固非溫熱補濟之症晨咳吐涎始從胃治以血海亦隸陽明耳

生白扁豆

玉竹

大沙參

茯神

經霜桑葉

苡仁

用白糯米半升淘濾清入

滾水泡一沸取清湯煎藥

又木虛在下。情懷悵鬱則五志之陽上蒸爲咳。固非實火。但久鬱必氣結血滯。延成乾血勞病。經候瀉少愆期。已屬明徵。當培肝腎之陰以治本。清養肺胃氣熱以理標。剛熱之補。畏其劫陰。非法也。

生扁豆

兩

北沙參

錢

茯神

三錢

炙草

五分

南棗肉

錢

凡方

熟地

砂仁末拌炒四兩

鹿角霜

另研一兩

當歸

小茴香拌炒一兩

紫石英

醋煨水飛一兩

淮牛膝

鹽水炒二兩

雲茯苓

二兩

紫石英

醋煨水飛一兩

熱

青鹽

五錢

另熬生羊肉膠和丸早服四錢開水送

章二

自服八味鹿角膠以溫補反咳嗽吐痰形瘦減食皆

一偏之害宜清營熱勿事苦寒

鮮生地

麥冬

玄參心

甘草

苦白合

竹葉心

分

某七脉數衝氣咳逆當用攝納腎陰滋養柔金爲金水同

治之法

熟地

四錢

白扁豆

五錢

北沙參

三錢

麥冬

二錢

川斛

三錢

茯神

三錢

王八脉左尺堅久嗽失音入夏見紅天明咳甚而納穀減

臨證指南醫案

卷二

咳嗽

六

損此勞損之症。急宜靜養者。

麥冬

大沙參

玉竹

川斛

生白扁豆

雞子白

某

久嗽咽痛。入暮形寒。雖屬陰虧。形痿脉冥。未宜芬補。

麥冬

南沙參

川斛

生甘草

糯稻根鬚

某

氣急咳頻欲嘔。下午火升。此上有燥熱。下焦陰虧也。

早都氣丸

晚威喜丸

張

今年春季時疫。大半皆有咳嗽咽喉之患。乃邪自上

干。肺氣先傷耳。近日身動氣喘。聲音漸不揚。着左眠臥。左脇上有牽掣之狀。此肝腎陰虧。衝氣上觸。冬藏失司。

漸有創聲音至矣勞傷致損非清邪治咳之病

六味丸加陽秋右阿膠麥冬蜜丸

顧 眞陰不旺先後天皆虧以填精實下爲主若清熱裏
圖治嗽必胃損減穀

熟地

萸肉

山藥

茯苓

湖蓮

芡實

五味

人乳粉

金櫻膏丸

湯三脈左弱右搏久有虛損交春不復夜卧着枕氣衝咳
甚卽行走亦氣喘促此乃下元根蒂已薄冬藏不固
春升生氣淺少急當固納攝下世俗每以辛涼理嗽每
致不效矣

水製熟地

五味

胡蓮

芡實

伏龍

青鹽

羊內腎

其氣衝咳逆行動頭脹下體自汗 都氣丸

樂九熱病兩三反覆其陰必傷當戊亥時厥昏汗出者乃

虛陽上冒非腎根蒂不牢衝脈震動則諸脈俱逆陽泄

爲汗耳此咳嗽乃下焦陰不上承非肺病也急當收攝

固澀閱醫蘇子鉤藤皆泄氣奪亡之藥施於陰陽兩損

之脈最宜斟酌 都氣加青鉛

朱五吸氣息音行動氣喘此咳嗽是腎虛氣不收攝形寒

怯冷護衛陽微腎氣九頗道形氣不足加人參河車

王^{十五}

氣急嗽逆足冷當用攝納水中藏火法 薛氏加減

八味丸三錢淡塩湯送下

郭^二形瘦脉垂尺澤久嗽嘔逆半年不愈是腎虛厥氣上干醫藥清寒治肺者不少誤人匪淺

坎炁

人乳粉 杞子

五味

胡桃肉

扶神

巴戟肉 萸肉

山藥漿丸

某^六

冬季咳嗽吐痰漸至卧則氣衝喘急起坐今三載矣

經以肺腎爲俯仰之臟是肺主出氣腎主納氣老年患

此按脉右弦左沉爲腎氣不收主治不必因痔患而畏

辛熱 腎氣丸去牛膝肉桂加沉香蜜丸

張三冬季喘嗽似屬外因表散杏進反致失音不得着枕

卧眠今戌亥時濁陰上干而喘急氣逆爲其仍議引導

納氣歸腎 六味加附子車前補骨脂胡桃沉香

朱虛勞食減便瀉已無清肺治嗽之法必使胃口旺冀其久延此非藥餌可效之病

人參

秋石泡湯拌烘

茯神

山藥

建蓮

芡實

以仁

訶子皮

用糯稻根鬚煎湯煎藥

沈九勞嗽食減便瀉汁出陰損已及陽腑中宜扶胃下因

腎陰爲治大忌清肺寒涼希冀治嗽

熟地

熟冬朮

五味

芡實

湖蓮

山藥

某氣弱久嗽痰多午前爲甚

早服都氣丸三錢 午服異功散

某久咳損及中州脾失輸化食減神倦肺無所資至咳
不已診得兩手脈弦細數精氣內損非泛常治咳消痰
所可投

熟地

阿膠

燕窩

海參

天冬

茯苓

紫石英

紫衣胡桃肉

孫脈搏大陽不下伏咳頻喉痺暮夜爲甚先從上治

生雞子白

生扁豆皮

玉竹

白沙參

陰虛火
炎

麥冬

地骨皮

周四人脉來虛汎形色衰奪久患漏瘍陰不固攝經管勞動陽氣再傷冬月客邪致咳都是本體先虛春深入夏天地氣泄身中無藏日加萎頓理固當然此豈治咳治血者議補三陰臟陰方法

人參

秋石湯拌

熟地

麥冬

扁豆

茯神

白粳米

施氏

脉細數乾咳咽燥脊痠痿弱此本病欲損

阿膠

雞子黃

北沙參

麥冬

茯神

小黑稻豆皮

某 左豚弦數遺泄久嗽痰黃當用填補

炒熟地

芡實

扁豆

女貞

茯神

糯稻根鬚

野合
陰兼虛

丁六秋令天氣下降上焦先受燥化其欬症最多屢進肺藥無功按經云久咳不已則三焦受之是不端於理肺可知矣六旬又三形體雖充而真氣漸衰古人於有年久嗽都從脾腎子母相生主治更有欬久氣多發泄亦必益氣甘補歟攝實至理也茲議攝納下焦於早服而純甘清燥暮進填實在下清肅在上比藥味苦辛宜忌爲傷胃泄氣預防也

服早

水製熟地

八兩

白雲苓

乳蒸四兩

五味子

去核蒸三兩

建蓮

去心衣三兩

淮山藥

乳蒸四兩

車前子

三兩

淮牛膝

鹽水拌蒸三兩

紫衣胡桃肉霜

連紫皮三兩

右爲末用蒸熟猪脊髓去膜搗丸服六七錢開水送

晚用益胃土以生金方注

眞北沙參

有根有鬚者四兩

生黃芪薄皮

三兩

麥冬

去心二兩

生白扁豆

國圖連皮四兩

生細甘草

一兩

南棗肉

四兩

淡水煎汁濾清收膏臨成加真柿霜二兩收晚土開

水化服五錢

中氣虛

徐八

色萎脉濡心悸倉痰咳逆勞心經營氣餒陽虛中年

向哀病加治法中宮理胃下固腎真務以加穀爲安纓
治非宜煎藥用大半夏湯早服附都氣丸

某色白肌柔氣分不足風溫上受而咳病固輕淺無如
羌防辛溫膏知沉寒藥重已過病所陽傷背寒胃傷減
穀病志仍若身體先倦問誰之過歟 小建中湯

又苦辛泄肺損胃進建中得安宗內經辛走氣以甘緩
其急然風溫客氣皆從火化是清養胃陰使津液得以
上供斯燥癢咳哈自緩土旺生金虛則補母古有然矣
金匱麥門冬湯

王亂藥雜投胃口先傷已經減食便溏何暇紛紛治嗽

急急照顧身體久病宜調寢食 異功去白朮加炒白芍炒山藥

高 甘藥應驗非治嗽而嗽減病根不在上腹鳴便忽澹陰中之陽損傷

人參

冬白朮

雲茯苓

炙甘草

炒白芍

南棗

徐二勞損咳嗽用建中法得效乃無形之氣受傷故益氣之藥氣醇味甘中土寧金受益然必安穀加餐庶幾可禦長夏濕熱蒸逼真氣致泄反覆 異功加歸芪薑棗其 內損虛症經年不復色消奪畏風怯少營衛二氣已

乏納穀不肯充長肌肉法當建立中宮大忌清寒理肺
希冀止嗽嗽不能止必致胃敗減食致劇

黃芪建中湯去薑

陳二脉細促久嗽寒熱身痛汗出由精傷及胃

黃芪建中湯去薑

許仁久嗽不已則三焦受之一年來病咳而氣急脉得虛
數不是外寒束肺內熱迫肺之喘急矣蓋飯弱無以自
立短氣少氣皆氣機不相接續既曰虛症虛則補其母
黃芪建中湯

李三久嗽經年背寒足附常冷汗多色白嗽甚不得卧此

陽微衛薄外邪易觸而濁陰挾飲上犯議和營衛兼護其陽黃芪建中湯去飴糖加附子茯苓

任五勞力傷陽自春至夏病加煩倦神羸不食豈是嗽藥可醫內經有勞者溫之之訓東垣有甘溫益氣之方堪爲定法歸芪建中湯

張九九節課誦讀動心耗氣凡心營肺衛受傷上病延中必漸減食當世治咳無非散邪清熱皆非內損主治法

歸芪建中湯去薑

呂脈左細右空搏久欬吸短如喘肌熱日瘦爲內損性症但食納已少大便亦溏寒涼滋潤未能治嗽徒令傷

脾妨胃昔越人謂上損過脾下損及胃皆屬難治之例
自云背寒忽熱且理心營肺循仲景所云元氣受損甘
藥調之二十日議建中法黃芪建中去薑

馬虛損脉弦久嗽食減小建中去薑

傷風脉來虛弱久嗽形瘦食減汗出吸短久虛不復謂之
損宗內經形不足溫養其氣黃芪建中湯去薑加人

參五味

某四脉弦右大久嗽背寒盜汗小建中去薑加茯神

朱九五年咳嗽遇風冷咳甚是肌表衛陽疎豁議固劑經
其急黃芪建中湯

吳三勞力神疲遇風則咳此乃衛陽受傷宜和經脈之氣勿用逐瘀攻傷之藥當歸桂枝湯合玉屏風散

某久咳神衰肉消是因勞內傷醫投苦寒沉降致氣泄汗淋液耗夜熱胃口傷殘食物頓減黃芪建中去薑

某脾胃脈部獨大飲食少進不喜飲水痰多咳頻是土衰不生金氣建中去飴加茯神按服四君子湯

某風溫咳嗽多勞氣分不充戊巳湯

人參

茯苓

於朮

炙草

廣皮

炒白芍

某勞嗽喜得辛煖之物異功加煖薑南棗

吳如病去五六當調寢食於醫藥之先此平素體實不可
不論自來納穀恒少大便三日一行胃氣最薄而滋膩
味厚藥憤商從來久病後大脾胃爲要咳嗽 非各症
治脾胃者土旺以生金不必窮究其嗽

人參

鮮蓮子

新會皮

茯神

炒麥冬

生穀芽

某

脉虛久嗽減食

四君子加用棗

勞倦
虛

汗

初咳不得卧今左脈咳甚並不口渴欲飲周身熱熱

汗出此積勞內傷木反乘金不飢不納滋屬難投惟以
培中土制木生金合乎內傷治法

川桂枝

茯苓

淡乾薑

五味子

生甘草

大棗

某二 咳逆欲嘔是胃欬也當用甘藥

生扁豆

北沙參

麥冬

茯神

南棗

糯稻根

冬

三錢

某 伏邪久咳胃虛嘔食殆內經所謂胃咳之狀耶

麻黃

杏仁

甘草

石膏

牛夏

苡仁

王二 脉沉短氣咳甚嘔吐飲食便澹泄乃寒濕鬱滯清陽

明胃營衛不和胸痺如悶無非陽不旋運夜陰用事

肝氣
肝氣

泛嘔吐矣。唐醫治痰氣治肺論咳不思內瀉胃咳之
狀咳逆而嘔耶。小半夏湯加薑汁。

石 氣左升腹膨嘔吐涎沫黃水吞酸暴咳不已。是肝逆
乘胃射肺致坐不得臥。安胃丸三錢。

范 久咳涎沫欲嘔。長夏反加寒熱不思食。病起真怒氣
暴上衝不能着枕。顯然肝逆犯胃冲肺。此皆疎泄失司
爲搏勢之症。故滋膩甘藥下咽欲嘔矣。

小青龍去麻辛甘加石膏

顏 氏 久有痛經氣血不甚流暢驟加暴怒肝陽逆行乘肺
則咳病家云少腹衝氣主于其咳乃作則知清潤肺藥

非中竅之法。今寒熱之餘。咳不聲揚。但脇中拘急。不飢不納。乃左升右降。不司旋轉。而胃中遂失下行爲順之。昔古人以肝病易於犯胃。然則所用宜泄胃腑。宜通爲定例矣。

桑葉

丹皮

鉤藤

茯苓

半夏

廣皮

威喜丸

三錢

大陷

某

脉弦右甚。嗽午潮熱。便溏。畏風。以大腸嗽治之。

生於朮

錢

茯苓

三錢

赤石脂

錢

禹糧石

二錢

薑汁

四易

大棗

三枚

又照前方加白芍炙甘草

又肝數右長左弦上咳下瀉

生於朮

牛

茯苓

三錢

炙甘草

五分

木瓜

一錢

薑汁

四分

大棗肉

四分

石

四

咳嗽十月醫從肺治無效而顛張喉痺脫疳顯是厥

陽肝風議鎮補和陽熄風

生牡蠣

阿膠

青黛

淡萊

某

昨議上焦肺病百日未痊形肌消瘦悉由熱化久熱

無有不傷陰液擬鹹補如阿膠雞子黃複入苓連苦寒

自上清氣熱以補下雖爲暫服之方原非峻尅之劑細

思手經之病原無遠入足經之理但人身氣機合乎天

地自然肺氣從右而降肝氣由左而升肺病主降口遲
肝橫司升日速咳喘未已乃肝勝木反刑金之兆試言
及久寐寤醒左常似悶熱嘈雜如飢及至進食未覺胃
中安適此肝陽化風旋擾不息致喘無平期卽候熱之
來升至左頰其左升太過足爲明驗倘升之不已入春
肝木司權防有失血之累故左右爲陰陽之道路陰陽
既造其偏以致病所以清寒滋陰不能驟其速功

阿膠

雞子黃

生地

天冬

女貞實

糯稻根鬚

姚

脇痛久嗽

旋覆花湯加桃仁柏子仁

某 寒熱右脇痛咳嗽

蘆根 一兩

杏仁 三錢

冬瓜子 三錢

苡仁 三錢

枇杷葉 三錢

白薤仁 三錢

咳爲氣逆。嗽爲有痰。內傷外感之因甚多。確不離乎肺臟爲患也。若因於風者。辛平解之。因於寒者。辛溫散之。因於暑者。爲薰蒸之氣。清肅必傷。當與微辛微涼。苦降淡滲。俾上焦蒙昧之邪。下移出腑而後已。若因於濕者。有兼風兼寒兼熱之不同。大抵以理肺治胃爲主。若因秋燥。則嘉言喻氏之議最精。若因於火者。卽溫熱之邪。亦以甘寒爲主。但溫熱猶有用苦辛

之法。非比秋燥而絕不用之也。至於內因爲病。不可
不逐一分之有剛亢之威。木扣而金鳴者。當清金制
木。佐以柔肝入絡。若土虛而不生金。眞氣無所稟攝
者。有甘涼甘溫二法。合乎陰土陽土。以配剛柔爲用
也。又因水虛而痰泛。元游竭而諸氣上冲者。則有金
水雙收。陰陽並補之治。或大劑滋填鎮攝。葆固先天
一炁元精。至於飲邪竊發。亦能致嗽。另有喘門。兼參
可也。以上諸法。皆先生臨證權衡之治。非具慧心手
眼。能如是乎。邵新甫

吐血

寒邪

朱 形寒暮熱。咳嗽震動。頭中腕中脇骨皆痛。先經嗽紅。體氣先虛。此時序冷熱不勻。夾帶寒邪致病。脈得寸口獨大。當清解上焦。大忌溫散之劑。

桑葉

蘇梗

杏仁

象貝

玉竹

大沙參

某

風溫上受吐血

桑葉

薄荷

杏仁

連翹

石膏

生甘草

徐陰虛風溫氣逆厥血

生扁豆

玉竹

白沙參

茯苓

桑葉

鬱金

顧四寸口脈搏指而勁。痰血能食。初因風溫咳嗽。震動絡血。以清心營肺衛之熱。

小生地

黑山梔

地骨皮

天花粉

丹參

連翹

竹葉心

注右脉大咽喉痒喘。頭中微脹。此冬溫內侵。陽氣不伏。絡熱血得外溢。當調其復邪。

桑葉

山梔皮

連翹

白沙參

象貝

牛蒡子

某脉小而勁。少年體豐。真氣易泄。經月咳。自非外感。因冬溫失藏。咳頻震絡。痰帶血出。當薄味以和上焦氣。熱得清。病患可却。

桑葉

山梔

杏仁

鬱金

象貝

花粉

糯米湯代水

王三脉石大。溫邪震絡。咳痰帶血。

桑皮

杏仁

山梔皮

花粉

大沙參

石膏

高溫邪上鬱。清空目赤頭脹。咳。噎見血。此屬客病。不必

爲內損法

連翹

黑山梔

草決明

桑葉

薄荷梗

荷葉邊

苦丁茶

花粉

藥用急火煎

唐二血後。喉燥痒欲噎。脉左搏堅。

玉竹

南花粉

大沙參

川斛

桑葉

糯米飲煎

高二脉小。瀉欲涼飲。熱阻氣升。血胃仍議治上。

嫩竹葉

飛滑石

山梔皮

鬱金汁

杏仁汁

新荷葉汁

某春溫嗽痰。固屬時邪。然氣質有厚薄。不可槩以辛散。

汪七 天明至午嗽甚痰血春暖陽浮是腎虛不藏聞咳音重濁不爽先議輕清治氣分之熱

桑葉

南花粉

黑梔皮

桔梗

甘草

橘紅

某 脈搏數舌心灰咳嗽有血頻嘔絡傷致血隨熱氣上出仍理氣分

桑葉

花粉

苡仁

川貝

黃芩

茯苓

方 夏熱泄氣胃弱衝逆失血

扁豆

茯苓

參三七

茜草

施 脉小數。舌絳。喉中痒。咳咯血。因暑熱旬日。熱入營。震動而溢。凡肺病爲手太陰經。逆傳必及膈中。仍以手厥陰治。

竹葉心 生地 銀花 連翹心

玄參 赤豆皮

高 脉數。汗出身熱。吐血五日。胸脘不舒。舌色白。此陰虛本質。暑熱內侵營絡。漸有時瘧之狀。小波莖中微痛。宜通腑經爲宜。

鮮生地 連翹 替金汁 滑石

竹葉 甘草稍

熟

且正在知識發動之年。陰分自不足。以至咳嗽失血。當以甘寒潤降。以肅肺金。

鮮枇杷葉

甜杏仁

南沙參

川貝

甜水梨

甘蔗漿

郭

熱傷元氣。血後咳逆。舌赤。脉寸大。

鮮生地

麥冬

玉竹

地骨皮

川斛

竹葉心

又

心眩。不饑。熱灼氣升。

鮮生地

玄參

丹參

鬱金汁

銀花

竹葉心

萊豆皮

不執機
肺

某 脉瀉咳嗽痰血不時寒熱此邪阻肺衛所致

葦莖湯加杏仁通草

孫六 用力氣逆血亂咳出腥痰濁血用千金葦莖湯

某 邪鬱熱壅咳吐膿血音啞

麻杏甘膏湯加桔梗苡仁桃仁紫苑

上焦氣
分

倪二 肛瘍潰膿雖愈陰氣已絕走泄當陽氣弛張發泄今

加嗽血痰多胃納減於平昔脉數促喘逆脘悶姑清肅

上焦氣分

蘇子

杏仁

香豉

黑梔皮

鬱金

蕤皮

降香

桔梗

又氣阻不飢

黑梔皮

香豉

藁皮

鬱金

杏仁

橘紅

王氏

入夏陰血乃氣泄陽升。幸喜經水仍來。大體猶可無妨。近日頭脹。腕中悶。上午煩倦。是秋暑上受。防發寒熱。

竹葉

飛滑石

杏仁

連翹

黃芩

荷葉汁

暑熱鬱
肺阻竅

江

積瘀在絡。動絡血逆。今年六月初。時令暴熱。熱氣吸

入首先犯肺。氣熱血湧。強降其血。血藥皆屬呆滯。而清
空熱氣。仍蒙閉於頭髓空靈之所。諸竅痺塞。鼻窒癰肉。

出納之氣都從口出。顯然肺氣鬱蒸。致腦髓熱。蒸脂液自下。古稱燐物消物莫如火。但清寒直泄中下。清空之病仍然。議以氣分輕揚。無取外散。而事內通。醫工遇此法則每每忽而失察。

連翹

牛蒡子

通草

桑葉

鮮荷葉汁

青菊花葉

臨服入生石膏末煎一沸

火氣通

某二

以毒藥燠瘡。火氣逼射肺金。遂令咳嗽痰血。咽乾胸

悶。診脉尺浮。下焦陰氣不藏。最慮病延及下。卽有虛損之患。姑以輕藥暫清上焦。以解火氣。

杏仁 三錢

萊菔皮 二錢

冬瓜子 三錢

苡仁 三錢

川貝半錢 兜鈴七分

木火升
逆受動

趙三咳逆自左而上血亦隨之先以少陽胆絡治

生地

丹皮

澤蘭

茯苓

降香末

荷葉汁

張六耳目昏蒙甚於午前此屬少陽鬱勃之升嘔惡痰血多是絡熱治以開泄莫投滋膩

桑葉

丹皮

黑梔

連翹

菊葉

萸皮

川貝

橘紅

華七色蒼能食腕有積氣兩年秋冬曾有咯血此非虛損由乎體稟木火噴怒拂逆肝胆相火擾動陽絡故也

金斛

山梔

鬱金

丹參

川貝

蘇子

鉤藤

茯苓

又接用清氣熱安血絡方。

生地

麥冬

玄參

知母

花粉

百部

桔梗

川貝

蜜丸

嚴四脉數濇小結。痰血經年屢發。仍能納食應酬。此非精血損怯。由乎五志過動。相火內寄肝胆。操持鬱勃。皆合動灼。致絡血上滲。混痰火。必靜養數月方安。否則木火劫燥。胃傷減食。病由是日加矣。

丹皮

薄荷梗

菊花葉

黑梔

淡黃芩

生白芍

鬱金

川貝

類 入夏陽升疾走驚惶更令諸氣益升飲酒多食櫻桃皆辛熱甘辣絡中血沸上出議消酒毒和陽

生地

阿膠

麥冬

嘉定花粉

川斛

小黑稽豆皮

沈 脉左堅上透是肝腎病血色紫乃既離絡中之色非久瘀也勞役暑蒸內陰不生有諸做瓊玉意仍是陰柔之通劑

鮮生地

人參

茯苓

琥珀末

張 血止脉左大

天冬

生地

人參

茯神

炙草

生白芍

女貞

旱蓮草

顧

二脉左堅。陰傷失血致咳。復脉去參桂姜加白芍

凡咳血之脉。右堅者。治在氣分。係震動胃絡所致。宜薄味調養胃氣。如生扁豆、茯神、北沙參、苡仁等類。左堅者。乃足腎陰傷所致。宜地黃、阿膠、枸杞、五味等類。脉弦脇痛者。宜蘇子、桃仁、降香、鬱金等類。成益盈碗者。葛可久、花蕊石散。仲景大黃黃連瀉心湯一症而條分縷晰。從此再加分別。則臨證有據矣。

趙四

虛不肯復。謂之損。納食不充。肌膚消瘦。不能着方。遇

節令痰必帶血。脈左細右勁數。是從肝腎精血之傷。延及氣分。倘能節勞安逸。僅堪帶病。永年損症。五六年無攻病之理。臟屬陰。議平補足三陰法。

人參

山藥

熟地

天冬

五味

女貞

張四失血五六年。脈虛氣喘。不運不饑。治在中下二焦。望其安穀精生。勿許攻病爲上。

人參

炙草

白芍

茯神

炒熟地

五味

某二勞力血復來。衝氣咳逆。當用攝納爲要。

熟地四錢

參三七錢

大淡菜兩

牛膝炭錢

川芎三錢

茯神三錢

某四脉弦脇痛已緩血仍來

大淡菜兩

參三七錢

牛膝炭錢

茯苓二錢

川芎三錢

小黑糖豆皮錢

某四失血後咳嗽咽痛音啞少陰已虧耗藥不易治

糯稻根鬚兩

生扁豆錢

麥冬三錢

川芎錢

北沙參錢

茯神錢

早服都氣丸淡鹽湯下

某三脉虛數失血心悸頭眩

大淡菜錢

牛膝炭錢

白扁豆兩

白茯苓錢

藕節三錢

糯稻根錢

某四血來稍緩。猶能撐持步履。乃稟賦強健者。且能納穀。

陽明未敗可驗。而脉象細澁。陰傷奚疑。

北沙參一錢

扁豆一兩

參三七半

妙麥冬一錢

扶神三錢

川斛三錢

施二噎血數發。是陽氣過動。診脉已非實熱。夏至一陰來復。預宜靜養。迨其生氣。秋分後再議。生脉六味去丹。

澤加阿膠秋石蜜丸

張脉右弦數。左細澁。陰損失血。後久咳。食減便澀。

熟地炭 扶神 建蓮 五味

芡實

炒山藥

某^四失音咽痛。繼而嗽血。脉來瀉數。已成勞怯。幸賴能食。胃強。勿見咳治咳。庶幾帶病延年。

細生地

錢三

玄參心

錢一

麥冬

錢一

細川斛

錢三

鮮蓮子肉

兩一

糯稻根鬚

錢五

沙^六陰虛。血後痰嗽。必胃強加穀者。陰藥可以效靈。形羸食少。滋膩久用。必更反胃。靜養望其漸復。

熟地炭

萸肉

五味

川斛

伏神

芡實

建蓮

山藥

馬^五

脉左堅右弱。木火易燃。營液久耗。中年春季失血嗽。

或由情志鬱勃致傷抑且少食怔忡古語謂瘦人之病
虛虛其陰

生地

阿膠

北沙參

麥冬

茯神

川斛

某女
脈左數測眠嗽血

生地

阿膠

麥冬

淡菜

生白芍

炙草

金氏
脈細左小促乾咳有血寒熱身痛經水先期漸漸色
淡且少此虛陰傷及府陽奇脈無氣內損成勞藥難驟
效

生地

阿膠

牡蠣

炙草

麥冬

南棗

盧氏

沉着濃厚。肝腎之血。

熟地炭

炒杞子

炒歸身

牛膝炭

茯神

青鉛

砂仁末

又

照前方去牛膝青鉛加桂圓肉天冬

繆

勞傷血後。夜熱食少。清骨散加生地

耿

久損。交節血溢。青鉛六味去萸加炒牛膝川斛沖

熱童便服

某

脈細。虛數。陰分不足。熱中帶紅。腸風春溫之後。再劫

津液以致上下失血風淫於內宜酸寒

生地炭

阿膠

龜膠

玄參

白芍

女貞

茯苓

稽豆皮

升

陶二下虛陽動失血。六味去丹澤加阿膠淡萊

陳日來寒暄不勻煩勞陽升。咳哈震動絡血上沸診脉左數五心熱知饑納穀。議育陰和陽方法。

生地

清阿膠

天冬

麥冬

茯神

川斛

炒牛膝

青鉛

童便

陳五形瘦脉促數吸氣如喘痰氣自下上升此屬腎虛氣不收攝失血後有此乃勞怯難愈大症用貞元飲。

鄒一內傷驚恐肝腎虛陰日損陽浮引陰血以胃上竅二

氣不交日加寒熱骨熱咽乾不寐陰分虛其熱甚於夜

阿膠雞子黃湯

沈勞動陽升血自左溢

阿膠

參三七

甜北沙參 茯神

生白扁豆 炒麥冬

江一少壯情志未堅陰火易動遺精淋瀝有諸腎水既失其固春木地氣上升遂致中帶血入夏暨秋胃納不減後天生旺頗好不致勞怯之憂但酒色無病宜節有病宜絕經年之內屏絕必得却病

熟地

水製

萸肉

山藥

茯神

湖蓮

遠志

五味

黃柏

芡實

金櫻膏丸

陸十知識太早。真陰未充。龍火易動。陰精自泄。痰吐帶血。津液被燬。幸胃納安穀。保養少動宜靜。固陰和陽可痊。

熟地

水製

萸肉

山藥

茯苓

芡實

遠志

五味

煅牡蠣

白蓮鬚

蜜丸

徐四心腎精血不安。火風陽氣熾。失血眩暈。心悸溺精。若過用心作勞。不能復元矣。

熟地

萸肉

山藥

茯神

芡實

遠志

建蓮

五味

海參膠

彭十陰虛有遺痰嗽有血。誦讀久坐陽升。

桑葉

生扁豆

北沙參

麥冬

霍山石斛

生甘草

苡仁

茯苓

吳八失血在五年前。咳頻嘔噦。氣自上衝逆。乃下元精血之虛。非外邪寒熱之咳。痰出腥氣。亦從下出。節慾勿勞力。胃壯可免勞怯。都氣丸。

周七左脉弦數。失血後。咳嗽音嘶。少寐。陰虧。陽升不潛之候。當滋養爲主。

生地炭

錢三

生牡蠣

錢五

阿膠

錢一

麥冬

錢一

茯神

錢三

川斛

錢三

周^三 虛損失血。飲食如故。形瘦面赤。稟質木火。陰不配陽。
據說服桂枝治外感。卽得此恙。凡辛溫氣味宜戒。可以
無妨。六味加阿膠龜甲天冬麥冬。

孫^二 形瘦脈數寸口搏指。浮陽易動上冒。都屬陰精不旺。
辛胃納尚佳。數發不致困頓。然須戒酒淡慾。怡情靜養。
水足火不妄動。絡血自必寧靜矣。六味加龜甲秋石。
趙^八 屢遭客熱傷陰。逢夏氣泄吐血。下午火升咳嗽。液虧。
陰火自灼。胃口尚健。安閑絕慾可安。

熟地 萸肉 龜甲 淡萊膠 五味

山藥 茯苓 建蓮 蜜丸

某內經分上下失血爲陰絡陽絡。是腑絡取胃臟絡論脾。今飲食甚少。臍腹結。上下交病。治在中焦。其午火升煩嗽。亦因血去陰傷。以胃藥從中鎮補。使生氣自充也。

人參

茯苓

白朮

炙草

扁豆

白芍

山藥

又因觸脇氣閉。絡血復上。過戌亥時自緩。早上診脈。細促無神。左目珠痛。假寐。喉息有音。足脛冰冷。皆血胃不已。孤陽上升。從肝腎引陽下納法。

人參

熟地炭

炒杞子

茯神

淡菜

炒牛膝

四服

又每下午戌亥少陰厥陰龍相上越絡中之血隨氣火上升考五行之中無形有聲莫如風火此皆情志之變動必須陽潛陰固方免反覆也

人參

河車膠

大熟地

五味

炒杞子

茯苓

炒牛膝

倘噎逆有聲加青鉛喉痒痛加阿膠秋石火升用秋石湯煎藥加女貞子便秘加鹹蘆蓉柏子仁血止幾日或涉思慮惱怒復有脇痛減食不甘乃少陽木火犯脾當泄胆益土用四君加丹皮桑葉

徐六脉左垂右弦陰精不足。胃納亦少。初冬痰中見紅。冬春寐有盜汗。難藏易泄。入夏當防病發。諸凡節勞安逸。經年可望安康。

熟地 阿膠 五味 萸肉 秋石

山藥 茯神 川斛 旱蓮草膏丸

又脉左細數。肉消肌燥。氣衝咳嗽。嘔吐失血。是肝腎內損。下元不主納氣。厥陽上冒所致。非肺咳矣。當交夏氣升血溢。姑以鎮納。望其血止。青鉛六味加牛膝白芍。又脉兩手已和。惟煩動恍惚欲暈。議靜藥益陰和陽。三才湯加金箔。

葉 講誦煩心。五志之陽皆燃。恰值芒種節。陰未來復。陽氣升騰。絡中血不寧靜。隨陽泄以外溢。午後上竅煩熱。陰不戀陽之徵。致頭中微痛。主以和陽鎮逆。

生地

阿膠

牛膝炭

生白芍

茯神

青鉛

杜^二七^七 脉小數入尺澤。夏季時令發泄。失血形倦。治宜攝固下焦。

熟地

萸肉

山藥

茯神

建蓮

五味

芡實

線魚膠

金櫻膏丸

蘇^三九^九 脉左堅。冬令失血。能食而咳。脊痛腰痠。乃腎臟不固。

少納。腎脉虛餒。五液不承。寐則口乾喉燥。宜固陰益氣。
固本丸加阿膠。芡實。蓮肉。丸。

潘二形色充偉。脉長關搏。述冬季。鰥血痰血。交夏不病。蓋
夏月藏陰。冬月藏陽。陽不潛伏。升則血溢。降則遺精。乃
稟陽體。而性情喜動之累耳。

生地

熟地

天冬

麥冬

龜腹甲心 秋石

龍骨

遠志

梅二性情過動。失血。夫血貴寧靜。不宜踈動。踈動則有泛
溢之虞。瘦人陽有餘。陰不足。補陰潛陽法。 補陰丸。

某十五脉數咳血。曾咯腥痰。若作肺癰。體質木火。因煩勞陽

升逼肺。肺熱不能生水。陰愈虧而陽愈熾。故血由陽而出也。當金水同治爲主。

熟地

四兩

生地

二兩

天冬

二兩

麥冬

二兩

茯神

二兩

龜版

三兩

海參膠

二兩

淡菜膠

二兩

川斛膏

四兩

女貞

一兩半

北沙參

二兩

旱蓮草

一兩

膠膏丸

鄒四向有失血是真陰不旺。夏至陰生。伏天陽越於表。陰伏於裏。理宜然矣。無如心神易動。暗吸腎陰。絡脉聚血。陽觸乃溢。陰伏不固。隨陽奔騰。自述下有衝突逆氣。血湧如泉。蓋任脉爲擔任之職。失其擔任。衝陽上冲。莫制。皆腎精肝血不主內守。陽翹爲血溢。陽隆爲陰遺。腰痛

足脛畏冷。何一非精奪下損現症。經言精不足者。補之以味。藥味宜取質靜填補。重着歸下。莫見血以投涼。勿因嗽以理肺。若此治法。元海得以立基。衝陽不來犯上。然損非旬日可復。須寒暑更遷。凝然不動。自日逐安適。調攝未暇。縷悉也。

人參 三錢

熟地

炒製成炭四錢
冷水洗一次

鮮河車膏

一錢
和服

茯苓 一錢

炒黑枸杞子

半錢

北五味

一錢
研

沙苑 一錢

紫石英

五錢
生研

血脫益氣。用人參熟地兩儀煎方。謂人參同陰藥則補陰。茯苓入陽明。能引陰藥入於至陰之鄉。河車血

肉溫養同石英收鎮衝脉兼以包固大氣之散越五
味酸收領其五液枸杞溫潤同沙苑之鬆靈入肝絡
叅方中之藥應乎取味况肝腎之病同一治也

劉二脉左數八尺是真陰下虧先有血症畢咽後血復來
下干火升哈咳陰中陽浮保扶胃口以填陰

阿膠

淡菜

生扁豆

麥冬

炙草

茯神

婁二思慮太過心陽擾動吸傷腎陰時時莖舉此失血皆
嬌陽獨升夜不得寐寐家談笑怡情可安

人中白

龜腹甲

知母

黃柏

錢 交夏陽氣大升。陰根失涵。火升血溢。必在晡刻。冲年
大忌身心少持。必使陽和陰守爲要。

生地

阿膠

淡菜

牛膝炭

茯神

川斛

某 口氣腥臊。血色渾濁。下元無根。恐難接續。還元事已
至急。與王先生同議攝陰陽法。

人參

川熟附

熟地

五味

炙草

青鉛

某 脉動極無序。血湧如泉。汗出畏冷。少焉熱躁。此無根
之陽上冒。血凝成塊。非涼藥可止。

熟地炭

生龍骨

茯神

五味

薄桂

生白芍

鹽水炒牛膝

又人參

生龍骨

熟地炭

茯神

炒杞子

五味

華二陽動失血。皆係陰虧。如心悸咽乾咳嗽。都是陽浮上

亢。必久進填實。厥陰斯浮。越自和。面亮油光。皆下虛少

納。都氣加龜版人乳粉蜜丸

徐陰根愈薄。陽越失交。初夏發泄。血湧吸短。心腹皆熱。

豈止瀉之藥可療。益氣攝陰。乃據理治法。

人參

熟地

五味子

驗虛肝
品初

羅 上年脇彈已屬絡傷。今夏四月陽氣升發。絡中血沸。上溢陰分熱蒸。下午乃甚。喉痒而噎。心中嘈雜。肝風內震。顯然。

鮮生地

阿膠

丹參

鹽水炒牛膝

女貞子

川斛

童便

龔 咳嗽繼以失血。經言三焦皆傷。喉痛失音。乃陰液無以上承。厥陽燔燎不已。病深難於奏功。憑理而論。鎮胃制肝。乃和陽熄風之義。

淮小麥

南棗

阿膠

茯苓

北沙參

天冬

壁 脉數血後咳甚痰腥肢腫陽升內風鼓動最屬難治

生地

阿膠

天冬

麥冬

生白芍

茯神

沈 味進辛辣助熱之用致肺傷嗽甚其血震動不忌陽
少潛伏而夜分爲甚清氣熱而不妨胃口甘寒是投與
內經辛苦急急食甘以緩之恰符

生甘草

玉竹

麥冬

川貝

沙參

桑葉

又 肝陽易逆內風欲湧不得着左卧惡辛氣喜甘潤治
肝體用潤劑和陽

生地

阿膠

天冬

茯神

牡蠣

小麥

羅九血去絡傷陽氣上蒸胸脇微痛非有形滯濁脉得左關前動躍如浮頭中微暈陽氣化風何疑

鮮生地

玄參心

麥冬

地骨皮

知母

川斛

又左脉形畧歛仍堅微暈喉燥脘痛熱蒸陽明津衰厥陰陽風自動而胃氣欲逆大便不爽是其明徵熄風和陽必用柔緩少佐宣暢脘氣亦暫進之法

鮮生地

麥冬

火麻仁

桑葉

鬱金

生香附汁

又復脉去參姜桂加白芍

血後傷
氣上逆

某血後氣衝形寒法當溫納

茯苓

三錢

粗桂枝

八分

炙草

五分

五味

七分

陰易並
氣上逆

何

早晨未進飲食咳逆自下焦上冲有欲嘔之象虛里

左脇呼吸牽引震動背部四肢寒冷入暮心腹熱灼而

舌上乾辣夫陽虛生外寒陰虛生內熱陽屬喘氣主乎

外衛陰屬臟真主乎內營由絡血大去新血未充穀味

精華不得四布知味容納而健運未能自然脇右少舒

全係胃絡下焦陰精損傷中焦胃陽不振夏至初陰不

主來復。交節絡血再動。總是耗損。難以驟復之徵。大意下焦陰陽宜潛。宜固。中焦營衛宜守。宜行。用藥大旨如此。至於潛心。潛慮。勿擾情志。再於子午。參以靜功。俾水火交。陰陽偶。是藥餌已外工夫。皆培植生氣之助。

養營湯去黃芪蓮志

又 自服養營湯。溫補足三陰。臟法半月來。諸症皆減。惟午餘心腹中熱未罷。凡精血久損。理必質重味厚填納空隙。祇因中焦運納不旺。況長夏時令。熱最耗氣。議早進通陽守陰。晚用益中消暑。冀其生旺。非攻病也。

午服生脉散

服早

人參

熟地

杞子

當歸

茯苓

肉桂

扶神

五味

某操持拂鬱五志中陽動極失血哈咳有年皆緣性情內起之病草木難以奏效今形色與脉日現衰憊係乎生氣剋削慮春平以後地氣升陽氣泄久病傷損裡真少聚冬春天冷主藏總以攝補足三陰臟扶持帶病延年就是人工克盡矣。

人參

炒白芍

熟地炭

五味

炙草

建蓮

陰陽

馬五

閱病原是腎虛嗽血年分已久腎病延傳脾胃遂食

臨證指南醫案

卷二

吐血

辛

截腹膨病是老勞難以速功行走喘促元海無納氣之權莫以清寒理嗽急急收納根蒂久進可得其益

人參

人乳粉

坎炁

枸杞

沙苑

五味

茯苓

胡桃

宋 臟腑附背督脉行身之背足少陰真氣不攝唾中有血吸氣少久而腰脊痠楚寐泄魄汗皆真氣內損若加噴怒再動肝陽木火劫燥脂液春木日旺調之非易

水製熟地

蜜炙五味

女貞

茯神

川斛

炒山藥

芡實

湖蓮

下虛當春升之令形與無力嗽血復來以甘溫厚味

者其陰中之陽

枸杞

沙苑

歸身炭

牛膝

巴戟

精羊肉

下損及

錢

一陽初萌血症卽發下焦真氣久已失固亡血後飲

食漸減咳嗽則脫中引痛衝氣上逆乃下損及中。最難痊愈擬進攝納方法

人參

熟地

五味

茯神

川斛

紫衣胡桃

調入鮮河車膠

上七少年陰火宜升宜降上則失血咳逆下墜肛瘍延漏皆虛勞見端食減至半胃關最要非可見熱投涼以血

嗽泥治

熟地炭

建蓮

霍石斛

茯神

炒山藥

芡實

某三診脉數滿咳血氣逆晨起必嗽得食漸緩的是陰損及陽而非六氣客邪可通可泄法當養胃之陰必得多納穀食乃治此損之要着

生扁

錢五

北沙參

錢一

麥冬

錢一

川斛

錢三

生甘草

錢三

茯神

錢三

南棗肉

錢半

糯稻根鬚

錢五

鄭八虛損四五年肛漏未愈其咳嗽失血正如經旨陰精不主上奉陽氣獨自升降奈何見血投涼治嗽理肺病

加反胃胃困減食夫精生於穀中土運納則二氣常存
久病以寢食爲要不必汲汲於病

生黃芪 黃精 訶子肉 白芨 苡仁

兩煎 淡火熬膏不用蜜收畧飢用五錢參湯送

脾腎虛

某五 向衰之年夏四月時令陽氣發泄遇煩勞身中氣泄

絡血外溢臟液少潤遂痰嗽不已俗醫見嗽愈投清肺
滋陰必不效驗此非少年情慾陰火之比必當屏煩戚
勞早進都氣晚進歸脾平補臟真再用嗽藥必然胃減
姜九自上年冬失血漸形減氣弱精血內損不肯再復延
成勞怯填養精血務在有情庶幾不奪胃氣

腎胃虛

人參

鮮河車膠

水製熟地

五味

茯苓

山藥

芡實

黑殼建蓮

顧六失血。血形濃厚。必自下先傷胃。減無力。氣分亦損。此陰藥中。必兼扶胃。非沉滯清寒所宜。

人參

熟地

建蓮

芡實

山藥

茯苓

邵六脉堅形瘦久咳失血有年。食物厭惡。夜寢不適。固以培本爲要。所服七味八味湯丸。乃肝腎從陰引陽法。服之不效。此液虧不受桂附之剛。當溫養攝納其下。兼與益胃津以供肺。

服晨

熟地

茯苓

杞子

五味

胡桃肉

牛膝

栝子仁

茯苓

蜜丸

服晚

人參

麥冬

五味

炙草

茯苓

鮮蓮子

山藥

胡三

冬季失藏吐血。四月純陽升泄。病不致發。已屬萬幸。

其痰嗽未宜窮治。用藥大旨。迎夏至一陰來復。兼以扶

培胃氣爲要。

人參

熟地

麥冬

五味

茯苓

山藥

勞傷中
氣虛

王十八冲年形瘦腹脹食減便溏。自上秋失血以來。日加羸

弱脉左堅右濡，雖陰虛起見，而中焦爲急，此非小恙。

人參

茯苓

炙草

白芍

廣皮

厚朴

席 半月前恰春分陽氣正升，因情志之動，厥陽上燔，致咳震動絡中，遂令失血，雖得血止，診右脉長大透寸部，食物不欲納，脉中呻吟囁語，由至陰損及陽明，精氣神不相交合矣。議欲攝神氣法。

人參

茯苓

五味

棗仁

炙草

龍骨

金箔

又服一劑，自覺索入少腹，腹中微痛，逾時自安，此方歛。

手少陰之經失以和四逆不爲重堅至於直下者陽明
胃虛也脈緩大長肌膚甲錯氣衰血虧如榆姑建其中
參芪建中湯去姜

又 照前方去糖加茯神

又 診脾胃脈獨大爲病飲食少進不喜飲水痰多嗽頻
皆土衰不生金氣金匱謂男子脈大爲勞極虛者亦爲
勞夫脈大爲氣分泄越思慮鬱結心脾營損於上中而
陽分萎頓極虛亦爲勞爲精血下奪肝腎陰不自立若
脈細欲寐皆少陰見症今寢食不安上中爲急况厥陰
風木主令春三月木火司權脾胃受戕一定至理建中

理陽之餘。繼進四君子湯。大固氣分。多多益善。

徐^四因積勞久嗽見血。是在內損傷。先聖曰。勞者溫之。損者益之。溫非熱藥。乃溫養之稱。甘補藥者。氣溫煦。味甘甜也。今醫見血投涼。見嗽治肺最多。予見此治法。胃口立卽敗壞者不少。歸脾去木香黃芪加杞子。

杜^二積勞思慮內損失血。久病秋季再發。乃夏暑氣泄。勞則氣愈泄不收。絡空動沸。此與陰虛有別。色脉胃減。涼降非法。人參建中湯。

龐血大去。則絡脉皆空。其傷損已非一腑一臟之間矣。秋分寒露。天氣令降。身中氣反升越。明明裏不肯收攝。

虛象何疑。今診脈弱濡瀋。肢節微冷。氣傷上逆。若烟霧
迷離。薰灼喉底。故作噎逆。大旨以上焦宜降。宜通。下焦
宜封。宜固。得安穀崇生。再商後法。

人參

炒黑杞子

炒黑牛膝

茯神

生苡仁

炒山藥

又血止納穀甚少。不饑泄瀉。此脾胃大困。陰火上竄。面
赤。忽嘈。先理中宮。必得加餐爲主。大忌寒涼治嗽。再伐
脾胃生氣。

人參

茯神

新會皮

山藥

炙草

炒白芍

又 脉右濡左未斂。

人參

茯神

熟朮

廣皮

南棗

又 左脉靜而虛。右如數。初進穀食。宜培中宮。霜降後五日。以九劑攝下。

人參

茯神

熟朮

廣皮

南棗

炒白芍

炙草

陳 脉如數。痰嗽失血。百日來反覆不已。每咳嘔而汗出。此屬氣傷失統。絡血上泛。凡寒涼止血理嗽。不但敗胃妨食。決無一效。從仲景元氣受損。當進甘藥。冀胃土日旺。柔金自寧。

黃芪

生白芍

五味

炙草

南棗

飴糖

某勞傷嗽血

生黃芪皮 三錢

茯苓 三錢

炙黑甘草 五分

黃精 三錢

南棗 三錢

錢四一形神積勞氣泄失血食減喘促由氣分陽分之傷非

酒色成勞之比黃芪建中湯去姜桂

陸脉細形瘦血後久咳不已復加喘促緣內損不肯充

復所投藥餌肺藥理嗽居多當此天令收肅根蒂力怯

無以攝納陰之戀陽多升少降靜坐勉可支撐身動勃

勃氣泛所納食物。僅得其悍氣。未能充養精神矣。是本
身精氣暗損爲病。非草木攻滌可却。山林寂靜兼用元
功。經年按法。使陰陽漸交。而生生自振。徒求諸醫藥。恐
未必有當。建中湯去姜加茯苓。

董二此內損症。久嗽不已。大便不實。夏三月。大氣主泄。血
吐後。肌內麻木。骨痠痠疼。陽明脈絡不用。治當益氣。大
忌肺藥清潤寒涼。

黃芪

炙草

苡仁

白芨

南棗

米糖

李二飲酒少穀。中氣先虛。酒力溫散助熱。絡血隨熱氣以

上沸血止之後。頓然食減脘痞。顯是中氣已因敗靜坐
稍舒煩言咳急。當以調中爲急。若見血見咳。卽投寒涼。
清陽愈傷。日就敗壞矣。雖酒客忌甘。然救其苦寒藥傷。
勿拘此例。戊巳寸不加南棗。

王入脉奕形勞失血。小建中加玉竹。

顧八勞心。神耗營損。上下見血。經年日衰。今勉納穀不飢。
中焦因不至運。滋陰清肺。更令傷中無邪。病好藥欲盡。
其安。須山居靜養。寒暑無害。方得堅固。異功散。

錢七形瘦。肝左數是陰分精奪。自述談笑或多或少。或胃中飢。
虛必衝氣咳逆。前年已失血盈碗。此下損精血有形難。

復以畧精飲食氣返不趨急以甘藥益胃中流砥柱病至中不可緩矣

人參

茯神

炙草

山藥

許四勞倦傷陽形寒失血咳逆中年不比少壯火亢之嗽血黃芪建中湯

徐二奔走五日卽是勞力動傷陽氣血從右起夜有冷汗乃陽絡空際而泄越矣凡治吐血之初多投涼血降氣以冀其止孰知陽愈滲泄益增病劇屢矣

黃精

黃芪

炙草

苡仁

茯神

汪肝風膨脹胃氣必虛酒客不喜柔膩肌柔色嫩質體

氣弱清明春木大旺理必犯土急宜培養中宮中有砥柱風陽不得上越而血可止矣。

人參

炒黃芪

炒山藥

茯苓

炒白芍

炙草

朱二秋暑失血初春再發診脉右大頗能納食金匱云男子脉大爲勞極虛者亦爲勞要之大者之勞是煩勞傷氣脉虛之勞爲情慾致損大旨要病根驅盡安靜一年可愈。

生黃芪

北沙參

苡仁

炙草

白芨

南棗

某勞力煩心失血。早食則運。暮食飽脹。踈補調中方。

人參

茯苓

炙草

生穀芽

廣皮

白芍

馮四脉弦勁。按之空豁。久嗽。先有瀉血。大便不實。近又嗽血。是積勞久損。陰陽兩虧。今食不欲餐。先宜甘溫益氣。但貧窘患此。參苓未能常繼。斯爲難調。

人參

黃芪

茯苓

炙草

苡仁

白朮

許四頻頻傷風。衛陽已踈。而勞怒亦令陽傷。此失血症。當獨理陽明胃壯。則肝犯自少。脉右空大。可証。若三陰之

熱蒸脉必參於左部。

人參

一錢

黃芪

三錢

炙草

五分

煨姜

一錢

南棗

二錢

又甘溫益胃血止五日。食腥膻怒。血咳復來。不獨衛陽
踈豁。絡脉空動若谷。豈沉寒者寒。冀獲片時之效。倘胃
口拒納。無法可投。按脉微瀉。議治心營肺衛。

人參

黃芪

炙草

南棗

白芨

茯神

棗仁

湯三脉細促。右空大。爪甲灰枯。久嗽入春夏見紅。食減身
痛。形容日瘁。是內損難復。與養營法。

人參

炒白芍

歸身

炙草

桂枝木

廣皮

煨姜

南棗

丁二 夏季痰嗽入冬失血自述晝卧安逸微寒熱不來則知二氣已損傷身動操持皆與病相背脉大無神面無膏澤勞怯不復元大著溫養甘補使寢食兩安若以痰嗽爲熱日餌滋陰潤肺胃傷變症調之無益

歸芪異功散

陳二

失血前後心痛

歸建中去姜

某

形瘦色枯脉濡寒熱失血心悸是營傷

歸芪建中

去姜

某

脉芤汗出失血背痛此爲絡虛

人參

炒歸身

炒白芍

炙草

棗仁

茯神

某氏失血半年。心悸忪。脇下動。絡脉空。隙。營液損傷。議甘緩辛補。

枸杞

栢子仁

棗仁

茯神

炙草

桂圓

又生地

阿膠

小麥

廣三七

烏賊骨

羌絲子

茯神

扁豆

夜服三錢

徐九龍課之勞。心脾營傷。食酸助木。中土更虧。春陽主升。

血乃大吐。况茹素既久。當培土。營陰損極。熱自內熾。非

實火也

歸脾湯去參

陳二先患失血復遺驚駭平素有遺泄獨處囁語是有形

精血無形神氣交傷漫言治痰治血真粗工卑陋矣補

精宜填安神宜靜然無形真氣爲要與心脾二經主治

人參

一錢半

當歸

一錢半

茯神

三錢

棗仁

三錢

遠志

七分

炙草

三分

桂圓

二錢

龍齒

二錢

金箔

五張

沖入

必遇節血症反覆脉弱廢食脇痛胃爽無治咳止血之

理扶得胃口受納可商調理

人參

炙黃芪

當歸炭

棗仁

茯神

炙草

桂圓肉

又歸脾去木香遠志加枸杞子

三思鬱傷於心脾二漢主乎營血營出中焦臟陰受損陰虛生熱薰蒸絡脉致血不寧靜食少痰多色澤少華皆虛象也不宜久進涼潤嗽藥當以錢氏異功散間進歸脾湯裁木香

馬六上秋下血今年湧血飲橘餅湯甘辛心中如針刺營枯液耗不受辛藥但以甘藥柔劑與心脾有益

人參

黃精

茯神

栝子仁

炙草

南棗

某老弱虛咳失血

臨證指南醫案

卷二

吐血

空

勞心過
度陽升

馮

生黃芪皮 歸身

煨姜

大棗

診脉左手平和。尺中微動。右手三部。關前動數。尺脉帶數。夜卧不寐。咳噎有血。晝日咳噎無血。但行走微微喘促。夫陰陽互爲樞紐。隆冬天氣藏納。緣煩心勞神。五志皆動。陽不潛伏。當欲寐之時。氣機下潛。觸其陽氣之升。衝脉升動。絡中之血。未得寧靜。隨咳噎溢於上。竅主於步趨言談。亦助其動。搏氣火。此咳噎喘息失血。同是一原之恙。當靜以制動。投藥益水生金。以制君相之火。然食味宜遠辛辣熱燥。凡上實者必下虛。薄味清肅上焦。正謂安下。令其藏納也。愚見約方。察末俟裁。

生薑

勿碎

麥冬

川斛

土阿膠

錢二

小根生地

錢二真北沙參

錢半

又診脈同前。述心中怯冷。交四更咽中乾。咳嗆連聲。必血已盈口。論心營肺衛皆在上焦。更擬欬心液滋肺津。

一法。

炒棗仁

勿研

鮮生地

錢三

天冬

錢一

炒麥冬

錢一

茯神

錢半

黑牛膝

錢半

茜草

錢一

參三七

磨沖錢一

又熟地

錢四

生地

錢二

天冬

錢一

麥冬

錢一

北沙參

錢三

茯神

錢一

卧時服天王補心丹

心營熱

查十二舌辣。失血易饑。

吐血

三

生地

玄參

連翹心

竹葉心

丹參

鬱金汁

陳

血止。脈兩寸未和。仍議心營肺衛方。

生地

生扁豆

麥冬

北沙參

丹參

茯苓

陳

夜熱。和迫血妄行。議清營熱。

犀角

鮮生地

丹皮

白芍

邵

營熱失血

生地

竹葉心

玄參

丹參

川斛

茯神

王十脉右大。失血知饑。胃陽上逆。咽乾喉痒。

生地

扁豆

玄參

麥冬

川斛

新荷葉汁

某四脉右濇。初氣冲失血。咳逆能食。無味。血來潮湧。乃陽明胃絡空虛。血隨陽升而然。法當填中爲要。着莫見血治咳。而用肺藥。斯症可圖。正在此歟。

大淡菜

兩

生扁豆

五錢

麥冬

二錢

川斛

三錢

茯神

三錢

牛膝炭

半錢

陶六色黃。脉小數。右空大。咳嘔血溢。飲食漸減。用建中旬日頗安。沐浴氣動。血咳復至。當以靜藥養胃陰方。

臨證指南醫案

卷二

吐血

三

金匱麥門冬湯去半夏

郭 脉右部不鼓擊應指。惟左寸數疾。昨晚失血之因。因於僞候於物。致陽明脉絡血升。今視面色微黃。爲血去之象。不宜涼解妨胃。倣古血脫必先益氣。理胃又宜遠肝。

人參

秋石水拌烘

黃芪

阿膠

茯神

炙草

生白芍

王六 腸紅愈後。吐血一兩月必發。此陽明胃絡氣血皆多。故吐後寢食如昔。久發陰虧。仍有內損之憂。宜養肺胃之陰以和陽。

生黃芪

北沙參

麥冬

生甘草

茯神

元米湯煎

程二吐血數發。肢震而熱汗出。寐中驚惕。蓋陽明脈絡已虛。厥陰風陽上熾。飲食不爲肌膚。皆消燦之徵也。

生黃芪

北沙參

生牡蠣

麥冬

小麥

南棗

程二脉左小數右弦。食減不飢。易於傷風。大便結燥。冬春已見血症。夫胃陽外應衛氣。九竅不和。都屬胃病。由冬失藏聚。發生氣少。遇長夏熱蒸。真氣漸困故也。急宜絕慾靜養。至秋分再議。

參鬚

黃芪皮

鮮蓮子

茯神

炒麥冬

生甘草

某着右卧眠。喘咳更甚。遇勞動陽痰必帶血。經年久嗽。

三焦皆病

麥門冬湯

華三勞怒用力。傷氣動肝。當春夏天地氣機皆動。病最易發。食減過半。熱升冲咽。血去後。風陽皆熾。鎮養胃陰。勿用清寒理嗽。

生扁豆

沙參

天冬

麥冬

川斛

茯神

又衝氣攻腹。遶喉。乃肝胆厥陽肆橫。久久虛損。而喘痰。

減食皆犯胃之象若不靜養經年必甚

甜北沙參 生白扁豆 生黃芪皮 茯苓

炙草 白糯米半升泡清湯煎藥

徐陰臟失守陽乃騰越咳甚血來皆屬動象靜藥頗合
屢施不應乃上下交征陽明絡空隨陽氣升降自由先
以柔劑填其胃陰所謂執中近之 金匱麥門冬湯去
半夏加黃芪

某^五失血後咳嗽不飢此屬胃虛宜治陽明

甜北參 生扁豆 麥冬 茯苓 川斛

陸食酸助木胃土受傷脘中陽逆絡血上溢內經辛酸

太過都從甘緩立法穀少氣衰沉苦勿進

生扁豆

北沙參

炒麥冬

茯苓

川斛

甘蔗漿

又甘涼養胃中之陰痰少血止兩寸脉大心煩脊熱汗出營熱氣泄之徵議用竹葉地黃湯

鮮生地

竹葉心

炒麥冬

建蓮肉

川斛

茯神

陶一兩年前吐血咳嗽夏四月起大凡春盡入夏氣機升泄而陽氣弛張極矣陽既多動陰乏內守之職司絡血由是外溢今正交土旺發泄欲病氣候急養陽明胃陰

夏至後兼進生脉之屬勿步趨於炎歊烈日之中可望其漸次日安 金匱麥門冬湯去半夏

王二見紅兩年冬月加嗽入春聲音漸漸喉舌乾燥診脉小堅厚味不納胃口有日減之虞此甘緩益胃陰主治

麥冬

雞子黃

生扁豆

北沙參

地骨皮

生甘草

盧四脉大色蒼冬月嗽血納穀減半迄今乾咳無痰春夏間有吐血夫冬少藏聚陽升少制安閑靜養五志氣火自平可望病愈形瘦穀減當養胃土之津以生金

甜北參

麥冬

玉竹

木瓜

生扁豆

生甘草

某二脉右大左虛夏四月陽氣正升煩勞過動其陽絡中
血溢上竅血去必陰傷生熱宜養胃陰大忌苦寒清火

北沙參

生扁豆

麥冬

生甘草

茯神

川斛

某九脉搏血湧飢易納食風陽過動而爲消爍若不自保
攝餌藥無益

生地

天冬

丹參

茯苓

生扁豆

川斛

倪三陽明脉弦空失血後咽痺卽噎是納食雖強未得水

穀精華之游溢當益胃陰

北沙參

生扁豆

麥冬

杏仁

生甘草

糯米湯煎

徐一失血能食痰嗽色蒼脉數可與甘涼養胃中之陰胃

和金生痔血便秘柔藥最宜

生扁豆

生地

天冬

麥冬

銀花

柿餅灰

側柏葉

某失血咽乾

稽豆皮

錢三

丹參

錢一

麥冬

牛

川斛

牛

藕汁

錢一

小

陳胃虛客氣上逆爲呃噎痰帶血星咽中微痛姑擬鎮

逆胃虛氣

臨證指南醫案

卷二

吐血

三

攝法

人參 熟地炭 五味 茯苓 青鉛

又 照前方去青鉛加麥冬川斛遠志炭

和肝胃不

孫三 脉小弦血去食減服地黃柔膩反覺呆滯且不喜肥

甘議兩和肝胃

蘇子 茯苓 金石斛 降香

鈎藤 黑山梔

蔡三 新沐熱蒸氣泄絡血止溢出口平昔痰多又不渴飲而大便頗艱此胃氣不得下行爲順之旨兼以勞煩噴怒治在肝胃

金石斛

紫降香

炒杏仁

橘紅

薏仁

茯苓

萬 脉數左堅。當夏四月。陽氣方張。陡然嗔怒。肝陽勃升。絡血上湧。雖得血止。而咳逆欲嘔。眠卧不得。欬左。此肝陽左升太過。木火水酒陰虧。則生熱。是皆本體陰陽迭偏。非客邪實火。可清可降之比。最宜恬澹無爲。安靜幽閒。經年不反。可望轉偏就和。但調藥治胃。減損怯矣。經云胃欲之狀。欬逆而嘔。木犯胃土。貫膈。卽至冲咽入肺。肺衰木反刑金。從內經甘緩以制其急。

米炒麥冬

糯稻根鬚

女貞子

茯苓

生甘草

南棗肉

又乙癸同治益胃養陰

人參

秋石湯洗
烘乾爲末

生地

熟地

天冬

麥冬

以人參末收實

某血去胃傷當從中治。况五年前勞怒而得病。肝木無
不尅土。腎者溫補競進。氣壅爲脹。至夜咽乾無寐。食物
不思。杳不知味。爲嘔爲咳。全是胃陽升逆。經云胃不和
則卧不安。而陽不潛降。似屬濁氣膠痰有形之物。阻撓
升降而然。古人有二虛一實。當先治實。以開一面之文。
余從胃病爲主。制肝救中。理氣清膈。乃不足中有餘。圖

通之治此機勿得亂治

人參

枳實

半夏

杏仁

甘草

竹茹

生姜

大棗

李 暴怒肝陽大升胃絡血湧甚多已失氣下行爲順之
肯仲淳吐血三要云降氣不必降火目今不亂不納寒
膩之藥所致

炒蘇子

降香汁

山梔

炒山查

鬱金

茯苓

川斛

丹參

某 左脉細堅搏指肝陽逆失血汗

熟地

五味

炙草

牛膝

白芍

桂心

童便冲

李氏脉細小如無。素多鬱怒。經來卽病。冬月胃痛。隨有咯血不止。寒戰面赤。驚惕頭搖。顯是肝陽變風。絡血沸起。四肢逆冷。真炁衰微。內經有肝病暴變之文。勢豈輕渺。議用景岳鎮陰煎法。制其陽逆。仍是就下之義。

熟地炭

牛膝炭

肉桂

茯神

生白芍

童便

又經來血止。肝病何疑。

炒查肉

當歸

炒延胡

澤蘭

桃仁

茯苓

氣

沈氏血後久咳。腕痛食減。經閉便溏。疑連服藥。

蘇子

炒丹皮

桃仁

鬱金

鉤藤

白芍

血各藥

蔡三水寒外加。驚恐內迫。陰癰三年。繼患嗽血。迄今七年。

未有愈期。詢及血來紫塊。仍能知味。安穀。察其虛傷。驚傷。必是肝絡凝滯。得怒勞必發。勿與酒色。傷損亂投。滋陰膩濁之藥。恐胃氣日減。致病漸劇。

桃仁 三錢

鯊甲 三錢

川桂枝 七分

歸鬚 一錢

大黃 五分

羌蔚子 二錢

柴二勞傷寒。煖不勻。脇痛嗽血。食物不減。宜降氣和絡。

臨證指南醫案

卷二 吐血

半

蘇子

茯苓

降香

橘紅

桔梗

苡仁

韭白汁

陸 交春分前五日。肝木升旺之候。涎血大吐。胸脘不爽。此久鬱氣火灼熱。神志失守。遂多驚恐。絡中之血。隨火升氣逆而上。當先降其氣。不宜寒苦碍阻。

蘇子

降香

丹參

查肉

桃仁

鬱金

枳殼

黑梔皮

吳

脈瀉能食咳血

降香

桃仁

鬱金

蘇子

炒山查

苡仁

韭白汁

中人

姚^四五此勞傷身動失血。脇有瘕聚。因咳甚而血來。先宜降氣。

蘇子

苡仁

茯苓

黑山梔

丹皮

降香

荊芥炭

牛膝炭

藕汁

尖^三四形畏冷寒熱左脇有宿痞失血咳嗽。曾驟勞力。經年。疔癰。藥不易效。

旋覆花

新絳

歸鬚

炒桃仁

栝子仁

茯神

何^三七左乳傍脇中。常似針刺。汗出心嘈能食。此少陽絡脉。陽氣燔灼。都因謀慮致傷。將有絡血上湧之事。議清絡。

宣通勿令瘀着

生地

丹皮

澤蘭葉

桃仁

鬱金

琥珀末

又服通絡方瘀血得下新血亦傷。嘈雜善飢。陽亢燔灼。營陰不得涵護也。仍以和陽熄風方法。

阿膠

雞子黃

生地

麥冬

生甘草

生白芍

王十二吐血後不飢胸背痛

蘇子

桔梗

鬱金

黃芪

山梔皮

降香

羅一八因左脉堅搏兩投柔劑和陽益陰血未得止而右胸似痞左脇中刺痛此少陽絡脉經山之所夫膽爲清淨之腑陰柔滋養未能宣通絡中是痛咳未罷議以辛潤宣暢通劑。

桃仁

丹皮

歸鬚

栝子仁

澤蘭

降香末

又照前方去降香末澤蘭加黑山梔皮

又辛潤痛嗽皆減累進苦降脇右皆痛不但絡空氣分亦餒古人以身半以止爲陽原無取乎沉苦。

桃仁

栝子仁

鮮生地

玄參

鮮銀花

四 脉左弦。右小濡。據病原起於憂鬱。鬱勃久而化熱。蒸迫絡脉。血爲上溢。凝結成塊者。離絡留而爲瘀也。血後納食如昔。是腑絡所貯頗富。况腑以通爲用。血逆氣亦上併。漉漉有聲。皆氣火旋動。非有形質之物。凡血病五臟六腑皆有。是症當清陽明之絡爲要。至於病發當治其因。又不必拘執其常也。

枇杷葉

苡仁

茯苓

蘇子

桑葉

丹皮

炒桃仁

降香末

某。努力咳血。胸背悉痛。常用仲淳法。

蘇子

降香汁

炒丹皮

苡仁

冬瓜仁

炒桃仁

牛膝

川貝母

某冬令過溫。人身之氣不得潛藏。陰弱之質。血隨氣逆。診得陽明脈動。吐出痰黑。絡中離位之血。尚有未可以止瀉爲事。

生地

丹參

丹皮

降香

桃仁

牛膝

韭汁

童便中

某肝逆失血

蘇子

鬱金

降香汁

炒丹皮

鈎藤

赤芍

丹參

茯苓

白糯米湯煎

候九。胃脘當心。肝經交絡所過。上布於肺。咳嗽胃旁作痰。

腹脹。絡氣逆也。當慮失血。脈數能食。宜和絡氣。

生地

桃仁

桑葉

丹皮

麥冬

茯神

血榮源
胸脇痛

陳二

吐血八日。腕悶脇痛。肢冷。絡傷氣窒。先與降氣和血。

蘇子

鬱金

杏仁

茯苓

桃仁

降香

翁

問。謂讀靜坐。痰血夏發。入冬不已。胸脇痛引背部。脈

小微滿。非慾傷陰火。夫痛爲絡脈失和。絡中氣逆血上。

宗仲淳氣爲血帥

蘇子

苡仁

茯苓

山查

桑葉

丹皮

降香末

老韭白

江診脉數。涕有血。嗽痰。冷熱外因。動肺。緣素患肝痺。左脇不耐卧着。恐陽升。血溢。微用苦辛泄降。不宜通劑。

黑山梔

桑葉

花粉

知母

瓜蒌皮

降香

沈左脇岑脹。攻觸作楚。咳痰帶血。無非絡中不得寧靜。姑進降氣通絡方。

降香汁

蘇子

苡仁

茯苓

橘紅

鈎藤

白蒺

韭白汁

又脉右長。陰血仍宜降氣。

蘇子

苡仁

茯苓

山梔

丹皮

鉤藤

鬱金

金九飢飽勞力。氣逆血瘀。胸膈頻吐。此液耗陽升。上逆不

已。血無止期。先宜降氣通調。莫與膩塞。

蘇子

降香

桃仁

丹參

韭白汁

山梔

茯苓

某四脈弦。失血。脇痛氣逆。

枇杷葉

冬瓜子

蘇子

苡仁

炒丹皮

桃仁

降香汁

牛膝炭

方二憂思拂鬱。五志氣火內燔。加以烟辛泄肺。酒熱戕胃。

精華營液爲熱蒸化敗濁。經云陽絡傷則血外溢。胃絡受傷陽明氣血頗富。猶勉強延磨歲月。至於陽明脈絡日衰。斯背先發冷。右脇痠疼而咳吐不已。胃土愈虛。肝木益橫。厥陽愈逆。穢濁氣味無有。非自下泛上。大凡左升屬肝。右降屬肺。山中焦胃土既困。致有升無降。壅阻交迫。何以着左臥眠。越其升逆之威。且煩蒸熱灼並無口渴飲水之狀。病情全在血絡。清熱滋陰之治。力量不能入絡。茲定清養胃陰爲主。另進通絡之義。肝膽厥陽少和。冀其涎少脇通。積久沉疴。調之非易。

桑葉

丹皮

薏仁

蘇子

鈎藤

鬱金

降香

桃仁

又桑葉

枇杷葉

苡仁

大沙參

蘇子

茯苓

鬱金

降香

又早服瓊玉膏

胡七有年冬藏失司似乎外感熱藏辛散苦寒是有餘實
症治法自春入夏大氣開泄日見厭懶疲倦呼吸嘆息
有聲脇肋室板欲痛咯紫血絡脉不和議以辛補通
調不致寒凝燥結並免隴絡上下交阻之累

柏子仁

細生地

當歸鬚

桃仁

降香

茯神

石四先有骨痛鼓腰每至旬日必吐血或黃白或冬人夏皆然近僅可仰臥着石則咳逆不已據說因怒勞致病都是陽氣過動而消渴舌翳仍納穀如昔姑以兩和厥陰陽明之陽非徒泛泛見血見嗽爲治

石膏

熟地

麥冬

知母

牛膝

又石膏

生地

知母

丹皮

大黃

桃仁

牛膝

將六宿傷怒勞動肝血溢紫塊先以降氣導血

蘇子

降香木

桃仁

黑山梔

金斛

製大黃

又 天地杞圓加棗仁茯神

某 形盛脉弦目皆黃咳嗽痰結濁嘔血此胃有濕熱膠痰因怒勞動肝故左脇中痛血逆而升非虛損也當薄味靜調戒嗔怒百日可却

蘇子 降香 廣皮白 生姜 桃仁

鬱金 金斛 六服後接服海粉九半觔

勞力傷
某 向有背痛尚在勞力氣逆咳血乃勞傷病也

歸建中去姜加茯苓

某 八 努力傷絡失血面黃口中味甜腕中煩悶衝氣病在肝胃勿以失血治以滋膩

旋覆花

代赭石

半夏

淡乾姜

塊茯苓

南棗肉

呂二脉數上出右脇上疼則痰血上溢必因嗔怒努力勞煩致絡中氣阻所致宜安閑靜攝戒怒慎勞一歲之中不致舉發可云病去

降香末

八分

炒焦桃仁

錢三

丹皮

錢一

野鬱金

錢一

茯苓

三錢

黑山梔

錢一

丹參

錢一

橘紅

錢一

吳氏氣寒失血咳嗽心熱至暮寒熱不思納穀此杞鬱內損二陽病發心脾若不情懷開張服藥無益

阿膠

麥冬

茯神

白芍

北沙參

女貞子

李氏情志久鬱氣逆痰喘入夏咳血都因五志陽升况脫有聚氣二年寡居隱曲不伸論理治在肝脾然非藥餌奏功。

降香木

枇杷葉

蘇子

鬱金

瓜蒌皮

黑梔皮

茯苓

苡仁

吳氏鬱損咳血頻發當交節氣逆嘔吐肢冷厥逆所現俱是虛勞末路豈是佳景勉擬方

生白芍

烏梅

炙草

炒麥冬

扶神

橘紅

張氏

失血。口碎舌泡。乃情懷鬱勃。內因營衛不和。寒熱可

熾。病鬱延久。爲勞所喜。經水尚至。議手厥陰血分主治。

犀角

金銀花

鮮生地

玄參

連翹心

鬱金

失血一症。名目不一。茲就上行而吐者言之。三因之
來路宜詳也。若夫外因起見。陽邪爲多。蓋犯是症者。
陰分先虛。易受天之風熱燥火也。至陰邪爲患。不過
廿中之一二耳。其治法總以手三陰爲要領。究其病
在心營肺衛如何。若夫內因起見。不出乎嗔怒鬱勃
之激傷肝臟。勞形苦志而耗損心脾。及恣情縱慾以

賊腎臟之真陰真陽也。又當以足三陰爲要領。再審其乘侮制化如何。若夫不內不外因者。爲飲食之偏好。努力及墜墮之傷。治分臟腑經絡之異。要知外因而起者。必有感候爲先。裡因而起者。必有內症可據。此三因根蒂用藥。切勿混亂。大凡理肺衛者。用甘涼肅降。如沙參、麥冬、桑葉、花粉、玉竹、川斛等類。治心營者。以輕清滋養。如生地、玄參、丹參、連翹、竹葉、骨皮等類。以此兩法爲宗。隨其時令而加減。若風淫津涸。加以甘寒。如蘆根、蔗汁、薄荷、羚羊之品。若溫浮火壯。參入苦寒。如山梔、黃芩、杏仁、石膏之品。若暑逼氣分。佐

滑石鮮荷之開解。在營與銀花犀角之清芳。秋令選
純甘以清燥。冬時益清補以助藏。凡此爲外因之大
畧。所云陰邪爲患者。難以並言也。舊有麻黃人參芍
藥湯。先生有桂枝加減法。至於內因傷損。其法更繁。
若噤怒而動及肝陽。血隨氣逆者。用繆氏氣爲血帥
法。如蘇子鬱金桑葉丹皮降香川貝之類也。若鬱勃
日久而傷及肝陰。木火內燃陽絡者。用柔肝育陰法。
如阿膠鷄黃生地麥冬白芍甘草之類也。若勞煩不
息而偏損心脾氣不攝血者。用甘溫培固法。如保元
湯歸脾湯之類也。若縱慾而竭其腎真。或陽亢陰騰。

或陰傷陽越者有從陰從陽法如青鉛六味肉桂七
味並加童便之類也若精竭海空氣泛血湧者先生
用急固真元大補精血法如人參枸杞五味熟地河
車紫石英之類也凡此爲內因之大畧至於不內不
外因亦非一種如案中所謂烟辛泄肺酒熱戕胃之
類皆能助火動血有治上治中之法如葦葉湯甘露
飲茅根藕汁等劑在人認定而用之可也墜陷之傷
由血瘀而泛大抵先宜導下後宜通補若努力爲患
屬勞傷之根陽動則絡鬆血溢法與虛損有間滋陰
補氣最忌凝滯如當歸建中湯旋覆花湯虎潛丸金

剛四斤九取其有循經入絡之能也凡此爲不內外
因之大畧但血之主司者如心肝脾三臟血之所生
化者莫如陽明胃腑可見胃爲血症之要道若胃有
不和當先治胃也仁齋直指云一切血症經久不愈
每每以胃藥收功想大黃黃連瀉心湯犀角地黃湯
理中湯異功散雖補瀉寒溫不同確不離此旨所以
先生發明治胃方法獨多有薄味調養胃陰者如金
匱麥冬湯及沙參扁豆茯苓石斛之類有甘溫建立
中陽者如人參建中湯及四君子加減之類有滋陰
而不碍胃甘守津還者如復脈湯加減之類其餘如

補土生金法、鎮肝益胃法、補脾疏胃法、寧神理胃法、
腎胃相關法、無分症之前後。一遇胃不加餐、不饑難
運諸候、毋從此義見長、源源生化不息、何患乎病之
不易醫也、邵新甫

失音

寒熱客
初起腫

吳六外冷內熱久逼失音用兩解法 麻杏甘膏湯

宋十三先失音繼喉痺是氣分窒塞微寒而熱水飲喻出咯痰隨出隨阻此仍在上痺舌黃口渴議與苦辛寒方

射干

麻黃

杏仁

生甘草

石膏

苡仁

陸二秋涼燥氣咳嗽初病皮毛凜凜冬月失音至夏未愈而納食頗安想屢經暴冷暴暖之傷未必是一氣之餒做金實無聲議治

麻黃

杏仁

生甘草

石膏

射干

苡仁

又

蘆根汁

杏仁汁

萊菔汁

鮮竹瀝

熬膏

范三

氣燥喉痺失音少陽木火犯上

生雞子白

冬桑葉

丹皮

麥冬

生白扁豆殼

某

喉乾失音一月未復津液不上供肺失清肅右寸脈

浮大

枇杷葉

一錢

馬兜鈴

八分

地骨皮

一錢

桑皮

八分

麥冬

一錢

生甘草

三分

桔梗

六分

白粳米

一錢

胆火喉

氣分燥
津液虧

大血
腹虧

某

血後音啞便澀

生扁豆

炒白芍

炙草

川斛

山藥

米糖

大棗

何

勞損氣喘失音全屬下元無力真氣不得上注紛紛

清熱治肺致食減便澀改投熱藥又是劫液宜乎喉痹
神疲矣用補足三陰方法

熟地

五味

炒山藥

茯苓

芡實

建蓮肉

孫

久咳失音喉痺

陳阿膠

同煎
錢

生雞子黃

同煎
一枚

炒麥冬

半

錢
川斛

三錢

甜北沙參

半錢

炒生地

二錢

生甘草

三分

扶神

半錢

夫宮商角徵羽歌哭呼笑呻此五臟所屬之音聲也。原其發聲之本在於腎其標則在乎肺。病有虛實由咳嗽而起者居多。或肺有燥火外感寒邪火氣鬱遏而瘖者有肺金燥甚木火上炎咽乾喉痺而瘖者有風熱痰涎壅遏肺竅而瘖者有喘急叫號致傷會厭者亦有龍相之火上炎燔燥肺金久咳不已而瘖者有內奪而厥則爲瘖俳此腎虛也是即暴中之不能言者也。先生有金空則鳴金實則無聲金破碎亦無聲此三言足以該之矣。有邪者是肺家實也無邪者

是久咳損肺。破碎無聲也。其治法有寒者散寒。有火者清火。有風痰則祛風豁痰。若龍枯上炎。燥肺者宜金水同治。若暴中之瘡。全屬少陰之虛。宜峻補肝腎。或稍兼痰火而治之。其用藥總宜甘潤而不宜苦燥。斯得之矣。華嶠雲

肺痿

辛散
和傷肺
胃津液

洪二 勞煩經營。陽氣弛張。即冬溫外。因咳嗽。亦是氣泄。邪侵辛以散邪。苦以降逆。希冀嗽止。而肺欲辛。過辛則正氣散失。音不能揚。色消吐涎喉痺。是肺痿難治矣。倣內經氣味過辛。主以甘緩。

北沙參

沙麥冬

飴糖

南棗

查二 脉細心熱。呼吸有音。夜寤不寐。過服發散。氣泄陽傷。四 爲肺痿之病。仲景法以胃藥補母救子。崇生氣也。

金匱麥門冬湯

徐四肺痿。頻吐涎沫。食物不下。並不渴飲。豈是實火。津液
蕩盡。二便日少。宗仲景甘藥理胃。乃虛則補母。仍佐宣
通。腕間之忤格。

人參

麥冬

熟半夏

生甘草

白梗米

南棗肉

沈積勞憂思。固是內傷。冬溫觸入。而爲咳嗽。乃氣分先
虛。而邪得外乘。辛散斯氣。分愈泄。滋陰非能安上。咽痛
音啞。虛中邪伏。恰值春暖陽和。脈中脈外。氣機流行。所
以小效。旬日者。生陽漸振之象。藪雨暴冷。驟加衛陽。又
弱。不能擁護。致小愈病復。診得脈數而虛。偏大於右寸。

口吐涎沫不能多飲湯水面色少華五心多熱面足背浮腫古人謂金空則鳴金實則無聲金破碎亦無聲是爲肺病顯然然內傷虛餒爲多虛則補母胃土是也肺痿之病議示仲景麥門冬湯

王十潰湯流膿經

年脉細色奪聲嘶食減咳嗽喉中梗痛

皆漏損脂液陰

失內守陽失外衛肺痿之病諒難全好

人參

黃芪

苡仁

炙草

歸身

白芨

顧三久咳神衰氣

促汗出此屬肺痿

黃芪

蜜炙八兩

生苳仁二兩

白百合四兩

兩

炙黑甘草二兩

氣不
除

湯

白芨

四川

南棗

四川

水熬膏米飲湯送

肺氣不降咳痰喘逆

鮮蘆根

桃仁

絲瓜子

苡仁

肺痿一症概屬津枯液燥多由汗下傷正所致夫痿者萎也如草木之萎而不榮爲津亡而氣竭也然致痿之因非止一端金匱云或從汗出或從嘔吐或從消渴小便利數或從便難又被快藥下之重亡津液故令肺熱乾痿也肺熱乾痿則清肅之令不行水精四布失度脾氣雖散津液上歸於肺而肺不但不能自滋其乾亦不能內瀝陳於六腑外輸精於皮七也

其津液。肺貯其中。得熱煎熬。變爲涎沫。段師作咳。唾之不已。故乾。有自乾。唾者自唾。愈唾愈乾。痰病成矣。金匱治法。貴取其精意。大意生胃津。潤肺燥。補氣。以通肺之小竅。清火藥。以復肺之清肅。故外臺用炙甘草湯。在於益肺氣之虛。潤肺金之燥。千金用甘草湯。及生薑甘草湯。用參甘以生津化熱。姜椒以宣上焦之氣。使胃中之陽不滯。而陰火自熄也。及觀先生之治肺痿。每用甘緩理虛。或宗仲景甘藥理胃。虛則補母之義。可謂得仲景心法矣。鄒時乘