

萬氏家傳育嬰

萬氏家藏育嬰家秘卷之三

羅田密齋萬全編著

治諸熱証

陽在身中主發生

奈何拂鬱熱熇煎

嬰孩本是純陽體

熱証推求有數般

人身之中溫養臟腑流通榮衛者陽氣也有風寒傷之於外則榮衛之氣不行水穀傷之於內則臟腑之氣不行不行則陽氣拂鬱而熱生焉故隨其所發以

為熱病之名也。夫傷有輕重，則熱有微盛，病有新久。則熱有虛實。此其當辨者也。錢氏有論詳見下文。

按錢氏云：心熱者，視其睛口中氣溫，或合面而臥，及上竅插頭咬牙，瀉心湯主之。肝熱者，手尋衣領及亂驗物，瀉青丸主之。脾熱者，其熱在肌肉，遇夜更深，喜搗背，臥身熱，飲水，四肢不收，瀉黃散主之。肺熱者，手搗肩，口面熱甚，喘數壯熱，飲水，瀉白散主之。一云涼隔散，腎熱者，兩足不喜衣履，蓋臍之下皆腎之所主，緣心下行于腎部也。宜地黃丸主之。一云東垣濕腎丸。

右按此論五臟之熱見前五臟歌內家傳涼驚丸金花丸三黃丸皆治五臟熱之方也。

家傳涼驚丸 退熱解毒鎮驚安神

黃連

黃芩

去腐

山梔仁

黃柏

各等分

硃砂

雄黃

俱飛減半

研極細末和勻雪水煮麩糊為丸黍米大一歲兒十五丸以漸加至五十丸薄荷湯下此黃連解毒湯加減也

大金花丸

治中外諸熱痾汗咬牙大小便不利即

前涼驚丸去胆草雄砂加九黃雪水丸又名既濟解

毒丸

三黃丸 治三焦積熱小便赤澀大便秘結此三黃  
瀉心湯也即前金花丸去枝子黃芩是也陳容為九  
如皇角子大白湯化服

按錢氏云潮熱者肝熱也時間發熱退后即退次日  
文依時發熱此欲發驚也地骨皮散主之壯熱者心  
熱也熱而不已甚則發驚癇也導赤散主之風熱者  
肺熱也身熱口中氣熱有風症人參生犀散主之濕  
熱者脾熱也但溫而不熱也瀉黃散主之  
右按此論四臟潮熱者如水之潮不失其候也吾有

寒熱則如瘧此只以時論也。故痛屬肝如日脯熱  
又屬胃者謂身常有熱至日晡尤甚也。此是宿食宜  
下之。枳朮大黃九主之地骨皮散治虛熱作潮及傷  
寒後餘熱又名人參地骨皮散。

知母

柴胡

炙草

人參

地骨皮

自研者半夏水內洗

赤茯苓

各等分

共細末諒兒大小加減入生薑一片水煎服

揚勿科引机要論表裏之熱為小兒之法以未精當  
机要之論表裏者乃風寒之氣邪自表入裏者也小  
兒之熱乃自裏而出表者也。如胎毒之熱生於命門。

變蒸之熱生於膀胱飲食之熱生於脾胃其傷寒者  
僅十之一二耳。惟直指之論傳之。

按直指云小兒表裏俱熱面黃頰赤唇焦口乾小便  
赤澀大便焦黃先以四順清涼飲為之疎利其熱即  
去。既去而復熱者裏已清而表未解也。當用惺惺帶  
少加去節麻黃以取微汗則表盡除其或表裏已解  
而熱文時來此則表裏俱虛而氣不歸元。溫浮於外  
不可再用涼藥與之解表。當為和其胃氣使陽氣歛  
而歸內。身體自冷宜參苓白朮散方見脾旺姜朮引

四順清涼飲

治小兒臍膈蘊積實熱

當歸

大黃

酒蒸

甘草

生

赤芍

各五分

或咀小煎服

惺惺散

治小兒虛熱解表

人參

桔梗

白朮

白朮

天花粉

各一兩

細辛

二錢

炙草

七分

防非

川芎

南星

生各二錢半

每服加生薑片半薄荷葉共藥末慢火煎此方煎

七味本方也

加減惺惺散

治傷風

風熱

及傷寒

鼻塞發熱

前方去人參白朮芩南星四味加 蒼朮

菴活

白朮

赤芍

麻黃

荆芥

當歸

上方治表虛熱此方治表實熱

參芩白朮散 治胃氣收斂浮陽退餘熱方見脾臟  
一小兒有病惟熱居多夫熱有虛有實實則面赤濃  
黃氣粗口熱燥渴唇腫大小便難掀揭露身煩帝暴  
斗虛則面色青白恍惚神緩口中清冷噓氣軟弱瀉  
泄多瀉夜出虛汗其或不清不溫憐憐悸惕上盛下  
瀉水琴不分此冷熱不調之痘虛熱者怪怪散實熱

背四順。湯冷飲。加柴胡。冷熱不調。則敗毒散。加木香當歸。

按全嬰論云。小兒氣稟純陽。臟腑主熱。陰陽氣變。莫薰於外。致身熱也。則兩眼赤痛流淚。羞明。或生翳障。心熱則口内生瘡。小便赤腫。淋瀝不通。肺熱則鼻衄不止。大腸必結。脾熱則多涎沫。口內常流。心脾熱則生重舌水舌。胃熱則口臭。腎熱則耳聾。或出濃汁。在所論五臟熱証。與前錢氏不同。大抵熱証俱多。不概盡也。今以上中下立法治之。頭面之熱。神芎上清丸主之。中焦之熱。赤膈散主之。下焦之熱。入正散主

之手足熱者升陽散火湯主之表裏俱熱者通聖雙  
解散主之

神芎上清丸

治一切熱証清頭面利咽隔

大黃

黃芩

各二兩

滑石

兩

薄荷葉

川芎

各半兩

桔梗

黃連

甘草

各二錢半

蜜丸芩實大每服一九或二九滾白湯化下

東垣涼隔散

治上焦積熱煩燥多渴面赤咽嗑痛

口瘡

黃芩

枝子仁

連翹

甘草

各傳分

薄荷

錢

為極細末每用淡竹葉湯入蜜少許調服或煉膏

九竹葉湯下

河間涼隔散 治中焦煩燥狂妄啼哭睡卧不安仰  
溺赤澁即前方無桔梗有大黃朴硝是也本方力黃  
連各清心湯

正散 治下焦熱二便秘結多渴咽乾口熱淋血

大黃

瞿麥

木通

滑石 未

扁豆

車前子

山枝仁

甘草稍

各等分吹咀入燈心煎服

升陽散火湯 治手足發熱此胃虛也

升麻

葛根

獨活

羌活

人参

白芍

各五

分

防丰

一錢

丰

柴胡

八分

甘草

錢各生各三

咬咀水作四劑煎服

通聖雙解散

治表裏俱熱又治瘡疹

防丰

川芎

桔梗

芍藥

黃芩

薄荷

當歸

荆芥

滑石

石膏

白朮

連翹

梔子

麻黃

大黃

朴硝

各等分

甘草

錢半

咬咀入生姜水煎調益元散服或末蜜加姜湯化

下有表無裏去硝黃有裏無表去麻黃

胎熱者兒初生十日之內便有諸熱症者宜育嬰解  
毒延齡丸。目赤腫不開者用黃連磨乳汁洗之。口瘡  
者黃連黃柏二味為末蜜水調搽。兒生滿月後有傷  
發熱者惡寒病在表宜用推拿搯法除之。惡熱病在  
裏用豬膽汁導之。勿輕汗下之。三歲以後方與大人  
同論前法主之。

夜熱者至夜則發熱啼哭不止日則無事此血熱也  
心主熱東垣安神丸主之。乳母宜服小柴胡加參黃  
湯。

餘熱者三歲以後如傷寒後裏已解又發熱者此虛熱也宜疑神散主之收斂胃氣清涼肌表

人參

白朮

白茯苓

山藥各一錢

桔梗

白扁豆炒

知母

生地

炙草各五分

竹葉

地骨皮

麥冬各五分

三歲兒分作四劑姜末引水煎頻服之

食熱者傷食得之手心壯熱暖氣吐乳大便酸臭輕者胃苓丸重者保和丸其者枳殼大黃丸不可猛浪傷胃氣也

煩熱者心煩不安多啼此心熱也錢氏安神丸主之

恐發驚搐虛熱者有二皆大病之後也如形氣未甚弱者此胃虛也宜參苓白朮散若形瘦頭髮成穗肚大足小者此疳病也宜集聖丸主之方見疳病癖熱者如瘧而不寒如潮熱而止無時面黃消瘦丸主之方見疳病

候服熱藥而發熱者宜大豆卷散主之用黑豆水浸生芽取出晒乾

炙草各等分

頁衆

板藍板

梁水煎服漿水者乃粟泔泔水也

凡人喜仰臥或合面臥者皆心熱也宜導赤散

調理脾胃

萬物五行皆藉土。

人身脾胃是根基。

四時調理和為貴。

胃氣常存怕損虧。

內經曰。胃者五臟五腑之海也。水谷皆入於胃。五臟六腑皆稟氣於胃。胃者五臟六腑之源也。萬物藉出而生。故古人以調理脾胃為醫中至道。厥有旨哉。胃主納穀。脾主消穀。皆穀氣之本也。穀多則傷胃。穀少則傷脾。全穀則胃絕。穀則亡。故人身之中。穀為寶焉。然脾喜溫而惡寒。胃喜清而惡熱。所以調理脾胃者。節其飲食。適其寒溫。為中和之道也。苟能飲食有節。

寒溫適宜則脾胃強。實外邪不能浸內邪無由起。何病之有哉。若飲食無節。寒暑不適。則脾胃虛弱。有病生矣。兒小兒脾胃常不足。非大人可比。幼小無知。口腹是貪。父母憐愛。縱其所欲。是以脾胃之病。視大人猶多也。蓋調理脾胃。必資於藥。五氣屬天。五味屬地。味氣之中。惟其平者土之性也。古人立法。必四氣渾合。五味相濟。所以合於四時。五臟陰陽。揆度以為常也。今幼科方中。多用丁香。豆蔻。益智。仁。砂仁之例。一切辛燥者。集群成劑。溫養脾胃。耗散陽氣。熬煎陰血。甚非所宜也。蓋調理脾胃之法。固難。而變通之法。尤難。

熱則消於肌肉。寒則減於飲食。吾在家秘養脾丸以  
和中進飲食之傷。肥兒丸以補脾胃之弱。又加黃芪  
調元湯。錢氏異攻散。參苓白朮散。皆調理脾胃之要  
藥也。茲於其間又取古方可用者以補其未盡之法  
於左。

加減異攻散調理脾胃傷食不消

神曲炒

麥芽

山楂肉

傷食嘔吐加半夏

藿香

乾姜炒

如吞酸水再加

黃連

將吳茱萸  
同炒去萸

傷食胸膈痞悶加

半夏

枳實

黃連 姜汁炒 去白朮

傷食腹痛加木香

砂仁

常覺氣逆去人參

白朮

加半夏

枳壳

桔梗

香附

傷食泄瀉酸臭者加

木香

黃連

澤泄 細末

姜朮湯調服

加味理中丸

治脾胃虛寒不進飲食嘔吐瀉泄或

服寒藥太過用白朮

四錢

人參

白朮

神曲 各一錢

砂仁

乾姜

煨

麥芽

炒各二錢

炙草

半錢

煉蜜丸姜湯嚼下

加味平胃散

治脾胃不和不思飲食用平胃散

加人參一錢 白朮錢半

東肉和丸姜湯下

健脾丸 養脾進食調理胃氣和養榮衛即前胃苓

丸方內加

山藥

蓮肉各二錢

木香

砂仁八分

當歸

麥芽炒各一錢

白朮錢半

神曲炒各二錢

東肉和丸米飲下

人參白朮膏

治脾胃虛弱肌膚瘦快欲成痺症者

人參

白朮炒土

茯苓

山藥

蓮肉

去心各一兩

山查

錢七

當歸

麥芽炒

澤泄名五錢

末煉蜜丸能服夫每服一九朱飲化下

○感冒四氣

感冒天時四氣中

小兒赤與大人同

必先歲氣無輕犯

寒熱溫涼有逆從

天地之氣行乎四時者有四氣焉。四氣者風寒暑濕之氣也。人在氣中體之虛也。感則病矣。故春傷風夏傷暑秋傷濕冬傷寒。此四時之正氣病也。小兒失其調理尤易感之。纖弱故也。治法與大人同。但劑小耳。大小兒病則發熱則發搐。此與大人異也。四時調理

之法不同。春宜食暖，下可犯溫。夏宜食寒，不可犯熱。  
秋宜食溫，不可犯涼。冬宜食熱，不可犯寒。然發表者  
必宜用辛甘溫之劑。如有可汗之症，必犯其禁而用  
之。經云：發表不遠熱者是也。但於汗藥中，少加涼藥  
以制之，勿使熱甚而發搐也。小兒四時感冒病，幼科  
未倫，今時表而出之。

小兒傷風寒者，口不能言，脈無可診，但以虎口之指  
之色驗之也。錢氏云：男體重，面黃；女面赤，喘急，惡寒。  
口中氣熱，呵欠頻聞，項急者是也。然病有表裏陰陽  
之症，治有汗解溫下之法。臨病之時，當詳察之，不可

誤也。如惡風寒者，必煖藏其身於毋爇內，引衣密隱，是為表症，可微汗之。人參敗毒散主之。如惡熱出頭，露而揚，手擲足渴，煩燥，摸掖衣氣粗，是為裏症，畧與疎通之。小柴胡加大黃湯主之。方見驚風中病即止。如頭額冷，手足涼，口中冷氣，面色間淡，大便泄青，此為陰病，裏虛，當以溫藥救其裏。以理中湯加附子主之。方見脾臟。如不惡風，大熱大渴，此表裏俱熱，半表半裏也。宜和解。柴胡白虎湯主之。又有夾食夾驚者，不可與上症同治也。夾驚傷寒者，或因驚之時又感寒邪，以發散為主，宜脫甲散主之。或因傷寒發熱，以

致驚風者宜退驚為主以薄荷散主之夾食傷寒者如先傷寒後傷食者此食傷証也。只實大黃丸主之。如先傷食後傷寒無吐下者先解其表香葛散後去其宿食只實大黃丸主之。如有吐瀉者以藿香正氣散主之。

入參敗毒散 治四時感冒及時行瘟疫並痘疹初發熱宜服 羌活 獨活 前胡

柴胡

川芎

只實

桔梗

茯苓

人參

甘草 芍藥 等分

或咀水煎服斑疹加防牛荆芥名為荆防透毒散

痢疾時行加陳倉米名食廩湯

柴胡白虎湯 治傷寒半表半裏大熱大渴自汗不

柴胡

人參

黃芩

知母

甘草

石膏

父咀淡竹葉水煎服

脫甲散 治夾驚傷寒煩渴

柴胡 軟

當歸 酒

胆草

炙草

知母 各三錢

白朮

人參

川芎

各二錢半

麻黃 去根節

一錢

用連根葱白水煎服熱甚加升麻乾葛

薄荷散 治傷寒發熱痰涎壅甚

薄荷葉

半兩

羌活

全蝎

去毒

麻黃

甘草

僵蚕

炒

天竺黃

白附子

薄荷湯調下一匙畧煎數沸入竹瀝少許服

只朴大黃丸

治傷食腹滿煩熱及傷寒後食服

只實

厚朴

大黃

煨

等分煉蜜丸共實大每服一九用大枝子一個研

破淡豆豉三粒水煎濃汁化下

香葛散

治夾食傷寒不吐利者

香附子

紫蘇葉子分葛根

陳皮

青皮 各減半 炙草 不減半

此香附散加減也 以咀生薑葱白引要溫服以汗  
微出為度傷食輕者木方去葛根姜葱加小只實  
一枚重者一分

三黃只木丸 治傷食乃下劑之輕者有熱者可服

黃芩

酒炒

黃連

炒

大黃

酒炒

只實

微炒

白朮 等分

神曲糊丸黍米大每服二三十丸白湯下

藿香正氣散 治夾食傷寒有吐利者

藿香

白朮 加發汗用

蒼朮

厚朴

陳皮

半夏

白茯苓

白芷

桔梗

天麻

蘇葉

甘草

吹咀入生姜片煎徐徐服之

凡小兒風寒外感用推摩捏插法亦效

中暑夏月有之其症面垢遍身大熱自汗煩燥不安

而渴兒不能言但吃乳不止是渴也治有二法

富貴家小兒居高厚深涼之處其有病也乃靜而得

之謂之中暑也惡寒發熱者以人參白朮湯加減主

之不惡寒而發熱者人參白朮湯皆可服熱退服調

元生脈散如有吐泄者加味五苓散主之。乳母服清暑湯。

一尋常家小兒常在烈日之中坐於熱地之上浴於寒澗之內其有病者乃動而得之為中熱也。或有病熱者或吐瀉者並以藟苓飲加減主之。

如上暑熱二症有發驚搐者如先病熱後作搐者辰砂五苓散和益元散主之。或先驚搐文中暑者以藟苓湯加減主之。

人參白虎湯方見肺臟有中暑不惡寒者只惡熱而渴加麥冬淡竹葉水煎調天水散用滑石水飛六錢。

甘草一錢和勻無汗惡寒者加麻黃不去根節本  
不去皮尖有汗惡寒者加桂枝白芍藥

調元湯見脾胃加麥冬五味子乃生肌散二方合也  
清暑湯小兒一歲內中暑以此方調其乳母

人參

白朮

茯苓

炙草

生地

麥冬

黃連

黃芩

等分

以酒煎食後服

五苓散

此治暑之要藥也

方見腎脘

加硃砂五苓

散吐瀉加藿香木瓜砂仁煉蜜丸只實大陳皮湯砂

有寒熱加

香薷

厚朴

姜汁炒

白扁豆炒

丹草

名驚苓湯

有吐瀉再加藿香

木瓜

有驚搐者用五苓散

未

加辰砂

三錢

黃芩

甘草

未各五錢

和勻煉蜜丸。芡實大苓冬湯下。名却暑丹。如先驚後中暑者。合香薷飲。加人參黃連麥冬。

中濕

凡小兒喜弄冷水者。坐濕地者。名此病。其症頭重體重。寒熱往來。並宜五苓散平胃散為主。二方合者。乃治暑之要藥也。蓋五苓散治中濕惡熱。加瘧小柴胡。

湯合服。名五苓湯。中濕吐瀉與平胃散相合。名胃苓湯。更以砂仁藿香木瓜。

平胃散

治中濕體章芥補脾胃

蒼朮

未泔浸  
磨四兩

厚朴 姜汁炒 陳皮 各三分

炙甘草 半兩

每姜湯服本方與五苓散

澤泄

蒼朮

八兩同  
茯苓

白朮

厚朴

陳皮

等兩

桂枝

甘草

等兩

名胃苓。九小兒要藥也。本方末半斤。加川椒末二

兩和勻。別用紅朮蒸取肉四兩。蒜去皮入獾猪肚

內煎熟去肚不用。取蒜與肉共搗爛和藥令勻。

為丸酒與米飲任下各散米養脾丸男女並宜服之。臍寒者最宜。忌生冷淹穢等物。本方以咀一料加小紅棗二百枚。蒸法核生薑二兩和皮切共和。五斗慢火煮乾。搗作餅子。膠乾淡塩湯調服。大人小兒温養脾元平和胃氣最良。

中温浮腫者胃苓湯。加五皮湯主之。生姜皮大腹皮茯苓皮桑白皮五加皮即五皮湯。中暑黃者五苓加茵陳蒿各茵陳五苓散。

如時行瘟疫小兒得藥者用平胃散去厚朴。加蘇葉香附為末。雪水煮菉豆粉為丸。芡實大雄黃硃砂為

衣每服一丸。姜枣湯化下面東服之。可免不正之氣所中也。常用雄黃磨水抹兒鼻孔。乳母尤宜服之。

咳嗽喘各色症治

風寒乘外從虛入

肺主皮毛先受邪

氣逆上衝成咳嗽

綿延轉變八他家

按錢氏論咳症云。八九月間肺氣大旺。其病乃寬。以葶藶丸下之。十一二月間咳者乃傷風寒咳嗽也。或以麻黃或以牛桔湯。五七月間身熱痰甚吐乳者。以福銀丸下之。有吐青綠水者。以百祥丸下之。虛者阿膠散補之。後人信之得治咳大法。不過如此。愚竊有

疑焉。仲陽先生著論立方。仲景之下一人而已。仲景之治傷寒在表則汗之。在裏則下之。在半表裏之間則和解之。小兒咳嗽皆自風寒得之。豈無在表裏之間可發散者乎。八九月間咳嗽者。豈專可下之乎。觀其下藥非牽牛巴豆則鉛汞輕粉也。如此峻利之劑。幼小嬌弱者。豈能勝之乎。欲治其肺。先損其胃。豈有不誤人者乎。是書也。皆出於關孝忠之筆。恐非先生法也。或曰。有之。吾亦不敢用矣。今採諸賢之論。分三法於左。初得之。未有不因感冒而傷於肺。內經曰。皮毛者。肺之合。皮毛先受邪氣。邪氣得從其合。使氣上而

不下逆而不收。充塞咽道故令咳也。乍瘦肺衣風邪  
從背肺愈穴而入。而赤唇紅。氣粗發熱。咳來痰鳴。或  
因汗出未乾。遽戕冷水者。眼胞微浮。額汗痰鳴。如此  
數者。當以鼻中辨之。因乎風者。則鼻流清涕。有汗宜  
參蘇飲主之。因於寒者。則氣塞氣促。聲濁無汗。以味  
黃湯主之。

參蘇飲 治四時胃感風寒頭痛發熱咳嗽痰壅

人參

茯苓

貝壳

半夏

前胡

桔梗

蘇葉

葛根

陳皮等

牛蒡子

以因姜葱引溫服取微汗

加味麻黃湯 治肺感風寒痰涎咳嗽

麻黃

蘇葉

桑白皮

容多

甘草

加茯苓

陳皮

名華蓋散其功同改咀以煎服得汗咳止身熱而  
渴者加知母石羔

百部丸小兒未一歲不能服湯藥者以此代之

石部

麻黃

多三

杏仁

四十粒  
去皮太

以水畧煮又各取末和勻蜜丸皂角子大溫水化  
二三丸此已上初治之法

凡咳嗽發熱後不止或有未發散者其熱症以法治之

咳嗽氣上逆喘嗽有痰者此肺咳也宜清肺飲主之  
喘甚者葶藶丸下之方見肺脾虛

清肺飲 治肺氣上逆咳嗽

前胡去蘆

柴胡

荆芥

桑白皮炒

炙草

只壳各三分 知母

貝母

薄荷

茯苓

桔梗

紫蘇

阿膠炒

杏仁去皮尖

天冬各五分

散用烏梅同煎去渣服

一咳喉中介介有聲而赤發熱心煩或咽喉痛聲啞者此肺病兼見心症也以清寧散咽疾痛宜清心湯加桔梗方見諸熱心悶驚悸者以錢氏安神丸主之方見心煎

清寧散 治咳嗽心肺有熱者宜小便利出

桑白皮炒

葶藶炒

赤茯苓

車前子

枝子仁等分耳炒底半

細末每服半錢姜末煎服

咳嗽面黃痰涎壅塞或吐痰或止乳食者食少喜卧此肺病見脾症也大抵咳嗽屬脾肺者多肺主氣脾

主痰也

橘皮湯

治咳嗽痰甚嘔吐者

半夏

洗五錢

茯苓

陳皮

各四兩

細辛

人參

旋復花

各一錢

青芝

桔梗

枳壳

炙草

各二錢

為散入生姜水煎服

玉液丸

化痰涎止咳

數此家傳治小兒咳嗽者

寒水石

煉研取末二兩

半夏

泡七次研

研

拈几

三錢

為極細末生姜自然汁煮飛羅麵糊丸黍米入次

姜湯下

咳嗽痰涎壅塞。喘咳不轉。腦目紅視。此肺病乘肝症也。不治則發搐。宜豁痰丸主之。轉者琥珀抱龍丸主之。方見家傳三法。

豁痰丸 咳痰涎壅塞通用

兩星<sub>三錢</sub>

半夏<sub>二錢</sub>

二味切片用濃皂角水浸一宿取出焙乾為末

白附子

五靈脂

白僵蚕<sub>炒</sub> 細辛

枳白<sub>各一錢</sub>

全蝎<sub>三錢半</sub>

為末皂角澆汁煮麵糊丸黍米六錢湯下

咳喘久不止吐痰涎水此肺病兼腎症也宜大阿膠丸主之

阿膠

熟地

白朮

五味

山藥各一兩貝母

百部

栝子仁

破故紙

桂心

杜仲

姜汁炒

麥冬生乾

兩各人參

沉香各三錢

每丸艾實大每服九紫蘇湯

凡咳嗽有熱者宜東垣涼膈散加瀉白散土之大小便不利者加大黃風化硝咳喘氣盛者宜加戒糖子解氣湯

真蘇子

半夏

炙草

前胡

陳皮

厚朴 姜汁炒 桂 去皮

犬腹皮

桑白皮

分

煎服兼治面浮腫

咳嗽痰甚者輕者王液丸 壅塞者沉香丸化痰

青礞石

研 色

枯白丸

猪牙皂

南星 泡

半夏

白茯苓

陳皮 各三錢 煨壳

黃芩

各半

沉香

分

共細末姜汁煮神由用為丸黍米大薄荷湯下

咳嗽聲不止口鼻出血者此氣逆血亦逆也只宜止

咳為主。加入參、款花、羔主之。

人參

五味子

天冬

麥冬

款冬花

貝母

桑白皮

阿膠一

黃芩

黃連

炙草

梓槀

當歸各錢半

煉蜜丸。圓服。大每服二丸。陳皮湯化下。已上中法。  
之法也。

調理之後其咳不止。此肺虛也。只以補肺為主。錢氏  
阿膠散方見肺脏。然補肺不補脾。非其治也。虛則補  
其形。脾者肺之切也。死病久者胃氣亦虛。在自陳以

胃氣也用作參王味子主之

人參

五味

桔梗

白六

白朮

炙草

熟地

芎歸各五

地骨皮

前胡

桑皮

枳壳炒

黃芪炒

陳皮白去

柴胡各三錢

蜜丸芡實大每服一丸或三丸姜枣湯化下

以咳不已經驗方各提金散此劫劑也用

鬼粟壳

水潤去其筋  
順日乾二兩

烏梅

擇肥者水洗去羽  
取肉焙乾七錢

葶草

陳皮

去白各  
七錢

蘇州薄荷葉

二兩

蜜丸圓服大則時令化一丸妙已上為未效之

法也

久咳瀉防百脈中

痰涎作搞類多肉

胸高其狀如龜壳

咳血無憂只怕濃

小兒百日內有痰嗽者謂之百晬嗽或因出胎之時  
暴受風寒或因浴兒之時為風所襲或因解換襦裳  
或出懷嬰乳皆風邪之自外入者也。因乳脈湧出衣  
燕不及。方昔。啼哭未定以乳哺之氣逆冷

出者此病之在內出

能為咳如前汗下調理

之劑難其服之。蓋胃氣方生恐藥傷也。故曰小兒百  
晬咳難治。

如上下百脉咳者一歲及三歲者加以痰涎壅塞迎氣  
冲併以致發驚搐者多不可治蓋小兒無知痰在咽  
中不會吐吞往來自任故也將作搐者急進硃砂蒸  
以降去之。搐止者吉。頻搐者凶。故頭搖者日帶上規  
者閉目呻吟者手足擺舞者有息胸突者喉中痰鳴  
者口禁不乳者喘不傳者手足冷者咬牙者皆死也  
从咳不止胸高骨起其狀如龜者謂之龜胸此肺也  
天冬去心炒 杏仁去皮尖 百合洗 木通  
桑皮炒 壁薤關州 石羔各等分

蜜丸芡實大服一九紫蘇湯下較者吉如龜胸已

成乃終身之痼疾也

久咳不止咯唾血者如前治之。噎澁血離鼻者此肺  
癆也多死欲治此者無如桔梗湯。

桔梗

當歸

貝母

瓜蒌

漢防己

甘草

杏仁

石合

枳殼

薏苡仁

黃芪

桑皮

加玄參

入生姜煎瀕服有熱口乾燥加薑木大便秘加大  
黃小便赤少加木通

端

氣喘綿綿自肺生

有寒有熱自痰起

尋常哮喘無他惡

病篤應喘燥急添

內經曰諸氣贖鬱皆屬乎肺喘者肺氣之贖鬱逆而上行也。有因感寒而得之者必惡寒發熱面赤唇紅。鼻息不利清便自調邪在表也宜發散之用五虎湯主之。內有寒痰者苦竭散。

麻黃

七分

杏仁

去皮尖

甘草

四分

細茶

炒

石膏

半斤

煎服

有因熱而得之者必口燥咽乾大小便不利宜葶藶丸下之。有因宿痰而得者必痰涎壅上喘息有聲。

千尋湯主之

半夏

七个湯

甘草

一打

生姜

指

卓角一打

咳阻作一服煎已上皆素燕而暴有者也

素有哮喘之疾。遇天寒宣不常。乍則連綿不已。發過自愈。不須上方。但人有苦於此。必欲治之。可預為之防也。有一發而吐痰涎者。宜服補腎地黃丸。加五味子。彼故昏。步方見腎。肺有發而不吐痰者。宜用反治

痰喘方

南星

半夏

人參

瓜蒌

枳實

陳皮法

卓角一打

蘿蔔子

為未姜汁煮神曲糊九黍米大每服二十九姜湯  
下切不可輕聽時醫妄用此信有毒之物

臨時宜用九寶湯此常治經年喘嗽屢驗

麻黃去節

陳皮白

薄荷各五分 辣桂

紫蘇

桑皮炒

大腹皮

杏仁去皮尖各

三分

炙草六分

剉烏梅生姜童便少許煎服

有小兒胸膈積熱大喘者此肺服也各馬脾風用牛  
黃奪命散生之方見驚風

又方用

并遂錢一

雄黃分五

每服五分新汲水五七匙清油三匙調下吐痰後  
喘定

大抵喘者惡候也。有因利下而愈者。亦有因利下而  
殞者。有數年痲瘡而自瘳者。亦有因他痰火而不救  
者。如汗出髮潤喘者為肺絕。自汗如油喘者為命絕。  
直視譫語喘滿者不治。諸有篤疾正氣欲絕絕時邪  
氣盛行多壅逆而為喘也。

諸疴

疴皆從水殺生

衰水減便成疴症

只因飢飽失調理

肥瘦空將口訣記

兒童十六歲以下其病為疳十六歲以上其病為疔  
年皆血氣虛也。意脾胃受病之所致同出而異名也。  
蓋骨者水穀之海也。水穀之精氣為榮榮者血也。悍  
氣為衛衛者氣也。氣以向之。充皮毛肥腠理者氣也。  
以濡之。潤皮膚。美顏色者血也。故水穀實者無病。水  
穀少減者病。水去穀亡則死矣。凡病疳而形不壯者  
氣衰也。色不華者血弱也。氣衰血弱而脾胃傷則水  
穀少矣。疳之生於脾胃也明矣。蓋小兒臟腑嬌嫩飽  
則易傷乳食。一者失常不成疳。鮮矣。疳皆飲食不  
調肥甘無節而然。或嬰兒缺乳粥飯太早或二三歲

後肉穀菜菓恣其欲則肝已傷得因而太飽停滯中  
爲食久成積積成痺或因取積轉下太過耗散胃氣  
或轉下之後又傷食一傷一取重亡津液痺之病起  
於積者也或因大病之後吐瀉瘡痢乳食減少脾胃  
夫養氣血益虛此痺之生於大病之後者也其候頭  
皮光急毛髮焦稀脰縮鼻乾口燥唇白兩眼昏爛操  
重操肩脊聳體黃閉牙交甲焦渴自汗尿白涎酸肚  
脹腸鳴痔結潮熱酷食瓜菜鹹炭水泥者皆其候也  
按錢氏云大抵痺病多辨冷熱肥瘦其初病者名肥  
熱痺病久者名瘦冷痺冷者木香九熱者黃連主之

斯言也亦其門人附會之誤也。故楊氏云痲之為痲皆虛使然其熱有虛中之熱冷者虛中之冷治熱不可妄瀉過涼治冷不可妄補過濕積溫成熱積涼成冷當識此宜今木香丸內枳實續隨子乃下重轉下之劑豈以病者可服乎吾為詳之曰凡病得於篤食之後者其病雖虛宿食猶存此受有餘之病曰肥熱痲得於大病之後者正氣已傷此為不足之病謂之曰瘠冷痲。熱者宜加戒集聖丸冷者宜加戒肥兒丸。

加戒集聖丸

治肥熱痲

黃連

乾蟾

燒青性  
冬二錢

莪朮

青皮

木香

砂仁

當歸

使君子肉

夜明砂

五靈脂

神曲

炒各錢  
半

山查肉

錢半

用粟米糊為丸黍米大量兒大小加減米飲下如未至疳者只服祖傳保和丸方見脾臟

加減肥兒丸

治瘦冷疳

炙莖

人參

白朮

茯苓

炙草

陳皮

青皮

當歸

川芎

白芍

薑甲

九錢

使君子肉

黃連

乾蟾

燒青性  
存性

木香

錢半

另取山藥煮糊丸黍米大量兒加減米湯下如黍  
成疳者只服肥兒丸 方見家傳三法

凡有疳熱者不可妄用推拿搗法。吾見殺兒多矣。

不問諸疳總屬脾胃無津液致羸瘦。只將集聖丸為  
主。隨症從權加減。

大抵疳之為病皆由乳食過飽。或因無乳而以他物  
飼之。或因病後被食所傷於脾胃。一家有積不治傳  
之他脏。亦有兒飢食少。或病後食少脾胃亦虛。五臟  
六腑皆無所稟。乃成五疳之症。治此者只以脾胃為  
主。集聖丸主之。其有五疳兼症。或因他病變成疳者。

各視其症從權加減不必多求方法也

集聖丸 不問冷熱諸痺病皆治之。此治痺之神方也。

蘆薈

五靈脂

夜明砂

陶砂仁

陳皮

青皮

莪朮 煨

使君子

木香

當歸

川芎 各二錢 黃連

乾蟾

炙佳各三錢

用猪胆一个取汁和藥粟米糊丸黍米大服三十

丸米飲下

病有咬牙舒舌。舌上生瘡。愛食冷水唇紅面赤喜伏地而睡。此心痺也。又名驚痺。前方大莪縮青陳芫木

香六味加

生地

白茯苓

胆星

錢二

甘草

硃砂

小飛各一錢

目生眵淚髮際左脇

青或目生白膜瀉痢夾水或加青色此肝痺又名

瀉肝前方去莪縮陳木香四味加

胆草

山支仁

防朶

天麻

蟬退各二錢

青黛

錢

病爰吃泥土冷物飲食無度身面俱黃髮稀作瘧頭  
大項小腹脹脚弱間或釀瀉肌瘦晝涼夜熱不思乳  
食此脾痺也文名食積痺宜前方主之  
病鼻下赤爛手足枯細口出腥氣或作喘咳嗽右腮

曉白各肺疔宜前方去莪朮縮砂青等木香五宋加

桑皮

倍

桔梗

炙草

紫蘇

阿膠

錢炒各二

為丸外用

蘭香葉

錢一歲

銅青

錢五

輕粉

二錢半

細末貼鼻下赤爛處

一方用鹽胆泡湯等法鼻中

病兩耳內外生瘡脚如鶴膝頭縫不合。或未能行或  
齒生邊。或齒縫臭爛。傳變作走馬疔之例。名曰腎疔。  
前方去莪朮青陳本香五靈脂六味加

澤瀉

茯苓

母皮

菜菔山

山藥 各二錢 地黃 焙三錢

馬丸外治兩耳前後赤爛用黃丹各一 枯凡

藜豆粉各一

研末搽之或<sub>以</sub>唾調亦可

又方治牙疔 取尿桶內白莖刮起新瓦上火煨過五分鼠婦七枚。蚊蛤內重二分。枯凡半分末。熬病積成疔又復傷食其症形瘦腹紫時發熱蓋與人見見之則哭。依前方去蘆薈五靈脂二錢加

人參 黃芪 白朮

炙草 半夏曲 只實炒 厚朴炒

神曲炒

麥芽炒

煎甲

炙

三棱

炙

為丸

痢有瀉久不止胃虛成癖者。此癖瀉也。宜煎法去虛  
薑莖朮五靈脂三味加人參白朮

茯苓

白豆蔻

煨

阿子肉

炙

粳米糊丸。如先病癖又病瀉者宜先止瀉用

錢氏異攻散加白芍

阿子肉

豆蔻

乾姜

炙

山藥作糊丸服待泄止又服治癖洲本方

病痢久不止胃虛成癖此痢癖也。以前方去蒼朮莖

木青皮五靈脂四味加

訶子

白蓮子

梗米糊丸如先有疥病復病痢者以治痢為主宜和中丸方見後痢門痢止再服治疥痢

病瘡未已胃虛成疥者此必有疥謂之疥瘡宜前方

去蘆薈五靈脂二味加

黃芪多

人參

鱉甲炙

柴胡

半夏

神曲

山稜各一錢

梗米糊丸如先病疥又病瘡者用乎瘡養脾丸與前方相間服之

病驚後成疥者即心疥肝疥也。宜前方。但疥病變驚

風者謂之慢脾風難治如腫脹者此痺之外候即  
痺也咳久成痺者肺痺也瘡疾成痺者此腎痺也各  
有本方

病腦痺者皮毛光急滿頭餅疹腦熱如火髮結如穗  
遍身多汗腮腫頰高令兒眼痛其病在肝宜前方去

菝縮青陳木香五味加

胆草

川芎

升麻

羌活

防丰

各木二錢

猪胆汁浸焦糊丸薄荷湯泡下外用鯉魚胆滴鼻  
中連三五日甚效產婦月中多忿令兒有此  
兩脊痺者至食肯管發熱歲黃積中生熱煩渴下痢

指背如鼓，鳴脊骨如鑿齒，或十指皆瘡，頰齒爪甲宜  
前方去莪縮青陳歸芎六味加苦練根皮白者綠色  
質衆蕪荑換仰各二錢為末，名安虫丸。蓋五疔成有  
停食成積，積久成虫，或如絲髮，或如馬尾，多出於頭  
頸腹背之間，黃白或赤者可治。青黑則難治也。按岐  
伯云三伏內用桃柳枝煎水浴兒，於午時當日中灸  
兒尾翠骨上三寸，腦中三壯，後用青帛拭之，有見疔  
虫墮汗出也。此法甚效。

病疔疔者，縞眉多瘡，嘔吐清沫，腹中乍痛，中則成聚  
肚腹青筋，唇口紫黑，腸頭疔疔者是也。蠅雖食虫虫

不可動從口鼻出者難治用下虫丸方見虫病輕者  
前安虫丸主之

病手足極細項小骨高尻削體瘦腹大膽突號哭胸  
陷是為丁奚虛熱往來頭骨分開飢食吐虫煩渴嘔  
穢是為哺露是為痺病之狀也宜集聖丸主之  
病無攻痺者腦後頂邊有核如彈按之隨動軟而不  
痛其間有虫如米粉不速攻之則虫隨熱氣流散臟  
腑淫蝕精血以致遍身瘡痞便利膿血壯熱虛度頭  
露骨高幼科書中稱是妖鳥之毒此或有之亦客許  
中惡之類耳天地間游魂為變之氣甚多不但妖鳥

也宜刺其核用紫金丹塗之內服前方去我補五靈

脂三味加

人參

黃芩

薑用醋

栝柳二

共末取青蒿白朮汁煮飛羅麵為丸米飲下

病瘵熱者脾胃虛弱陽浮於外氣不歸元只以補脾胃為主使陽氣收斂熱自退也參苓白朮散主之多服作見脾脏

病瘵渴者此胃氣下陷津液不生故渴也宜補其胃氣使清氣上升津液漸生渴自止矣七味白朮散主之見泄瀉多服佳

厲

音歷去聲

病走馬疔者亟也。一名厲，謂匿於腐齠之間不見也。以走馬名者，齒屬腎，腎主虛，絳受邪熱，直奔上焦，故以走馬為喻。狀如狐疔，傷寒唇瘡之症，初作口氣，名曰臭息。次第齒黑，名曰崩砂。盛則斷爛，名曰潰槽。熱血迸出名曰宣露。甚者齒皆脫落，名曰腐根。其根既腐，縱得全活，齒不復生。外証：腦熱、肌削、手足如冰、寒熱時來、滑瀉、肚痛、口臭、乾渴、齒齦生瘡、爪黑、面鰲、身多瘡疥、瘡疹之後，多有此病，不可救者，毒歸於腎故也。宜服加味清胃湯。

黃連

當歸

升天

生地

黃丹皮

白芷稍時

細辛

半

爲氣燕之外用燒鹽散用椽斗子不拘多少埋而  
个入蓋滿殼蓋作一合或十數个安在火內切鹽  
燒透取放地上退火毒以碗蓋定存性候冷入射  
香少許乳鉢內搗極細先用鹽湯洗瘡上後以數  
文方 治走馬疔蝕透損骨用天南星一个當心剉  
坑安雄黃一塊在內以麪裹煨候雄黃作汁以碗  
蓋定出火毒去麪射少許爲細末搽瘡甚驗或發  
滿腮鼻穿牙落飲食不進氣促痰鳴乃不生之症  
也

兒方周歲。毋腹有孕。乳汁成毒。厥積小兒神氣亦致。骨主厄羸。足為魁病。宜龍膽湯主之。

膽草

此

釣藤皮

柴胡

桔梗

赤芍

川芎

茯苓

甘草

大黃

溫姤

人參

或

并水煎服。仍以夜明砂不拘多少。紅紗作袋盛之。常佩。

霍亂

霍亂無嘔吐瀉煩。

然腹乾痛。腹中尋

治其吐瀉多寒熱。

乾痛。須防喘與驚。

霍亂之病起於倉卒。多因夾食傷寒。陰陽乖隔。上吐下瀉。而燥煩悶亂也。人有三焦。上主納水穀。入而不出。中主腐化水穀。流行臟腑。下主分別水穀。出而不入。上焦者。上胃脘也。邪在上焦。則吐。下焦者。下胃脘也。邪在下焦。則瀉。中焦者。中胃脘也。邪在中焦。則上吐下瀉。霍亂者。得吐瀉。則邪氣上下得出。無苦也。陳莖出盡。吐瀉自止。不吐不瀉者。乾霍亂。又名絞腸痧。其病因胃邪氣無從出也。若加喘滿驚搐者。十不救一。其吐瀉者。須分寒熱。主治大要。所其乳食。恐增痰也。故霍亂飲米湯必死。霍亂吐瀉宜用霍香正氣

散主之方見感冒四氣其先瀉後吐者乃脾胃虛冷故先瀉白水吐亦不多口氣緩而神色慢頰前有汗六脉沉滯此為冷也宜補溫之錢氏益壽散方見脾臟及理中湯加藿香木瓜主之

理中湯 治霍亂吐瀉水穀不化手足厥冷

人參

白朮

甘草

乾姜

煨

加藿香

木瓜

艾咀水煎為末密丸共費大木飲化下霍亂姜湯下

其先吐後瀉者乃脾胃有熱故促唇紅吐來面赤渴

飲水漿脉洪而此為熱也。宜和辨之。五靈散加藿香  
主之。

五靈散 治小兒霍亂吐瀉燥渴飲水

猪苓

澤泄

白朮

茯苓

加藿香

右末水煎其乾霍亂不得吐瀉者有塩湯吐法最  
佳。但小兒必待探吐之。或以針刺手十指甲縫令  
血出。或於委中刺血皆良法也。

或發驚搐或腹脹氣喘者青死候也。急用枳實一枚  
剉半夏一枚劈破。黃連三分切。細用水煎湯。入甘遂

末五厘。沉香磨水一匙和勻。灌之。得吐。生後進合。

病素有積者。發則吐。瀉不止。非霍亂也。宜下之。肥積丸主之。方見積。

區吐

小兒區吐有三因。

藥食難嘗成格拒。

因熱因寒因食停吐多清水是虫名。

幼科云小兒區吐大槩難舉。有寒有熱有食積。然寒吐熱吐。夫有不因於食積者。故吐之病多屬於胃也。又有溢乳有嘔乳有區吐。皆與吐相似。不可以吐瀉。

治之又有格拒者。有出者當飲法外求之。太陰小兒  
嘔吐莫如節乳。節者減少之謂。非斷其乳食也。嘔吐  
多渴勿急飲之。水入復吐終不得止必強忍一二時  
而後以薄粥與之。吐自止矣。

按劉河間論吐者分三焦。此言甚善。如食入即吐者  
有積在上焦胃脘也。上胃脘在咽喉之下太倉之上  
口名曰賁門。食方下咽波積者塞不得入胃故吐出  
也。宜瓜蒂散吐之。此在上者引而越之止是用吐法  
使積去乳食得入也。如食入少頃吐出者有積在中  
焦胃脘也。中胃脘太倉下口之上。小腸上口之上名

曰尚門。飲食入胃不得入於小腸，故轉而上出，則吐也。吐出皆完穀未腐熟者是也。如食半日後復吐者，此積在下焦胃脘也。下胃脘在小腸下口之下，大腸上名曰闕門，有積壅塞傳化不去，復轉向上出為吐，亦多糟粕之物是也。此二吐並宜下之，去陳莖菟物，使腸胃之氣得通，水穀之物得行，吐自止矣。丁香、香脾積丸主之，以見前傷寒。

瓜蒂散

瓜蒂 炒黃君 赤小豆

共末，每少許，淡豉煎濃湯調服，量兒加減。

寒吐者，乳片不消，多吐而少出，面白，眼慢，氣緩，神昏。

額上有汗出，脈息沉澁，宜溫中消食。輕者胃苓丸，煨  
芩湯研碎服之。不止用理中丸，加藿香如諸藥不止，  
以參香散治之。

參香散

治小兒胃虛作吐，諸藥不止者。

人參

沉香

丁香

藿香葉

木香

分等

細末木瓜湯調下

知服已上藥，并乳食不得入，入則吐者，此陰盛格陽  
謂之格拒也。宜理中切戒劑。用獾豬膽汁童便各少  
許，拌藥炒焦煎服即止。內經曰：熱因寒用之法。蓋陰  
寒氣太甚，陽熱之藥難入。故理中湯溫熱用胆汁童

便之寒涼與之服其始則同其終則異入咽之後陰  
體漸消陽氣乃發伏其所主先其所因此仲景之秘  
論也

熱吐者面赤唇紅吐少而多出乳片消而色黃遍  
身熱甚而煩燥夏月多此証宜胃苓丸用向東陳壁  
土一槐杵細炒熱入水煎數沸澄清將丸研服不止

用黃連

厚朴炒

藿香

分

香薷

加信

水煎服吐久不止用理中湯煎熱調天水散冷服  
即止

食積吐者腹脘浮腫面微黃足冷熱日輕夜重或吐

兒音行小兒吐乳

酸酸之氣或吐黃水或吐青痰脈弦實而滑此有積食也宜下夫其積乃止脾積丸主之

傷乳吐者緣哺乳即吐或少停而吐此因乳食無脾脾胃嫩弱不能運化俾如小瓶注水滿則溢出也宜節其乳自止 兒乳者時時吐乳而不多似吐非吐非吐是吐此胃虛吐也參香散主之

溢乳者謂乳多而溢出非真吐乳也苟不知禁即成真吐矣百日内小兒多有之蓋身小身軟不能自立必待毋擁抱之苟有傾側乳即溢出碎以瓶注水瓶側而水出矣不煩治之

嘔吐者必待兒噉定而後乳也。或噉未定以乳哺之其氣必逆，乳不得消化而為痰，痰氣壅塞，噉不得轉，故噉而吐乳也。宜玉液丸姜湯下。

小兒初生三日內吐者，錢氏方用白餅子下之，誤也。初生小兒出離母腹，惟乳可食，安可當此毒藥也。此由拭口不盡，使惡穢之物損其胃氣，只用丁香一小粒去苞，陳皮一分，木瓜一分，共研細末，每半分乳調納兒口中，令自噉用煎，皆是。

嘔穢者，有聲無物也。不問大小，但病久危，因嘔穢者不治。經云：木陳者葉必落，弦絕者聲必嘶，是也。

蟲者腹有虫時作酸痛則吐清水涎沫宜下

下虫丸

白苦練根酒浸焙

綠色貫衆

木香

桃仁去皮尖尖栴柳

蘇黃焙各二錢

鶴虱炒

乾蟾炙焦各一錢使君子肉五十枚

輕粉五分

右末麵糊丸麻子大每服一二十九俟天明先以

肉汁味臭鼻內使香聞鼻中即仍肉汁下丸

傷食証治

傷食無如損節奇

規其輕重法何為

欲求陳莖推將去

消導不行攻取之

內經曰飲食自倍脾胃乃傷東垣先生解云飲者無形之氣也食者有形之血也山此推之乳為血所化飲之類也乳食之類宜有辨矣幼科消乳丸有山稜莪朮誤也

小兒之病傷食最多故乳食停滯中焦不化而成病者必發熱惡食或噫氣作酸或惡聞食臭或欲吐不吐或吐出酸氣或氣短痞悶或腹痛啼哭此皆傷食之候也方見傷食之証不必悉具便宜損之損之者謂姑止之勿與食也使其自消所謂傷之輕者損其自愈也損之不減則用胃苓丸以調之調之者謂其

脾胃使乳穀自消化也。調之不減，則用保和丸以導之。導之者，謂腐化乳食導之使去，勿留胃中也。導之不去，則攻下之。輕則枳朮大黃丸，重則備急丸。主之枳朮大黃丸，枳實並厚朴姜汁炒大黃酒洗

枳實並厚朴姜汁炒大黃酒洗

共細末，神麩糊丸。黍米大量，兒加減，姜湯下。

備急丸

大黃

巴豆去膜

乾姜分

酒得精新好藥，研末煉蜜丸。黍米大，每服三五丸。量兒加減，白湯下。

凡用消導攻取之藥，必的見其所傷之物，則胃氣不

傷而食物去却無遺毒矣。故傷熱物者如酒肉溫麵辛辣之類則以枳實青皮黃連大黃牽牛主之。傷冷物者如瓜菜米水豆粉之類則以丁香木香砂仁藟果巴豆治之。又如山楂之消肉食神曲麥芽之消穀食半夏乾姜之消菜菓生冷各有所宜也。苟不問寒熱而以寒治寒以熱治熱則所傷之物雖去而偏寒偏熱之藥性留於胃者或為寒中或為熱中。作兒終身之害者皆一時之誤也。

小兒傷食最關利害。父母不可輕忽。醫人不可粗率也。如棄而不治則成積疳。治之夫法則成疔。攻兒

之強壯者脾胃素實恃其能食父母縱之以致太過  
存蓄不化此乃食傷脾胃真傷食也可用前法治之  
如小兒之怯弱者脾胃素虛所食亦少或因少加則  
必停蓄不化此乃脾虛不能消穀轉運遲耳非真傷  
食也治以前治則誤矣宜用養脾凡主之

小兒易虛易實者也如使壯食者縱其口腹則飲食  
自倍脾胃乃傷而實者亦虛矣其虛怯者節飲食則  
脾胃無傷穀氣漸長而虛者可實矣

胃苓散之方如五苓散之利水平胃散之消穀可以  
調理脾胃可以消導飲食誠小兒之要藥也如傷食

又感風寒者此內傷夾外感也不吐瀉者謂之夾食傷寒先解其表宜藿香正氣散主之表解後攻其食積枳朮大黃丸有吐瀉者謂之霍亂宜藿香正氣散王之詳見感冒四氣如傷食發熱變驚風者先去食積使食去熱除而搐自止宜加減宜風散主之發搐者人參羌活散見驚風詳

宜風散

換即仁

草果

陳皮

各半兩

黑牽牛

二兩各半

加枳實

五枚

大黃

兩

六末每半錢寒湯調服

人參羌活散

柴胡

防丰

天麻

前胡

人參

川芎

當歸

枳殼

茯苓

羌活

桔梗

甘草

加煇退等

未薄荷同煎服

傷食或吐或瀉則其所傷之物去矣只以肥兒丸調之和其胃氣或錢氏之異攻散蜜湯調服

積聚証治

宿食停傷脾胃中

是名食積法宜攻

必詢原物分寒熱

莫犯虛虛可立功

按東垣云食者有形之物傷之則宜損其穀其次莫

治消之不止則攻之此治初傷乳食之法也只因不早治之或治之晚以致陳莖菘聚乃成積也小兒病積者多其候面黃色白腹大或緊食少或腹作痛無所發作發則數日不止治其積者若不問平日所傷之物是寒是熱觀兒之形或虛或實一槩用偏寒偏熱峻下之劑而犯虛虛之戒其害大矣如曾傷乳熱食熱者則為熱積如傷冷乳冷食者則為冷積傷五穀者則為食積傷五畜之內者則為肉積熱積傷五果之類者則為菓子積生冷積傷五菜之類者則為菜積有冷有積冷積宜丁香脾積丸下之以原食生

冷之物作湯熱積宜丁香檳榔丸下之以原傷穀肉之物作湯謂之迴源湯

丸用攻下取之藥必先補其胃氣如異攻散之類而後下之所謂補而瀉之勿犯胃氣也

家傳丁香脾積丸 治冷積腹痛又治傷食積瀉效

丁香

木香

良姜

清油炒  
各一升

青皮

皂角

虎存性

檳榔

二錢

三稜

煨

莪朮

煨香  
三升

巴豆

四十九粒去壳  
膜另研如泥

右前八味細末入巴豆泥研令勻用醋煮麩糊丸

麻子大每五丸原物湯下如取黃練根皮湯下

木香栝柳九 治熱疾腹痛天治痢疾

木香

栝柳

青皮

陳皮

枳壳此

莪朮煨

黃連

黃柏各一兩

香附

大黃各三兩

黑牽牛

取頭末三兩

右細末滴水為丸麻子大每服十九丸原物湯下

原物湯取原日所傷之物用韭菜搗爛捏成餅子

燒存性研細煎湯送下名取積丸

如素弱者不可輕下當以補藥去之用錢氏益黃散

加莪朮木香黃連炒共細末水煎神曲糊丸黍米

大服二三十丸米湯下

泄瀉証治

泄瀉先須辨五因

治分三類見於經

養其脾胃嘗為本

莫使五臟成慢驚

泄有五者謂風寒暑濕食積也皆屬濕論故風濕寒  
濕濕熱中濕此皆濕之主於外者也食積則濕之主  
於內者也叔和云濕多分五瀉者是也治有三法者  
按仲景傷寒論云下利宜理中丸不止理中者理中  
氣也治瀉不利小便非其治也五苓散主之不止者  
利在下焦也宜赤茯苓芍藥湯上之故初則濕中  
理其胃氣也次則分利使陰陽和暢水穀分別也末

則止澁澁可去脆恐腸胃滑而穀氣不收也此三者  
治瀉之大法也故予家傳心法初用聖中湯中用五  
苓散末用七味豆蔻丸或一粒白玉膏即是仲景之  
法

七味豆蔻丸 治瀉泄不止澁可去屬之法也又治

厚朴 芍藥 木香 砂仁 各三

白龍骨 訶子肉 赤石脂 枯丸 各七

共細末麵糊丸麻子大諒兒加減亦者十五丸服

止五十九米飲下

白玉丹又名一粒除 治滑瀉不止神效大人通用

寒水石

陳所水飛二兩

枯凡兩

共細末麵糊丸小者冷子大大者皂子大中者苑  
豆大每服一丸米飲下久者宜用枳則勿用  
傷風瀉泄其症口乾氣熱呵欠頻聞乍涼乍熱睡多  
氣粗大便黃白色嘔吐乳食不消令時咳嗽宜發散  
加減惺惺散主之

加減惺惺散

治小兒風泄補脾胃發散風和為主

人參

白朮

白茯苓

各一錢七分

防丰

川芎

藿香

各三錢

細辛

二錢

按小兒科論夏至後泄者熱多秋分後瀉者寒多中

間按節氣分寒熱多少之說似太強如不若原病式

明白蓋麻泄熱泄四時有之但暑月多熱冬月

寒

熱瀉者原病式云穀雖不化而色變淡白溲瀉小更  
赤澁凡穀消化無問色及他症便為熱也寒瀉而穀  
消化者未之有也然熱瀉亦有不化穀者和熱不殺  
穀也穀雖不化乃糟粕耳非若邪氣之完穀出也此  
宜辨之如夏月得之大瀉者宜五苓散作湯調至  
散若身熱與瀉畧減者只服五苓散不可更加至  
散恐生中寒之症瀉仍不止用胃苓丸和一逆丹止  
之神效非夏有此熱瀉者瀉飲水白朮散乃理

藥

寒瀉者原病或云完穀不化而色不變吐利腥穢澄  
清冷小便清白不澀身涼不渴此為寒也冬月得之  
宜理中湯丸不止以五苓散加姜枣煎再不止者七  
味肉豆蔻丸主之春秋月同惟夏月得之先服理中  
湯丸後以五苓散和玉露散

玉露散 一名斗露飲 治傷熱瀉黃色

石膏

寒水石

研水飛二兩

甘草

生七分半

右極細末每服一字或半錢溫水調下

如寒泄火不止一日三四次糖而不多腹中鳴宜

黃芪補胃湯 炙芪

歸身

川芎

柴胡

益智仁

陳皮

炙草 各二

升麻

分

共末水煎服

濕瀉者身重泄水風濕者水穀混穢宜升除濕湯濕熱者宜五苓散加玉露散濕不渴宜胃苓湯此病夏秋間多有之益黃散尤如

升麻

柴胡

神曲 九

防丰

澤泄

猪苓

各五分

蒼朮 一錢

陳皮

炙草

麥蘗

炒各五分

如胃寒膈鳴加

益智仁

半夏 等分

治風濕作瀉自下而上者引而竭之

人姜枣煎泄瀉鳴不得用也右吹咀分作五服水煎

胃苓湯 治夏秋間脾胃傷冷水穀不分泄瀉不止  
五苓散 平胃散二方相合入姜枣同煎服今治泄  
瀉者不問大人小兒通用此方

如寒濕瀉不止宜益黃散此治寒濕之要藥也  
食積泄者因飲食過多遂傷脾胃以致泄瀉其候大  
便不聚臭如敗卵或作酸臭之氣或色黃白腹中或  
有痛者宜先補胃氣而後下之補用錢氏異攻散加  
神曲下用丁香脾積丸小下積之方惟此能去痛止

瀉也有巴豆按藥性巴豆能令未瀉者瀉能令已瀉者止故也

凡大瀉引飲者其病不論新久皆服白朮散痲病亦同蓋脾惡濕腎惡燥飲水太多大腎益燥津液不升渴亦不止水止於脾濕傷脾胃瀉亦不止故白朮散治渴瀉之聖藥也常宜服之以折湯水不可再飲湯水蕪之不效矣

白朮散 治泄瀉胃熱煩渴閉陰陽並宜服之

人參

白朮

茯苓

木香

甘草

藿香

各一錢

葛根

一錢

共細末水煎服本方治小兒陽明經本虛陰陽不和  
吐瀉亡津液煩熱口乾以參朮甘草并溫補胃  
和裏木香藿香辛溫以助脾茯苓并平分陰陽利  
水濕葛根耳平倍於衆藥其氣輕浮鼓舞胃氣上  
行津液又解肌熱治脾胃虛弱泄瀉之聖藥也一  
問泄痢但久不止者並服之

錢氏云瀉黃者傷熱乳也瀉青者傷冷乳也予家通  
用胃苓丸主之熱者用車前草湯下寒者用煨姜湯  
下

久瀉不止非青氣之下陷則腸滑不禁及肺虛不行

故也。宜家傳和陽固脫湯主之。

人參

白朮

白朮

坤草

當歸

白芍

地黃

朱麻

猪苓

澤泄

葛根

陳皮

烏梅

訶子肉

共十四味等分量兒大小吹咀水煎服。魚時即大人亦可服之。

久瀉不止多屬虛寒。魚有熱也。故經曰暴瀉無寒久瀉無熱。宜由豆蔻丸和胃苓丸各半相合。陳米炒熟煎湯送下。即止。如再不止宜用人參白朮散。加白豆

磁麵罌煨柯子肉為丸服庶不成虛瘦慢驚風也

有先瀉未止而成疝者易治宜參苓白朮散加肉豆  
蔻訶子肉丸服之則泄自止津液漸生不致成疝也  
有先疝而後瀉者謂之疝瀉難治宜用集聖丸去蘆  
薈莖朮五靈脂三味加

肉豆蔻

訶子肉

等分

大山藥糊丸黍米大每二十五丸四君子湯下

經曰五虛者一脈細二皮寒三少氣四泄瀉不止五  
飲食不入五虛悉具者生能食者生又瀉不定精神  
好者脾敗也吐瀉唇深紅者內熱故也不退必死面  
黑氣喘者不治大瀉不定止之又瀉腎敗也遺為不

青囊卷之三  
覺者死

痢疾証治

赤白無分寒熱議

多因食積宜通利

育嬰家寶只三分

傳自河間真秘密

按內經曰飲食不節起居不時陰受之則入五臟陽受之則入六腑。填滿閉塞不為飧瀉。以為腸瘕飧瀉者為米穀不化也。腸瘕者下利是也。又按五七難曰。胃瀉者飲食不化色黃。脾泄者腹脹滿泄注。食即嘔吐逆。大腸泄者食已窘迫大便色白。腸鳴切痛。小腸泄者溲而便濃血。小腹痛。大瘕泄者裏急後重。數至。

圍而不能便。莖痛大瘦泄者痢也。由素難之文觀之。則痢起於食積也。况小兒之病傷食者多。惟有宿食為積。故因四時之感而成痢也。赤白皆屬熱。說見原病式中。或謂赤者屬熱。白者屬寒。未敢聽之。但謂痢久不止。則為虛寒。或服冷藥過多。熱變為寒者。則有之矣。此當以脈証別之。身熱而渴。脈數。大有力而能食者。為熱。身涼不渴。脈沉無力而不食者。為寒。明矣。治痢之法。為起腹中。苦痛裏急後重者。其痛為實。宜急下之。三黃承氣丸。不可用。巴豆牽牛之劑。巴豆損血。牽牛損氣也。如有外症不可遽下。宜發散之。舍廩

湯主之物治不止各隨其証施治也

三黃承氣丸

治痢疾初起兩眉皺而啼哭者腹痛

也裏急後重煩燥不安者以此下之

大黃

酒蒸一兩

枳實

炒

厚朴

炒

檉榔

各五錢

黃連

黃芩

黃柏

俱酒炒

當歸

各三錢

木香

二錢

共細末神曲糊丸黍米大兒小者十五丸兒大者

三十九滾白水下

倉廩湯

治傷風痢疾及時行疫痢大小相似蒼宜

先服此方即人參敗毒散方見前加陳倉米煎服一

方加陳皮

因傷風得之者則純下清血。宜胃風湯主之。如下純血宜黃連四物湯。家秘剪紅丸。不止者何膠梅連丸。大效。

月風湯治風冷客於腸胃。泄下鮮血及腸胃滯塞。下如豆汁或下瘀血。

川芎

黃歸

白朮

白芍等分

辣桂

人參

白茯苓

右以且量兒。加減八粟米。按古法同煎。食前熱服。黃連四物湯。治下痢純血。

黃連

官歸

川芎

白芍

生地

槐花

荆芥穗

等分

加犀角

右以咀量兒大小水煎服

家傳剪紅丸

沿疔下純血及大人腹風下血神效

枳壳炒

槐子炒

側柏葉炒

荆芥穗等分

共細末酒糊丸黍子大量兒加減米飲下

阿膠梅連丸

治下疔無問新舊赤白黑瘰癧諸症

真阿膠

剉碎用炒

赤茯苓

去皮

赤芍

烏梅

洗淨去核酒乾

黃藥

黃連

乾姜

骨歸

酒洗日乾

黃藥

黃連

乾姜

共細末水丸黍米大米飲下。忌鷄魚油膩諸物。已上皆初治之法也。

赤白痢者。心主血。因傷熱得之。則心移熱於小腸。是為赤痢。故赤者從小腸而來也。肺主氣。因傷熱得之。則肺遺熱於大腸。是為白痢。故白者從大腸而來也。劉河間據內經云。澁而便澁。血知氣行而血止也。以芍藥為主之行血。則便自愈。調氣則後重除。此治痢之要法也。吾之先祖以此立法。用黃連阿膠丸加當歸木香治血痢。於血中行氣。胃苓丸加當歸芍藥治白痢。於氣中養血。赤白相兼者。香連丸。有積者。家秘。

治利保和丸相兼服之無不效者

河間芍藥湯 行血則便自急調氣則後重除

芍藥

錢一

當歸

黃連

黃芩

各五分

芍藥

分二

大黃

分三

桂枝

木香

各二分

桂枝

分二

吹咀兒小分三劑大則一劑水煎食前溫服

黃連阿膠丸

治赤痢

黃連

阿膠

各二錢

白朮

當歸

木香

各一錢

細末水九米飲下

胃苓丸

治白痢

加當歸

白朮

白米

同研末水糊丸米飲下

香連丸

治赤白痢此吾家傳秘方也

黃連

大如鴉反清  
去板橫切

吳茱萸

木香

石蓮子

錢  
三

共末酒糊丸黍米大量見加減限米炒煎湯下

家傳治疴保和丸 其積有未盡有久痢原未得下

脾虛不可下者俱宜服下之

陳皮

半夏

陳莖

枳壳

厚朴

黃連

山查肉

蘿蔔子

神曲

麥牙

木香

枳殼

炙草 各賦半

右細末別取神曲糶丸米飲下此已土中法之治也

痢久不止各休息痢不可驟用肉豆蔻訶子罌粟壳止之恐有滯積未盡反成重病也必腹中不痛雖有虛痛切不可止之吾有家秘和中丸不犯此禁如有可止者幼科中秘傳香連丸萬金散擇而用之家傳和中丸專治休息痢及痔痢屢驗

人參

炙草

當歸

川芎

車前子

楮本

澤泄

神曲

麥芽性

訶子肉性

石蓮肉性

白朮

白茯苓

陳皮

白芍

黃連性

木香

乾姜性

白豆蔻性

各一錢

共細末酒煮麪糊丸黍米大米飲下

秘傳香連丸 治男女小兒諸般痢疾作痛並火痢

虛脫濃血不止者服之神效如初痢一二日開不可

服恐攔住積滯熱毒變生他症又反為害也

黃連

酒制炒

木香

肉豆蔻

各三錢乳香

沒藥

各一錢

右末麪糊丸 啖實大服一丸赤痢其草湯白痢姜

湯下

萬金散 治水瀉下痢久不瘥者

栗壳

去盡一兩生用

判細

兩炒

甘草

晉簡生一兩炙一兩

陳皮

二兩去

烏糖

和糖一兩

判細合成劑量兒大小熱渴畧與二沸和渣傾出

碗內蓋定澄清回造空心溫服已上未治之法也

瀉痢從來更變多 久而休息轉沉痾

脫肛不禁甚惆悵

膝腫其如鴨膝何

有泄瀉變痢疾有痢疾變泄瀉者生正有言曰先瀉後痢者此脾傳腎也為賊邪難治先瀉後瀉者此胃

傳脾也為微邪易治斯言也。謂瀉痢久而傳變者惡  
亦有說焉。瀉久不止復變痢者其後重者胃氣之下  
陷也。其膿血者腸垢之下濁也。水穀竭而胃敗如之  
何不死。痢久不止而變瀉者其後重除者乃濕熱之  
筋盡矣。其膿血止者乃陳莖之物去也。腸胃通而水  
穀行故可治也。若初瀉便變痢者此氣病傳入血中  
宜養血為主。加調氣之藥不可復下傷胃氣也。初痢  
即變瀉者此血病傳入氣中以調氣為主。加養血之  
藥不可遺澁使毒留而不去復成痢也。瀉變痢者宜

四物湯加

黃連

木香

白茯苓

痢變瀉者宜四君子湯加當歸白芍主之

痢久不止無津液飲成癖病者宜參苓白朮散大補胃氣可也。有素病癖又新病痢者此重傷食感冒四氣之所致也。宜錢氏異攻散加

白芍

木香

訶子肉

當歸  
神效妙

各等分為九服不可作痢治之

痢久不止謂之休息痢。脾胃受傷其氣之下陷也。則為噤口。其上逆也。則為食入即吐。不思乳食。謂之禁口。腎開竅於二陰。痢久則腎敗矣。而膝紅腫謂之鶴膝。更有不治之症俱宜辨之。

脫肛者胃氣下陷也。後重不除，勞責太過，故腸頭脫肛出也。肛門名魄門，肺是主之。腸頭脫出，又肺氣不出，收令也。宜用養血調氣升提之劑，使病止則肛自不出矣。升麻湯主之外用洗法托法灸法。

升麻湯

升麻錢一

人參

白朮

白茯苓

陳皮

當歸

白芍

麻子仁各五分

甘草

防風各五分 荆芥錢二

烏梅去核

右咀分二劑，食前服。

洗法獨流散

治脫肛不收

五倍子

半兩研末并花水三碗入磁罐內慢火煎半入

朴硝

荆芥穗

錢各一

乘熱薰洗仍以五倍子末付之

一方用綠桑螺燒存性研末以猪膏和塗腸頭上

托法 用木賊存性為末摻以軟帛接入

又方 用赤石脂伏龍肝等分為末敷之

又方 用龍骨末木賊燒存性等分末敷之

灸法 脫肛不收灸尾翠骨穴神效又能治痢

禁口者乃胃虛逆氣上衝而吐也。有不思食者皆虛

損也。宜用參苓白朮散米飲調服。大抵此病難治。九

瀉痢者能食則吉。不能食則凶。

鶴膝者兩膝紅腫如鶴之膝也。小兒痢後多此疾。乃腎虛之症也。宜補腎地黃丸。加虎脛骨牛膝主之。有五色痢者。此五臟之真色見也。痢疾腹脹者。屬中氣不足也。宜胃苓丸調之。慎勿下之。下之則死。亦有餘毒之未盡。誤服瀉藥。大早腹脹者。此為實也。腹中必痛。宜下之。三黃枳朮丸主之。痢病不治。症外鬼下痢如塵。腐色者死。如屋漏水者。下痢日久。大便如竹筒者死。如魚腥者死。凡赤白同下。久而不禁。小便赤澀。腹痛發熱。唇紅舌胎。氣促心煩。坐卧不安。大渴飲水。穀道傾陷。而容似

衄禁口不食服胞腫足背腫者皆不可治。內經云：臍  
癰身熱脉躁疾者死。身涼脉遲者生。又脉大而有力  
皆死。脉微而無力者生。