

萬氏家傳育嬰

重錄萬氏家藏育嬰家秘卷之二

羅田容齋

胎疾

孩兒初生襁褓中

如苗秀實漸成童

四因內外能分辨

治不乖方大有功

幼科立方古有定制見初生後病者惟以膏丸化而服之蓋以寢蒸未定腸胃脆弱恐不勝藥則立調治乳母之法一歲之後則有湯藥與大人同但劑小耳

有因氣動而病生于內者。如驚病。亟。癲之屬。驚用安神丸。內病用木香丸。魚用亟丸。癲用消癲丸。有不因氣動而病生于內者。如傷乳食之屬。初傷以胃苓丸和之。和之不去以保和丸消之。消之不去以脾積丸取之。量兒虛寢勿損胃氣。

有因氣動而病生于外者。如結核。亟。瘀。丹瘤之屬。結核用安秘內消丸。再瘀用苦參丸。丹瘤用泛法。

有不因氣動而病生于外者。如傷風。傷寒。傷暑。傷濕之屬。風用鴻青丸。防風惺惺散。寒用理中丸。藿香正氣散。暑用涼驚丸。黃連香薷飲。濕用胃苓。天水五苓散。

散

胎疾初生治較難

幼科証治若空談

丹溪妙論如繩墨

家秘書中次第看

小兒胎病有不必治有不可治者常觀內經巔疾之文東垣紅絲癰之論則此疾之生于父母者似乎不必治矣一隕之脾風不治百晬之痰咳難醫未三月而驚搐者凶恰一月而丹癟者死又不可治者矣今幼科有胎熱胎寒胎肥胎瘦胎驚胎黃之論証治雖詳豈小兒常服之藥也况寒熱者胎胚之餘毒也肥怯者父母之賦予也非惟不可治亦且不必治矣

惟丹溪論治胎毒者，只調治乳母。其法誠幼科之絕墨典。

胎寒者，毋娠時多熱病，乃服寒涼之藥，令見受之。生後昏昏多睡，間或呑乳漏白，此其候也。或百日之內忽病戰慄，口冷手卷曲，不伸，手亦握拳，腹痛晝夜呻哭不止。此生後受寒得之。亦名毒胎。宜服溫補之劑。當歸散主之。乳母宜服釀乳。當歸散。

當歸散 治小兒胎中受寒，生下再感外風，面色青冷，四肢厥冷，大便青黑，及腹痛，體陽內寒。

歸尾酒

黃芪

蜜

人參

細辛

龍骨

桂心

赤芍

甘草

為細末每服一字以乳調下

釀乳當歸散

乳母服之

當歸

川芎

赤芍

生地

香附

炙炮

各等分

桂心

懷姜

各半錢

咬咀水煎食后服少頃捏去宿乳與兒吮之  
症熱者。毋服。時喜食辛熱魚炒之物。或患熱病失於  
清鮮。使兒受之。生后目閉面赤。眼胞浮腫。常以身努  
咤泥作聲。或時啼叫。或時驚煩。遍身壯熱。小便黃澁。  
此胎熱也。若不早治。則丹瘤瘡癧。由此生矣。宜用牛

黃連炙甘草各等分爲末入珠砂半和勻生蜜調成  
糊每取豆許大納見口中令其嚥下乳毋宜服釀乳  
赤芍散

生地酒

黃芩

川芎

菖鷄

木通酒

炙草

赤芍

天花粉

連翹各等分咬咀加淡竹葉水煎食後服令乳母搘  
去宿乳亦湏少與兒吮之

胎驚者母娠時曾因驚慄氣停于子子受之生後頻  
頓發驚此胎癇也不可治治之無功如因有熱發搐  
者必先啼哭亦名胎驚用燈心湯下東垣安神丸效

搐不止者此真搐也勿治

丸方 治小兒胎中受驚生末滿月而驚啼用生

黃連珠砂

射少許研細取稍乳調稀納入口中又

用全蝎一枚以生薄荷葉裹之線札定火上炙焦為  
末分四服入珠砂射少許麦冬湯調下

胎黃者兒生下而目身盡黃者亦胎熱也治同法

胎肥者兒生下遍身肥肉如血色紅滿月以后漸

漸羸瘦。

胎怯者兒生下目無晶光面無華彩身無血色此二  
二者乃胎稟不足之病宜服地黃丸方見前

又用沐體法 天麻二錢 蟠稍五分 珠砂五分 白凡  
膏 紫 蛇 三 射香一字 烏梢蛇肉三錢 酒洗焙乾同研

末每用三錢水三碗 桃枝一握並葉五六片 同煮十

沸去渣温熟浴之勿沐昔

一小兒初生遍身無皮俱是赤肉。用白葵粉遍身擦  
上。候生皮乃止。

一小兒初生如魚泡。又如水晶。破則水流。用蜜陀僧  
研極細擦之。

小兒胎疾有胎癧不足並宜地黃丸。有胎毒者如胎  
熱法。所謂胎癧不足者各隨五臟論之。如語遲心氣

不足也。心主言行，是皆肝氣不足也。肝主筋，齒不生者，腎氣不足也。髮者，血之餘。腎主血，齒者，骨之餘。腎主骨，吐瀉頻併者，脾胃之氣不足也。脾胃為水谷之府，帝轂短者，肺氣不足也。肺主殺。

脾風証治

脾在身中號命關

衝任在此發靈根

最宜調護無傷損

總少差池咸壽元

脾在兩腎之間，謂之命門，乃人之根本也。衝任督脈皆起于脾之下。任脈自中而上，至于人中與督脈合。衝脈二道夾任脈而上，散于舌下與脾脈合。胃脈

二道又夾衝脈任脈而上入于齧中上下往來如環無端故男子十六歲而精行女子十四歲而血動任脈行衝脈滿胃脉寢也小兒初生三脉方具而臍之千係尤重也所以斬臍之時不可不慎或剪臍帶太短或結導不緊致外風侵于臍中或用鉄器斬臍為冷所侵俗兒時或牽動臍帶水入生瘡客風乘虛而入內傷于腎腎傳肝肝傳心心傳脾脾傳肺肺蘊蓄其毒發為臍風之病其症面赤啼哭者心病也手足微搐者肝病也唇青口撮瘻延壅塞者脾病也牙關緊者腎病也啼聲不出者肺病也五臟之中畧見一

二臟之証者病猶可治悉見不能矣

臍風初子幾遭傷

一臟之中最不詳

識得病在何處起

無求無患早隄防

小兒初生一臍之內惟臍風為惡候也如臍腫腹痛  
啼哭不止唇青口撮者曰臍風牙關緊急吮乳不得  
啼声不出者曰禁風肚腹緊脹腸若雷鳴大小便不通者曰鎖肚此三者同一病也但症不同耳俗名焉  
无風者是也三症多死臍腫唇撮者脾胃之氣絕于中也禁風乳食不入者心肺之氣絕于上也鎖肚大小便不通者肝腎之氣絕于下也任脉止衝脈閉胃

脉散如之何不死。欲免此症須要提防。

預防法 小兒初生十日之內但覺噴嚏多啼不乳者此將發之候也急抱兒向明處視其喉中懸癰上脣有小泡如珠之樣相聚者即用銀挖耳或平指甲刮去之以軟綿蘸甘草汁拭去其血去之早而泡自者無慮也其色黃或有泡痕在而落入腹中者急用硃砂牛黃射香各少許研細取猪乳汁調稀抹入口中或取猪乳汁一二匙與兒吞之佳。蓋猪乳汁主小兒口噤不閉最良。

又法五苓散加

當歸

川芎

木通

木香

除此不取魯  
汗入藥內

與乳母服如上法

若失預防之法

其病將來而口漸振啼多乳少者此

腹中痛也內癟同宜五苓散加

當歸酒莫茱萸炒

木香

乳香

沒藥

鈎藤鱗

二為極細末乳拌如

芩寃大納

兒口中服之無時

乳母仍服上五苓散又

取附子桂等分為末生姜

自然湯調作餅約一分厚

與脾相等放在兒脾上以布托住

上用炭斗火燄之

如諸症悉見不可治也

按古方治脾風者初用控涎膏

吐風痰次用益胃散

和胃又用辰砂膏利驚此良法也

又用僵蚕全蝎蜈

卷之二  
諸毒藥以怯禁風者此皆治其標也。不治其本而治其標故鮮克有濟者矣。然父母愛子之心必欲救之。醫有活人之心不可不救也。病輕各加上方。五苓散為主。蓋五苓散是太陽膀胱之裏藥也。澤瀉茯苓以養心安神。官桂莫茱萸當歸以伐肝臟寒邪之氣。白朮茯苓以去脾臟寒、濕之氣。木香乳香淡薑以止腹中之癟。官桂茯苓澤瀉猪苓又去腎中之溫。以鈎藤官桂去風之搐。以人乳和之或乳母血之所化其氣用也。若有瘍者本方加胆星末。口噤者加白僵蚕末。更加人參末服之。加大便不通者宜三黃解。

毒丸下此急則治其標也去其惡毒之后如此法治之。脾風之病有胎毒者十無一生吾見人家難于子息者所生之子多以脾風死如東垣所論紅絲瘤之事是以知之。

脾瘻者其帶因有所犯而落故根未欬潰腫而成瘻也宜白龍宣枯丸黃柏三味為末敷之甚妙要宜常看勿使抱裾之內有尿溫也。

臍突者小兒多啼所致也臍下為氣海啼哭不止則觸動氣氣動于中臍突于外理之常也其狀突岀者光浮如吹起者捏按則微有声此症鄉俗但遇婦人

挑水來者即抱兒以突睛當擔頭上觸之不拘日數以睛入為度每試輒效亦良法也吾見小兒睛哭者多難養由於多哭也

不乳似癱風小兒生下三日之內忽有不乳者當審問之勿以不乳似癱風治也癱有多涕撮唇之症若此無之但不乳也有吐乳乳之又吐者或因拭口不慎惡物入腹也用黃連甘草木香木瓜各少許為末每用少許納兒口中乳汁下如有啼哭不乳者此腹痛也乃胎寒症宜上方去黃連甘草加乳香改藥以當歸湯少許蒸調如上喂之如無上症無故不乳者

問其母之乳汁多少有乳多者傷乳也宜少節之  
久自思乳矣乳少者必有他症心誠求之

燮蒸証治

草木逢春變化新，太和元氣日薰蒸。

細推物理皆如是，莫把芽兒作病名。

天地之造化陽主生長陰主收斂故草木之生長于  
春夏者陽之舒也收藏于秋冬者陰之慄也幼科書  
中寔者寔生五臟也蒸者蒸養六腑也以燮蒸二字  
分臟腑論又有燮蒸之後有三大蒸之說后人因之  
莫有覺其非者故予直解之曰寔者寔湯也謂見之

知覺運動以漸而發也。蒸者蒸然發熱也。形神寢易之時真陽發舒之象也。人之生也一歲而寢蒸是男子八歲而真牙更。十六歲而精動六十餘歲而精竭女子七歲而真牙更。十四歲而經行四十九歲而經止此天地陰陽之氣其分數固已定矣其一歲之外復有三大蒸之論者誠未達其旨也若一歲之內寢蒸之日似亦不可執也形有強弱氣有清濁寢有遲速故形壯氣清者其寢常速形弱氣濁其寢常遲謂三十二日一寢者乃舉其大數如是也至于形之強弱氣之清濁則又稟于父母出于造化陰陽之殊也。

切針中治變蒸者發熱方用黑散子麻黃杏仁發表  
藥也大黃攻裏藥也表裏無邪不知此法如何而立  
變蒸之熱生于其中發于其外自有微汗而解按仲  
景論有傷寒不宜汗下之戒如是方者悞兒多矣

兒當變蒸之時或有傷風或有傷食者法當治之先  
後補瀉不可不辨如先有所傷兒後變蒸者邪氣盛  
而正氣受傷當先瀉後補也。先變蒸而後有所傷者  
正氣虛而邪氣乃乘也當先補後瀉家秘之法挾外  
感首宜罕裡之法以發散块內傷者宜枳术丸細  
典之更節其乳有客忤者宜至聖保命丹薄荷湯研

育嬰卷二  
服或吐瀉者錢氏異攻散加藿香葉共作細末蜜為丸如芡實大每服一丸米湯化下

小兒廔瘞遍如蒸不除者調其乳毋用加減小柴胡湯人參

柴胡

甘草

麥冬

生地

木通

陳皮

等分

淡竹葉水煎食後服如前法

有廔蒸咳嗽痰壅鼻塞較重惺惺散要方也方見傷寒

寒

又浴法用白芷或苦參煎湯抱兒向避風處浴之

有廔蒸發搐者此甚生風亦胎驚也宜尋驚風法

治之渴肝渴青丸渴心道赤散如先發驚搐方治正後變蒸又發者此胎驚將成癇也勿用正法此有痰伏心中宜安神去痰錢氏安神丸主之方見心脏

### 急慢驚風

兒在母腹中只是一塊血肉耳及其生也啼聲一發以後九竅開張四肢蠕動如夾物覺之象肌骨嬌嫩又如草木萌芽之象故曰芽兒以漸壯健全賴父母之養一旦有病醫藥之助不可無之然病有三因須明辨之有因于胎毒者如丹疹瘡癰之類宜解其毒如幼嬰解毒延齡丸邈源解毒湯之類是也有因胎

稟不足者如解願五軟之類是也宜地黃丸主之。有  
因外感風寒暑濕之氣得者謂之外因。有因飲食寒  
熱之傷得者謂之內因。有客忤領誤湯火得之者謂  
之不內外因。如外因者發散之。內因者消導之。不內  
外因者各從其症治之。臨機應變不失其宜可也。

幼嬰延齡解毒丹。解胎毒氣物生下便宜服之。

用胞衣餘帶近衣者不拘長短剪下炭火上焙乾為  
末。每一錢加甘草一錢。淨黃連五分。朱砂飛三分。為  
細末。用生蜜和勻。分作七服。每日取豆大許納兒口  
中。以乳送下。七日去其腹中之穢毒。自消風之疾。

通源解毒湯 兒有胎疾乳母服之此四物湯加也

當歸

川芎

生地

人參

連翹

黃連

八皮

甘草

木通

水煎濃入竹瀝服之

丹溪曰乳母致病事起于默人多玩忽醫所不知故乳母稟受之厚薄性情之緩急骨肉之堅脆德行之善惡令兒相肖為大關係不可不格也

驚風總論

小兒大病是驚風

急慢陰陽便不同

採集前賢諸秘訣

指揮後學救孩童

錢氏云急慢或聞大聲或大驚而發搐發遇則如故此無陰也當下之此症本因熱生于心身熱面赤嘔飲口中氣熱大小便黃赤剝則熱也蓋熱甚則生風風屬肝此陽盛陰虛也故下之以除其痰也不可與巴豆大溫藥下之恐觸虛熱不消也小兒熱痰客于心間因聞非常之聲則動而驚搐矣若熱極不聞声及驚亦自發搐也按錢氏治之用利驚丸亦以硃砂膏代之

慢驚因疾後或吐瀉脾胃虛損遍身冷口鼻出氣亦

冷手足時喚癡昏睡露睛此無陽也。按錢氏曰：經言  
湯不知其義，今用調元合建中湯。

急慢驚陰陽異証切宜辨而治之。急驚合涼渴慢合  
溫補如不分別則誤甚矣。

薛氏曰：小兒平常無事忽發肚熱，手足搐搦，眼目戴  
上，涎潮壅塞，牙關緊急，身熱面赤。此急驚風屬陽病。  
在腑當治以涼，如面白身無熱，口中氣冷，多啼不寐。  
目睛上視，項背強直，牙關緊急，涎潮或自汗，此慢驚  
風屬陰病，在臟當治以溫。

肝驚眼赤，面青，糞下青白，心驚面皮紅赤，夜啼至晚。

肺驚氣喘飲食喫中痰鳴腎驚夢中咬牙睡中驚哭  
腮驚五心煩熱乾嘔腹脹不食

按陳氏治慢驚風初去痰用芎蝎散次溫中用油珠膏。后補元氣用補脾益中湯。多辛燥之藥。今改用沉香礞石丸以降其痰。調元建中湯加附子以溫其中十全大補湯以復其元氣或參苓白朮散。

絜古云急驚陽証也。俱腑受病耳。小兒客痰熱于心臟是少陽相火旺經云熱生風。因時火盛而作。蓋東方震木得火氣而發搞。木火不動得風而動。兩用利驚丸。導赤散。瀉青丸。地黃丸主之。搞止服安神丸乃

東垣安神丸也。

慢驚陰証也。俱臟受病耳。小兒吐瀉病久。脾胃虛損。若不早治。則成慢驚。名曰癥癓。似搐而非真搐也。因脾虛損故。大便不聚。當去脾間風。則其利自止。既以失治。則脾肺俱虛。致按木所乘。是為慢驚也。當用溫補。按絜古用宣風散。以導脾間之風。不知其義。蓋脾胃虛損。豈可用牽牛大瀉元氣。此不可服也。用益黃散。羌活膏。皆犯辛熱。大耗真氣之藥。不如東垣之論。其義最精。見后。

東垣曰。外物驚宜鎮心。以黃連安神丸。若氣動所驚。

宜錢氏寒水石安神丸。大忌防半丸。治風以辛溫之藥必殺人。何也。辛散溫浮熱火也。

因驚而渴青色。先治肝以硃砂之類勿犯寒涼之氣。大禁涼驚丸。風木旺必剋脾胃。當先寔其土。后渴其木。闔茅忠集錢方以益黃散補土誤矣。其藥有丁香辛熱以助其火。上旺土愈虛矣。青橘皮渴肺丁香熱大渴肺與大腸脾寔當渴子。今脾胃虛反更渴子而助火重虛其土殺人無疑矣。其風木既旺有關係洪大掌中熱腹皮熱。豈可以助火渴金。今立一方火浦金。大補其土之為神治之法。宜黃芪湯主之。乃

治驚慢之神藥也即調元湯加芍藥是也

丹溪曰驚風有二慢驚屬脾虛所主多死宜溫補一  
云溫補宜參术煎湯下安坤丸急驚屬痰熱宜涼驚  
一云用養血藥作湯下降火清痰丸子錢氏涼驚丸

世以一緊通治二証甚謬

急慢發熱口瘡心肺伏熱痰熱痰收痰喘並用湯法  
重則瓜蒂散輕則用苦參末小豆末以淡茶汁調服  
吐之吐後擣定更宜防風通聖散為末蜜丸服之  
全要方云驚証因風則目青面紅發搐其病在肝因  
驚舌瘡面赤忽然作聲發搐其病在心因食則嘔吐

氣而發搐。其病在脾。皆陽癆也。脾胃經虛。則生黏痰。  
痰涎者。脾胃所出也。痰則凝滯在于咽喉。如牽鉛之  
聲。時復痰癆。或因吐瀉所致。脾虛則肺亦虛。痰涎流  
溢其証亦然此陰癆也。

身熱脉浮。精神恍惚。或吐瀉不思乳食。發搐即半陰  
半陽合病。身熱脈沉。精神倦怠。或吐不瀉又能乳食  
發搐。亦半陰半陽合病者也。

亦有急驚。濁涼而不愈。或與吐下藥太過者。變為慢  
驚。又有慢驚溫補而不愈。變為急驚者。  
急慢驚風。症有陰陽症。有順逆。搐有真假。治有次第。

不可不知其候可預防者如目鮮目眩目白目青目斜目閉目轉目瞪声寔声嘎声輕啞口弄舌蹉舌露筋噓風撮口噎乳噎食忽然定睛吐涎沫扭頸搖頭仰身擦面藏頭畏明手擎手戰脚擎不伸忽擦忽亂失張失志精神恍惚睡卧不寧睡中喜笑困倦噬齦心煩噪哭咬人面臉色變或紅或青身舒用力呢上作声者已上症候乃急驚之先兆也宜預防之驅風膏錢氏抱龍丸

凡見搖頭斜視以手抹人昏睡喜昧額上多汗口亦粘汗其脉沉細即是慢驚之候宜急溫之調元湯

中湯定心丸主之

病有陰陽急驚風屬實

病在肝心二臟

一歲謂之陽癇

慢驚風屬虛寒

病在脾肺二臟

謂之陰癇

此以寒熱

分陰陽也

五臟為陰六腑為陽

急驚發於六腑為陽

治慢驚發于五臟為陰

此以臟腑分陰陽也

証分順逆者男發搐目左視

握拳拇指在外者為順

反之者逆女發搐目右視

握拳拇指在內者為順

此者逆蓋天地之道陽左陰右陽外陰內也

錢氏云男發搐目左視無聲

右視有聲女發搐目右

視無聲左視有聲相勝故也

蓋震東兌西男女之寢

位也震屬乙木兌屬辛金肝肺之分位也。男子主於寅而左行。女子生於申而右行。左右者陰陽之道路也。今男搐左視無聲。寅乃甲之旺位。乙之從甲妹之從兄也。故為順而無聲。右則從庚。乙與庚合金木相華而有聲也。女搐右視無聲。申乃庚金旺位。辛之從庚妹之從兄也。故為順而無聲。左則從丙。辛與丙合火金相灼而有聲也。活幼心書順搐散可取用之。如此觀之急驚風為順而易治。慢驚風為逆而難治。搐有真假。此錢氏論。百日内發搐之証也。真者不渴。三兩次必死。假者發頻不為重。真者內生驚癇。假者

外生風冷。蓋血氣未貫不能勝。任乃發搐也。欲知假者。口中氣出熱也。治之可發散。

按錢氏肝主病云。氣溫則內生。氣熱則外生。外生者病在表。故可治。發散宜瀉青丸。去大黃加天麻全蝎主之。內生者病在裏。乃氣動之病也。周歲以後小兒宜瀉其本腑。當歸龍蓄丸主之。

治有次第。初發搐時。卒然昏絕。牙閼緊急。俗用摳法。灸法以醒其驚者。蓋不知昏絕口噤皆痰涎壅塞之所為也。輕者可摳可灸。即醒。重則先用定驚散吹鼻中。喚出可治。不出則用辟驚散。必醒。如不喚不醒。不

可治也。次用開閉散擦牙涎出自開然後進藥急慢同法。

如痰涎壅塞或吐之。或利之皆非其治也。蓋痰之上壅者火載而上也。辟如釜中之水益沸故云湯止沸不如釜底去薪今不濁火而但吐之利之前痰雖去後痰壅塞復至矣。急驚風用珠砂膏揭風湯甚則用蒙石滾痰丸。慢驚風用星香散甚則以礞石丸降之。痰去則搐自止矣。搐不止者依後法治之。搐止驚退可以安也。急用錢氏涼驚丸慢用溫驚定心丸此用急慢故風始終之要藥也。

急慢驚風氣喘氣鳴手足冷皆不可治

急慢二証貴先知

風在肝經食在脾

驚恐傷心神志亂

現其發搐在何時

錢氏曰傷風得之口中氣出熱呵欠頓悶手足搖動當發散小兒本怯者多此病也

錢氏曰因食得之身體溫多睡或多不思食而搐當先定搐後安神

兒因嬉戲指二蠟以阻之者或因帝哭扮稱異類以止之者皆能作搐蓋心藏神心主驚土則傷神腎主志腎主恐則傷志神志既傷則心腎俱虛而胆亦

情矣。如此搐者，若作驚搐治之，誤矣。宜補心腎之神，志安志丸主之。

錢氏曰：病潮熱，寅卯辰時，身乍汗熱，目上視，手足搐動，口內生熱涎，頓悶頑急。此肝旺也。梁古云：潮熱于寅卯辰時，木旺之位，是肝旺也。當先補腎水以制心火。地黃丸後，瀉肝以止其搐。瀉青丸。

因潮熱已午未時，發搐心神驚悸，目上視，白睛赤色，牙關緊急，口內涎潮，此心旺也。梁古云：巳午未時，火旺之位，而熱搐者，心熱也。真赤散涼驚丸。錢氏方或木通散，以瀉心肝之火。

因潮熱申酉戌時不甚燒而喘目微邪視身休似熱  
腫露睛手足冷大便淡黃是肺旺也。梁古云申酉戌  
時金旺之位而肝木強法當補脾忌被木之賊所犯  
害當瀉心肝以挫其勢而后補肺按瀉心肝宜木通  
散補脾宜錢氏異攻散治肺又小阿膠散

因潮熱亥子丑時不甚燒而卧不穩身休溫熱目睛  
緊斜視喉中有痰大便銀褐色乳食不消多睡不醒  
梁古云皆因大病之後脾胃虛損多有此病故宜補  
脾涼心按補脾宜異攻散涼心宜涼驚丸皆錢氏方  
錢氏案古論日夜發瘧之証治亦有陰陽之分宜

外辰巳午未陽之位也。申酉戌亥子丑陰之位也。故  
肝心之搐多用涼瀉肺脾之搐多用溫補也。

他病傳來發搐多或因搐後變他癥

能將脈証分虛實從本從標治不訛

脾風發搐此胎毒也。兒生一臘之內多啼不乳或撮  
唇或牙開緊或肚大或脾尖發搐者此胎驚也。謂之  
直搐。生于內者氣喘痰鳴手足冷者不治詳見脾風。  
寢蒸發搐此胎病也。因寢蒸之後或傷風或傷乳或  
突驚或發搐百日之內搐有真假說見前皆曰胎驚  
真搐者頑發必死假搐者少宜散風化痰安神至聖

保命丹主之。百日以後發搐口中氣熱此肝旺病也。  
宜瀉青丸竹葉湯入沙糖少許化服後以至聖保命  
丹安神如逢癰蒸之期必發搐者此胎癇也自內生  
者若不急治後成終身之病宜安魂鎮心定魄頻上  
細與服之以不發為度秘傳三聖散主之

白滑石飛兩半甘草二錢半和勑作三分一用青黛一  
錢和勑名安魂散早以淡竹葉湯下一用殊砂  
飛一錢和勑名鎮心散午用灯心湯下一用苦  
梗細末和勑名定魄散晚用蘇葉湯下  
外感傷風發搐其病在肝即前傷風發搐也治同先

如肝有風甚則角弓反張似天癆似瘇瘇此有搐也  
宜酒肝散風。蓋足厥陰經之脉隨腎脈循脊裏上至  
頸項脊傍兩行。則足太陽膀胱脉也。故風甚同見証  
也。宜加減亨合湯主之。如脊下客三指者不治

人參

紫胡

黃芩

杏仁

去尖

麻黃

不去根  
芦一分

甘炒

川芎

葛根

升麻

羌活

當歸

防風

石膏

此湯青柴胡麻黃葛根四物加減也共爲

細末鈞藤湯調服

傷食發搐其病在脾謂之食癆即前傷發搐病也。搐

甚者如前治法太甚者宜用輕劑下之去其食熱三  
黃枳术丸主之

黃芩

二錢

黃連

酒洗

大黃

酒洗

神遊丹

陳皮

白术

各一錢

枳實

五分

為末湯浸蒸餅丸百沸湯下

中暑發搐一名暑風宜清暑涼心下痰安神却暑丹  
主之 五苓散

二兩

黃連

朱

甘草

末各二錢

硃砂飛鉢和勻蜜丸如芡實大每服一丸麥門冬  
煎湯下此辰砂五苓散也

霍亂發搐其病在胃此訛霍亂也神氣變亂心腹絞

不吐不瀉所以邪氣上下不得出陳氏所謂氣逆而作搐痰聚發驚是也不急治之必死先用瀉吐法宣瓜蒂散吐出積食痰散氣順後和其胃氣以藿香正氣散主之

藿香

紫蘇

白芷

各一

厚朴姜

白术

陳皮

去白

桔梗

各一

半夏

各四

甘草

錢一

加枳實

分六

為細末

姜汁調下

土法

瓜蒂

猪牙皂

殊砂

共為末

每少許

以淡豆豉湯服即止

吐瀉發搐者病在肝先病吐瀉後發搐者此因吐瀉

不止。脾虛生風乃慢驚風也。治法同後。但吐瀉未止。又加發搐者。宜參芩白朮散。加內豆蔻作丸服。如先發搐后吐瀉者。此因病時多服利驚之藥。脾胃受傷所致。宜參芩白朮散或散或蜜丸。如龍眼大。每用一丸。米飲下。如搐甚。下泄者。乃遺尿也。不治。

痢疾發搐者。其病在肝。先病未止。又發搐者。此因誤服丁香木香豆蔻等辛熱。止痢之劑太多。以致內有積熱。則生風也。蓋肝為厥陰。風木在裏。則便膿血。在外。則為癟。脹。肝乃屬火。反服辛熱助火之藥。安得不發搐也。宜用瀉青丸。如黃芩。黃連蜜丸。井草湯。下此。

傷青三黃丸二方合也。知利止後發搐者作脾虛治。

同慢驚風法。東垣調元湯加白芍湯主之。

搐後更瀉此表邪入裏也。益風傷脾入裏則便腹血先用小柴胡湯加大黃下之。後以加減龍虎丸主之。

當歸

川芎

陳皮

青皮

各一  
武

黃連

酒炒

黃芩

酒炒各半

山楂

木香

各五  
分

人參

炙草

錢

為末別用阿膠三錢溶化。加九陳米湯下。瘧疾發搐者其病在肝脾此有三症或併病者。瘧至發熱則搐。瘧止搐止日日如之。病如是者不必治搐。

但治其瘡。退搐亦退也。勿起宜用刲瘡。風瘡小恙  
胡湯。暑瘡用白虎湯。食瘡用平胃散。瘻瘡用枳榔吐  
出其瘞即愈。火瘡補脾平肝宜加減。平瘡養肝丸主  
之。

黃芩

錢

人參

錢

一

白朮

當歸

白茯

半夏曲

黃芩

陳皮

常山

鱉甲

九肋者

使君子

肉

各

柴胡

草果

厚朴

姜

一

神曲

炒各

內桂

五分

青皮

六分

炙草

五分

神曲糊丸陳米湯下

一先搐後瘡者此肝傳脾也宜養脾平瘡九主之  
一先瘡後搐者脾虛損肝木乘之也為慢驚風治同  
慢驚。

一咳嗽發搐者病在肝肺肝木肺金金木相搏故成  
此病得此者多不治但觀新久衰旺何如如初得咳  
嗽數十声不止而發搐此痰盛氣逆也所謂氣逆而  
作搐痰聚而發驚是也宜丹溪薄荷湯主之如久咳  
發搐者面目唇白咳而喘促此肺虛而肝木乘之也  
病不可治無上証者身熱而渴宜小阿膠散或搐甚  
者宜先補肺後瀉肝補肺以阿膠散爲肝以瀉青丸

主之

如搐後咳嗽者驚癥未去也宜丹溪鎮驚丸主之已上方並見前

一丹毒發搐者病在少陽少陽者胆之相火也先搐後發丹毒者此毒火自內出外也可治先發丹後發搐者毒自外入內也必死自內出者火之餘宜發散解毒及反法防半通聖散主之或用加減升麻葛根湯

桔梗

乾葛

升麻

川芎

赤芍

湯

羌活

柴胡

升草

水煎服此

驚丹之要藥也

一瘡瘻發搐此胎毒也小兒身生亟以浸淫瘡痛不知用藥內服解毒之劑外用此硫毒藥搽之瘡忽自平或不搽自平者其候腹脹便祕膚無血色目閉不開而發搐者乃惡候也急進解毒之劑瘡出方生瘡不出加喘者死  
**雄黃解毒丸**主之

雄黃

另研

黃金

各一兩

巴豆

八錢去油炒

乳香

沒藥

另研

鐵

各二錢

各製為末醋糊丸珠砂衣此方治諸

惡病甚妙

凡小兒未周歲者不問癰毒瘡疥丹癧但發搐者皆  
雜治脾胃嫩脆谷氣未實雖以藥攻也

一痘疹發搐者其病在心初發熱時作搐此瘡毒欲出也宜清心安神導赤散入硃砂末調服神妙瘡出搐止者吉瘡出搐不止者山瘡正發時作搐者宜錢氏涼驚丸加珠砂主之搐不止者不治瘡結脣作搐者此非正醫乃倒醫也瘡毒留于內乃山惡之候急用雄黃解毒丸紫草井水煎湯下瘡復起者吉搐不止者凶

搐後餘症

病有搐久不止其舌黑者熱劇也內服涼驚丸外用生薄荷葉煎湯洗之舌轉紅者可治玉溪歌曰傷寒

舌黑洗不紅者凶藥洗明見吉凶即此意也  
一病有瘍久未止大小便秘者宜八正散主之如大  
便四五日不通者不可利之恐損其胃氣宜猪胆汁  
通法通之神效

一病有唇內生瘍者此熱在心脾二經也內服洗心  
散外以藥連散加珠砂擦之神效

一病有目久其瘍似止不止神昏有瘍者不早治之  
必成痼症此病在心宜利驚丸主之

胆草

防風

錢各二

真青黛

薑會

硝各一

百病考二  
珠砂錢一

腦射少許

蜜丸芡實大每服一大丸金銀煎湯下

一病有搐時失音者宜木通湯主之

木通

石菖蒲

防風

苦梗

真桑螵蛸

全蝎焙

炙草

僵蚕各半錢半

胆星一錢

共末每服二字紫蘇三片煎湯調服

一病有搐後失音者此痰入心肺竅中故也如不早治必瘡成瘻人矣宜加減錢氏安神丸主之

黃芪錢

人參

歸身

川芎

麥冬去心

石菖蒲

木通

炙草

遠志

去心  
失乾

姜汁

蜜

半斤

水石

半

蜜丸

大

每服

一丸

蘇葉

三片

煎湯

下

每

日

取

僵

猪心

剖

一半

煎湯

飲

之

以助

藥力

火服

神效

一病有時

鼻衄

不止者

此肺熱症

肝乘肺也

又有

心火上炎者

以心火乘肺也

宜潤心

肝之火

殊砂涼

肺丸主之

黃芩

黃連

山枝

連翹

桔梗

甘草

人參

各等分

薄荷

減半

殊砂

蟲為衣

蜜丸

芡實

大麥冬湯下

一病有

瘡後

目不明者

此肝虛也

地黃丸主之

之

黃丸主之

一病後有餘熱不退者當察其虛實治之如身壯熱面赤唇燥大小便不利此熱為實因服補脾之藥太早宜小柴胡加大黃主之如面白口干大小便自調唇潤者此虛熱也宜清心丸主之

人參

麥冬

茯苓

柴胡

防風

炙草絡

硃砂細

五

蜜丸芡實大

金箔十片

為衣每服一丸淡竹葉湯下

一病後發熱喘咳者當察其虛實治之如身熱飲水鼻乾唇燥脉疾有力者此熱在心肺為實宜從小便利之寧肺散

利之寧肺散

桑白皮炒

葶苈子

赤茯苓

車前子

太子参分

天草

姜東引煎服如面皰白不

熱不潤此虛也阿膠散主之

一病後肌膚消瘦精神昏憊者此驚癥也宜安神丸

主之

茯神去心

蘆薈

琥珀

黃連

赤茯苓三

胆星

遠志

甘草

蛤蟆灰一

石菖蒲

使君子四分

湯煎

山藥煮糊丸心湯下

一病後食少形瘦者宜補脾和中丸主之

卷二  
宋氏異攻散

一兩

加青皮

砂仁

使君子

名一另取冲曲作糊為丸陳水湯下

一凡病搐止後宜補胃參芩白朮散或蜜為丸甚效  
凡病搐後以券心安神定志丸生之

方俱見前

癇

驚自心生風自肝

凡因病后見癇癲

急求妙手施方法

父母固循作療殘

痛者其病卒然忽倒四肢強直目閉或翻上不轉已  
矣或有咬其舌者口中涎出或有無涎者面色或青  
或白或作六畜声其狀不一乃小兒之惡候也一時

即醉如常也。一發也或以旬日計，或以月計，或以年計。古人有三癟五癟之名，証治太多，又與急慢驚同論，似無一定之說。故後學不知其所從也。雖有論者，不過依樣西葫蘆耳。愚不自揣，強為之辨。所謂三癟者，原其得病之因也。所謂五癟者，叙其病發之狀也。驚久成癟，久者慢驚，風之變症也。不然，何以小兒之發驚者皆有治法，而發癟者至終身更無治法耶？管見如是，惟高明者擇之。

一癟之所起，因父母之循醫之無遠慮也。且知初發時或有不治自愈者，或有因捕法治而愈者。父母吾

之見其易退。見無他苦。皆不加意。或有頻發之時。不過請醫治之。請巫術之而已。不知束上智之醫以斷之。乃為終身不治之症。此父母之過也。其為醫者當知也。病之時。如唇癟則發之食癟則下之。驚癟則安之。幸其病退以為能也。及其再發不適仍用前法。而不思有結瘀在心以致沉痼為終身之病。此醫之過也。

治癟之法。幼科所載其方甚多。而無可取者也。惟承氏五色丸。宝鑑琥珀寿星丸。及牛蒡猪胆湯。枳蘇丸。三者誠治癟之要藥也。今予今此三法。辦立一方。審

試屢驗如神乃名為斷痛丸

黃連

礞石

石菖蒲

礞砂

珍珠

鐵花粉

胆星

三分  
片遂

沉香

二分

茯苓

二分

共末

芩膏爲末別用參

一錢

白朮

三錢

煮糊爲丸

炭窯大每用一丸取

猪心一個劈開八

瘡

瘡在內將線札長

流水煮熟取

出丸子研細

灯心湯調下以

猪心及汗與兒食之

三日服一丸又宜常服

參沙膏以通心氣

珠砂

五分

牙硝

雄黃

五分

射香

一分

金銀箔

五十

真白付子

枳壳

慈各

川芎

白茯苓四  
人參

黃連

遠志

兩合二至

前五味另研勻後七味共末和勻蜜丸芡實大  
每服一丸麥冬煎湯下此殊砂膏加減也

一癇之爲病乃痰迷心竅之所致也初病之時便宜  
服通竅化痰鎮心之劑醫者慮不及此執用平日治  
驚之法父母不肯早治淹延年久其狀如痴如健忘  
者終不可治也常見在火水而卒發者後致疾傷亦  
多矣

一胎癥由兒在腹中受驚氣得之生未便有是病不  
可治也

按大無云一小兒周歲因長老摩頭受記脩人念咒  
恐懼發搐痰迷有聲目多白睛強硬骨一時許方醒  
後安見皂衣人卽發多服犀珠腦射鎮墮之藥已四  
年餘此症尚在又添行步動作神思如痴診其脉沉  
弦而急誠經云心脉洪大痛陳筋柔病久氣弱多服  
鎮墮寒涼之劑復損其氣故添動作如痴先灸兩脣  
各二壯然後服藥后肝脉小急蓋小兒神氣尚弱因  
而被驚神思無依動于肝肝主筋故痰癥筋挛立  
大名沉香天麻湯蛭曰恐則氣下精怯而上焦閉以  
羌活獨活之苦溫引氣上行又入太陽為引故用以

為君。天麻防風辛溫以散火。甘草當归辛溫以補氣。  
血之不足，故養脾氣是以爲臣。附子川烏益智大辛  
溫行陽退陰。又主助腎。腎主五液。入肝爲涎。以生姜  
半夏燥溫化痰。沉香辛溫體重氣清去怯安神故以  
爲使。

余氏云。一小兒吐瀉。諸醫藥下之。至虛變慢驚。手足  
癓癩而身冷。醫復與八正散。口不能食。而胃中虛故  
利大小便即死。久則脾腎俱虛。常身冷而目閉。必用  
益黃散四君子。尤補脾。遂能飲食。又不愈。以地黃丸  
補腎。一日而安。引此一事。以爲治癥者之法。

一灸法按鍼經云癲癥瘓癓不知所苦而矯男陽女陰。黎古云晝發灸陽濤中脉穴夜發灸陰蹻照海穴各二七壯。

一癱者手足或挛曲強直或軟緩無力不能舉動或左或右其人目視不正口中流涎語言蹇澁因受風寒之氣得之未得發散初病擣時日久不醒以致風濶之氣深入筋骨后雖擣止手足之病未平如五軟五硬之狀父母因循不知早治遂成癱疾

一治癱之法當視其在左在右在左者爲血虛其治在肝肝筋肝血虛則筋無所養故筋急拘牽強直宜

補腎地黃丸主之。乃虛則補其母也。

山藥

山茱萸

酒洗取肉

熟地

酒三

獨活

川斷續

酒洗

白茯

丹皮

澤泄諸二

手不利加桂 足不利加牛膝 手足俱不利並

加各二至蜜丸空心溫酒下此地黃丸加減法也  
在右者為痰其治在肺。肺主四肢。手足為液。痰流經  
絡故手足緩而不能舉也。宜補肺行痰大補丸主之。

炙蕘

人參

白朮

白茯

炙甘草

當归

川芎

酒炒

半夏

酒泡

陳皮

絡

川烏丸

三酒

湖丸姜湯下此十全大

補湯加減也更灸曲池三里捷骨肩頸各二七壯  
若口眼歪向一邊者灸頰車穴左灸右山火左即

止

### 驚風諸症

兒多異病狀如癇

家秘幼科皆有法

莫作真癇一例看  
非人勿示泄心傳

一 天癇似癇天癇者壯熱驚悸眼目翻勝手足瘲掣  
或哭或咷喜怒不常甚者瓜甲皆青紫之狀此肝病  
也。但不睡卧耳宜鮮利風邪則愈鈎藤散主之

鈎藤

白荻

各五分

大黃

炮熑一

防風

硃砂

蟬退

羌活

獨活

青皮

甘草各三

為末姜蜜調服此濕青丸

又方用鈎藤

人參

犀角屑各五  
炙草

天麻

全蝎各二  
為末薄荷湯調服

一內鈎似癰。內鈎者腹痛多啼。唇黑囊腫。僵反張。  
眼內有紅筋斑黑者也。此肝病也。但不瘡固耳。乃受  
寒氣所致。先是內眩抽掣極病。狂叫則泄瀉縮脚。腸  
痛而啼。內鈎一過外証油掣又來。內外交攻極難調  
理。須分內外用藥治之。內鈎甚者宜乳香膏主之。

乳香

三分

沉香

一

爲極細末

蜜丸梧桐子大

每服二丸用

石菖蒲

釣藤

煎湯下

又方木香丸

沒藥

茴香

木香

炒各等分

釣藤同上

全蝎

乳香

各半

先研乳香另放後研上諸

藥爲末取桂少許研和

白芍

少許研和

白芍

少許研和

白芍

少許研和

白芍

少許研和

大酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

酒

釣藤丸主之

鈎藤

白芍

各五

大麻

硃砂

三分

蟬退

羌活

獨活

防半

青皮

炙草

除硫砂另研餘為末水煎

調硫砂末服

按天鈎內鈎二症百日內小兒多有之。此二者皆肝

之病也。蓋厥陰肝經內行于小腸外行于背故外感  
傷風熱則為天鈎。內傷寒冷則為內鈎。故曰天鈎者  
陽也。內鈎者陰也。

病有盤腸腹痛似內鈎者。乃小腸氣痛也。亦令腹痛  
作啼。僵腰曲乾痛多啼額上有汗。此小腸為冷氣  
所搏然耳。宜用和乎溫氣之劑。川陳子散主之。眼  
內無紅筋黑斑囊不腫者。

木香

小茴去薑

格一川練血二升用巴豆二粒炒去皮共末酒調

一客忤似癰。小兒神氣怯弱，外邪客氣，或馬異物，觸而忤之。其候口吐青黃白沫，水谷鮮進，面色變異，喘急腹痛，反側瘧癆，狀似驚癇。脈來弦急而數，視此口中懸瘻，在左右，若有小腫核，即以竹針刺潰或以指甲搗破治之。當辟邪正氣散，驚安神，久延則難為力也。古方作客忤及中惡者，急作醋炭服蘇合丸，此方治客忤中惡之要藥也。

全按客忤者，謂客邪之氣忤其兒之正氣也。論其所忤不但外邪之氣，與人物之氣，自鼻而入，乃外因之

客忤也。聞見之驚，自心而生，乃內因之客忤也。然則之所奏其氣必虛。小兒神氣既虛，故易動耳。邪有微甚，治有輕重。幼科混同論之，所謂辨之未辨者矣。夫痛則病，發而困亦真痛矣。予特表而出之。按手指三閏紋經，發而困亦真痛矣。情知四足驚，赤因水火符。紅色是人驚。此治客忤者以此辨。

養小兒之法，許見前卷育嬰四要中。凡小兒客忤，中惡諸病，皆父母及抱養者之過也。或因生人遠來忤首，或因六畜忤者。或因感冷水忤者。胥外生者也。

物之氣自鼻而入上衝顙項逕曰五氣入鼻藏于心  
肺人主皮毛心主血脈頃顙之上諸陽之所會也邪  
中之即病矣宜用沐浴法塗顙法治其外次鼻法補  
之內服對証之藥以扶正氣為主正氣勝則邪氣自  
退也並用酸乳湯

病時睡不醒而喜睡者忤之微也宜發散醒之散  
人參      白朮  
桔梗      天花粉各等細辛  
白芍      火草

一方加防半 川芎各等水煎薄荷葉引微汗妙  
浴休湯 治客忤中惡自利諸証有邪者當宜浴之

川芎

蒼术

白芷

藁本

零陵香各等長流水 煎去渣向無風處浴之浴後睡片時

牽顫法

治客忤白虎証伏龍肝散

牡心黃土紅雄黃

五

射少許東夷和丸捏作

餅子如米樣四圍出顫一分顫門上安餅取艾作  
小炷炎三壯

搐鼻法一名救苦散治傷風寒頭目不清並客忤

川芎

藿香

藜芦各三

大胡索

牡月皮

朱砂禹爲極細末少許吹鼻得嚏

則邪氣出矣

如病時客忤症悉具者此忤之甚也宜表裏發散  
生飲安神驚氣丸主之

弭生飲 治一切卒中太小科同

南星

皂螺

木香

半夏

泡各半

北細辛

生花木

石菖蒲

甘草

各一

爲末每用生姜同水煎調驚氣丸服

驚氣丸 治驚憂積氣不受風邪發則牙癟篤急涎

潮昏塞醒則精神若痴又可治癆

木香

白僵蚕

白花蛇肉

酒洗

橘紅去

天麻

麻黃

鐵華粉

全蝎

蘇子

胆星

半兩

硃砂

半兩

腦射

此許學士方也蜜丸芡實大茴肚一丸痛用薄荷  
金銀湯下 已上治外中客忤之法

如抱兒騎馬或父母騎馬遠归未及換衣薰衣即抱  
其兒或戲抱兒在馬鞍上坐得病者此名馬客忤或  
聞馬嘶著驚者取馬尾燒烟薰兒面頰薰以醒為度  
如見生人異物人或六畜跳躍異者或鬼神惡狀者  
或迅雷擊鼓一坊太虛使兒成客忤者此內生之病  
也宜安神去痰不用病根日深但見面原忤之倒卽

發兒成癟矣抱龍丸主之

水銀

二兩

鉛

一兩

五朱

浴八水

艮制

研以柳枝

燒成珠又入硃砂末乳香末各一兩在內乘熱用  
柳木槌擂勻為丸大寔大每一丸空心片花水下  
服后令睡不可驚動或作小丸服亦如此承氏五  
色勿減也

如見平常憤怒之人喜炎之果近戲之物有所不得  
則忤其意但見神昏不食即其病也宜順意更與之  
及服安神之劑沉香丸主之

人參

五分

白朮

陳皮

去白

枳壳

去核

桔梗

青礞石

用蜜

金色砂

各二

炙草

沉香焰王

珠砂

一

黃連

各二

神曲糊丸

黍米大麥各湯下

小兒客忤者吾以為父母之過有所喜者乃戲而奪之則怒而哭矣有所畏者乃戲而嚇之則恐而驚矣失所喜者思則傷脾遇所畏者驚則傷心因循而成癇誰之過哉

一中惡似癇此客忤之甚者乃小兒危憲症也其候因物中惡毒心腹刺痛皮青黑不能啼息悶亂欲死立方治此先用皂角末治鼻急服蘇合香丸全按

中惡與尸厥同但腹不鳴心腹俱煥也此有二症初  
科未辨有中惡毒之氣自鼻而入心肺受之故忽昏  
倒地四肢厥冷而手握拳不能喘息也有中惡毒之  
物自口而入腸胃受之故心腹刺痛腹皮青黑內亂  
欲死者先用辟惡散搐鼻令醒追藥仍以殺鬼丸房  
內燒之以薰百鬼惡氣

辟惡散 治卒惡死者

牙皂

三分

細辛

川芎

白芷各五

羊麝頭花粉雄黃二分

射少許

共末每用少許

寸心三寸長蘸點鼻內噴嚏為驗

殺鬼丸

雄雌黃酒二  
枯羊骨

虎頭各一

龍骨

鱉甲

駁解甲

蠅皮各三

鵠鷄

十五枚  
无即以  
五枚代之

川芎

鬼白

禹餘糧

東自上

雄鷄頭一枚用蠟

白蒺藜

二十兩為丸  
桔子大如口房內燒之男左女右臂  
上帶一丸可辟百鬼

如中惡毒之氣即死者宜逐魂湯主之即仲景麻黃

湯也

麻黃

去根  
三錢

杏仁

去皮尖  
七枚

炙草

一錢

水一盞煎半

益分開細屬

如中惡毒之物卒死者宜雄黃解毒丸主之

方見驚風

又方通治中毒用降真香

白膠香

沉香

虎頭骨

兔肉

龍胆草

人參

白茯

雄黃

射一冬凍瘻丸次寢大乳香湯下或令兒佩帶一丸即燒卧房妙

一兒忽大吐一声而罔絕者亦中惡例不治。

一白虎似痢白虎者流年白虎神太歲后五位是所占之方不可犯也。小兒变蒸未滿者乳母無知抱兒向其方顧戲更觸犯之使兒不精爽兩眼楊物不轉

手如數物此客忤之降者也宜用浴体法更以綫鬼丸房內燒之使兒聞其烟又取伏龍肝搗醋和丸塞久摩兒頭及五心效卿俗妇人以鷄子一枚遍身摩之送糞地埋之亦禳法也

一邪祟必痛幹濯兒衣不可夜露恐為雞鳥落羽所汚染觸兒身未有不為病者其後面色變不常見人看怕宜常用煎浴体法房中殺鬼丸又以糞盛一丸掛兒背上男左女右宜辟邪丸主之

人參

白芨

炙草

使君子肉

夜明粉

蠶蠅辰絳

沉香

五分

雄黃

錢

朱砂

五分黃連

各半

射少許

猪胆汁和粟米糊

為丸黍米大每服二十一丸至三十五丸飲下

一馬脾風似癇。小兒肺脹喘漏胸高氣逆而脇痛動  
鼻脰亂噦。渴聲嘎痰涎潮塞俗謂之馬脾風者宜  
雄黃奪命散主之。

黑白丑各四半取頭末半兩

大黃

各半 桃榔

木香為末三歲者服二至溫水調服涎多者加  
輕粉少許方見丹溪附余

一疊痛似癇。小兒本怯致胃虛冷則腹痛而心痛口  
中沫及涎水出弊竈。有忤但目不斜手不撓也。宜木

香化血丸主之

旃柳一两

木香

鶴風

貫仲

錫灰

乾勝<sub>禁尽烟</sub>

使君子肉各五分

輕粉二钱

巴豆肉

雷丸各半飛羅麵糊為

丸五更米飲下

一症症似癇其症項背強直腰身反張搖頭掣手瘓癱口不語發熱腹痛鎮目不醒病在足太陽經其候有二如面紅眼赤牙紫手張痰涎壅甚昏曠煩渴小便赤澁先語語而發者此剛症也宜小柴胡加大

黃湯方見前

如大便滑泄不渴不語手足先冷而發者此柔痓也。  
宜理中加桂枝湯主之。

理中湯加桂枝

白芍 水煎服