

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百九十六

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣石鴻翥

謄錄監生臣方汝觀

欽定四庫全書

普濟方卷一百九十六 明周王朱橚 撰

黃疸門

三十六黃

附論

論曰黃病有三十六種所載名數雖同而證候各異皆非黃疸之比求之於經無所稽考然此病中原之人未曾識唯東南方往往有之其狀與熱病相似俚俗能辨之者其口中血脉即知是黃乃施點烙鍼灸多致痊安

者大抵東南之域其地濕其氣熱濕熱相蒸易成瘴毒人感其邪有此黃病療不及時則傷害至速炙烙方治不可緩也

方

心黃第一

病人面赤口張氣喘多驚饒睡手脚煩疼舌上生瘡心下急悶不欲飲食舌縮口乾七八日內心發狂走即是心黃先烙上管穴次烙關元及灸十八壯若不瘥再灸

七炷次烙背心下廉穴及天聰如不瘥再服

柴胡湯

柴胡去苗

枳殼去白

升麻

黃連

各一兩

麻黃去根節

一兩

錢五

甘草

炙

知母

焙

梔子仁

各三

兩

右為散每服五錢水一盞半煎至七分食後溫服日三飲少熱粥以助藥力汗出為度

肝黃第二

病人齒黃目如丹赤口燥熱渴氣力虛劣身體青黃即

是肝黃眼中血出氣息急者不堪醫先灸肝俞次烙心
俞及上關灸下廉次烙臍下三寸次烙中脘陽明二穴
若不瘥灸天聰及心腧各百壯又不瘥即作土漿服之
又不瘥宜服知母湯炙烙百會

土漿方

人糞

半盞用新汲水三升調入地坑中攪百遍濾取汁二合

青蒿汁

一合如無汁取

錢二

右人生薑汁半合和勻頓服不拘時

知母湯

聖惠
總錄

知母

培五

柴胡

去
苗

茵陳蒿

甘草

常山
吳常山

名
鱉甲

醋炙去
各三
分

右龜搗篩每服五錢匕水一盞入豉一百粒同煎至
七分去滓入煉了猪脂半合攪勻食前溫服吐利為
度

脾黃第三

病人兩頰上青脉起目黃齒斷背青唇黑生瘡通身黃

色鼻中煤生心腹脹滿不下飲食大便不通即是脾黃
先烙頰上青脉次烙脾俞及胃脘及陰都穴不瘥灸脾
俞百壯宜服

豬苓湯

聖惠
總錄

豬苓

去皮黃芩心

大黃

梔子仁

朴硝

各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓空
心溫服

鹽蜜煎

聖惠
總錄

治脾黃脹滿氣冲胸膈大腸不通

鹽為末
五錢
蜜二分
合皂莢為末
一分

右先將鹽入銚子內次下蜜皂莢末慢火煎候冷丸如棗核大以膩粉滾為衣納下部中良久大便通利

肺黃第四

病人口乾舌縮目赤鼻血出先烙足心次烙心俞百會天聰裏廉肺俞丹田等穴若不瘥即灸肺俞期門氣海穴百壯若煩渴欲得飲水及大便不利宜服之

黃硝湯聖濟總錄

大黃 炒硝石 錢各五

右和勻水二盞煎至一盞去滓空心分溫二服

腎黃第五

病人腳冷面目俱青身上冷躋下結鞭氣急衝心先烙
腎穴次烙期門氣海足陽明兩手心天聰百會等穴若
不瘥灸氣海期門下廉腎俞百壯宜候之如氣聲重呼
吸勻即堪醫若氣連呼三聲吸氣不入者不堪醫者也
灸兩乳下三七壯不瘥宜服

雞參飲

聖濟總錄

雞子

去殼一枚

人參

一兩

蜜

一合半

生薑汁

合一分與雞子同研勻

右先將人參薑蜜用水一升煎至七合去滓入雞子

朴硝攪和更煎五七沸空心頓服

芸薹飲

聖濟總錄

治病人事足俱急眠卧艱難

芸薹子

葛苣子

各一兩

右同研如泥入新汲水一盞攪和後以生絹濾取汁
頓服之

鬼黃第六

病人汗不出漸加困重憇氣心脹脣黑偏身黃妄見鬼物道得古人名字此是鬼黃宜烙中腕穴更灸二七壯次烙背心及炙上顙一七壯又烙心俞肝俞腎俞如瘥即偏身赤色汗流如雨喘氣調勻此為可救如身體青脉息漸微胃脉絕者死如無此候宜服

龍齒湯

聖濟總錄

龍齒

麥門冬

去心

人參

各一兩

遠志

去心三分

甘草

炙到一分

右粗為篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食後溫服

薺黃第七

病人向明卧多愛索鞋擬起身體全冷肉蒼色睡中啼泣或狂言妄語此是薺黃先烙手心次烙第三指間又灸一七壯次烙氣海上腕人中神庭等穴不瘥灸背心下廉穴百壯候之如背心腫脚腫暮回窺人者不堪醫也如無此候宜服

茯神湯

聖濟總錄

茯神

去木心

酸棗仁

炒各一兩

人參

附子各一兩

炮附子

去皮五錢乾薑

炮一分

右㕮咀如麻豆每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食前溫服

血黃第八

病人三日鼻中出血大小便亦下血心間煩悶腹中有塊痛如虫咬吐逆喘粗此是血黃先烙丹田穴次烙後

心上顫不瘥者宜服

續隨湯

聖濟總錄

用續隨子十四粒細研水一盞煎至六分去滓放冷
頓服當吐瀉愈者鼻衄及下血其血鮮者堪醫如齒
及鼻黑髮直者死

茅根湯

聖濟總錄

治血黃頭悶心中痛結塊心煩吐逆

生茅根

一握剉

生地黃

一兩拆碎刺薊剉

剉

右以水三盞煎至一盞半去滓食後分溫二分

人黃第九

病人面青掩口惡聞人聲或似顛狂此是人黃急宜灸
烙承漿穴次烙第三椎次烙下腕次烙期門不瘥灸肺
俞後心百壯若脉息動止常共鬼語此不堪治若無此
證宜服

赤箭散

赤箭

一兩天竺黃錢五

牛黃

一分鉛白霜錢一

銀

右為散和勻服一錢匕食後煎金銀湯下

髓黃第十

病人四肢疼痛無力好眠冷地身體偏黃次變青綠色
起脣齒俱白眼帶微腫宜灸下廉及兩手陽明穴百會
等每處各三十五壯若身體赤色宜服

黃耆散

黃耆

剉黃連

去頭甘草

炙各五錢

黃芩

去心一兩

右為散每服三錢匕粳米泔調下不拘時

癰黃第十一

病人色青次却色赤或頸後髮自落喫食漸少吐逆心
煩夢與鬼交氣力虛乏或食物難消宜灸脐下百壯得
力者肉色漸變如是小便赤澁鼻中煤生齒焦眼黑不
堪治也若無此候宜服

桑螵蛸湯

桑螵蛸 炒白朮 黃耆 赤茯苓去皮 人參各一錢 甘

草
錢

右為散每服五錢匕水一盞半入生薑棗大拍碎同

煎七分去滓食前溫服

急黃第十二

病人心腹急悶煩躁身熱五日之間便發狂走體如金色起卧不安此是急黃先烙百會次烙下廉再烙肝俞更灸三十壯不瘥灸神庭天聰後心百壯宜用

吹鼻方

瓜蒂

七枚
為末
亂髮燒灰一錢

右同研勻每用少許吹鼻中

又方

惡實一兩黃芩去心五錢

右粗搗篩用水一盞半煎至半盞去滓入馬通汁一
合攪令勻更煎一二沸食前分二溫服若是齒如熟
豆色緩氣心頭鞶者不可治也

氣黃第十三

病人初得先從兩脚黃腫大小便難心中戰悸面目虛
黃不能食宜服

葫蘆飲

用苦葫蘆穰不以多少以水研服少許須臾吐出瘥

癰黃第十四

病人身如金色不多言語四肢無力好眠卧口吐黏涎者宜服

茵陳湯

茵陳蒿 白鮮皮

各一兩

右粗搗篩每服三錢以水一盞煎至六分食前溫服

日三

白黃第十五

病人顏色乾枯目下赤口乾舌縮心中恍惚四肢煩重
此是白黃先烙舌上青脉次烙上腕魂門二穴灸二十
壯不瘥灸百會氣海百壯宜服

地黃當歸湯

地黃汁

五合如無生以乾地黃
三兩水漬研汁代之

蜜

二合

當歸

白朮

雨各一

右先將當歸白术用水二盞煎至一盞去滓下地黃
汁并蜜和勻分作三服相繼服盡若患人言語錯亂
者十死不治也

陰黃第十六

病人寒熱并十指冷痛鼻中生煤此是陰黃先烙上腕
穴更灸二十壯次烙氣海下廉內乳等穴不瘥灸氣海
天胞百壯更服麻黃梔子湯若唇反者不可治也

麻黃梔子湯

麻黃去根節五錢 桑子仁七枚 甘草炙三分

右各細剉用水二盞煎至一盞去滓食後分二溫服

膽黃第十七

病人身黃綠色胸中氣滿或硬不下飲食此是膽黃先烙膽俞下腕穴次烙手足心井十指次烙心俞百會神庭風門穴不瘥灸膽俞并後心百壯宜服

黃芩湯

黃芩去心三分 茵藥一兩五錢

右粗搗篩每服五錢七水一盞半煎至七分去滓食

後溫服

驚黃第十八

病人面青身黃心煩亂起卧不安脣裏生瘡目視瞓瞓
此是驚黃先烙上腕次烙風池心俞下廉穴如不瘥灸
後心兩傍一寸五分各二十壯宜服

牡荆湯

牡荆子 白术 各五錢
芒硝 一分研
湯化下

右細剉以水二盞煎至一盞去滓下芒硝攬令勻食後溫服如病人望之色青近之色白身體涼冷言語帶邪氣急衝心汗出不多此是死候也

風黃第十九

病人愛笑腰背急手足強口乾舌上生瘡三部脉亂此是風黃先烙肺俞次烙第三椎風門兩旁相去各三寸又烙手心及烙足陽明氣海陰都百會下廉腎俞不瘥更灸神庭天臆氣海後心下百壯宜服

麻黃湯

麻黃去根
葛根 白朮各一
兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食

後溫服

走精黃第二十

病人惛惛饒睡四肢疼痛面目俱黃舌上紫色甚則舌面拆裂及加黑色皆是走精黃宜用藥烙之

治走精黃

牛脂一
兩
二
合

右煎過牛脂以綿裹作包子於舌上烙去一重黑皮濃煎豉湯一盞飲之不瘥者灸上顙穴百會穴後心氣海百壯名爪甲黑者不可治若得睡喘息匀者生

酒黃第二十一

病人五臟積熱面赤語言帶邪音錯亂目中黃色此是酒黃矣後心百會下廉三處百壯若是憚氣上喘脉如屋漏此候不治如祗大便下血宜服

澤瀉散

澤瀉

剉

黃芩

去

白鮮皮

茵陳蒿

阿膠

交炒各一兩

甘草

炙三分

右為散每服一錢半空心米飲調下日三

雞黃第二十二

病人面目俱青好向暗處眠卧不欲見明手捉衣服狀如鬼神望見黃花生者此是雞黃六日堪醫七日難治宜先烙大樞次烙風府及手心更灸後心天聰百壯即

瘡若脚冷腰疼擣掣左足眼睛忽陷不可治也如無此
狀宜服

地黃飲

地黃

八兩肥嫩者洗黃雌雞腸胃細剉

右用水一斗煮至五升去滓一日徐次服盡一方以
地黃納雞腹中繫定於銅器中蒸令熟絞取汁分五
服不拘時溫服

蚰蜒黃第二十三

病人身體涼冷舌上黑脉及兩頰有青脉起目黃時時
變異腦如針刺頭旋欲倒者是蚰蜒黃宜先烙青脉令
斷次烙舌上黑脉及舌根兩傍更烙章門百會不瘥即灸
氣海下廉百壯宜服

驢乳方

用驢乳一二升頓服若舌上有黑黃色鼻乾不得睡
面帶青色不可治也

火黃第二十四

病人先體熱身赤午後却涼徧身有赤點起宜烙脚心
背心手心百會下廉即瘥如生黑點不可療也若無黑
點宜服

紫草湯

紫草

去苗

吳藍

各一兩

木香

黃連

去鬚

各五錢

右粗擣篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食
後溫服

走馬黃第二十五

病人眼黃面赤狂言罵詈怒目高腎起卧不安發即狂走先烙髮際次烙風門上腕及闕元又烙下廉井兩手足心即瘥宜服

竹葉湯

聖濟總錄

竹葉

一握細切

小麥

二合

生薑

一兩白馬通

新者綾取汁

二合湯成下

右用水三盞先煮麥取二盞去麥下竹葉生薑煎至一盞半去滓入白馬通汁一合和勻分溫二服

房黃第二十六

病人身體沉重狀似著熱不得睡卧小便黃色眼赤如朱心下塊起狀若癱人如此証候十無一生先烙上腕及心俞次烙舌下灸關元下廉百壯宜服

燒衣灰方

取婦人內衣燒灰細研每服二錢匕溫酒調下

黑黃第二十七

病人身面黑黃口脣兩頰上有青脉起出於口角者十無一生亦有脉息沉細喫食不妨身如土色宜先烙口

中黑脉次烙百會穴又烙玉泉足陽明穴章門心俞下廉不瘥宜服

鬼臼方

聖濟
總錄

用生鬼臼一兩絞取汁一小盞服之即瘥如無生鬼臼即用乾者擣為末每服二錢新汲水調下不拘時服

厭黃第二十八

病人四肢煩疼手足無力吐逆不下飲食漸漸瘦弱先

烙玉泉及灸三十壯次烙口中黑脉并曲池灸裏廉後
心百壯如未瘥宜服

大黃湯

聖濟總錄

大黃

剉炒

木香

枳殼去穰炒各一兩

右粗搗篩每服五錢匕水一盞半煎至七分去滓食
前溫服

水黃第二十九

水黃之狀面目俱青狂言妄語聲咽不出先烙關元次

烙下廉百俞髮際不瘥灸後心氣海百俞百壯宜服

大黃甘草湯

聖濟總錄

大黃炒剉甘草炙各五錢

右剉如麻豆大每服用水一盞煎至六分去滓食後

溫服

又方

聖濟總錄

乾木瓜一兩芥子合陳橘皮

湯洗去白剉炒五錢

右剉如麻豆大分為三服每服水一盞半煎至八分

去滓食前溫服

爪黃第三十

爪黃之病口苦舌乾身體急強面目俱黃行履不得言語狂亂四肢疼痛發即便走宜先烙後心次烙氣海足陽明及烙百會灸五心穴各二十七壯未瘥宜服

爪黃散

聖濟
總錄

用爪黃一兩為細末每服五分匕新汲水調下不拘時以利吐為度

腸黃第三十一

治腸黃心中悶絕腸內疼痛狀如刀刺先烙大腸俞次
烙小腸俞氣海如未瘥宜服

四味黃芩湯

聖濟總錄

黃芩

去黑心

當歸

各一兩

黑豆

半錢

茅根

五錢

右細剉三服每服水一盞半煎至八分去滓食前溫

服

續黃第三十二

治癟黃舌兩邊先從後起次生向前兩傍有赤脉狀如蚯蚓宜急烙斷毒氣貫舌其狀紫色次灸兩口角及人口并承梁各二十壯

聖濟
總錄

氣黃第三十三

治氣黃先從脚膝浮腫大小便難心寒顛掉宜烙百會及兩口角次灸中脘二七壯此黃亦令人多嘆七日堪治八日病過不可治也

聖濟
總錄

豬黃第三十四

治豬黃口嚼沫從口角出九日不治十日疾勢已過宜
急灸兩牙闊二七壯次灸承漿二十七壯

聖濟總錄

土黃第三十五

治土黃身體冷面色青宜灸大衝及百會後心髮際百
壯若面目夕十指俱青不治也

蝦蟆黃第三十六

治蝦蟆黃舌上青脉起七日盛九日病過急烙大權此
病晝夜不睡宜服

豉梔湯

聖濟總錄

豉合梔子仁

七枚

右粗搗篩用水一盞半煎至七分去滓頓服

聖惠方三十六種黃證點烙論并方證

夫諸黃者其皆因傷寒為本五臟互有所傷熱氣相侵
致使病人精神恍惚六腑不和七神無主情意改變或
起坐卧不安或狂言妄語忽喜忽悲或寒或熱或即多
言或即不語多饒喜笑望見鬼神四肢沉重扶舉不行

或即潛身便走氣力倍加如此證候並是五臟熱壅閉塞不通療不及時甚損人命或有鼻衄不止口內生瘡或有小便不利大便不通有此證候速令點烙依後方治療可得痊平也

方證

肝黃證候

肝黃者面色青四肢拘急口舌乾燥言語蹇滯頭目不利爪甲青色若背上浮腫腹脹滿者難治烙肝俞三

穴中管穴足陽明二穴及兩臂間手背後

柴胡散

聖惠

治肝黃

柴胡

一兩

去苗甘草

微

車前子

決明子

羚羊角屑

各五錢

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時溫
服

犀角散

聖惠方

治肝黃面色青黃筋脉拘急口乾心躁

小便不利言語或澁

犀角屑 柏子仁 黃芩 羚羊角 升麻 各三兩

柴胡 一兩 去苗 龍膽 去蘆頭 甘草 炙各五錢

右為散每服三錢以水一鍾入淡竹葉二七片煎至六分去滓不拘時溫服

心黃證候

心黃者目赤舌上生瘡心悶喘急多言無度或笑或嗔微微汗出口乾舌短起卧不安神鬼恍惚小便赤難心下脹滿狀如心風悲哭手亂捻物者難治烙心俞二穴

小腸俞二穴 天聰百會承漿上管關元穴下廉二穴

生地黃湯 治心黃

生地黃

二兩 淡竹葉片

二十片

大麥

半合 甘草

五錢

炙

右細剉和勻每服五錢水一鍾入生薑半分煎至七

分去滓不拘時溫服

馬牙硝散 治心黃心神恍惚口乾煩悶

馬牙硝

細研

朱砂

研

龍齒 犀角屑 黃芩

甘草

炙赤各
一兩

右研為末令勻不拘時候以生地黃調下二錢一方

有龍腦無龍齒

又方

聖惠方

雞子清

二枚鹽
錢
麻油一合

右相和勻頓服之以吐利為度

脾黃證候

脾黃者偏身如金色眼目俱青脣口生瘡或吟或咏有時吐逆不能下食大便澁若臍凸者難治烙脾俞二穴

次烙胃脘陰部二穴丹田穴塊穴足陽明二穴

土瓜根散

聖惠方

治脾黃

土瓜根 蒜薹根 甘草

炙微赤

枳殼

炒微黃去白各五錢

右為散每服三錢水一鍾煎至五分去滓不拘時溫

服

肺黃證候

肺黃者眼目白色頭面微腫鼻衄不止多涕憎寒偏身
生赤粟子壯熱腹脹胸滿身上粟子紫黑色及腫者難治

烙肺俞二穴大腸俞二穴天聰穴手陽明二穴下廉二
穴舟田穴承山二穴及手足心背心兩乳頭上三寸

蒜薹散 治肺黃

蒜薹一兩
乾者柴胡去苗甘草微款冬花 蘆根 貝母
煨令微黃
各五錢

右為散每服五錢水一大鍾生薑半分煎至五分去
滓不拘時溫服

又方

用瓜蒂七枚為末每取一字吹鼻當下黃水為度

腎黃證候

腎黃者面色青黃腰背疼痛耳中聰聰百般聲響脚膝無力多吐嘔逆不能下食悲而不樂若兩脚浮腫齒黑如大豆者難治烙腎俞二穴膀胱俞二穴章門二穴魂舍二穴百會穴三里二穴及兩足心

附子散 治腎黃

附子

炮裂去皮臍

乾薑

炮各一分

生乾地黃

一兩

右為散分三服每服水一大鍾煎至五分去滓不拘時溫服

又方

用葛苣子一合細研以水一大鍾煎至五分去滓不拘時溫服

又方

用蔓菁子一合細研入熱湯一小鍾攪濾去滓不拘

時溫服

膽黃證候

膽黃者面色青黃多青少卧悲泣不定嗔怒無恒舌上生瘡唇口乾燥若喘粗不止者難治烙膽俞二穴上管穴風池穴下廉二穴心俞二穴肝俞伏兔二穴

車前子散 治膽黃

車前子 秦艽 甘草

微火犀角屑各五錢

右為散每服五錢水一大鍾煎至五分去滓入生地

黃汁半合不計時候溫服

腦黃證候

腦黃者由熱邪在於骨髓而腦為髓海故熱氣從骨髓流俞腦則令身體發黃頭疼眉疼絡百會天聰風腑穴

石膏散 治腦黃

石膏

二兩

秦艽

去苗

犀角屑

梔子仁

各一兩

甘草

炙五錢

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫

服

又方

梔子仁 大黃 炒 茜草根 各一兩

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫

服

行黃證候

行黃者由瘀熱在脾臟但肉微黃而身不甚熱其人頭
疼心熱不廢行立也烙脾俞二穴上管百會穴

治行黃

黃芩 麥門冬去心犀角屑 茜草根 梔子仁各一

兩
甘草
錢
失五

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫
服

癬黃證候

癬黃者由飲水停滯結聚成癬因熱氣相搏則鬱蒸不
散脇下滿痛而身體發黃烙胃俞二穴上管胃脘穴

半夏散 治癬黃

半夏一兩湯洗前胡去蘆頭七次去滑
大黃一兩杏仁三分 桔梗三分

湯浸去皮尖
炒微黃
枳殼五錢
炒去白

右為散每服二錢水一鍾煎至六分入生薑半分於前水一鍾同煎至六分去滓不拘時溫服

又方

芫花醋拌炒
令乾
桃仁湯浸去皮尖
炒各五錢
大黃兩
炒一

右為散不拘時以溫酒調服二錢

胃黃證候

胃黃者吐逆下利心腹氣脹或時煩悶不能飲食四肢

無力若唇口面白目舌根黑者難治烙胃俞二穴上管穴

太冲二穴

人參散 治胃黃

人參

去蘆頭

黃芩

赤茯苓

各一兩

蘇蘿

枳殼

去根炒熟

微黃微黃

甘草

五錢各一錢

右為散每服五錢匕水一大鍾煎至六分去滓不拘時溫服

鬼黃證候

鬼黃者面色或青或黑偏身皆黃狂言多驚皮膚乾枯舌根蹇澁心中恍惚恒見神鬼或自強言詐作惺惺若鼻中灰色舌黑毀裂衣裳者難治烙心俞二穴百會巨闕穴章門二穴下廉二穴明堂神庭穴

丹砂散 治鬼黃

朱砂五錢馬牙硝一兩鐵粉五錢

右細研如粉不拘時磨犀角水調服一錢

糾黃證候

軒黃者是鬼黃變入軒黃也面目偏身俱黃言語失錯
心神狂亂詐軒默如不患人若不盥漱即口乾燥氣喘
者難治先烙心俞肺俞二穴次烙胸前兩邊

犀角散 治軒黃

犀角屑 麥門冬去心白鮮皮 茄蕤 黃芩 大

黃炒各
一兩

右為散每服四錢水一鍾煎至五分去滓入生地黃
汁五合不拘時溫服

走馬黃證候

走馬黃者眼目黃赤煩亂并狂言起卧不安氣力強壯
唯愛嗔怒努力高聲打罵他人猶如癲醉若厥逆者難
治烙肺俞二穴百會風腑穴關元穴腎俞二穴下廉二
穴上管穴中管穴次烙手足心

竹葉湯

聖惠方

治走馬黃

方見前三十六黃走馬黃類

立黃證候

立黃者兩脚疼痛眼目黃澁小便色赤淋瀝不利心下

有氣塊者難治烙上管穴心俞二穴關元穴下廉二穴
次烙舌下黑脉

治立黃

茅根五兩白朮五錢

右為散每服五錢水一大鍾煎至五分不拘時溫服

黑黃證候

黑黃者面目或黃或黑眼目青色腰脊拘急口中兩頰
有黑脉出口角者難治烙百會穴舌下黑脉口角兩旁

玉泉穴絕骨二穴足陽明二穴章門二穴次絡心俞二穴

治黑黃

聖惠方

用鬼臼一兩剉水一鍾半煎至八分去滓分為二服
如人行五里再服

體黃證候

體黃者身黃面赤腳膝疼悶身上不熱心煩躁腹中微
微有氣飲食或進或退好蓋衣被又欲冷處睡卧絡百

會背心及心一寸至二寸三寸四寸五寸

蒴蘿湯浴之

聖惠方

治體黃

蒴蘿

柳枝

桃條

各五錢

黃櫨木

五兩

右細剉用水三斛煎成二斛去滓以白礬末一兩攪

和勻溫溫浴之

勞黃證候

勞黃者四肢無力骨節煩疼或時吐逆不能下食鼻中乾燥身熱疼悶漸覺羸瘦寒熱不定喘急氣粗難治烙

心俞二穴玉枕穴章門二穴百會勞宮二穴曲骨穴

柴胡散

聖惠

治勞黃

柴胡

去心各

苗麥門冬

去心各一兩

茵陳

犀角屑

甘草

炙微

各五錢

鱉甲

二兩醋炙微

黃去裙

潤

右為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓不拘時
溫服

脊禁黃證候

脊禁黃者腰背脊硬口噤不言喘急氣粗眼中出血心

神恍惚狀如中風烙百會心俞二穴上管穴肝腧二穴
承漿穴魂舍二穴氣海穴下廉二穴絕骨二穴次烙鼻
中柱及大權骨上

獨活散

聖惠方

治脊禁黃

獨活

麻黃

去根節各一兩

犀角屑

秦艽

去苗桑白皮

甘草

炙微赤各五錢

右為散每服四錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫

服

食黃證候

食黃者聞食氣吐逆心腹脹滿身體疼痛喘急氣粗飲食不下或時虛汗腹中結燥亦似心黃夢見鬼神烙童門二穴關元穴脾俞二穴上管中脘穴

茅根散

聖惠

治食黃腹中結燥

茅根

大黃

微炒黃各一兩

甘草

炙三分

右為散分作五服每服水一大鍾煎至五分去滓溫服似人行五七里再服以利為度

又方

聖惠

商陸 蘆薈根

各一兩

右為散不拘時以葱白煎湯調服二錢

火黃證候

火黃者偏身如火色兩腋下有赤點子如粟米或似麥
麩其點子紫色少者可治黑色多紫色少者難治烙百
會穴天聰穴及背脊兩旁

治火黃

聖惠方

用生蒜姜根搗絞汁不拘時服半鍾

陰黃證候

陰黃者身如熟杏愛向暗卧不欲聞人言語四肢不收頭旋目痛上氣痰飲心腹脹滿面白色青黃腳膝浮腫小便不利烙腎俞二穴胃脘穴陰部二穴

秦艽散 治陰黃

方見前
陰黃類

氣黃證候

氣黃者上氣心悶腹脹滿兩脚冷疼睡卧不安小便

淋澀狀似脾黃烙氣海穴肺俞二穴

治氣黃

聖惠方

用苦葫蘆子仁一兩微炒為末不拘溫水調下一錢
以得吐為度

瘧黃證候

瘧黃者頭痛口苦舌根乾黑喘急不調鼻中出血心神
煩亂作悵望之聲小便不利赤色如紅花汁若眼不能
開者難治烙耳尖上五分及耳前後五分頭兩角太陽

穴百會穴玉枕穴心俞二穴足陽明二穴及足心

生地黃散

聖惠方

治瘧黃

生乾地黃

一兩犀角屑

黃芩

竹茹

麥門冬

去心

分各一

右為散以水二鍾煎至一鍾去滓分二服如人行五
里再服

髓黃證候

髓黃者身體赤黃四肢不舉肌肉戰掉鼻中出血兩脚

疼悶一手專安額上身不壯熱愛冷處卧烙下廉二穴

百會穴肺俞二穴接脊穴絕骨二穴

地骨皮散

聖惠方

治髓黃

地骨皮

柴胡

去苗

人參

去頭蘆

羚羊角屑

甘草

炙微

赤各一兩

右為散每服四錢水一盞煎至五分去滓入生地黃
汁半合不拘時溫服

房黃證候

房黃者眼赤身黃骨髓煩疼頭目昏痛多饒睡卧體虛無力夜多夢泄神思不安腰脚酸疼小便黃赤烙腎俞二穴膀胱俞二穴足三里二穴關元穴氣海穴

鹿茸散

聖惠方

治房黃

鹿茸

去毛塗酥微炙

熟乾地黃 山茱萸 五味子 黃

耆 刺 牡 蠽

燒為粉各一兩

右為末不拘時溫酒調下二錢

血黃證候

血黃者頭疼心悶眼暈欲倒胸膈熱擁鼻衄不止咽喉
乾燥舌上生瘡若身熱如火頭面腫者難治烙心俞二
穴百會穴足陽明二穴下廉二穴及手足心

羚羊角散

聖惠方

治血黃

羚羊角屑 黃芩 柏子仁 麥門冬 升麻 各一

甘草

微炙五錢

右為散每服四錢水一鍾煎至五分去滓入生地黃
汁半合不拘時溫服

憂黃證候

憂黃者面色青黃手足疼痛多吐痰沫咳嗽不止兼吐濃血肌膚消瘦行步欲倒狀同勞黃烙背心次烙膽俞

二穴心俞二穴

秦艽散

聖惠方

治憂黃

秦艽

去苗

柴胡

去苗

鱉甲

醋炙去裙

各一兩

瀉各一兩

黃耆

湯浸去皮尖

黃芩

炒各五錢

角屑

甘草

杏仁

炒各五錢

右為散每服四錢水一盞煎至五分去滓入生地黃

汁一合不拘時溫服

驚黃證候

驚黃者面色青黃心多驚悸口舌乾燥不肯眠卧即多言語狂亂身體壯熱烙風池二穴後烙天聰穴心俞二穴

犀角散

聖惠方

治驚黃

犀角屑 白鮮皮 麥門冬

去心沙參

去蘆

茵陳 升

麻

朴硝

甘草

炙各五錢

右為散每服四錢水一錘煎至六分去滓不拘時溫服

花黃證候

花黃者面色似紅花頭目疼腫寒熱如瘧恒多脚冷早起即輕午後發重進退不定狀同神祟烙百會穴手陽明二穴關元穴足陽明二穴

知母湯

聖惠方

治花黃

知母 地骨皮 柴胡

去苗

石膏

梔子仁

各一兩

右為散每服四錢以水一鍾煎至五分去滓入生地
黃汁一合不計時溫服

瘡黃證候

瘡黃者面色萎黃憎寒壯熱頭痛不止口乾多渴四肢
羸瘦不能飲食或好或惡進退不定烙肺俞二穴百會
穴風府穴天聰穴太陽二穴玉枕穴及耳尖上五分

恒山散

聖惠方

治瘡黃

恒山

茵陳 赤茯苓 知母

鱉甲

醋塗灸微黃去裙襡

各一兩 甘草 級五錢

右為散每服四錢以水一鍾入豉四十九粒煎至六分去滓不拘時溫服

水黃證候

水黃者身面青黃腳膝浮腫心腹脹滿上氣煩悶語聲不出烙關元伏兎穴下管穴足三里二穴承山二穴百會穴及背心

治水黃

聖惠方

大黃

剉微炒
五錢

甘遂

煨微黃
一錢

右擣碎以水一大鍾煎至六分去滓分為二服如人行五七里再服利即住服

蛇黃證候

蛇黃者腰背反張口苦舌縮咬嚼衣裳伏地似隱不多言語難蓋衣被少開眼目或呴喚心神不定烙手心背心足陽明二穴及氣海穴

羚羊角散

聖惠方

治蛇黃

羚羊角屑 麥門冬心沙參

去蘆頭各一兩

秦艽苗茵陳

去苗各一兩

甘草

炙各五錢

右為散每服四錢以水一鍾煎至六分去滓不拘時

溫服

牛黃證候

牛黃者舌如蠟色口作噍不多言語或如牛吼若眼目頭面未變作深黃色者可治如舌上及身體黃黑色者難治烙承漿穴脾俞二穴及後心

犀角散

聖惠

治牛黃

犀角屑

大黃

剉微炒各五錢

牛黃

細研施子仁各一兩

右為散入牛黃麝香同研令勻不拘時以溫水調下

一錢

鴟黃證候

鴟黃者十指青綠舌上生黑點唇口青黑身如黃銅烙

下廉及足心胸前當心

治鴟黃

聖惠方

蘆根剉 生乾地黃各一兩 茵陳五錢

右為散每服五錢以水一大鍾煎至五分去滓不拘

時溫服

雞黃證候

雞黃者偏身爪甲並青黃夢寐見鬼神時自言笑烙風
池二穴及鼻柱下三分手掌後橫紋三寸及足心

地黃飲

治雞黃

方見前三十
六黃雞黃類

蚰蜒黃證候

蚰蜒黃者喉中似噎喘息不調四肢疼悶言語不正水
米難下若頰內有青脉出口角手足亂動冷者難治烙
手足心及口角內青脉尖頭及胸前

半夏散

聖惠方

治蚰蜒黃

半夏

湯洗七次去滑

射干 升麻

犀角屑

各一兩

甘草

五錢

錢

右為散每服四錢水一鍾入生薑半分煎至六分去
滓不拘時溫服

救急療三十六種黃

用雞子一顆并殼燒作灰研破醋一合又溫之總和頓服身體眼暗極黃者不過三顆鼻中虫出神效

諸痘 附論

論曰諸痘證狀雖異大率多因酒食過度水穀相併積於脾胃復為風濕所搏熱氣鬱蒸所以發黃為痘也

方

秦艽飲子

濟生方

治五痘口淡耳脚弱微寒發熱小便

白濁

秦艽

去苗當歸酒浸去蘆

芍藥

白朮

官桂去皮不見火

茯

苓

去皮熟地黃酒浸橘紅

小草

川芎

各一兩半夏炮

湯

甘草

炙各五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至七分去滓溫服不限時候

犀角茯苓丸 治一切諸黃酒疸身面皆黃皮膚如塵
麵色心下堅滿小便赤黃心煩欲嘔倦怠少力不思

飲食

赤茯苓 茵陳葉 枳實 炒前胡 苗甘草 炒杏仁

去皮半夏洗七次
尖炒三分培各一兩

當歸

培各一兩

白术

犀角屑

各一兩

右除杏仁為末入杏仁勻研煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸米飲下食後稍空時服量虛實加減
茵陳丸 治酒疸食氣女勞疸諸種黃疸及陰黃身面悉黃大便澀少小便如梔子汁

茵陳

草龍膽

去蘆

大黃

炒各二兩

黃芩

枳殼

炒各二兩

升

麻三兩
柴胡一兩
桔子仁一錢
五分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸米飲
下食後日進二服大小便俱利赤為度外臺秘要作
湯以水八升煮取二升八合分溫三服若身絕羸加
生地黃一升梔子加至七兩去大黃如氣力不羸用
大黃

葶苈丸 治諸痘大小便澀

苦葶苈炒
桑白皮切
枳殼炒
木通各五錢
桔梗 木

香
鐵

各三

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三二十丸食

後橘皮湯下日三服

九疸秦椒散

胃疸食多喜飲

施子仁主之

心疸煩心中熱

葛根主之

腎疸

其人脣乾

葶苈主之然

舌疸渴而數便

石鍾乳主之

肉疸其

人小便白

凝水石主之研

脾疸溺赤出少惕惕若恐

括翼主之

肝疸胃熱飲多水激肝

白术主之

髓疸目眶深多嗜卧

壯蠅澤

秦椒焙出汗瓜蒂
主之一云膏疸

肺疸飲少小便多

右名秦椒散各等分隨病所在加二分擣合篩下飲

服五分日三服稍加可至方寸匕忌桃李雀肉

又方 夫人病疸者或無熱靜言了了腹滿欲吐酒疸
心中熱欲吐之即愈

右取千金翼苦參散吐良在上遍身黃部中七味者

是也

苦參散方
見諸黃類

又方

用好鹽一觔紙裹清濕燒之取通赤內三升水中攪
令稠手巾瀘過為一服以前二方服訖並吐出黃汁
茵陳蒿湯一名湯聖惠方 治諸般痘病面目身體發黃小
便祕澀及時行癥熱在裏鬱蒸不散

茵陳兩山楂子七大黃一

右以水五盞先煎茵陳二盞半却入大黃楂子煎至
一盞半去滓分作二服空心服當利小便如皂角汁
及黃赤色其黃從小便出也未愈再服五苓散亦可

發黃二藥亦可

薑蜜湯

百一選方

治諸痘通用或小便出血或小便如血

用之皆效

蜜

半錢片

右用新汲水一碗煎服逐日常服二次小便漸白及

出血黃痘遂瘥

礬石滑石散

千金方

治濕痘得之一身盡疼發熱面白

黑黃七八日後壯熱在裏有血下如肫肝狀小腹滿

者急下之身目盡黃小便不利其脉沉細及女勞疸

礬石 煅 滑石 各等分

右為末每服二錢麥粥飲調下日三服食前便利如血者效或汗愈或小便出血黃水為度

柴胡甘草湯 治熱痘

柴胡 一兩 甘草 一錢 剉細 白茅根 一握

右以水二碗煎至七分時時服一日盡

治痘熱毒在內悶亂坐卧不安

聖惠方

用生髮燒灰存性為末新汲水調方寸日三服

治緩痘

本草

用黃耆一兩杵成散不拘時以溫水調二錢匕

痘病有五種謂黃痘穀痘酒痘黑痘女勞痘是也黃汗

者身體四肢微腫胸滿不得汗汗出如黃蘖汁由大

汗出卒如水所致

本草

用豬脂一觔溫令熱盡服之日三當下下則稍愈

治痘病有五黃痘穀痘酒痘黑痘女勞痘黃汗身體四肢微

腫胸滿不得汗出如築汁由大汗出卒入水所致

後肘

方

用藍花一把水五升鼠矢兩頭尖者二七枚煮取二升盡服溫覆取汗

小半夏湯

指南方

治濕疸

半夏

五分生薑而

用水七升煮至一升分五服

腎疸湯

試效方

治腎疸目黃甚至渾身黃小便赤澀

升麻錢

五

羌活

防風

藁本

獨活

柴胡

各五

以上治腎疽目黃渾身黃

白朮

分五

蒼朮

一錢

豬苓

一分

四澤鴻分茯苓分以上治小便赤澁

葛根

分五

甘

草

三

黃藥

二

人參

三

麵

六

右件剉如麻豆大分作二服每服水三盞煎至一盞
去滓稍熱服食前服

療癰疽者手足肩背累累如米起色白剗之汁出愈而

復發

本草

以虎屎白者以馬尿和之暴乾燒灰粉之

風痘

附論

論曰風痘者由風氣在於臟腑與熱相搏便發於黃小便或赤或黃好卧而心振面虛黑名為風痘也

方

犀角散

聖惠方

治風痘臟腑風熱相搏心神不安多卧

少起小便赤澁

犀角屑

黃連

各一兩

赤芍藥

三分

茵陳

一兩

白鮮皮

三分

梔子仁

柴胡

去苗

蕘根

子芩

各三分

大黃

炒一兩

錢朴硝

二兩

貝齒

二十粒

燒細研

右為末每服不計時煎茅根湯調下二錢以利為度

牛黃散

聖惠方

治風痘心脾風熱面色虛黑身體皆黃

小便赤澁

牛黃

一分細研

犀角屑

三分防風去蘆

蕘根

各三分

大黃

各三分炒一兩

一兩甘草

五錢炙

白鮮皮

秦艽

各三分去苗

麥門冬

一兩去心

梔子仁

五錢

杏仁

三分湯浸去皮尖微炒黃

右為散研入牛黃令勻每服不拘時以竹葉湯調下
二錢金銀湯下亦可

艾煎丸

半金

治因傷風癥熱不解發於風痘舉身皆

黃小便或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱

生艾

三月內採取束搏
取汁銅器煎如膏

大黃

蒸

黃連

炒

蕘蔞仁

凝水石 苦參 萱蘆

隔紙炒
各等分

右為末以艾膏和得所丸如梧桐子大初服六七丸
漸加至二十丸有熱加苦參渴加蕘蔞根小便澀加

葶藶小便黃加凝水石小便白加黃連大便難加大
黃所加並倍之溫水服之

胃疸 附論

論曰已食如飢者胃疸也夫胃熱則能消穀今已食如
飢者以胃氣但熱而無陰也然胃為足陽明陽明之脉絡
屬於心陽明得熱則心火上行陽炎過矣單陽成疸心
情煩而身面黃小便赤色也

方

鴻熱湯

聖濟
總錄

治胃中有熱食已如飢不生肌肉面色

萎黃

大黃

班麻黃去根節

黃芩

去心各四兩

杏仁

去皮尖

赤茯苓

去皮

甘草

陳橘皮

去白炒

芒硝

澤瀉

各三兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至八分去滓食後溫服

大黃鴻熱湯

聖濟
總錄

治胃中熱食已即飢舌強腹脹身

重節疼

大黃

剉水浸一宿

甘草

各三兩

澤鴻

赤茯苓皮

黃芩

去心去皮

細辛

葉去苗

芒硝

陳橘皮

各二兩去白焰

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至八分去滓食後溫服

茯苓湯

宣明論

治胃中積熱食已即飢面黃肌瘦胸滿

脇脹小便悶赤

赤茯苓

去皮

陳皮

去白焰

澤鴻

各三分

芍藥

白朮

各四兩

人參

桂

去皮各二兩

桑白皮

各三兩

石膏

八兩

半夏

六兩洗七次

右粗擣篩每服四錢水一盞半入生薑少許煎至一盞去滓不拘時溫服如病甚者加大黃朴硝各二兩

黃芩湯

聖濟
總錄

治胃中熱甚食已即饑唇燥口乾

黃芩

石膏

各三

赤茯苓

去皮

甘草

葛根

五加

皮

麻黃

去根節
各五錢

柴胡

去苗一兩

右粗擣篩每服三錢水一盞入生薑半分煎至八分

去滓食後溫服

梔子湯

聖濟
總錄

治胃中熱盛食已復飢而黃肌瘦唇燥

口乾瀉熱

梔子仁

赤芍藥

犀角屑

赤茯苓

去皮

黃芩

去心

射干

大黃

炒各一兩

右為散每服四錢水一鍾半煎至八分去滓入生地黃汁一合蜜一大匙攪勻再煎一二沸食後分作二次溫服

蘆根散

聖濟總錄

治胃中熱盛食已如饑常渴引飲滌熱

蘆根

苦蘿蔔根

麥門冬

去心各一兩

知母

甘草

各五

分赤茯苓去皮三分

右為粗篩每服三錢水一盞入小麥五十粒竹葉二

七片生地黃一分生薑半分煎至八分去滓食後溫

服

黃連丸聖濟總錄

治胃中熱盛食已如饑多渴心煩肌肉

羸瘦

黃連

去頭

蕷藴根各一兩

去心

麥門冬一兩

去心

知母一兩

去心

茯

神

去木三分

右為末煉蜜和丸擣百餘粒丸如梧桐子大食後粥飲下三十九或牛乳汁下亦可

犀角湯

聖濟總錄

治胃實熱嘔逆不下食

犀角屑

葛根

各三分

枇杷葉

拭去毛炙黃

麥門冬

去心各一

兩

右為散每服三錢水一鍾入生薑半分煎至八分去滓不拘時溫服

穀疸

附論

論曰失饑飽甚則胃中滿塞穀氣未化虛熱熏蒸遂為穀疸其證心下懊悶頭眩心忡怫鬱發黃小便不利身黃如橘是也寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘀熱以行跗陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食則滿也尺脉浮為傷腎跗陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身故盡

黃名曰穀疸

方

石韋湯

聖濟
總錄

治穀疸跗陽脉緊而數緊則為實數則

為熱緊數相搏胃中苦熱骨節煩疼小便不利

石韋毛

去
通

柴胡

去
苗
各一
根
五
錢

梔子仁 芒

硝
各
五
錢

右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓溫服日三

硇砂乳香丸

聖濟
總錄

治穀疸食畢頭眩腹滿及酒疸脉

沈實

硝砂 乳香 安息香 各一兩

杏仁 二七粒去皮
尖熱炒研

巴豆

三十粒去皮心膜用
醋一盞煮至半盞研

右為細末棗肉丸如菉豆大每服五丸食後溫生薑
米飲下日二夕一

苦參梔子丸

聖濟總錄

治穀疸

苦參

龍膽

黃芩

去心各一兩

山梔子仁

五錢

右為細末以豬胆汁和擣五百杵丸如梧桐子大每

服二十丸食後米飲下日三

紅丸子

危氏方

治穀疸腹滿眩暉怫鬱怔忡酒疸通用

二陳湯加硝砂煎湯下

莪术

三稜

各二兩
醋煮一伏時

胡椒

青皮

三兩
炒香

阿魏

化醋

右為末別研陳倉米用阿魏醋煮米糊搜和丸如梧桐子大炒土硃為衣每服五十丸生薑甘草湯下

穀疸丸

一名苦參
危氏方

治胃蓄瘀熱氣濁食穀不消大小

便不利脹滿不下食跗陽脉緊而數亦治因勞發熱

熟麝發黃

苦參三兩龍膽草一兩梔子仁炒五錢人參三分

右為末以豬膽汁入熟蜜少許丸如梧桐子大以大
麥煮湯下五十丸日三不知稍加之一方用牛膽一
箇依上丸服

麝金散

聖惠方

治穀疸唇口先黃腹脹氣急

麝金

一兩牛膽

乾者

麝香

五分研

右為末每服五分新汲水調下不拘時

滌熱湯

一名茵陳蒿湯

治穀疸食畢頭眩心中怫鬱腹滿

見方

本門諸

痘類

治食氣遍身黃腫氣喘不得食心胸滿悶

皂角

不蛀者去皮及子酥火令焦為末一錢匕

巴豆

七粒去油

右以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三丸食後
陳皮湯下日三服隔一日增一丸以利為度如常食
酒酒飲一方名黑虎丸

苦參丸

千金方

治穀疸食已頭眩心中怫鬱發黃由失

饑大食胃氣攻衝所致其腹必滿

苦參

一兩
五錢
龍膽
蘆生用

右為細末以牛膽和擣三百杵丸如梧桐子大每服十五丸早晚食後煎大麥湯下或以生薑甘草湯下一方煉蜜丸以生麥門冬汁下一方用豬膽不用龍膽

穀疸食畢頭旋心怫鬱不安而發黃由失饑大食胃氣

衝薰所致治之方

一名茵陳蒿湯出肘後方見本門諸痘類

茯苓梔子茵陳湯

衛生方

昔元顏正卿丙寅二月區區

官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱又以怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身體麻木次傳心目俱黃微見青色顏黑心神煩亂怔忡不安兀兀煩悶欲吐口生惡味飲食遲化時下完穀小便癃閉而赤黑辰巳之間發熱日暮則止至四月則尤甚其子以危急來請治之具說其事脇其脉浮而緩金匱要略曰

浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃
瘀熱以行食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流
熱流膀胱身體盡黃名曰穀疸此之謂也

梔子仁

蒼朮

白术

各三

豬苓

二分

茵陳葉

一錢

澤

鴻黃連

去頭各

二分

枳實

炒

二錢

陳皮

二分

青皮

一分

茯

芩

去皮

五分

漢防已

二分

黃芩

六分

右㕮咀都作一服長流水三盞煎至一盞去滓溫服
食前一服減半又二服良愈內經曰熱淫於內治以

鹹寒佐以甘苦又濕化於大行熱反勝之治以苦寒
以苦泄之以淡滲之以梔子茵陳苦寒能瀉濕熱而
退其黃故以為君難經云并主心下滿以黃連枳實
為苦寒泄心下痞滿肺主氣今日傷其氣故身體麻
木以黃芩苦寒瀉火補氣故以為臣二木苦甘溫青
皮苦辛溫能除胃中之濕熱去其壅滯養其正氣漢
防己以苦寒能去十二經留濕澤瀉鹹平茯苓猪苓
甘平導膀胱中濕熱利小便而去癃閉也

胡椒紅丸子

如宜方

治穀疸因飢中過食傷胃蘊熱瘀

滯腹滿心鬱怔忡

三稜

陳皮

青皮

各一兩

胡椒

乾薑

兩

右為末醋糊丸如梧桐子大硃砂為衣每服三十丸
空心薑湯煎二陳湯加砂仁下

酒疸

附論

論曰胃虛穀少醉以入房胃犯風邪胃中熱毒隨虛入

裏小便黃赤濕毒內聚心下懊痛熏發肌肉則身目發
黃赤斑足胫浮腫或下之早則變為黑疸令人心如病
饑大便黑瘡皮膚不仁治法既宜先去濕毒後分小水
餘隨證治之如心下懊悶而熱不能食則欲吐名曰酒
疸夫酒疸者必小便不利心中熱足下熱欲吐鼻燥脉
浮者先吐之沈弦者先下之欲嘔者吐之即愈大抵五
疸唯酒疸變證最多蓋酒之為物隨人性量不同有盈
石而不醉者有濡唇而輒亂者以醞釀而成有大熱毒

滲人百脉為病則不特發黃溢於皮膚為黑疸流於清氣道中則眼黃鼻腫種種不同故方中論酒疸外有內疸黑疸癬勞役疸令人恍惚失常等數證不同

方

黃連丸

聖濟總錄

治酒疸心向黃心懊痛小便黃赤不利

黃連

去睛

黃蘖

去皮

黃芩

去心

大黃

炒

梔子仁

薦金

黃藥子

秦艽

去苗上

貝母

去心

甘草

炙

款冬花

黃

明膠

炙令燥

白芥子

各五錢

右為末粳米飲丸如梧桐子大每服十丸煎麥門冬
湯下

半夏湯

千金方

治酒疸發黃身無熱言語了了腹滿欲

嘔心煩足熱或成癥癖心中懊惱其脉沉弦或緊細
千金方云酒滯陰胸心脹滿骨肉沉重逆害飲食乃
至小便赤黃此根本虛勞風冷飲食衝心由脾胃內
痰所致

半夏

洗去滑

茯苓

白术

各三兩

前胡

枳殼

炒去穰一作

枳實甘草炙各一兩大戟炒各二兩黃芩 茵陳 當歸各一兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓

空心服

當歸白朮湯三方

治酒疸發黃結飲癖在心胸間心

下從橫堅滿骨肉沉重逆害飲食小便赤黃此由本

虛飲食生冷與脾胃痰結所致其脈弦濶

白朮 茯苓

各三兩

當歸

黃芩

茵陳

各一兩

枳實

炒去梗前胡

甘草

炙各一兩

杏仁

炒去皮各二兩

半夏

湯洗上次二兩

錢五
一方加乾葛二兩

右為散每服四錢水二盞薑七片煎至七分食前服
凡酒痘熟痘大便祕者可服三黃丸

聖惠方

方見積熱門

赤茯苓丸

聖惠方

治心下堅而小便赤澀是酒痘之後

宜服此方

赤茯苓

茵陳

枳實

炒去白微黃

白术

前胡

去蘆

黃

各一兩

甘草

炙當歸

半夏

湯洗七次去滑

杏仁

湯浸去皮尖皴

炒微黃各三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸粥飲下

茯苓丸

千金方

治酒疸心下縱橫堅而小便赤

茯苓

茵陳

乾薑

各一兩

白术

熬

枳實

各三
十銖半夏

杏仁

各十
八銖

甘遂

六
銖

蜀椒

當歸

各十
二銖

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心服三丸日三稍稍
加以小便利為度千金翼加木通一兩大黃十八銖
名茵陳丸治黑疸身體闇黑小便澀

二石散

一名凝水石
散
千金方

治肉疽飲少小便多如白泔色

因酒所致其脉弦滑

凝水石

煅水
瓶

白石脂

煅水
瓶

蕘蔓根

各一兩
分

桂心

各一兩
分

兜

右為末每服二錢大麥飲調下日三服五日知十日

瘡

茵陳湯

聖濟
總錄

治酒疸心中懊憹痛小便黃赤

茵陳

去苗
土

赤茯苓皮葛根

各三
兩

梔子仁

半分
分

蕘蔓根

三分
分

秦艽

去苗
土

升麻

各一
兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓食後溫

服日三

桔梗湯

聖濟總錄

治酒疸腹滿如水狀心中懊惱不能下

食時時欲吐

桔梗

剉炒

百合

赤茯苓

去黑皮

桑白皮

枳殼

去穰炒

各一兩

木通

二兩

桺榔

五枚

右剉如麻豆大每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服良久再服

白术湯

一名桂术
湯三肉方

治酒疸因下後久為黑疸目青面

黑心中如啖韭薹狀大便正黑皮膚不仁脉微而數

桂心

白术

枳實

麸炒去穰

京豆

乾葛

杏仁

甘草

錢各五

右剉為散每服四錢水一盞煎至七分去滓食前服

一方有柴胡無桂心

治酒疸

經驗良方

茵陳

葛花

黃連

神翹

京三棱

細辛

等各

分

右為細末每服三錢用溫酒或鹽湯調無時服

葛根湯 治酒疸因下後久為黑疸目青面黑心中如

啖韭薹狀大便正黑小便赤或面黑脉微而數

葛根

二兩
枳實

去穰
炒

梔子仁

各一兩
敗

甘草

五錢
炙

右為散每服四錢水一盞半煎至八分去滓不拘時

溫服

瓜蒂丸

一名牛膽丸

治酒疸遍身黃麴塵出

瓜蒂 大黃

炒各一兩

牛膽

一枚

茺花

醋炒五錢

右為末以清酒二升漬一宿煎至一升去滓入牛膽汁微火煎稠丸如梧桐子大每服五丸溫熱水下得吐利為度

六物湯 治酒疸腹脹

萆薢

荆芥穗

不蛀川棟子

連皮枝用

生薑母

軟

烏梅

甘草

各等分

右於石臼中搗細用磁器盛以自己滿腹小便去其

首尾取中間小便浸藥兩重紗蓋露星一宿拂明飲其汁續用車前子茵陳竹園萎煎湯乘熱調五苓散服自覺黃水從小便出而腹不脹

追毒飲 治酒疸遍身發黃

狗脊

去毛
一兩

白芥子

甘草

各一錢

右細剉用酒一升煎取半升去滓分溫二服以利下為度

乳香硝砂丸

治酒疸心下懊痛身目發黃

方見本門
穀疸類

大黃湯 治酒疸心下懊痛脛腫溲黃而發赤斑面不甚熱或乾嘔

大黃剉炒枳實去穰炒梔子仁各一兩 各一
炒合

右粗搗篩每服四錢水一盞半煎至八分去滓溫服
日三一方無枳實

艾葉湯 治酒疸身目俱黃心中懊痛

生艾葉一握無生者
乾者煮亦得 麻黃去根節二兩 大黃炒一兩五錢

右剉如麻豆大每服四錢酒一盞半入大豆半合同

煎至八分去滓食前溫服

黃耆木蘭散 治酒疸心懊痛足脰滿又小便黃而發
赤斑或黃黑色此由飲酒大醉當風入水所致

黃耆二兩木蘭皮一兩

右為末每服二錢七食前熱酒調下日三

治酒疸心懊痛足脰滿小便黃飲酒發赤斑黃黑由大
醉當風入水所致

方用後

芫花 椒目

右等分燒末服五分立愈

如神散

危氏方

治酒毒不散發黃久久浸清流入清氣

道中宜引藥內鼻滴出黃水愈

苦匏子

去壳苦葫蘆子

各三七箇

黃赤米粒

三百粒

安息香

二

大子

右為末以一字搐入鼻滴盡黃水一二升或過多則
以黍穰燒灰麝香末各少許搐鼻立止

治酒疸

百一選方

弱葉灰神麵燒炒各五錢

右為細末每服二錢或酒米飲調下食前服甚妙

治酒疸

百一選方

用田螺七箇水養出泥撻碎取螺頭細剉以熟酒浸
頻服水類鈴方用小螺蟬煮肉并汁常服

小麥飲

聖濟總錄

治酒疸

用生小麥二合以水一盞絞取汁食後頓服一方用

三升杵和水取汁五合服之

酒蒸黃連丸

直指方

治酒疸

用黃連去鬚淨四兩剉碎以酒酒醃一宿日乾為末
米糊為丸如梧桐子大每服三四十丸以二陳湯加

葛根茵陳蘆薈煎湯送下

治酒疸及治熱疸

直指方

用土瓜擣取汁任服

除煩熱解酒疸目黃草

以黃櫨木煮服之

治酒疸

用明眼草研細調喫

大黃丸

指南方

治酒疸脉沈腹脹滿大便秘

方見本門
黃疸類

治酒疸目黃及野病熱利下血

本草

用黃屑水煮服之

治酒疸

本草

用苜蓿擣取汁服一升令人吐利即愈

治酒疸黃色通身者

取萱草根擣絞汁服亦取嫩苗煮食之

治酒疸

以鹽麴子根白皮擣碎米泔浸一宿平旦空心溫服

一二升

瓜蒂散 治酒疸脉浮腹滿欲嘔宜吐之

方見本門
黃疸類

木通散 治酒疸通身黃腫

木通

剉

甘草

炙

木香

枳榔

剉

麻黃

去節根

秦艽

去苗

土瞿麥穗 乾薑

炮

右等分為散每服一錢白湯點服空心食前日三病甚者用猪膽一枚去汁一半入巴豆一粒薤白二寸在膽內以線繫定同青橘皮少許以水一盞半煎熟濾去膽取藥湯調下一錢也

女勞疸

附論

論曰脾胃素有濕熱或緣大暑醉飽房勞過度引熱歸腎濕氣交攻小水不利小腹堅脹濕氣流於肌肉之中則四肢身面發黃故謂之女勞疸然其症又有額心黑

微汗出手足心熱薄暮即發膀胱急小便自利腹如水
狀則不治三因症治云夫交接輸瀉必動三焦上焦屬
心中焦屬脾下焦屬腎動則熱熱則慾火熾因入水中
中焦熱鬱故能發黃下焦氣勝故額黑上焦起血隨熱
瘀行大便溏黑貴勝人有男女同室而浴者多成此病
攝生者不可不知

方

辰砂妙香散 治飲酒行事酒熱瘀於心經致成黃疸

茯苓 茯神 去皮 木山藥 炮 遠志 水浸去皮 各人

參 甘草 炙 北梗錢 各五 木香 辰砂 另研各三錢 麝香

錢一

右為末每服二錢加辰砂少許用茵陳湯調下日三服

人參飲 一名人參散 治飲酒房勞酒入百脉令人恍惚失

常

人參 白芍藥 括囊根 枳殼 去穰 芨神 酸

慈炒

茯苓

酸

棗仁 各一兩 熟地黃 二兩 甘草 半錢一兩

右剉為散每服四錢水一盞煎至七分去滓食後臨

卧溫服

鱉甲湯 治女勞疸手足煩熱肢節疼痛小腹拘急時

有虛汗

鱉甲 去裙襠醋炙
一兩五錢

柴胡 茵陳 地骨皮 赤芍

藥

梔子仁 黃耆

麥門冬

去心焙
各三兩

右粗擣篩每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時

卷一
溫服

牡蠣湯

治女勞疸額上汗出四肢虛煩日晡發熱小

便自利

牡蠣

燒赤令

龍膽

升麻

麥門冬

去黑心炒

甘心

炙各三分

犀角鏹

藁本

桂

錢各五

右為散每服四錢水一大盞煎至八分去滓熟服溫覆即避風寒

秦艽散

治勞黃心脾熱壅皮肉面目悉黃

秦艽

去土苗

犀角屑

赤芍藥

各五錢

茵陳

麥門冬

心柴胡

去苗各一兩

大黃

炒二兩

黃芩

三分

右為散每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服日三四服以利為度

治心熱勞黃口乾舌澀皮肉面目俱黃上氣喘急宜服此方

黑豆

二升淨以水四升煎取二升去豆

生地黃汁

麥門冬汁

生鷄汁

蕎麥根汁

各三合

蜜

右藥并豆汁微火煎如膏於磁器內盛每服一茶匙
不拘時服

龍膽湯 治女勞疸額上黑汗出手足中熱四肢煩疼
薄暮發熱小便自利

龍膽

去蘆

甘草

炙去

麥門冬

去心

柴胡

去蘆

升麻

犀角

各三

分牡蠣

一兩

研如粉

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓入生地黃
汁半合再煎一二沸不拘時溫服

犀角湯 治女勞疸及勞氣熱渴額上汗出手足俱熱

小便赤澁

犀角

銘

龍膽

各一兩

升麻

甘草

炙各五錢

麥門冬

去心三

分

右為細末山藥糊三錢水一盞入生薑一片棗一枚拍碎煎至七分去滓入生地黃汁一合食後溫服

小兒絲子 治色痘

兔絲子

五兩

洗酒

浸

宿研

焙

二

石蓮肉

兩

白茯苓

兩

山藥

一兩

留一半
打糊

右為末山藥糊丸如梧桐子大每服五十丸用芎藭湯下加多茯苓下

四君子湯

直指方

治色疸

人參 白朮 白茯苓 甘草 加後黃藥 白

芍藥 黃耆 白扁豆

各一兩

右剉細每服三錢薑五片棗二枚煎服

苦參丸

聖濟總錄

治女勞疸

苦參三兩
龍膽二兩
五錢
梔子仁三兩
五錢

右為末以牛膽汁和丸如梧桐子大每服二十九溫水下日二夜一稍加至四十九本草用猪膽服

硝石散

一名礬石
散十金方

治女勞疸其腹腫脹膀胱急欲作

水狀大便黑者非水其脉滑腹滿者難治身目皆黃發熱惡寒小腹滿急大便難由太勞大熱房室損傷得之交接後入水所致治之方

硝石
礬石并研各等分

右為末每服一錢用大麥粥飲調下蓋衣出汗其病隨小便出者色黃大便出者色黑是效

滑石散千金方 治女勞疸身黃額黑日晡發熱惡寒小腹

急足下熱其脉浮緊腹滿者難治

滑石 石膏假等分一作白礬

右為末大麥粥飲調下二錢日三四小便極利則瘥

豬膏髮煎本草 治女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿

急小便難由大熱大勞交接後入水所致

方見本門
諸黃類

黑疸 附論

論曰諸疸黃疸酒疸女勞疸久不已皆變為黑疸其狀小腹滿身體盡黃額上黑足下熱大便黑是也黃本脾病脾者土也脾病不已傳其所勝腎斯受之腎為水臟其經足少陰其色黑病在腎故小腹滿色黃大便黑足下熱是皆少陰經受病之證

方

當歸湯

聖濟總錄

治諸疸久不瘥變成黑疸

當歸

三兩

桂去皮六兩

麥門冬

去心兩五錢

黃芩

去黑心一兩

黃耆

乾薑

炮炙各

赤茯苓

去皮去心三兩

大黃

炒各一兩

茵陳

各一兩

右剉如麻豆每服二錢七分去滓溫服日三一方無

黃耆

茵陳蒿

聖惠方

治黑疸身體闇黑小便澀

茵陳蒿

各一兩

赤茯苓

去皮

草薢子

炒各一兩

枳殼

熟炒去穰一兩

白朮

各一兩一分

杏仁

湯浸去皮尖炒三分

蜀椒

去閉口及目子炒令出汗

當歸

焙

乾薑 炙甘遂

炮各一分

大黃

醋炒各半夏

湯洗七次去滑培各一錢

半夏

滑培各一錢

右為末煉蜜擣三五百杵丸如菉豆大每服十九空心米飲下日三方有木通無乾薑溫水下

瓜蒂散

一名赤小豆散聖惠方

治黑疸身體及大便並黑及黃

痘久不瘥

瓜蒂

一雄黃

研一錢先用醋煮

甘草

炙一兩

瓜萎

二兩

右為細散每服一字用赤小豆二十粒茯苓一分水一盞煎至六分去滓調服須臾當吐吐止即愈

硝石散 治日晡所發熱而及惡寒此為女勞而得之

膀胱急小腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其

腹脹如水狀大便必黑時溏此女勞之病非水也腹

滿者難治


方見本門
女勞疸類

治黃疸變成黑疸醫所不能療多死急治之方

千金
方

用土瓜根汁每日空心服半錢即半盞其病隨小便出即愈然須量病人強壯者可服半盞羸人一合如無生者即剉乾的一兩水一盞半煎取七分去滓頓

服羸量減



普濟方卷一百九十六