

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷四百五
六

詳校官太醫院人品史目臣黃發
編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄舉人臣薛炳文

欽定四庫全書

普濟方卷四百五

明 周王朱橚 撰

嬰孩諸瘡腫毒門

癰疽

附論

夫癰疽瘡癧瘰結核疥癩毒腫赤遊癰疹火癰等皆由風邪客搏經絡澁滯經曰五臟不和九竅不通六腑不和流結為癰或積毒熱氣不得宣行入於皮膚或發頭面或發虛處無故身熱微覺增寒或有痛處按之必熱

乃癰癧欲發也其有火癰立名多端乃古人強為之名
大抵治法同一理 母患血熱兒在胎中受之其血亦
熱母患氣壅兒在胎中受之其氣亦壅初生受母熱血
壅氣聚在經絡臟腑之間積滯不散久則成毒毒氣相
交內不通利即從外消外無能消其血與氣壅在一處
則是生背齶或脊督脉腫大如拳紅赤似血其兒之體
是一塊腐血又加生一塊壅毒卒未能消醫有何法善
術之士俾勞以鍼灸熨炳取次攻之十不得一外傅用

朴硝天南星當歸秋芙蓉葉黃蜀葵花乳香木鱉子無
名異其癰已熟即研白丁香少許津唾調傅菉豆大良
火破潰膿血迸出宜先與服托裏排膿消毒散血藥用
生甘草爪蓼根苦桔梗枳殼川當歸錦頭漏蘆好大黃
等分為末服一錢七煎熱為服以利為度克効萬一不
可荒亂意欲速消以惡毒草藥致難保 小兒因五臟
不和寒邪壅滯榮衛閉塞逆於膚肉遂生疽腫其狀腫
結皮強上如牛領然疼焮堅硬深附筋骨既得膿後其

疽可愈更須用排膿換肌之藥若餘毒未去封歛稍疾則源流復至或痒或痛肌汁不斷瘡竅不得合矣 陳氏子四歲忽二月患核內塊五六枚不赤不腫亦不疼痛大小如鷄鴨子皮不實硬從肉內透起召愚視之曰素問云榮衛不從逆於肉裏乃生癰腫此因疳成瘰癧惡核也寶鑑云惡核而肉裏頻生瘰癧而頂邊暗長萬金丸大黃丸治無辜疳瘰癧惡核愚曰此病不可治通真子云核塊結實經久不破破則膿潰經久不合

者肉死不治且謾與藥和肌薰用外醫膏藥貼治月餘無効覺微軟內有自破者有開破者膿潰不止經兩月瘡口不合或一日發熱與四順飲大黃丸并涼肌藥鎮驚藥熱除尚有進退雖飲食如舊日漸黃瘦主人曰服藥已多日何効遲遲如此愚曰藥非無効也病有終身不除者也藥非無驗也病有決不可救者也此病決不治後七月間忽傷食吐數口神昏不省因驚而卒核塊之有惡者如此後之學者不可不知

也

方

五香丸 治小兒癰疽癧毒未破或膿未潰增寒壯熱

木香

沉香剉蘇合香研各分

麝香研半分

犀角鏘二兩

大黃

生剉一兩半吳藍葉兩梔子仁二兩熟乾地黃二兩

芍藥

一兩去鷄舌香二兩人參一兩蘆頭

白茯苓一兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九粒

黃耆湯食前服

木香散 治小兒熱毒疽腫及赤白諸丹毒腫或生癰
癰瘍癰身中風疹癰痒

木香一
分薰陸香一
分鷄骨香一分
黃芩一分去
根節

連翹半
海藻半
兩洗去
鹹味射干半
兩川升麻半
兩枳實半
兩炒
黃牛蒡子半
兩微炒
川大黃二
兩剉
黃微炒

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹
瀝半合更煎三兩沸量兒大小不計時分減溫服

五香湯 治小兒一切癰疽腫毒瘡癰癰瘍癰瘍火瘧

赤遊等疾

連翹 木香 沉香 薰陸香即乳香 射干 升麻

獨活 桑寄生 通草 膜香 丁香各一兩 大黃

兩半

右咬咀三歲用一錢煎汁去滓服

藍葉湯 治小兒疽瘡

方見本門癰瘍類

五香連翹湯 治小兒熱毒腫色白或惡核瘰癧附骨

癰瘍節解不舉白丹走偏身中痺瘡

方見本門毒腫類

治小兒大腸頭惡癰熱瘡 用蟻娘白擣汁傅其上
即安或燒為末醋和塗數過先以鹽水洗之妙

犀角知母湯 治小兒癰疽

犀角銹去黑知母焙去黑黃耆剉去黑黃芩去黑人參 丹參

葛根剉大黃剉甘草炙各一兩元參三分麥門冬去心焙一兩半右箋搗篩每服一錢七水半盞入生地黃汁半合同

煎至四分去滓食後臨卧溫服量兒大小加減

漏蘆湯 治小兒熱毒癰疽赤白諸丹毒瘡癧

漏蘆 連翹

肘後用白薇

白欒

芒硝

肘後用芍藥

甘草

各六

大黃

一兩升麻

枳實

一方不用

麻黃

黃芩

各九銖

聖惠方有赤芍藥

二分

右㕮咀以水一升半煎取五合兒生七日內取一合分三服八日至十五日取一合半分三服十六日至二十日取二合分三服二十日至三十日取三合分三服三十日至四十日取五合分三服肘後治大人各用二兩以水一斗煮取三升分三服其丹毒須針

錢去血 經心錄無連翹有知母芍藥犀角各等分

黃耆湯 治小兒癰疽瘡癧腫毒

黃耆 連翹 升麻 惡實炒各半兩 元參 丹參

露蜂房 枳殼去穰甘草炙各一分

右龐搗篩每服一錢七水七分煎至四分去滓食後
臨卧溫服小大加減

木通湯 治小兒痘

木通 升麻 赤芍藥 黃芩去黑心 山梔子仁

麥門冬去心培
各二兩

大黃剉炒各一兩

枳殼去穰炒半兩

右簾搗篩每二錢七水一盞入生地黃汁半合煎至七分去滓分溫二服食後臨卧服量兒大小加減

治小兒痘癰

丹砂各十
大黃各二十
二銖雄黃
蘭茹漆頭者各二十四枚
礬石
馬齒

者十
八銖此黃
四銖莽草
十八銖
黃連三十
銖

右咬咀以猪脂一升三合微火煎三上三下膏成去

滓下諸藥末攪凝傅

黃耆湯 治小兒瘡腫癰疽

黃耆

剉

葛根

剉

麥門冬

去心培

黃芩

去黑心

犀角

鎔升

麻

甘草

炙各

木香

半兩

右搗篩每服一錢七水七分煎四分去滓食後服量

兜大小加減服之

黃耆散 治小兒痘腫及瘡癰身體壯熱口乾心躁

黃耆

半兩剉

連翹

半兩

川升麻

半兩

元丹

一分丹

參

一分丹

露蜂

一分丹

房

一分微火

枳實

半兩微火

甘草

一分微火

黃去穰

微火去穰

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小加減服之

犀角散 治小兒痘毒腫硬壯熱大渴

犀角屑

三
分
菖根半兩
剉

麥門冬

一兩
去心
焙

川升麻半兩木

香

半兩
黃耆半兩
剉

黃芩

半兩
甘草半兩
微赤剉

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服之

鷄舌散 治小兒痘瘡

鷄舌香

一木香一沉香一兩 麻黃 海藻洗去
炮各半兩

大黃

右搗羅為麩散每服一大錢水一大盞竹瀝三兩點煎至五分去滓溫服兼放令溫熱淋渫患處
清水膏 治小兒痘腫毒堅硬疼痛攻衝四畔焮赤宜用抽熱毒消腫氣

羊桃根

一兩剉 川大黃一兩生用

黃芩半赤小豆合黃

藥剉

半兩 茼萱粉半兩

右羅為散用蕷薹菜搗取自然汁以蜜少許相調藥令稀稠得所看四畔腫赤處大小剪生絹上勻攤可厚一錢貼之乾即換之

天烏散 貼方

南星 赤小豆 草烏 黃柏各等分

右為末生姜自然汁貼患處或用米醋調尤佳

治發背癰疽

羌活一兩
為末
麝香少許
川山甲醋炒焦半兩
生龍骨煅存性半兩

右件煎麻黃薄荷酒調如陰瘡頭平向者服之即突其功效不可具述若小兒痘瘡黑陷者只一服而起萬不失一

龍角散 治小兒癰疽腫癧一切等瘡或於頭面或發虛處無故身熱微覺增寒或有疼處皆癰癧證也

地龍去土一兩荆芥穗一兩甘草一兩角刺三兩潤者杵去骨用皮濕秤

右為末每服一錢酒水合半盞煎至三分去滓調入乳香末半錢加減服

又方

忍冬草 甘草 大黃各等分

右為末依前法煎調乳香末服之

黃連散 治小兒疽已潰

黃連半兩去須剉 黃蘖半兩剉 白芷半兩

右搗為散每用鷄子白調塗於故細布上貼之

又方

白芷半兩 黃連半兩去須剉 地榆半兩剉 白欽半兩

右羅為散每用鷄子白調塗於故細布上貼瘡日三四度換之良

蜜陀僧散 治小兒疽腫穴後及惡瘡膿水雖淨肌肉不生

蜜陀僧一兩黃連三分去須檳榔三分

右羅為散用繖瘡上日三用之

治小兒疽腫硬已成膿未成膿貼膏方

鹿角屑二兩燒灰

白欽一兩龜理黃石三兩燒赤以酒淬九遍

右羅為散以醋調稀稠得所厚塗之乾即更塗五七度即効

松脂餅子 治小兒痘瘡久不瘥

松脂一兩 薰陸香一兩

右合研內少許鹽為餅子貼於瘡上汁出盡即差
治小兒癰疽癤毒未破或膿未潰增寒壯熱 用乾蝦
墓一箇燒灰細研以猪脂和傅之

又方

用敗布不以多少燒灰細研以豬脂和傅之

備急神驗方 治未結之初微有紅頭癟子起隱疼者
急用不語唾夜半頻頻塗之即消散飲了酒不可用
若已結成當用

治小兒疽腫結硬已成膿貼膏方 用蛇蛻皮貼之經
宿自消

又方

用商陸爛搗傅之

又方

用芫花搗羅為末水和如膏塗之

又方

用蠍蟻研塗之鰐鱷魚膽汁及血各用塗之並効

癰瘡附論

夫小兒六腑不和寒氣客於皮膚搏於血脉壅遏不通
稽留於經絡之間結腫而成癰其狀腫上皮薄而澤是
也熱氣乘之熱勝於寒熱盛則致血肉腐化為膿若膿

潰之後其瘡不瘥故曰癰瘡也

方

黃芩湯

治小兒癰瘡煩熱疼痛

黃芩去黑心

梔子仁 元參 升麻 大黃

炒黃者
剉

剉連翹

藍葉 甘草 芳薷 木香 犀角屑

右箆搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓溫服

量兒大小加減

吳藍葉散 治小兒肺熱毒攻於諸處生癰瘡及項腋

下有結核煩熱疼痛不得睡卧

吳藍葉

半兩

黃芩

一分

大青

一錢

犀角屑

半兩

元參

半兩

川升

麻半兩

梔子仁

半兩

川大黃

三分到碎微炒

黃芩

半兩

連翹子

半兩甘草

半兩

右為散每服半錢水一小盞煎至五分去滓量兒大小不計時分溫服

黃耆散 治小兒癰瘍膿潰數日不止致體虛煩熱頭疼昏悶宜服

黃耆

半兩剉

防風

半兩去蘆頭

川升麻

半兩

羚羊角屑

半兩

窮一分甘草

半兩

地骨皮

半兩

人參

半兩去蘆頭

白茯苓

半兩石

膏

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒
大小不計時候分減溫服

犀角散 治小兒癰腫成瘡臟腑壅滯

犀角屑

半兩

麥門冬

三分去心焙

元參

半兩

赤芍藥

半兩

薺莞

半兩

葳蕤

半兩

川升麻

半兩

甘草

一分紅雪

半兩

右為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓入竹瀝半合更煎一兩沸服一方無紅雪入硝石末一字煎鎔去滓溫服量兒大小加減

麥門冬散 治小兒癰瘍膿水出不盡心中煩悶不已

麥門冬三分去心焙紫葛半兩黃耆半兩川升麻半兩犀角屑

半兩甘草半兩炙木通半兩

右羅為散每服半錢水一小盞煎至五分去滓量兒大小不計時候溫服

大黃散 治小兒癰瘡臍廯熱心神煩躁大小便不利

大黃炒剉升麻 桔子仁 朴硝研別枳殼去穰炒黃耆

剉各半兩

右箋搗篩每服一錢七分煎至四分去滓溫服
量兒大小加減

連翹散 治小兒癰瘡等瘡

連翹一兩沉香半兩白欽一兩朴硝一分川大黃一炮甘草

一兩

右搗羅為細末每服一錢水一盞炒麝香一錢煎至
五分食後溫服

大麻仁丸

大麻仁二兩木香半兩枳殼半兩麸炒
草微赤剉川大黃一兩牛蒡子一兩
微炒甘

右為末煉蜜丸如菉豆大每以熱水下十圓取利為
度更量兒大小加減服之

黃蘖散 治小兒一切癰腫毒諸風神驗

黃藥去粗皮
蜜炙各一
葛金兩

陳橘皮湯浸去
白炒人參葛

根剉各半兩

右搗羅為末用溫水調下半錢匕量兒大小加減日兩
三服

大黃散 治小兒癰瘍膿腫熱太過心神煩悶大小
便不通

川大黃半兩
微炒剉
川升麻半兩
梔子仁一分
川朴硝半兩
葵

子半兩

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服
以利為度量兒大小加減服之

益毒散 治癰癧皆可用

益母草

二兩燒灰

鹽花

一兩炒乾

伏龍肝

半兩

右研為細末每用一錢新水調稀稠得所旋取塗瘡
口上

消毒散 治小兒癰瘡腫毒熱赤

川大黃

三分生剉

杏仁

三分皮別研浸去

鹽花

二分

右羅為散入杏仁以新汲水和稀稠得所旋取塗瘡
腫上乾即易之以効為度

益母草飲 治小兒癰瘡腫痛

用益母草不拘多少洗剉搗取汁每服三二分服
之更量大小加減以滓傅癰上乾則易

又方

用豬腦脂塗紙上貼之乾即易日數偏

又方

用芥子爛研水和塗紙上貼之

又方

用馬齒莧搗傅之

又方

用地龍糞新汲水調塗之一方薄荷汁調塗傅

又方

用姜石末和蒜搗封上

又方

用馬鞭草搗傅之即消

又方

用蕷薹菜搗塗之

又方

用鷄腸草搗爛傅之

又方

用伏龍膽末以好醋調作膏塗於故帛上貼之

又方

用地松爛搗傅之乾即易

又方

用赤小豆末以鷄子白和塗之

又方

用龍葵菜爛搗傅之

又方

用景天草葉爛搗傅之

治小兒癰有膿令潰方

用鷄羽毛七枝燒末服之即潰

又方

用人乳和麯封上至晚膿血出盡

漏蘆散 治小兒癰瘍及丹毒瘡癧

漏蘆一
分 麻黃去根一
節 連翹 川升麻

黃芩各一
分 白

欽三
分 甘草一
分 川芒硝一
分 川大黃一兩
微炒

右件藥搗籠羅為散每服一錢以水一小盞煎至五
分去滓量兒大小不計時候分減溫服

外傳朴硝散

天南星 朴硝 乳香 秋芙蓉葉 木鱉子

當歸 無名異 黃蜀葵花各等分

右為末每服用濁酒傅患處其癰已熟即研白丁香少許津唾調傅其大其癰自破宜服排膿托裏之劑

托裏排膿消毒散

大黃 當歸 枳殼 花粉 苦瓜根 錦頭漏

蘆甘草各等分

右為末每服一錢熟服如體虛則不可服

腫毒附論

夫小兒毒腫之候與風腫不殊時令人壯熱其邪毒盛者則入腹令人赤色惡寒心煩悶而嘔逆氣急腹滿有如此狀宜速療之不爾即殺人也

方

五香連翹湯 治小兒風熱毒腫腫色白或有惡核瘰

癰附骨癰疽節解不舉白丹走竟身中白疹常瘡瘍

香散
一名五

青木香 薰陸香 鷄舌香 沉香 麻黃 黃

芩各六銖 大黃二兩 膚香二兩 連翹 海藻 射干 升

麻 枳實各半兩 竹瀝半兩

右㕮咀以水四升煮藥減半內竹瀝煮取一升二合
兒生百日至二百日一服三合二百日至朞歲一服
五合一方不用麻黃

漏蘆散 治小兒壅熱在臟腑皮膚毒腫或生瘡癧心
神煩躁大小便不利

漏蘆

半兩

白飲

半兩

黃芩

半兩

麻黃

半兩去根節

知母

半兩

枳實

半兩炒微黃

川大黃

半兩碎微炒

川升麻

半兩

屏角屑

半兩赤芍

藥

半兩

川芒硝

半兩

甘草

炙微赤

剉半兩

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫
量兒大小不計時候分減服之

屏角散

治小兒毒腫壯熱煩悶

犀角屑

半兩

川大黃

一兩

露蜂房

一分

川升麻

半兩

麥

門冬

半兩

去心

焙

連翹

一分

川朴硝

一分

牛蒡子

一分

微赤

剉

枳殼

三分

炒

黃耆

半兩

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒
大小不計時候分減溫服

麝香散

治小兒熱毒腫惡毒氣入腹取利以洩其

毒氣

麝香

半分

細研木香

半兩

沉香

半兩

獨活

半兩

桑寄生

一兩

射干

半
兩 屏角屑

半
兩

川大黃

一
兩 刮
碎微炒

甘草

半
兩
炙
微赤刮

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小不計時候分減服之

升麻膏 治小兒諸腫毒

川升麻

二
兩

白欵

二
兩

漏蘆

二
兩

川大黃

一
兩

剉
碎

川芒硝

二
兩

黃芩

二
兩

蛇啞草

二
兩

蒴藋

四
兩

梔子仁

一
兩

右細剉用酒浸一宿後以猪脂三斤煎諸藥色燒黃即膏成以綿濾去滓傾於不津器中於毒腫處塗之

即消

木香散 治小兒熱毒腫貼煥

木香

一兩 紫葛

一兩 刮

紫檀香

一兩 川朴硝

一兩 赤小豆

一兩 合

川升麻

半兩

白欽

半兩

白礬

半兩

燒

及

右搗為散用溫調稠糊量腫大小貼之日二易之

大黃散 治小兒熱毒腫解風熱腫令內消塗傅之

川大黃

半兩

檳榔

半兩

川芒硝

半兩

黃連

半兩

去須

黃蘖

半兩

赤

小豆

半兩

右羅為末用蜜水調塗患處日三上一方有雄黃半
兩細研

治小兒身上毒腫肉色赤熱宜貼憎方

硝石半兩川大黃半兩
芒草豆半兩

右羅為散每使時量腫大小取莙薑根研汁調塗腫
上如有頭即以膏藥當心貼之四畔使散憎之若無
莙薑用鷄子白或以車前根葉代之

治小兒熱毒腫忽發頸項膿背發即封之不成膿方

生地黃切一升豆豉三兩川芒硝五兩

右搗令熟以傅腫上厚二分已來日六七度傅之効

治小兒一切毒腫方

川朴硝一兩川大黃一兩

右羅為散每用冷水調塗於腫處乾即更塗以毒腫消為度

又方

蔓菁根一兩
乾者雲薹根一兩
乾者

右搗羅為散以鷄子清塗之

又方

商陸一兩
雲薹葉一兩

右搗令爛熟貼於腫處頻易之効

大黃散 治小兒風毒

白牽牛一兩
半炒 大黃三錢 青皮 甘草 朴肖各一錢

右為細末每服一錢砂糖水調下

癩 附論

夫小兒腫結長一寸至二寸名之為癧不似癰熱痛久則膿潰捏膿血盡便差亦是風熱之氣客於皮膚血氣壅結而成凡癰癧捏膿不盡而瘡口便合其惡汁在裏雖差終能更發皆變成瘻也

方

犀角九 治小兒熱腫之氣壅外攻皮膚生癧赤腫焮痛或時煩熱少得睡卧

犀角屑

川升麻半兩

黃芩半兩

元參半兩

黃耆半兩

人

參

半兩去
蘆頭

皂莢

一兩去皮塗酥
炙令黃焦去子

坐掣

半兩

川大黃

一兩剉
碎微炒

右羅為末煉蜜和搗三五百杵丸如麻子大每服以

生甘草湯下七九量兒大小加減服之

地黃丸 治小兒虛熱消瘡癧

生乾地黃

一兩桂心

半兩川大黃

一兩剉碎微炒

赤芍藥

半兩赤

茯苓

半兩王不留行

半兩甘草

一分生用

右羅為末煉蜜丸如菉豆大每服以熟水下七九量

兒大小加減服之

硝石散 治小兒瘡癧初生熱氣始結疼痛妨悶塗之

便令內消

硝石半兩 紫檀香半兩 甜葶苈一分 生用 莢草一分 川大黃半兩
白藥一兩 分 白欒半兩

右羅為散以漿水和稀稠得所用竹篦子塗於腫上
乾即易之以熱退腫消為度

乳香膏 治小兒軟癧

乳香

半兩

膩粉

一
分

油

一
分

黃蠟

半
兩

松脂

一
分

蜜陀僧

半
兩

細研

右先取油煎蠟松脂乳香烊後下粉蜜陀僧調和成

膏看癧大小攤膏於故帛上貼之

大黃散 治小兒初生瘡癧五臟壅熱

川大黃

半兩

剉

施子仁

一
分

黃芩

半
兩

川升麻

半
兩

甘草

一分

右羅為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫量兒大小分減服之以利為度

治小兒軟癩立効方

百草霜

半兩
鹽花

半兩

黃藥剉

一分

乳香

半分

寒食麵

半兩

右羅為散每以醋和塗於故帛上貼之

三物散 治鬢邊生軟癩名髮疽數年不愈者此方妙

猪頸上毛

猫頸上毛

各一

撮灰

鼠屎

一粒

右為末清油調傅或加輕粉尤妙

歛瘡口方

白芨

赤石脂

各一錢

研當歸

三錢

去蘆

龍骨

半錢

研

許

右為細末乾糲

治小兒軟癤

豆豉半
鹽半
葱白七
莖
細切

右搗作餅子量瘡貼之如瘡大即以大艾炷灸之効

又方

生椒末 麴 伏龍肝以上各等分

右研為散以醋和封之乾易之効

又方

狗骨頭炙令黃等 藝薹子分等

右羅為散以醋調傅

又方

石灰半兩 乾姜半兩 生用

右羅為散以生油和捏作丸子捲在瘡上立差
治小兒軟癧雖出膿水熱痛不止

赤小豆四十粒 乳香半分 脂粉半兩

右羅為散先去膿水後糁散藥於瘡上立効

治小兒軟癧有膿不穴

巴豆一粒 豆豉五十粒 葱白一寸

右同研令爛塗在癧上別以醋麯糊封之

治小兒軟癧赤腫疼痛不可忍

天靈蓋

一枚塗
酥炙黃麻鞋底
故者燒灰
一雙多年

右羅為散每使以油調塗之

豬頭散 治軟癧愈而再作者

用野蜂房一二箇燒灰存性以巴豆三七粒去殼煎

清油三二沸去巴豆以油調藥敷立効白礬枯為末

清油調亦効

此藥有驗人以猪頭為謝故名之

又方

用大枳殼一枚去穰令空地上磨令口平以稠麩糊
搽四唇靨在癧上自破膿溜出盡更無瘢痕

又方

用桑螵蛸燒灰存性以清油調傅

又方

用鷄抱卵殼燒灰存性為末入輕粉少許清油調塗
傅此物難得只以鷄子抱退殼如上法用亦可

治小兒軟癩

用炒油麻從銚中取乘熱嚼吐傅之

又方

用生澱柿子連皮薄切焙乾為末以少許輕粉三之
一薄薄牛皮膠水調成膏攤帛上貼之先用溫湯洗
淨去膿可一貼而愈

治小兒軟癤焮熱

用半夏末以水調塗之乾即更塗

又方

用葛蔓燒灰細研封之

治小兒癩無頭者

用黍粘葉爛搗傅之

又方

用雀糞細研水調傅之

又方

用葵子一枚以水下之即有頭

錦鱗膏 治小兒軟癧不差

用鯽魚鱗取皮貼軟癧上極妙

瘰癧

附論

凡小兒身生熱毒瘡久不差者後則必生瘰癧其狀如作結核在皮肉之間三兩相連瘰也是風邪搏於血氣凝結所生也

方

五香膏 治小兒瘰癧

沉香半兩

煎香半兩

木香半兩

丁香半兩

麝香半分

細研熊膽一分

蘆薈一

黃丹二

黃蠟二

亂髮一

油半斤

右藥細剉先以慢火煎油令沸下亂髮煎令消即下

諸藥煎三上三下以綿濾去滓下黃蠟次下黃丹麝

香攪勻膏成以瓷合盛每使先以米泔洗拭乾以膏

攤於故帛上貼之

連翹丸 治小兒瘰癧發寒熱項頸生結核腫硬如石
腹脇背裏有如堅急不通

連翹半兩桑根白皮半兩

犀角屑半兩

白頭翁半兩

漏蘆半兩

黃藥半兩

牛蒡子半兩

微炒川大黃半兩

碎微炒秦艽半兩

苗去川升麻半兩

右羅為末煉蜜和丸如菉豆大每服以粥飲下五丸
日三服量兒大小加減

犀角散 治小兒瘰癧焮腫疼痛身體熱大腸壅滯小

便赤澁心神煩衆少得眠卧

屏角

銹屑一兩

惡實

一兩

連翹

二兩

麝香

研兩

木通

剉兩

元

參

二兩

沉香

剉兩半

丁香

一兩半

朴硝

一兩

右籠搗篩每服二錢匕以水一盞煎至六分去滓分溫三服早晨日午晚後各一以利為度

木通散 治小兒癩癰發盛壯熱煩躁坐臥不安

木通

一兩剉

大麻仁

一兩

元參

一兩

川升麻

一兩

敗醬

一兩連

翹

一兩

川大黃

一兩碎微炒

川芒硝

一兩

屏角屑

一兩

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓量兒
大小分減溫服當利下惡物筋膜為妙

元參膏 治小兒腦熱結癧癰連兩耳下腫疼身體寒
熱坐臥不安飲食減少

元參 紫葛 黃藥子 大黃剉炒今黃木香 卷柏

芒硝 紫檀香各一兩

右搗羅為末以鷄子白調稀稠得所調於腫上破時
則去芒硝塗之

麝香散 治小兒腫結久不消散成結瘰癧

麝香

一分研

牛黃一分細研

蝎牛子一兩炒

黃皂莢子一分微炒

黃皂莢子一分炒

黃皂莢子一分炒

黃皂莢針一兩

黃薄荷一兩

乾研

雄鴿糞一兩

微炒

右羅為末煉蜜丸如菉豆大每服以薄荷湯下七丸
日三服量兒大小加減

生肌膏 治小兒瘰癧穴後

黃丹半兩

杏仁一兩

湯浸

去皮

蛇蛻皮一條

黃蠟半兩

亂髮一束

菜

子油六兩

皂莢

三寸水浸

去黑皮子

右先取杏仁蛇皮皂莢搗碎後以菜油於銚子中煎
亂髮令消次下杏仁等三味同煎三上三下以綿濾
去滓下黃臘次下黃丹以柳篦子不住手攪令勻候
膏成以瓷器盛於故帛上塗貼之

赤小豆散 治小兒熱毒風腫癰癧內消

赤小豆 猪牙皂莢皮炙去黑井子 黃蘖子 硝石 大

黃刺木鱉子去殼各一兩

右羅為散每用量大小以不語津唾調塗貼惡核用

卷四百五
鷄子清調塗患處

妙聖散 治小兒瘰癧不消

綿黃耆

連翹

各一兩

鴿糞燒灰

川大黃

炒

犀角屑

各半

生

甘草

糯米

半兩

用班

猫

七分

同炒

黃不

用班

猫

右羅為細末每服一錢水八分入酒三二滴同煎五
分去滓溫服時時呷

紫檀散 治小兒瘰癧癰核

紫檀香

木香

芒硝

卷柏

各一兩

芍藥

半兩

大黃

半
兩

右搗羅為細末每用少許以鷄子白調和得所塗患處

連翹丸 治小兒瘰癧不消去除根本

連翹

一元參

一糯米

半班貓

一分微炒

去翹足

皂莢針

半兩

黃川大黃

半兩

碎微炒

右羅為末煉蜜丸如麻子大每於空心以生薑湯下二丸當利下惡物為度後喫粥一日補之

生肌散 治小兒瘰癧成瘡有膿水

顆鹽一
分黃丹半
兩黃藥一分
剉白礬一分
以上四味以
瓷瓶盛大火燒令

研用赤細
白歛一
兩膩粉一
分

右羅為散都研令勻每貼時先用溫鹽漿水洗瘡令
淨拭乾看瘡口大小貼之日一度用

蜜陀僧散 治小兒瘰癧穿潰膿水不止

蜜陀僧二
兩胡粉二
兩熊膽一
兩蘆薈一
兩白芨一
兩白歛一
兩

右搗羅為散傅瘡口內効

皂莢丸 治小兒癰癧難消

皂角

八兩不艸者水浸一宿去黑皮塗酥炙令黃燒

薄荷

五兩

荆芥

五兩

雄黃

半兩細研

麝香

一分細研

右羅為末都研令勻用白羊肉四兩去筋膜細切以
煉成蜜相和搗三五百杵九如菉豆大每服以薄荷
湯下十九量兒大小加減

四味大黃飲子 治風熱毒氣與血相搏結成核生於
項下頸上遇風寒所折不消成癰癧久而潰爛成瘡

大黃 甘草 當歸 赤芍藥

右等分咬咀水煎去滓大小以意加減食後服忌毒物

膩粉散 治小兒癩癧除根本

膩粉一分 黃耆一斗 班貓二七枚去翅足以
糯米拌炒微黃 糯米二七粒

右羅為散每服空腹以溫酒調下一字良久喫少許
醋湯病隨小便中出量兒大小加減服之

治小兒瘰癧已結成外貼自出

水銀

一分手心內用津研如泥

粉霜

一分砒霜

一分燕子糞

一分班貓

一分用糯米同炒
令黃去翅足用

右研令勻用臘月豬脂調和得所取一小豆大安在
癩子上以消腫膏貼之六七日當有穴膿水出半月
其癩子自出得以生肌膏貼之取差

班貓膏 治小兒瘰癧不穴

班貓

二枚去翅足

松脂

三分巴豆

十枚去皮心以漿水
煮過與班貓研令細

雀

糞

一兩
為末

右先取松脂入鉢子內鎔化入班貓巴豆熬成膏捏作餅子熱貼在瘰癧上候穴用生肌膏貼之日再換差為度

貼散瘰癧神効方

白膠香 海螵蛸各等分 真降香用

右為細末摻患處外以水紙掩之一夜而進

班貓九 治小兒久患癰子未破者取下

班貓七枚蛤粉炒去頭足淡豉粒一錢

右為末津唾丸小豆大十歲十五九空心槲皮煎汁
下至夜取如鴨子核如未全退十日後更取之 又

方治久新癧子草烏頭末并水調塗自消已破者淨
洗先以膏藥貼瘡口後以藥塗十數次即差如小便
澁以滑石末半錢燈心湯調下

追毒班貓膏 治小兒瘰癧結核久不差

班貓二枚足及頭炒去翅巴豆二十枚水漿水煮松脂三分

右先研二味為粉次入松脂鎔化攬令勻更搗一二百杵作餅熱貼在瘰癧上藥力盡別換以差為度

蝸牛丸 治小兒瘰癧內消

蝸牛子

一百二十枚
活者去殼

薄荷末

二兩
丁香末半兩

右入乳鉢內同研為丸如菉豆大每日空心以薄荷湯下五丸晚再量兒大小加減

硇砂丸 治小兒瘰癧連綴如梅李核狀

硇砂 硚霜各一

右研如粉用糯米飯為劑撚如小麥粒大有患者即
烙破內一丸五日一換後用生肌膏

麝香散 治小兒癩癰

麝香研一
分鴿糞炒三遍
秤一兩

右件再同研如粉每服半錢酒調下日三服早晨晚
後各一量兒大小加減

治小兒癩癰結硬令內消方

膩粉半
兩鷄子
三枚取
白用

右件和調如稀麪糊以文火炒之用火筋急攬勿令
粘着鉗子候焦黑色即住入上好硃砂半兩同研如
麪每服以粥飲調下半錢五更與服良久腹疼便漏
出病根棗核之狀如未差即隔日再服之若已成瘡
者宜用後散貼之

又方

毒蛇皮三條

吳茱萸半合

右燒為散研以生油調塗之須用帛子遮藥氣不得

衝眼切須忌之

蝸牛散 治小兒瘰癧

蝸牛殼一兩 真牛乳半升

右件入銚中於慢火上熬令乳盡取蝸牛殼研如粉
入大黃末一分更研令細每服以皂莢子仁湯下半
錢大小便中利出惡物即差

又方

用皂莢子四十九枚用手指大竹筒安得皂莢子壓

在竹筒中緊塞竹筒口投在溷坑中浸四十九日取出洗淨曝乾搗羅為散每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小加減

又方

用白花蛇五兩以酥塗炙令黃焦色搗羅為散每服以粥飲調下半錢日三服量兒大小加減

又方

用白僵蚕炒搗羅為散每服以溫水調下半錢日三

服量兒大小加減

治小兒頸生瘻癰榆皮傅方

用榆白皮爛搗如泥封頸上頻易

治小兒瘻癰鉛丹塗方

用鉛丹三兩以銚子熬當有脚如黑灰取脚不計多少更研如粉用面脂調塗以故帛貼數拭患處有惡汁出拭却更貼半月差內消不作瘡極効

防風九 治小兒瘻癰結核寒熱一名連翹丸

方見患核類

皂莢刺散 治小兒瘰癧腫硬

用皂莢刺一斤於盆中燒候火盛時取牛蒡子半升撒於火中與皂莢刺都成灰為度待冷放之搗羅為散每服以井花水調下一錢日三服三五日內有惡物下如膠鶴狀下盡即永斷根

治小兒癰子寒熱

用苦瓜苗子煮汁服亦生搗絞汁服

治小兒閃癖頭髮豎黃瘰癧羸瘦

用杵林檎末以和醋傅上癥如移處就傅之

惡核附論

夫小兒惡核者是風毒氣與血氣相搏結成核生頸邊風寒所折遂不消不潰名為惡核也

方

五香散 治小兒受風熱項邊生惡核寒熱腫痛一名

五香連翹湯方見本門
毒腫類

連翹丸 治小兒無故寒熱強健如故而身體頸項結

核癰癰及心腹脅背裏有堅核不痛名為結風氣腫

連翹

桑白皮

一方用榆白皮

白頭翁

牡丹皮

防風

黃蘖

桂心

杏豉

獨活

秦艽

各一兩

海藻

右為末蜜丸如小豆大三歲兒米飲服五丸至十九

五歲已上者以意加之聖濟方無桂心名防風丸

丹參散 治小兒風熱項腋下有惡核不消大便多閉

心神煩熱

丹參

半兩露蜂房一分微炙

川升麻

半兩防風一分去蘆連翹

連翹

半兩

黃耆

半兩

川大黃

半兩

甘草

半兩炙

牛蒡子

半兩

枳

殼

三分

麸炒
黃去根

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓放溫

量兒大小分減服

元參丸 治小兒胃間積毒風氣不散連項生惡核煩

熱不已

元參

半兩

漢防已

半兩

羌活

半兩

川大黃

一兩

微炒

木香

半兩

梔

子仁

半兩

赤芍藥

半兩

連翹

三錢分

川升麻

半兩

牛蒡子

半兩

微炒

右羅為末煉蜜丸如菉豆大每服以粥飲下五丸日
三服量兒大小分減

升麻散 治小兒項生惡核壯熱不止

升麻半兩射干半兩連翹半兩屏角屑半兩川大黃半兩
朴硝半兩

右搗羅為散每服一錢水一盞煎至五分去滓放溫
量兒大小分減服之忌酒麵炙博

赤小豆散 治小兒毒風腫生惡核令內消

方見本門
癰癧類

癰氣附論

夫小兒癰氣之狀頸下皮寬內結突起壘然不消長大氣結所成也小兒啼未止因以乳飲之令氣息喘不得消散故結聚成癰也

方

木通散 治小兒癰氣咽喉腫塞妨悶

木通剉昆布洗去鹹味乾姜炮裂甜草庵隔紙炒令紫色已上各半兩
羚羊角屑 人參去頭蘆頭海藻洗去鹹味射干 檳榔

以上各
一分

右羅為末煉蜜丸如麻子大不計時候以溫酒下十

丸量兒大小加減

陳橘皮

治小兒癰氣咽喉壅塞

陳橘皮

湯洗去白穰焙去心

赤茯苓

連翹

海

藻味

洗去鹽味商陸乾者以上各半兩

上杏仁

一分

湯浸去皮尖

雙仁

炒微黃

羊

歷

三枝

黃柏

三分

右羅為末煉蜜丸如菉豆大二三歲以溫水下七九

兒大者綿裹一丸如皂莢子大不計時候含嚥津

商陸散 治小兒癰氣胷膈噎塞咽喉

商陸

一兩
微

炙昆布

一兩
洗去鹹味

牛蒡子

三分

射干

木通

剉海藻

洗去鹹味

羚羊角屑

杏仁

湯浸去皮尖

雙人

炒微黃以上各

半兩

右搗為散每服一錢水一小盞入生薑少許煎至五分去滓不計時服量兒大小分減溫服

木通散 治小兒癰氣心胷壅悶咽喉噎塞

木通 海藻 洗去鹹味 昆布 洗去沫 松羅 桂心 白欵

以上各半兩 蛤蚧 一兩 炙微黃 琥珀 三分

右羅為散每服以牛蒡子煎湯調下半錢不計時候

量兒大小加減

海藻散 治小兒癰氣腫結漸大

海藻 洗去鹹味 海帶 海蛤 昆布 去鹹味 木香 以上各半兩

金薄 三十片 羊羣 三枚 炙黃 猪羣 三枚 炙黃

右羅為散每服以溫酒調下半錢量兒大小加減日

三四服

昆布散 治小兒癟氣腫悶

昆布

洗去鹹味剉

麥門冬

去心焙

川大黃

剉炒微

陳橘

皮

湯浸去白穰

甘草

一分炙

杏仁

一分湯浸去皮

尖雙人搗炒微

黃

右搗為散每服一錢水一小盞煎至五分去滓不計時候量兒大小加減溫服

半夏散 治小兒癟氣心胃煩悶

半夏

湯浸七
遍去滑

海藻

洗去
鹹味

龍膽頭

去蘆
頭味

昆布

去鹹
味

土瓜

根 射干 小麥麪

以上各
一分

右羅為散每服以生姜酒調下半錢日三四服量兒

大小加減服

昆布丹 治小兒癧氣不散

昆布 海藻 草龍膽 甜葶苈

隔紙炒令紫
色研各一兩 檳

榔 牽牛子

炒各半兩

右搗羅細末白麪糊和丸如黍米大每服十粒人參

湯下大小加減服

治小兒癰氣咽喉噎塞

昆布

洗去鹹味海藻洗去鹹味

訶梨勒皮

木香

分川大黃

剉微炒以
上各半兩枳殼一分
微黃去穰

右羅為散末煉蜜丸如麻子大不計時候以溫酒下
七九量兒大小加減服之

又方

羚羊角屑

昆布

去鹹味桂心

木通

剉以上各半兩

川大

黃一兩剉微炒

右羅為末煉蜜丸如麻子大不計時候以粥飲下七
丸量兒大小臨時加減

又方

檳榔一兩

海藻

昆布

以上各半兩洗去鹹味

右羅為末煉蜜丸如麻子大不計時候以溫酒下七
丸量兒大小加減服之

又方

羊蜃半兩
今黃

青橘皮半兩
湯浸

去白
燒銀砂竭半

燒銀砂竭半

右羅為末用糯米飯和丸如菉豆大不計時候以溫酒下五丸量兒大小加減服之

風瘡癰癧

附論

夫小兒風瘡癰癧者由風邪客於腠理搏於榮衛傳而為熱熏散肌內溢於皮膚變生癰瘍狀如瘡乍差乍發痒不時搔之血出其痒不已故名風瘡赤疹者熱白疹者寒治法不可不察

方

蒴藋浴方 治小兒風癩瘍

蒴藋

防風

羊桃根

石南葉

秦椒

一方用
秦光

升麻

苦參

茵芋

光花

一方用
茺蔚

蒺藜

子

枳殼

一方用
枳實

礬石

各一

右咬咀以漿水三斗煮取一斗去滓內礬令小沸浴

之

治瘡毒及嬰孺風疹在皮膚不出者

用景天草生苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞取汁
以熱手摩塗之日再但是熟毒丹瘡皆可如此用之
治大人小兒風癩癰疹心煩悶方

用巴豆二兩搗破以水七升以帛染拭之

五參散 治小兒肺風癩痒癰疹癬疥

人參 紫參 白附子焙裂各二分 桔梗根 天麻各半分

兩 元參剉一兩 沙參剉三分 丹參三分

右同搗為散五十日至百日兒每服一字二百日至

一歲兒每服一字半妳汁調下二歲至三歲每服半錢煎薄荷金銀湯下或東湯調下空心午後各一服如乳母服一錢溫酒調下

麝香犀角丹 治癩瘻不差甚者如癩服之神驗

犀角屑 烏蛇肉牛兩酒浸去皮骨 天麻 白附子 白

僵蚕各半兩微炒以上各搗為細末次入硃砂 麝香 龍腦各一錢研

右件都研勻煉蜜和丸如黍米大每服十粒煎金銀

薄荷湯下

防風湯 治小兒癰瘍風痺

防風

白茯苓

去黑皮

升麻

貝母

去心

蒺藜子

炒去角

大黃

剉炒

甘草

炙剉各一分

右箋搗篩每服一錢水七分煎至四分去滓溫服食後日二服之

澤蘭湯 治丹及癰瘍入腹殺人方

澤蘭

各二

芎藭

附子

茴辛

藁本

莽草

細辛

辛

各二
十銖

右咬咀以水三升煮取一升半分四服先與此藥湯
然後作餘治

麻黃散 治小兒風癩瘡疹

麻黃一兩去根節 川升麻一兩葛根剉 射干 鷄舌香
半兩微赤剉 甘草半兩炙 石膏

右散每服一錢以水一小盞煎至五分去滓放溫量
兒大小分減服之

黃耆湯 治小兒風疹壯熱心躁

黃耆剉

白鮮皮剉

防風去蘆各一兩

枳殼去穰炒黃一兩

黃

芩

心去黑各半

甘草一分

炙各

右箒搗篩每服一錢水一小盞煎至五分去滓溫服食後臨臥各一服量兒大小分減

防風湯 治小兒癰瘍瘡疥皆宜服之

防風

一兩

鼠粘子

一兩

荆芥穗

一兩

人參

一兩

去蘆

甘草

炙

天

麻

各半

右搗羅為末每服一錢水八分入生姜薄荷各少許

煎五分去滓溫服

犀角湯 治小兒風疹壯熱心累

犀角銚升麻

麥門冬

去心
焙

蒺藜

炒去角

甘草

炙各一分

右㕮咀如麻豆大每服三錢匕水一盞煎至五分去滓食後溫服更量兒歲數加減

苜草湯 治小兒風瘡癰瘍心膈煩悶

苜草 防風 附子 牡礪

莽草

各半兩

右細剉和勻以水一斗煮取六升去滓着冷緩洗浴

避風一方無首芋名葦草湯各用一兩

廣濟療小兒疹浴湯方

柳木空中屑二升 蒴薢根切二升 鹽二合 檉木切一升

右切以水二斗煮取一斗入鹽以洗浴頻為之以差

止

竹瀝湯 治小兒壯熱癰疹已服湯九不消宜服

淡竹瀝一升 葛根汁一升 牛黃豆大三合研

右相和一歲兒服一合五六歲兒服三合至五合以

意增減之

枳實湯 治小兒風疹皮膚腫

枳實去黃兩片炒薑藥分一

右搗篩每服一錢匕水半盞煎至三分去滓入清酒半合更煎三五沸分溫二服空心午間晚後各一更量兒大小加減

石南湯 治小兒風疹皮膚腫

石南葉一握蜀椒去目及閉口者炒出汗半兩

右以水二盞取一盞半去滓下硝石白礬各半兩攪令消以綿搘塗於瘻處乾即易

治大人小兒皮膚風熱身生癰瘻

牛蒡子 浮萍

右等分為末薄荷煎湯調二錢服

治小兒風疹出不止塗傅方

景天火草是也 一兩一分慎藍三兩

右同搗細絞取汁以熱手摩塗之日再

又方

用白礬熬令汁枯研為末酒調用鷄翎掃塗疹上一方熱酒投化以馬尾搵酒塗之

治小兒風癩瘻疹瘡癟

用牛膝末酒服方寸匕漏瘡多年不差搗末傅亦主骨疽及癩疾瘰癧絕妙一方溫酒調下半錢

治小兒手足及身腫方

用小便溫暖清之良

又方

用巴豆五十枚去心皮以水三升煮取一升以綿內
湯中拭病上隨手消并治癰瘍又以大戟煎湯淋三
五偏風毒癰瘍即消

治小兒患癰瘍入腹體腫強而舌乾方

用蕪菁子為末酒服方寸匕日三

又方

用瘀沙三升以水三升煮去滓洗之良亦治丹毒

又方

用車前子為末粉之良

又方

用鹽湯洗了以蓼子按傅之

治瘻疹方

用白芷針刺燒存性為末溫酒調下二錢又以根葉

煮汁洗之

治風疹亦治風熱皮膚瘡癢因而生瘡方

用赤石脂不拘多少研細每服二錢荆芥茶調下食後荆芥酒調亦得如氣實用蜜水調亦妙

治癩痒成瘡方

用殼蠶炒黃末酒調服立差

療丹癰疹方

用酪和鹽熟煮以摩之手下消

療五野鷄病小兒患赤疹方

用鯿搗碎傅之

治大人小兒風疹方

用茱萸一升以酒五升煮取一升帛染拭之

治腫毒遊風風疹頭痛方

用芭蕉根并署傅又治丹毒煎汁塗之

土沙散 治小兒風疹進退腫痒

用土砂當歸等分為末冷酒調下一錢兼用塗之又

慎火草生姜及鹽同研擦痒處消

又方

用石灰水醋調塗即消

治小兒風癩癰瘍心中悶亂

右川芒硝二兩以清酒三大盞煎至二盞放溫洗痒處候燥復洗之痒差乃止避風

又方

用虎脂摩之即愈

五香枳實湯 治小兒着風熱痞癟堅如麻豆粒瘡痒搔之皮剥汁出或偏身頭面年年常發者

青木香

九銖

麝香

六銖

漏蘆

各半兩

升麻

半兩

黃芩

白斂

鷄舌香

薰陸香

沉香

防風

秦艽

麻黃

各一兩

枳實

一兩

大黃

一兩

八銖

右咬咀以水五升煮取一升八合兒五六歲者一服
四五合七八歲者一服六合十歲至十四五者加大
黃半兩足水為一斗煮取二升半分三服之

枳實丸 治小兒病風癩痒痛如疥搔之汁出偏身瘡
癰如麻豆粒年年喜發面目虛肥手足乾枯毛髮細

黃及肌膚不光澤鼻氣不利此則少時熱盛解體當
風風熱相搏所得也不早治之成大風疾

枳實

一兩

菊花

蛇床子

防風

蒺藜子

白薇

浮萍

各一兩

天雄

麻黃

漏蘆

各半兩

右為末蜜和丸如大豆許五歲兒米飲服十九加至二
十九日二五歲已上者隨意加之兒大者可為散服
治小兒風疹走帶方

姜黃

荆芥

黃連

土硃

赤小豆

爛石膏

分等

右為末撲之

二聖散 治癰瘍肌肉青黑

胡粉一
兩 苦參一
兩

右為細末每服一錢溫酒下薰塗患處

消毒飲 如麻風身或熱不熱遍身紅疹如此者是麻
風宜朱砂雄黃等分為末井水調塗後服藥

牛蒡子

炒六
兩

荆芥穗一

兩

防風

甘草

炙一
兩半

升麻

各一
兩半

右咬咀水煎食後溫服

又方

用土硃砂酒服并搽之

普濟方卷四百五

欽定四庫全書

普濟方卷四百六

明 周王朱橚 撰

嬰孩諸瘡腫毒門

五色丹毒附論

夫丹之為候由熱毒之氣搏於榮血而風乘之所以赤乳肌肉而為之走注也外因乳母食啖熱毒物藥及烘衣不候冷便與兒服而得之其證或發於手足或生於頭面脣脛令兒煩悶腹脹其熱如火痛不可言赤腫遊

赤偏體也湯氏所為丹有十五種又有赤遊風及熛瘡
本事方以十種治之然丹不特色赤或青或黃或白或
黑是血熱風毒有盛有衰挾冷挾熱故其色變易又不
同焉要之諸瘡皆屬於心心為血之主血為熱之媒古
人以丹命名蓋謂心應火色尚赤揣本揆元大槩心家
血熱所致風以動之於是遊赤而遍體也蔓衍而不歇
則爛肌自四肢而入腹入腎則殺人惟初生於胃腹然
後流散於四肢者易愈夫小兒五色丹者由丹發而

變改無常或青黃白黑赤此是風毒之熱有盛有衰或
冷或熱故發為五色丹也赤丹者由風毒之重故使赤
也初發疹起大如連錢小者如麻豆肉上生粟色如鷄
冠故謂之赤丹亦名茱萸丹也白丹者由夾風冷之氣
故使色白也初發痒痛微虛腫如吹妳起不痛不赤而
白也黑丹者由風冷傷於肌肉故令色黑也初發痒痛
或嫖腫起微黑色者是也丹發於肉中有赤如丹色大
者如手劇者遍身赤痒故號天火丹丹發於兩脇及腋

下此謂之殃火丹也。丹發兩膀上過一日便赤謂之神火丹也。丹發赤斑如梅子遍背腹謂之野火丹也。丹初發着兩頰兩腋下兩膀上謂之家火丹也。丹發如灼在脇下正赤初從頭起而多痛謂之蠢火丹也。朱田火丹由丹發於背漸至遍身一日一夜而成瘡謂之朱田火丹者是也。丹發兩膀裏尻間正赤流至陰頭赤腫血出謂之天竈火丹也。丹發從足趺起正赤謂之廢竈火丹也。丹發膝上從兩股起及臍間走入陰頭謂之尿竈火

丹也有肌肉虛者為風毒熱氣所乘熱毒搏於血氣則皮膚赤而腫起其風隨氣行遊不定故名赤遊腫也

凡患諸丹瘤腫毒必須先服升麻飲之類導氣藥以散其毒方可用藥調塗不然恐毒氣入腹則殺人也 凡

小兒丹瘤乳腫毒赤走引遍身者乃邪熱之毒在表以磁片撇出紫血其病立愈如不愈者後用京膈散加大黃芒硝利三五行為效次用拔毒散掃三五度必愈矣經曰丹煉赤瘤火之色也相火主之 凡小兒有赤瘤暴

腫可用牛黃通膈丸瀉之後用陽起石散傅之則腫毒自消如不消可用銚針砭刺血出而愈矣銚風熱發丹古方謂小兒得之最忌以其氣血未定肌膚柔脆無以勝悍毒故也是以諸丹不同其發無定處俗又謂之溜走經絡散發肌表如塗丹之赤有法可鍊洩去毒氣不爾則毒入腹近心則死但初發於心頭者不可鍊爾

方

藍青散 治丹毒大赤腫身壯熱百治不差

寒水石

十六銖

石膏

十三銖

藍青

十二銖用乾者

犀角

八銖冬

柴

胡銖

知母

十銖

羚羊角

六銖

杏仁

八銖

芍藥

各七銖

黃芩

梔子

二銖

竹瀝

一升

生葛汁

四合澄清

蜜

右㕮咀以水五升并竹瀝煮取三升三合去滓內杏仁脂合蜜汁微火煎取二升一二歲兒服二合大者量加之米飲化下

搗湯 治小兒數種丹方

大黃 甘草 當歸 芎芢 白芷 獨活 黃

芩 芍藥 升麻 沉香 青木香 木蘭皮各

芒硝

兩

右咬咀以水一斗二升煮取四升去滓內芒硝以綿搗揚中適寒溫搗之乾則易取差止

藍葉散 治諸丹發熱赤腫

白芷 柴胡 知母 杏仁去川芎 赤芍藥

生地黃 川升麻 生甘草各一分 乾葛一分 爛石膏

梔子仁各半分 藍葉日乾一分

右剉細每一錢半新水煎服熟甚加黃芩玄參煎服
藍青散 治一切丹毒赤腫身熱如火已服諸藥不退
由風熱毒氣在於腠理熱毒搏血蒸發於外其皮上
熱而赤如丹塗之狀故謂之丹若久不治則肌肉壞
爛若毒氣入腹則殺人也今以一方同療之

藍青 知母 甘草 桔子

各半兩

黃芩

一兩

杏仁

去皮

尖用牛兩

升麻

柴胡

寒水石

石膏

各二兩

赤芍藥

錢
羚羊角四

右㕮咀每服三錢水一盞煎六分三次溫服

升麻膏 治小兒一切丹發無常處體熱如火燒

川升麻 川大黃 景天草 蛇銜 梔子仁

寒水石 川芒硝 藍葉 生地黃 芭蕉根

羚羊角屑 楤桐皮各半

右細剉以竹瀝浸一宿明日漉出却入鑄中用臘月
猪脂一斤於慢火上熬一食久承熱以綿濾去滓候
冷成膏以甕合盛旋取摩之兼以膏如東核大以竹

瀝調服之

升麻膏 治小兒赤毒腫

川升麻 白斂 漏蘆 川芒硝各二兩 黃芩 积

殼 連翹 蛇御各二兩半 桔子仁二兩 蒴薢二兩

右細剉以猪脂一斤入於鑄中以慢火煎諸藥令赤色去滓放冷以甕合盛旋取塗之

麻黃湯 治小兒丹毒風腫及風疹

麻黃一兩半 獨活 射干 甘草 桂心 青木香

石膏 黃芩

各一
兩

右咬咀以水四升煮取一升三歲兒分為四服日再

升麻黃芩湯 治小兒月內發丹一名藍葉散

升麻

黃芩

去黑

犀角

銹大黃

剉柴胡去苗

山梔子

仁

各半
兩

石膏

三分甘草

炙剉一
分

藍葉合

切二
合

右搗篩每服二錢匕水一盞煎至半盞去滓食後分溫二服更量大小加減外臺秘要用竹瀝四合同煎

治小兒惡毒丹及風疹

麻黃 升麻 葛根各一 射干 鷄舌香 甘草

各半
石膏半
合

右咬咀以水三升煮取一升三歲兒分三服日三
治小兒大腹痞滿丹毒寒熱

取郎耶根莖煮服之

治小兒衝惡熱毒煩悶及諸熱丹毒

以生銀水磨服功勝紫雪忌生血

內托散

紅內消 當歸 茄片 甘草節 巷活 黃芩

各半兩
麝香半錢

右為末每服二錢茄蒂煎湯調下或生地黃亦可

金花散 治一切丹毒

鬱金 黃芩 甘草 山梔 大黃 糯米 黃

連

右各一兩生為末蜜和冷水調以鵝毛上患處

淋洗方

防風 桑白皮 黃菊花 丹參 莳草 荆芥
棗木根等分

右剉煎水避風浴之

大黃散 治小兒一切丹遍身赤痛

川大黃半兩剉微炒 防風半兩去蘆 川升麻一分去苗 黃芩一錢分三 黃柏三分

一分去根節

秦艽一分去苗 川朴硝三分

右搗羅為散每服一錢以水一盞煎至五分去滓放溫不計時候量兒大小分減服之

防已散 治丹腫候熱毒之氣極與血相搏而風乘之
故赤腫及遊走遍體者又名赤遊風入腹入腎則殺
人也

漢防已半朴硝 犀角 黃芩 黃耆 川升麻
各半錢

右咬咀每服半錢水一盞加竹葉煎去滓大小以意
加減服之一方加川芎蜜煎

升麻飲 治一切丹遍身壯熱煩渴赤流初發甚者一

名消毒散

升麻 黃芩 大黃各一 麥門冬去心葛根 朴硝

各三
錢研

右為細末和勻熟水調下半錢一方煎服無葛根量
兒大小加減

黃芩湯 治小兒丹毒偏身

黃芩去黑心 麻黃去根節 泰光去苗土 升麻各二兩 大黃炒剉

防風去蘆各半兩

右搗節每一錢匕水七分煎至四分下朴硝末半錢
匕去滓空心分溫二服晚再服更量兒大小加減

寄生散 治毒腫甚者

桑寄生 獨活 川大黃各一兩 甘草

草各半兩

右搗羅為末每服一錢煎五分去滓溫服量兒大小
加減

升麻膏 治小兒赤丹初發肉色如硃色如鷄冠又名

茱萸丹

川升麻 白欵 漏蘆 川芒硝各一連翹 桔

子各半
兩

右剉細以猪脂半斤入鑄中用慢火煎諸藥令赤色去滓放冷以磁合盛旋取每用少許塗患處

升麻湯 治小兒黑丹以此藥搗之

升麻散

二兩 漏蘆

二兩 川芒硝

二兩 黃芩

三兩 楢子仁

一兩 蒴

瞿半
兩

右細剉和勻每用三兩以水五升煎至三升去滓微溫以軟帛旋蘸搗病上以消為度

牛黃散 退丹毒

龍膽金 甘草炙桔梗 天花粉 葛粉

右等分為細末每服一錢薄荷湯入蜜調下

淋洗方

防風 桑白皮 黃菊花 丹參 莪草

右等分加荆芥煎湯浴患處

黃耆湯 治小兒丹毒

黃耆

剉

疾梨子

炒去角

黃芩

去黑心

大黃

剉

甘草

炙剉

各一

分

右搗篩每一錢七水七分煎至四分下朴硝末半錢
七去滓食前分溫二服更量兒大小加減

吳藍湯搗方 治小兒發丹毒熱痛

吳藍

大黃

槐白皮

商陸

榆皮

各二

右細剉每用二兩以水五升煎至四升去滓入朴硝

半兩攬勻以綿二片浸於湯中更旋搗丹上日三五度即差

祛毒膏 治小兒丹黑色痒痛腫起一名祛毒散

川升麻 漏蘆 芒硝各二兩 黃芩一兩 柴子一兩

右為籠末每用兩匙頭以水三盞煎至二盞去滓微熱以軟帛旋蘸搗瘡上以消為度

治小兒五色丹

川大黃 黃芩 川芒硝 梔子仁 乾藍葉

商陸各一
兩

右羅為散以水調塗之立効

治小兒天竈火丹

薺葉三
分赤小豆一
合鍛鑪門上灰一
兩青羊脂三
兩
白
蜜

二莖
切

右相和搗如膏摩之燥再摩之

拔毒散 治小兒丹毒肉色變異或着四肢或在脣背
遊走不定焮熱疼痛拔毒消腫散熱痛

石膏三兩 甘草一兩 黃藥各一兩

寒水石七兩

右為細末每用水調服時以鷄翎刷掃以芭蕉汁調尤妙

朱黛散 治解丹熱諸毒

青黛一兩 土硃各半分 軟滑石一錢 荆芥穗各半分

右為末每一錢半蜜水調下兼與撲身

寒水石散 治角癰遊走不定焮然赤腫疼痛用藥角

歸手足上為妙

寒水石 石膏 黃連 黃柏 各一兩

右為末水調刷

治小兒野竈丹從膝起蕁葉塗方

乾蕁葉 末 香薷 末 赤小豆 末 各半兩 生蒴蘿蔔莖 一握 細剉

右細研蒴蘿蔔入諸藥末和調如糊塗乾即易之以差
為度

治小兒天竈火丹發尻間正赤流陰頭赤腫血出蕁葉

疮塗方

葱

五莖和項切碎

薺莞

五莖生者和梗切研

赤小豆

末

竈門上灰

研各

合一

右合研勻細以青羊脂三兩調勻塗之以差為度
治小兒天火丹發徧身赤如絳色痒痛甚者

桑根白皮

二兩

丹參

二兩

甘菊

一兩

莽草

一兩

右細剉和勻每二兩以水三升煎至二升去滓令緩

避風浴兒

棗根湯 治小兒五色丹徧身宜用洗浴丹發而變改

無常

棗木根四兩
丹參三兩
乾菊花二兩
半

右細剉煎湯避風冷處浴之次敷藥每用二兩以水
五升去滓

丹毒至効散 治小兒一切丹毒及龍帶發作先服消
毒飲次用傅之

黃丹一錢
朴硝一錢
赤小豆兩頭尖者
為末半合

右研令勻井水調以鷄毛刷立効

麻黃散 治小兒丹若入腹及下部陰卵百藥不差

麻黃去根節 升麻各半兩 硝石研一兩

右搗羅為散每服半錢匕井花水調下空心日晚各

一

三黃散 貼一切丹腫毒

大黃 黃蘖 宣連各等分

右為末猿猪膽汁調塗頭心及貼脚心

又方

用硝石白麪等分研勻井水調稀睡時塗脚心効

硝石散 治小兒丹發如灼其初從額起至脇下大痛

者名蠻火丹

硝石
兩醉寒水石
分赤小豆
合

右搗羅為細末每用半錢以冷水調塗患處一方用

猪脂

莽草散 治小兒丹發從足趺起色正赤乃名癩竈火

丹

莽草 寒水石 硝石

各半兩

右搗羅為散每用以新汲水調塗患處一方每服半錢一日三服量兒大小加減服之

慎火草散 治小兒一切丹通用

慎火草

半兩紫葛半兩硝石半兩

右搗羅為散用冷水調塗之乾即再塗以差為度

治小兒黑丹

茺蔚子 蛇唧草 慎火草

各二兩

右搗令爛以鷄子白調塗之

治小兒天竈火丹

細辛一兩糯米一兩景天草三兩

右搗如泥塗丹上差

白玉散 治赤遊丹毒

白玉一兩寒水石二兩

右為末米醋調傅貼患處或腫至外腎有破處只用

水調亦可

保嬰方

無白玉用白土如乾上用水鷄翎掃之

治小兒天竈火丹病從髀間起其小兒未滿百日犯行

路竈君若熟流下令陰頭赤腫血出方

鯽魚肉剉五合赤小豆末三合

右二味同搗少水和傅之良

姜礬散 治小兒火丹并一切風疹赤腫

生姜五兩切片子白礬二兩半研同上調少時自乾不見火

右為末生姜自然汁調鵝毛拂之又方牽牛末薄荷
蜜水調下食後大便利是効

治小兒丹瘤

綿羊腦子生用朴硝

右調勻貼於瘤上

備急治白丹

苧麻根三斤連葉赤小豆四升

右以水三斗煮浴日三四遍浸洗妙看冷熱避風

甘草散 治小兒丹毒防入腹

甘草炙剉一
分為末油麻半斤

右先取油麻去皮研細絞取汁一合調甘草末半錢

七服日再服

青藍汁 治小兒丹毒

青藍汁一竹瀝二

右和勻空心溫服一合日晚再服以差為度

鯽魚塗方 治小兒丹毒偏身絳色

生鯽魚

一頭
三兩

麻油

二兩

右搗魚令細入油研勻塗丹上日三五度即差

梓木灰塗方 治小兒家火丹發如大指日長一寸偏着兩脇傍兩頰上

梓木白皮

蓼葉各一
分

右燒灰研末以鷄子白調如糊塗之以差為度

梓木灰塗方 治小兒烟火丹從身起

猪槽下泥

一
合
生
兩
油

右和調如糊塗之以差為度

癩塗方 治小兒地竈丹從陰下起入踝骨上

廢竈博末屋四角茅燒灰各一兩

右和研勻細以新水調如糊塗丹乾即易之以差為度

戎鹽塗方 治小兒鬼火丹發兩臂赤起如李子及從

面上起

戎鹽分附子一枚

右燒過研細用雄鷄血調塗丹上日三五遍以差為度一方用雄黃半兩

雄黃塗方 治小兒野火丹發偏身斑如梅李狀

雌黃 戎鹽研各一兩

右以鷄子白調塗丹上日三五次以差為度一方有

雄黃無雌黃

猪通灰塗方 治小兒白丹

猪屎灰 雞子白

右調和如糊塗之以差為度

茅灰塗方 治小兒火丹從踝及胫起

茅草屋四角者
取燒研灰 鷄子白

右和調如糊塗之以差為度

拔毒散 治小兒發丹生於兩脅及腋下乃名殃火丹

川朴硝一兩 楔子仁一

右羅為末每用半錢好醋調塗患處

山梔膏 治丹發生於兩脅及腋下乃名殃火丹

山梔子四兩
生鯽魚半斤

右藥同搗如泥每用少許看丹發處以醋化塗患處
竹葉散 治小兒丹發斑斑如梅子偏背腹乃名野火
丹

青竹葉二兩
燒灰竈中黃土一兩

右細研為散看丹發處每用少許以鷄子白調塗患
處

赤豆散 治小兒丹發於兩膀裏尻間正赤流至陰處

乃名天灶火丹

赤小豆一分研 伏龍肝一分研

右再同研勻每用一錢以鷄子白調塗患處

二根湯 治小兒丹發膝上從兩股至臍間走入陰處
乃名尿灶火丹

桑根白皮 李子根各四兩

右細剉每用三匙頭以水兩碗煎至一碗去滓者冷
熱避風處淋患處

硝石散 治小兒一切丹癯身體熱

硝石一
兩 乳香一
分

右細研為散以鷄子白調塗之

又方

太陰玄精一
兩 白礬一
兩

右細研為散以調塗之

治小兒白丹方

酸母草 五葉草 各五
兩

右搗絞取汁塗之

治小兒黑丹

風花石灰二兩屋四角茅草三兩
燒灰

右細研為散以鷄子白調塗之日三五度効

治小兒天火丹發徧身赤如絳色

虎脂二兩黃丹一兩

右研為膏塗之即差

治小兒鬼火丹

景天草

五兩蛇頭草

右搗如泥以鷄血調塗之

治小兒野火丹

白僵蚕

二七慎火草

一兩

右搗令爛塗之

治小兒螢火丹

竈中黃土

一合生油

二合

右調如泥時用塗之以差為度若痛至陰不治即殺

人

治小兒癩竈火丹

赤小豆

末一兩

牛角

二兩燒灰

右細研為散用鷄子白調如泥塗之

治赤遊毒腫

用花藍石散生姜薄荷自然汁調鷄毛刷上患處此方尤妙於前白玉散行在潘術幹傳尤妙於前方只一晝夜消盡

治小兒丹毒及火丹熱如火燎腰者

用搗馬齒莧一握取汁飲之以滓傅其上亦可

又方

用煎大豆汁塗之良差後亦無瘢痕

又方

用臘月豬脂和金下土傅乾則易

治小兒五色丹方

用猪槽下爛泥傅之乾則易

又方

服黃龍湯二合并傅患處佳

治小兒赤丹方

用蓼葉搗取汁服三合滓傅上良手金翼以蓼葉

末用鷄子白和塗

治小兒赤丹斑駁者方

用唾和胡粉從外向內傅之一方粉熬過

又方

用鍛鐵屎以豬脂和傅之

又方

用屋塵以臘月豬脂和傅之

治小兒火丹赤如朱走皮中方

用醋和豉研傅之

又方

用鯉魚血傅之良

又方

用荳子搗傅之良亦治天火丹

又方

用猪米水和絞取汁溫服少許良

治小兒天火毒肉中有赤如丹色大者如手甚者遍身
或痛或痒腫方

用赤小豆二升為末鷄子白和如薄泥傅之乾則易
便差一切並用此方皆瘥一方用五合水和取汁飲
一合取滓塗五心一方水調搗毛拂上大妙又有鷄

冠丹大者如豆粒肉上生粟一名茱萸火療同前天

火法

治小兒骨火毒其瘡見骨方

用搗大小蒜厚封之着足踝者是也

治小兒殃火丹毒着兩脇及腋下者方

用伏龍肝為末油和傅之乾則易若入腹及陰以慎

火草取汁服之

治小兒尿竈丹從兩股起及臍間走入陰頭皆色赤

用切桑白皮二升以水二升煮取汁浴之良

又方

用燒李根為灰以田中流水和之良一方半斤

治小兒朱丹火丹病一日一夜即成瘡先從背起漸至

偏身如豆棗大正赤色者亦治茱萸丹五色丹

用濃者棗根汁洗之已成瘡者赤小豆末傅之未成

瘡者鷄子白和小豆末以傅之凡方中用鷄子者皆

取先破者用之完者無力

治小兒癩竈火丹初從足趺起正赤色者

用棗根煮汁沐浴五六度

治小兒丹毒

用白豆末水和傅之勿令乾

黃皮散 治小兒偏身火丹并赤遊

用黃皮山梔子等分為細末雪水調塗即差又方菉
豆大黃為末薄荷墨水調塗又方藍澣塗之并藍青

汁飲之

獨効散 治小兒諸丹毒并赤遊腫

用柏枝研細塗立効又塗白礬汁頻刷之即消又方
以芒硝泡湯拭之亦効

治小兒丹毒腫痛如火

用土蜂窠為末入麝香少許蜜調塗之水調與喫尤
妙

治小兒丹毒入腹即殺人

用水苔生地黃生菘菜豆葉蒴蘿浮萍護火草五葉

簾苦硝海藻菜黃芩大黃梔子黃芩但得一味研末水

調傅之良

治小兒熟丹瘡成片及治大人

用糸茅草葉破即愈

治小兒丹瘤

用草麻子五箇去皮研如麪以水一匙調塗之甚妙

又方

用木蠻子新者去殼研如泥淡醋調傅之一日三五

次便効

治急救丹毒方

用白扁豆末水和塗若入心腹者以慎火草取汁一
盞服乾即末之水調服

本事方 治小兒十種丹瘤腫毒所起形候

一飛竈丹從頂起腫光用葱白研自然汁塗

二吉竈丹從頭上紅腫痛用赤小豆末鷄子清調

塗

三鬼火丹從面上起赤腫用竈心土末雞子清調塗

四天火丹從背起赤點丹桑白皮末羊脂塗

五天竈丹從兩臂赤腫黃色用柳木燒灰水調塗

六水丹從兩脇虛腫用生鐵末猪糞調塗

七胡吹丹從臍上起黃腫用檳榔末米醋塗

八野火丹從兩脚赤腫用乳香末羊脂調塗

九烟火丹從兩角有赤白點猪槽下土清油調塗

十胡漏丹從陰上起黃腫用屋漏處土羊脂調塗
右此十種丹毒變易非輕治之或緩終不能救余不
惜是方逐一子細辨認依方法治之萬不失一如經
三日不治攻入臟腑則終不可救治之也

治丹瘤方

用大黃朴硝大土蜂窠三味為末箇箠子箠定真赤
處將刀子刺破令出惡血然後用井水調塗赤處効

又方

用茅屋上經年青苔焙乾為末醋調塗赤腫處消

治小兒瘤初發

用麻子擂為漿并水調下

治小兒丹瘤

服托裏散消毒飲外用白芨白斂研為細末搽無病
肉上而截之令不得過却用紫浮萍爛研傅瘤上萬
不失一

治大人小兒纏蛇丹初發便用

用蚯蚓糞連皮生姜研爛傅即愈亦治火丹以水和泥傅之米醋調亦可

又方

用大黃為末搗爛馬齒莧取汁調塗已成丹亦治

又方

用蓼葉燒灰鷄子清和數數塗之

又方

用桃仁湯浸去皮爛搗塗之又清油調白礬末亦妙

治小兒風丹疹

用蜜調赤土硃入酒一二滴服之亦研塗疹上

治諸丹

用人參羌活散惺惺散夾和用竹葉煎湯調下熟證
加黃芩玄參冷證加黃耆白芷

踈風解毒散 治丹毒傅方

用紫浮萍一碗活地龍中等者七條同研細傅之

又方

用水藻搗傅

又方

用芭蕉根用汁傅之

又方

用蚕沙一升井水煎溫和密室洗之亦治天竺火丹

治青白丹毒痒痛虛腫如吹

用龜中黃土一分豉半分為末麻油調傅患處

蜞針法

用水蜞數條以青苔蓋覆或溫紙亦可去血即消未
消再用癰毒滿身偏黑入腹入陰難治

平血飲 治風熱積毒聚成發於頭面手足熱者如胭
脂色其熱如火輕輕着手痛不可忍

右加紫草與犀角消毒飲相間煎服赤癰丹火癰紫
萍癰並治壯熱煩渴甚加黃芩麥門冬去心朴硝各
半錢一方與敗毒散和生姜薄荷蟬蠅去足翼防風
去蘆細切煎渴加天花粉少許

治角癰

用青黛土硃為末并水調入蜜敷角亦可

又方

用黃丹不拘多少磨刀水調刷

治丹毒腫如火

用大黃朴硝為末調塗腫處立効水苔生地黃葛根菜
浮萍梔子皆可研爛水調傅

洗方

用防風醋車前赤豆竈心土煎水洗

又方

洗角後用小驚九壓邪大驚九鎮驚

治丹發疼痛

用搗篤竹汁服一日一兩服立差若未差再服之

治赤白遊疹及癰腫毒腫

用水蛭十餘枚令啗病處取皮皺肉白無不差也冬月無蛭地中掘取暖水中養之令動洗去人皮醣

以竹筒盛蛭綴之須臾便咬血滿自脫更用飢者崔
知悌令兩京預養之以防緩急收乾蛭當展其身令
長腹中有子者去之此物難死雖加火炙亦如魚子
烟薰三年得水猶活也

治小兒赤遊行於體上下至心即死方

用芒硝內湯中取濃汁以拭上又方以水調塗之治
一切丹毒流腫

治小兒丹毒破作瘡黃水出亦治惡瘡

用豉炒令烟絕為末油調傅之

治小兒丹毒

用柳葉一斤水一斗煮三升去滓搗洗赤處日七八度

治小兒赤丹不止

用番黃米粉鷄子白和傅之

治丹者惡毒之瘡五色無常

用蜜和乾薑末傅之良

治丹火毒偏身腫不可忍亦治赤流

用蘚蘿草搗絞取汁或搗傅上隨手消

治小兒熱毒遊腫

用故麻鞋草鞋和人亂髮燒作灰醋和傅之

治火丹毒

用梔子和水調傅之一方用醋和塗之亦治神火丹
治五色丹俗名遊腫若犯多致死不可輕之

用敗蒲席燒灰和鷄子白傅之

治小兒赤遊行於體上下至心即死

用水中苔搗末傅上良

治暴熱小兒丹毒寒熱腹內熱結

用搗積雪草絞汁服之

治小兒丹毒皮膚熱赤

用寒水石半兩白土等分搗羅為末用米醋調傅之

愈

治白丹

用取白堯末猪脂和傅之

治小兒丹毒從臍起方

用伏龍肝是年深竈下黃土研為末用屋漏水和如糊傅患處乾即易以差為度用新汲水調亦得一方用鷄子白相和塗良

治天竈火丹風熱赤遊腫

用豬脂塗

治小兒赤遊行於體上下至心即死

用蒴蘚煎汁洗之方搏葉傅之治丹毒五色者

治小兒油丹赤腫

用蕎麥麪醋和傅之良

療螢火丹從頭起

用慎火草搗和苦酒塗之

療煙火丹發從背起或兩脅及兩足赤如火

用景天草即慎火草真珠末一兩搗和如泥塗之

治小兒赤遊行於體上下至心即死

用慎火草生一握搗絞汁以拭之搗上日十遍夜三四遍

治小兒赤丹不止

用胡荽汁傅之差

療竈丹從兩脚赤如火遶

用五加葉根燒灰五兩取鋸鐵家槽中水和塗之

五色丹名油腫不可輕

用牛屎傅之乾則易

治赤丹

用研粟米傅之

治熱遊毒赤腫

用枯棲末二大兩釀醋調塗之

治小兒丹毒

用青黛和水服之又以汁傅之熱則易

治小兒遊瘤丹毒諸惡瘡腫

用爛搗剪刀草莖葉如泥傅之又以此草膏化如糊

以鷄翎掃上腫便消殊効根煮熟未甚乾時人作果
子常食無毒

治小兒丹毒熱

用旋覆花根苗搗絞汁服之

治小兒風熱丹毒瘡

用水甘草同煎飲服之

又方

用桔梗菜傅之

治小兒火焰丹消赤腫

用老鴉眼睛草根與木通胡菜煎湯服通利小便

治小兒丹

用杵黃芩末水調傅之

香欒皮散 治諸腫丹毒發於四肢腹背頭面或赤或白或痒或痛或寒或熱

用香欒皮一兩水一大碗同煎取半碗以翎毛刷患

處効

蟾蜍散 治丹走行皮中浸廣者入腹殺人用蟾蜍乾者碾末油調塗之以差為度

泥醋塗方 治小兒胡吹竈丹從陰下起

用磨刀水棚下泥和醋調膏塗之乾即更塗以差為度

鐵槽水洗方 治小兒飛竈丹從項起

用浸槽中水日三五度又方飲一合治熱毒遊腫

大骨灰塗方 治小兒神火丹從項起

用犬枯骨為末以青羊脂調如糊塗之日三五次

治白丹鐵挑方

右於兒男左女右大胸脂面螺文上以鐵挑有筋斷之差

羊脂塗方 治小兒殃火丹從兩脅下起青黑色

用鍛鐵下槽中鐵屎搗研為末半兩羊脂二兩猪糞燒灰一兩同研如糊塗之以差為度

治小兒患赤白遊疹

用蝦蟆搗碎傅之煮熟色正赤小兒及鷄狗食之脚屈不行

治一切丹毒

用梔子大黃蜜水搗傅

治小兒一切丹癉身體熱

用浮萍草研如泥傅之

又方

用韭畦中土以水調塗之

又方

用粟米水煮濃汁洗之

又方

用地龍煮以水研如泥塗之

治小兒一切丹及諸腫毒

用鼠粘子根洗去苗搗絞取汁每半合量兒大小分

減服之

治小兒一切丹

用水苔搗爛頻頻傅之

又方

用景天草爛搗傅之一方取汁先微揩丹上後塗以
差為度

治小兒丹發惡毒五色無常

用青粟毬有刺者搗碎以水煮洗之

治小兒五色丹偏身熱如火燒違腰即損人

用雲薹子一兩以酒一小盞細研取汁塗之

治小兒火焰丹消赤腫

用老鴉眼睛草葉入醋細研傅

治小兒白丹

用蘭香葉搗爛塗之

又方

用蓼葉搗爛塗之

又方

用枳上塵以醋和塗之

用鹿角燒灰細研猪脂和塗之

治小兒面身卒得赤丹或痒或腫起不速療之即殺人
用羖羊角屑八兩以水五升煎至一升絹瀘去滓入
煉了豬膏五兩和令勻傅之

治小兒赤丹

用葛勒蔓輕磨破以醋研訶梨勒塗之妙

治小兒黑丹

用青羊脂熟摩日三五度用之

又方

用喂猪杓子炙令熱熨之

治小兒天火丹發偏身赤如絳色

用鬼木搗絞汁塗赤處

又方

用小兒埋胞衣瓶子中水二合時時與兒服及塗身

上有毒處効

治小兒殃火丹生於脇腋下方

用川朴硝細研為散每服以竹瀝調下半錢量兒大
小加減服

又方

用伏龍肝細研以生油調塗之一方鷄子白和傅

又方

用浮萍草絞取汁時時與兒服之

治小兒神火丹

用鯽魚半斤赤小豆屑三合搗如泥塗丹上唯數塗
為良

治小兒朱田火丹

用鷄子白塗之

治小兒天竈火丹

用車前子末水調塗之

又方

用鐵落末以餳和如膏塗之

治小兒尿竈火丹

用屋四角茅燒灰細研為散以鷄子白調塗之

澤蘭湯 治丹入腹

方見本門風
癰瘍疔類

治天行煩毒小兒寒熱丹毒

用鹽或青布水漬取汁飲之

拔毒膏 治小兒赤毒腫及腮頰腫痛

黃柏一兩寒水石一兩石膏半兩甘草二錢半黃芩兩

右為細末醋調成膏貼赤腫處或用新水調搽亦可

葛根白术散 治一切赤白丹腫毒

白术

一錢
半

木香

一錢
半

芍藥

一錢
半

甘草

茯苓

三錢
去皮

葛根

三錢
錢

右㕮咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候量兒大小增減

土黃散 治赤流丹毒可用一小鋸刀蹠去赤暈惡血

毒汁次用此藥

土硝

一錢
西

大黃

細末
一錢

右二味相合新水調攬勻用鷄毛蘸時時塗掃

解肌散 治火丹

赤芍藥

二錢牛

甘草

二錢乾葛

麻黃

去節一錢

黃芩

一錢川

升麻

二錢

右咬咀每服半錢桃柳條各七寸水六分盞同煎溫
服如發熱氣壅宜先用虎睛丸麥煎散

人參散 治赤遊丹

人參

三錢蟬退十五分去足

芍藥

二錢

防風

三錢

當歸

二錢

粉草

二全蝎十錢去毒
三茯苓三錢紅花三錢

右咬咀每服用燈心薄荷生地黃同煎

當歸散 治一切風丹火疹

赤芍藥二當歸一地黃一紫草二錢
麻黃一錢去節羌活

一錢桂皮一錢甘草二錢

右為末每服一錢薄荷葉同煎

塗角藥

赤小豆 白藥子 天花粉 槐花 滑石 黃

皮拍寒水石等

右為末用生赤芍藥地黃鴉節雪草搗汁塗患處即散

治丹毒未見面目或不當處不可角退

牡礪 青黛 豆粉等分

右為末用生地黃汁塗角調傅患處

又方

赤小豆 赤芍藥等

右為末用鷄子清生地黃藕汁調塗傅患處

治小兒赤遊行體上下至心即死

以生景天草搗傅瘡上

治白遊赤遊

以死蠶塗之白遊用白死蠶塗赤遊用赤死蠶塗



普濟方卷四百六